



Bacchanelli.
e

1558.

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
598/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
598/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
598/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
598/A

598/A

Axxix Bac






2A (21) 19860

Chlorophyll

104
2/04



19860 234.
IOANNIS

BACCHANELLI

REGIENSIS,

De consensu Medicorum in curan-
dis morbis libri quatuor.

EIVSDEM PRAETEREA ACCES-
sit de consensu Medicorum in co-
gnoscendis simplicibus,

Liber vnus,

*Cum dictionum precipuarum Indice
locupletissimo.*



LVGDVNI,

Apud Sebastianum de Honoratis.

1558. 50

*AVTHORES, QVORVM
consensus hoc libro producitur.*

Hippocrates	Auicennas
Plato	Auerrhois
Aristoteles	Razes
Galenus	Serapio
Aetius	Haly abbas
Paulus Aegineta	Azaraius
Alexander Tral.	Nicolaus Florētinus
Cornelius Celsus	Conciliator
Oribasius	Mesues
Dioscorides	Gordonius
Theophrastus	Michael Sauonarola
Theophilus	Marcus Catinarius
Plinius	Arculanus
Philaretus	Gulielm ^o Placētinus
Platearius	Ioannes Manardus.

3

IOANNES

BACCHANELLVS

*Excellentiss. Medico Ioan-
ni Scutellario S.*



ERTVM est mi doctis-
sime Ioannes, quòd olim
elegeram quædam Me-
dicorū dogmata, ad me-
dendi normam satis (meo iudicio)
opportuna, tum vt inde labili memo-
riæ, quandoque aliis in rebus occu-
pata, succurrerem, cū etiam vt il-
lis satisfacerem, qui nō nisi authori-
tatibus, etiam si mille rationes pro-
batissimæ adducerentur, acquiesce-
re nolunt. Certè, vt ingenuè fatear,
quod ex mea inuentione non pote-
ram, vt Græcè loquar, συλλεξαµεν
γὰρ πολλὰς ἑ παλαιῶν ἐκείνων βίβλοις
ἀνδρῶν, ἐν μέσσω τέτρω ἑµαυτὸν ἰδρύσα, ac
flores varios veluti ex pratis rele-

gens, ita effeci, vt quod prima nauigatione non poteram, πρὸς τὸ δέυτερον πλοῦν me contulerim ac expediuerim. Sed opus adeò vtile ac gratum esse non potest, vt tuo excellenti ingenio possit satisfacere: quanquam (ni fallor) nihil in eo dictum vel excogitatum est, quod authoritate non comprobetur, quod planum non sit, quod nō remediis fultum, quod breuitatem etiam non amplectatur: in quo multa vno intuitu visuntur ac comprobantur, quæ sicco pede fortè intacta dimitterentur. Non aude-rem tamen (quod exoptulas) vt formis excusum istud opus in publicum prodiret: ne mihi nouo homini, & vix intra proprios lares cognito, id mihi vitij daretur, quòd plura voluerim amplecti & exprimere, quæ semidocto cuius homini nota ac vulgata sunt, & ita trita ac explosa, vt vix de illis mentio fieri debeat.

Urget

5
Urget tamen me tua quotidie hu-
manitas, & potissimis præcipuè ra-
tionibus adhortatur, vt illud iam
iam in lucem pariam, & alios iue-
nes huiusce mei laboris participes
efficiam. Certè vereor ego, si tuæ
voluntati obtemperare voluero, ne
velut inter olores anser primùm ob-
streperere videar. Et quum plurimi
nominis apud te sim, ne deinceps de
me id fiat, vt est apud Theocritum,
quòd τῶσδε ἔχει λάδας ὅσδε πόκα θα-
σέα φαντὶ Εὐ δία λαοθῆμεν εὐπωλοῦμαι
ἀειάδνας. Nosti enim (ita varia sunt
hominum ingenia) quod vni placere
solet, multis non placere posse. Nec
te præterit, quòd in diuino illo Pla-
tone confusionem criminantur, in
Aristotele tenebrosam obscurita-
tem, in Plinio turbulentam quādam
congeriem, in Paulo Aegineta mi-
ram breuitatem, in Auicenna etiam
nuper emendato quandā nominum

barbariem, in Galeno nimiam pro-
 lixitate, & ad praxim non desyde-
 ratum ordinem, in aliis confusionem
 potius, quàm compositionem: qui-
 dum Latini videri non possunt, in-
 terdum ita loquuntur, vt vix à pau-
 cis quid velint intelligantur. Quid
 dicam de Hippocrate, qui modò lau-
 datur, modò à Galeno damnatur ac
 reprehenditur? Hunc deinde Auer-
 rhois pluribus in locis, alioqui do-
 ctissimum, etiam redarguit. Postre-
 mò Thessalus omnium placita me-
 dicorum renuit ac confutat, adeò vt
 nihil sit in scientiis ab omni parte
 beatum. Quare si vera hæc tibi esse
 videntur: existimare poteris, pauxil-
 la hæc mea, quæ nec nomine digna
 sunt, si in lucem exierint, quo tan-
 dem appulerint ac peruenerint, vt
 τιμιώτερα, sicut dici solet, πολὺν ἢ γρα-
 φησαμένῳ τὰ χαρτία εἰσὶ. Verùm si his
 rationibus acquiescere nolueris, ecce
 mitto

mitto tibi librum, vt tuo arbitrato
 eo vtaris ac abutaris:expunge ac re-
 seca quod est superfluum:quod verò
 deficit,adiunge:fac vt lubet,modò id
 intelligas animi nostri pignus apud
 te esse,& tenax nostri amoris in-
 timi quoddam vinculum.

Vale,& vt facis,me ama,

Ex ædibus nostris.ꝯ.

Calendas Maij,

Anno 1550.

2 4



IOANNIS
BACCHANELLI

Regiensis, De consensu Me-
dicorum in curan-
dis morbis,

LIB. I.

Quid sit Medicina.

MEDICINA, est scientia corporis
humani sanitatem reficiens vel
conseruans. vel, Medicina est ad-
iectio & ablatio. vel, Medicina
est scientia sanitatis conseruatrici, morbo-
rumque repultricis. vel, Medicina est, quæ
sanis victus rationem præscribit, & ægro-
tos curat: Quæ definitiones, veræ non sunt
medicinæ: non enim hæc ipsa efficit, sed ex
illis quæ efficit hæc proueniunt, idque non
semper. Quare Medicina erit scientia sa-
lubrium, insalubrium & neutrorum.

*Loci consentientes ex vera
Medicina.*

Galen. 11. Meth. cap. 12. Medicina appo-
fitio est & detractio, deficientium quidem
apposi

appositio, redundantium detractio. Et hæc intelliguntur de prima, secunda & tertia descriptione. De quarta loquitur Gale. lib. finitionum med. in principio. Sed quod hæc non sint veræ definitiones, ex sequentibus locis monstratur. Gal. in lib. de sectis, ad eos qui introducuntur, Propositum artis medicæ est sanitas, finis verò eius adeptio. Quibus autem quis absentem sanitatem recuperet, vel præsentem cõseruet medicis cognoscere est necessariũ. Porro quæ absentẽ sanitatem restituunt, curationes & auxilia vocantur: quæ præsentem cõseruant, salubris victus est ratio. Quod si ita est, medicina igitur non erit cõseruans vel reficiens, sed salubrium, insalubriũ & neutrorum scientia. Quod probatur ex Gal. 1. art. med. cap. 2. Auic. Medicina est scientia, qua humani corporis dispositiones noscuntur ex parte qua sanantur, vel ab ea remouentur, vt habita sanitas conferuetur, & amissa recuperetur. Si scientia est, qua noscuntur humani corporis dispositiones, id igitur nõ erit, quod adiicit vel aufert, quod reficit vel cõseruat, nec quod ægros ad sanitatem perducit.

Quot sint partes Medicinæ.

Partes Medicinæ sunt quinque. Prima est φυσικὴ, id est, rerum naturæ contem-

platio. Secunda est αἰτιολογικὴ ἢ παθολογικὴ, id est, causarum & affectuum consideratio. Tertia est ὑγιεινὴ, sanitatis tuendæ ratio. Quarta est σημειωτικὴ, id est, signorum observatio. Quinta est διαπραγματικὴ, id est, medendi modus. Physiologica naturam hominis cōsiderat, & elementa quibus componitur: & generationem eius, & partes corporis tam intrinsecas quàm extrinsecas. αἰτιολογικὴ vniuscuiusque morbi causas & effectus inquirat. ὑγιεινὴ sanitatem tuetur, præcauendo ne corpora in morbos incidant, & vbi inciderint, ad sanitatem reducit. σημειωτικὴ signorum notitiam, præteritorum cognitionem, præsentium inspectionem, & futurorum præfagia nobis declarat. διαπραγματικὴ tres in partes diuisa est, vnā, quæ victu curat, alterā quæ medicamentis, tertiam quæ manum ad-mouet.

*Loci consentientes de naturæ
contemplatione.*

Gal. lib. de constit. art. med. cap. 13. φυσιο-
λογικὴ non est inter minimas naturalis con-
templationis partes recensenda, imò opus
erit medicū in ea esse probè exercitatū. E
primo de elem. Naturalis scientia corpo-
ra quæ generantur ac intereunt, quæ quæ
pror

prorsus sunt exposita trasmutationi, contemplatur: quibus deinde ablati pariter & medicina tollitur. Primum quidem ob id, quod ea sit quasi generationis & interitus ministra. Et Meth. tertio cap. quarto. Nihil posse medicum, inquit, de vlla similariū partiū agitare sine naturali scientia. Et tertio Meth. capi. 7. In eiusmodi sermonis nostri decursu perspicuum planè fit, tum ægri naturam esse cōsiderandam, tum cuiusque hominis esse propriam curationem, &c. Et in lib. quod optimus sit medicus & physicus. Hæc ars docet corporis nosse naturam, tum eam quæ ex primis constat elementis, tum quæ constat ex secundis. De ceteris medicinæ partibus deinceps suis locis loquemur.

Quid sit Natura.

Natura philosophicè sumpta, est quæ deorum, hominum, syderum, plurimorumque corporum essentiam, potentiam, viresque complectitur.

Natura humana, est temperies, vel quædam facultas, qua animal regitur.

Loci consentientes de Natura philosophica.

Plato loquens de natura deorum, vim quandam esse dixit rationis atque ordinis participem, cuius solertiam, inquit Cice-

ro de natura deorum, nulla ars, nulla manus, nemo opifex consequi potest imitando. Galen. libr. finit. medic. de mente Platonis, Natura est vis, quæ ex seipsa mouetur, auctor formationis, generationis & perfectionis. Aristo. sec. physic. Natura est principium motus & quietis in quo est primò & per se.

Loci consentientes de Natura humana.

Galen. tert. de temper. & secun. Aphorif. comment. 34. Natura humana nihil aliud est, quàm ex primis quatuor elementis conflata temperies, vel facultas quædam vniuersi corporis reatrix. Et quin. de Sympto. cau. in principio. Natura est omnis illa facultas, qua animal regitur, siue illa pendeat à voluntatis nostræ imperio, siue secus. Et sext. de Sympt. cau. cap. prim. Natura est aggregatio omnium virtutum, quæ totum corpus regit. Et lib. fini. medi. Nam est spiritus calidus, qui ex sese pro semina rij rationibus mouetur, ac certis temporibus homines generat, perficit & conseruat.

Quot modis accipitur Natura.

Accipitur Natura quadrifariam: primò pro facultate naturali, secundò pro consuetudine, tertio pro temperie & cõpositione naturali, quartò pro naturali calore.

Loci

Loci consentientes ex vera Medicina.

Quòd pro naturali facultate natura accipiat, hi sequentes loci attestantur. Galen. quinto de Sympto. cau. capit. 2. Nam si morbus facultatem vicerit, id est naturam membrum haudquaquam poterit transferre: si superior manserit facultas, id est natura, nihil eam impediet. Et paulò inferius, Natura facultates attollit & sustinet, id est, natura hoc efficit. Et quarto de vic. in mor. ac. Scire oportet naturam haudquaquam quiescere, sed interdum contentos humores ita aggredi, ut à bonis eos separet, &c. id est, Naturam esse facultatē qua boni humores retinentur, & pravi reiiciuntur. Pro secundo, de consuetudine. Galen. 2. de temper. Cōsuetudo est natura acquisita. & Hippocr. lib. de Aëre & aqua: item Auerrhois pri. phy. & Arist. in prædicamentis. Consuetudo est altera natura. Pro tertio, de temperie: Galen. 2. de temper. Hæc in nostra regione, quæ utique est temperata, subiectarum partium naturā prodit, id est, temperiem demonstrat. Nam temperaturas iuxta regiones ibi considerat. & Avicen. Humor & natura mutant animam, id est, humor & temperies. Pro compositione sic, & intelligitur de natura medicinarum. Unde citatur poeta in libr. de natura humana

ita

ita loquens,

Sic ait à Maia genitas, medicamen & offert

Euulsum terra, naturamque edocet eius.

Id est, compositionem eius explanat. Pro quarto, de naturali colore, Galen. libr. de tre. & pal. capit. 6. Natura & anima nihil aliud quàm calidum est, quod semper mobile est. Distinguit autem naturam ab ipsa anima primò de potentiis naturalib⁹, dum dicit. Et motor in corpore aut est natura aut anima. Hic pro' calido intellige calorem innatum, qui teste Galen. aphor. pri. commet. 15. est facultatis nos gubernantis robur, & omnium naturalium operum causa.

Quid est elementum.

Elementum philosophicè sumptum ita describitur, Elementum dicitur id ex quo quidpiam primò componitur, & est in eo, indiuisibileque existit specie in aliam speciem. Medicè sic, Elementum est minima rei particula cuius est elementum.

Loci consentientes de elemento philosophico.

Aristo. 5. Meth. tex. 4. στοιχείων λέγεται ὅτι ὁ σὺγκνιται πρῶτον ἐν ἀρχῇ αἰδιότατος τῷ εἶδός αὐτοῦ ἴσην εἶδος. Similiter secundo de generatione à principio, & tertio cæli, & de sensu & sensato tex. 20.

Loci

*Loci consentientes de elemento
Medico.*

Galen. 8. de Plac. Hippoc. & Plat. Nominatur utique elementum, quodcunque minima sit pars illius rei, cuius fuerit elementum. Similis sententia est prim. elementorum cap. prim. item primo elementorum ad medium. Si elementum sit minima & simplicissima rei particula, atque hoc si sensu metiri oporteat, profectò os & similia omnia erunt humanorum corporum elementa. Et Auic. pri. cau. cap. 3. Elementa sunt corpora, & sunt primæ partes humani corporis & aliorum, quæ in partes diuersarum formarum diuidi minimè possunt. Intellige quatuor elementa sub ratione elementi hîc definiri: nam dixit, sunt corpora, ut primam materiam, facultates, & id genus alia excluderet. Dixit primæ partes, ut nequis de humoribus membrisque simplicibus, ut caro, os, &c. quæ in componendo non sunt, prima intelligeret. Cætera in descriptione sunt nota.

Quæ sunt elementa?

Vniuersalia elementa sunt quatuor à prima materia, ut Ignis, Aqua, Terra, Aer. Particularia erunt duo membra simplicia
&

& humores.

*Loci consentientes de vniuersali
elemento & de particulari.*

Aristo. secundo de generatione probat per quatuor qualitates, esse quatuor elementa. Nam sicut sunt quatuor qualitates, vt calida, frigida, humida, sicca: ita erunt quatuor coniugationes, vt calidum cum humido, vnde aër: calidum cum sicco, vnde ignis: frigidum cum humido, vnde aqua: frigidum cum sicco, vnde terra. Probat etiam hæc esse quatuor per binas essentielles formas elementorum, quæ sunt grauitas & leuitas. Auicen. & Auer. similiter iisdem argumentis hoc probant. De particularibus elementis Galenus secundo elementorum, Hominis verò propria elementa sunt ipse particule minimæ, quæ similes appellantur: de quibus (inquit) paulò post in dissectionum pertractationibus sermo erit. Et secundo element. in primo, Sanguis enim pituita & vtraque bilis sunt non modò generationis hominum, sed cæterorum animalium sanguine præditorum elementa. Probatur etiam tali ratione: Id esse elementum dicitur, quod est principium omnium corporis particularum: sed sanguis cum aliis humoribus in utero matris est huiusmodi

modi. Igitur sanguis & cæteri humores
erunt elementa.

*Authores erronei dissentientes cir-
ca elementa.*

- 1 Adserere, elementa esse vnum, vt pleri-
que philosophi.
- 2 Adserere, quas qualitates in summo in
elementis dari.
- 3 Adserere, idem esse principium & ele-
mentum.
- 4 Adserere, elementorum doctrinam esse
medico inutilem ac superfluam.

*Confutatio dissentientium ex
vera Medicina.*

Confutat eos Galenus primo de elemen-
tis. Si vnum est, vel erit patibile, vel im-
patibile: non patibile, quia vnum quate-
nus vnum, non habet in quod transmuta-
ri, vel à quo pati possit: non impatibile,
quia tunc id alteratione & sensu careret;
igitur plura quàm vnū. Aristo. primo phys.
cōtra hos inquit. Quicumque ens vnum ef-
se pronuntiant, naturalis philosophiæ prin-
cipia tollunt: quum maximè in physica con-
templentur corpora, quæ generantur & in-
tereunt, & transmutationi sunt exposita,
quæ si auferantur, tum medicina tollitur.
Ad secundum Aristotel. secundo de gene-

b

ratione inquit, Quòd ignis est magis calidus, quàm siccus: aër magis humidus, quàm calidus. Igitur duæ qualitates non sunt in summo in elementis.

Obiectio.

Quomodo dicis hoc? nã Galenus quem tantopere sequeris, dari has qualitates in summo docet primo elementorum?

Responsio.

Quòd in igne sit summus calor & summa siccitas, verum est, vt Galenus asserit, si modò intellexeris, in superlatiuo gradu has qualitates reponi non debere, sed quòd sint duæ qualitates in summo, id est, simplices & sine vlla admixtione. Ad tertium, Galen. prim. de elementis, Principia sunt eiusdem generis cum iis quorũ sunt principia: sed elementa non sunt huiusmodi: igitur sunt diuersa. Quòd principia sint eiusdem generis, probatur ab ipso: nam simplex qualitas ita qualitatis compositæ, sicut simplex corpus corporis compositi est principium. Differunt etiam, quia elementum dicitur de causa materiali intrinseca: at principium de causa finali & efficiente extrinseca, vt Aristot. 12. Meth. Quòd verò elementum dicatur de causa materiali, probatur ex Aristot. 8. Meta. dum inquit, Elementum

tum est materia, cuius est elementum.

Ad quartum: Quòd hæc doctrina elementorum non sit inutilis, neque superflua, probatur à Galeno primo de elementis, tribus mediis. Primo, quia omne quod nostris corporibus offertur, non impermixtum est, sed cum altero semper mixtum: Secundo, quia omnibus elementis, vt aqua, aëre, terra, igne, semper vtimur: Tertio, quia hæc qualitates possunt omnem substantiam transmutare, vnde fit, vt si quid in qualitatibus modum excesserit, comprimi indigeat, & si quid defluit, restituatur: igitur nec inutilis, vel superflua. De elementorum utilitate lege vberius Auicennam capit. de elementis.

*De temperaturis, & primo
de earum descriptione.*

Temperies, quæ à Græcis *ὑγῆαι* dicuntur, duplices sunt, quarum altera qualitas est, quæ ex elementorum qualitatibus conficitur. Altera quæ ex mixtorum etiam inuicem actione & passione resultat.

*Loci consentientes ex vera
Medicina.*

De vtraque loquutus est Auicen. pri. pri. capit. de complexionibus. Complexio est qualitas, quæ ex actione & passione diuersarum qualitatum in elementis inuētarum

b 2

prouenit, quorum partes ad tantam paruitatem sunt redactæ, vt plurimum cuiusque earum, plurimum alterius contingat. Ad si dicat, Temperies est quoddam aggregatum, nō ex actione & passione mixtorum, sed ex qualitatibus elementorum, vt res naturales & corporeas excludere. Nam dictum est etiam alibi ab ipso, quod ex primis elementorum qualitatibus remissis, quædam media qualitas constituitur, quæ corporis mixti est propria qualitas. Vide fusius de his Arist. quart. Meth.

Quot sunt Temperature.

Nouem sunt temperaturæ, octo inæquales, & vna æqualis: vnde inæqualium quatuor sunt simplices, vt calida, frigida, humida, & sicca: quatuor ex his compositæ, vt calida & humida, calida & sicca, frigida & humida, frigida & sicca. Æqualis est, qua corpus incolume cum moderatione quadam seruatur.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Quod nouem sint, probatur ex Auicenn. prim. pri. capit. de complex. Tum, inquit, postquam de complexione temperatura diximus, ad loquendum de distemperatis redeamus. Igitur datur temperata complexio. Quod verò distemperatæ sint octo, paulò inferius dicta resumens, inquit, Vnaquæque

queque autem harum octo complexionum
ut est cum materia, aut sine materia, &c.
Galen. prim. de temper. cap. pri. Vnum igitur
& primum id est, quod temperatam na-
turam dicimus, quæ tamen non virtute mo-
dò, sed etiam viribus reliquis præstat. Et
pri. de tēper. probat etiā quod de ista tem-
perata natura, tali ratione, Caliditas stat
cum excellenti siccitate & cum excellenti
humiditate, igitur cum medio inter eas, &
sic datur natura media contra philosophos.
Quod verò sint nouem temperature, proba-
tur rursus ex Gal. pri. de temper. cap. 8. dum
inquit. Etsi quidem hæc sic se habent, sicut
certè se habent, cur nouem dicere vniuer-
sas temperamentorum differentias dubite-
mus, temperatam quidem vnā, non tem-
peratas octo? Quarum quatuor simplices
sint, calida, frigida, humida, sicca: qua-
tuor compositæ, vt calida, humida, &c.
Quid verò sit temperies æqualis, Gal. pri.
de temper. capi. 6. Aequalis siue temperata
ea est, quæ ex contrariis æqua prorsus inter
se portione coeuntibus constat.

*Auithores erronei dissidentes
circa temperamenta.*

1 Adserere cum antiquis, non esse nisi
quatuor temperamentorū coniungatio-
nes, duas humidas, & duas siccas, atq; has

b 3

- à calore & frigore diuifas.
- 2 Adferere cum Auerrhoiftis, fimplices non dari temperaturas.
 - 3 Adferere, temperatam naturam effe calidam & humidam.
 - 4 Adferere, humiditatem non poffe cum abundanti calore confiftere, aut ficcitatem cum vehementi frigore.
 - 5 Adferere, temperiem & mixtionem effe idem.

Confutatio diffidentium ex vera Medicina.

Confutant antiquorum opiniones loci fuperiùs citati de nouem temperaturis ex Auicen. & Gale. Confutat etiam eos Galenus 1. de temper. cap. 3. inquiens, quòd antiqui, quò de fanitatis tuendæ victu inueftigant, calidius iufto corpus iubent refrigerare, vt omne exuberans æquæt. Sed quomodo (inquit) hoc fieri poteft, nifi tēperatam quandam naturam conftituant, ad quam funt intenti? Quam fi conftituerint, tunc erunt quinque & non quatuor, &c.

Ad fecundum: Auerrhois fui finet verbis vincitur, quum tertio colliget, fpecies octo morborum enumerat: inter quas quatuor fimplices reponit. Erunt igitur per ipfum quatuor fimplices à compositis feparatæ. Gal. 1. de temper. c. 8. hanc etiam opinionem

imp

improbat hoc modo, Concedis alterā esse temperiem humidā & calidam, & alteram ficcā & calidam: si non erit, igitur necesse ficcā esse, quæ calida est, quoniam & eam esse humidam licet: tunc igitur eam esse mediam licebit, & sic calida tantū. Quod etiam de frigida & de aliis similiter est ratiocinandum. Igitur quatuor erunt simplices temperaturæ.

Ad tertium: Hipp. 3. Epidimiōn, Si totus, inquit, annus calidus & humidus fuerit, tunc necesse est quod magna succedat pestilentia: igitur quod erit calidum & humidum, non erit temperatum. Præterea Gal. 1. de temper. cap. 4. ad hoc probandū tali utitur ratiocinio. Quod est putredini aptum, id est pessimum temperamentum: sed natura calida & humida est putredini apta: igitur erit pessima. unde optimā esse concludit temperiem, quæ in quatuor qualitatū mixtionis æqualitate consistit.

Ad quartum: Impugnat Gal. 1. de tempē. & omnis schola medicorum, nec non & ipsa experiētia: nam aqua ex calore fervēti humida manet. Verūnnum calida magis vel humida dicatur, ab eo quod in mixtura pollet (inquit Galenus) appellatio sumitur, ut si maior erit portio humiditatis, quàm caliditatis, humida dicetur, &c.

Ad quintum: lege Arist. 2. de gener. cap. de mixtione, vbi omnes dicunt temperiem esse mixtionem, sed non extra. Item mixtio significat motum, vnde complexio provenit, & fit idem: non sunt, &c.

Quot modis dicatur aliquid esse calidum vel frigidum.

Bifariam calidum dici potest, absolute, & sic omnes qualitates absoluto sermone inveniuntur in elementis. Aut per collationem, & sic trifariam: aut per collationem ad medium: siue ad pondus, siue ad iustitiam, aut ad seipsum, aut ad extraneum medium. Ad iustitiam rursus duplici modo sumitur, scilicet secundum genus, ut animal in genere animalis dicitur calidum; vel secundum speciem, ut homo in specie hominis est temperatus. Calidum etiam dupliciter intelligitur, energia, quum id sit actu; vel potestate, quum id nondum sit, sed id fieri facile possit.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Galen. 1. de temper. cap. 6. Calidum dicitur per collationem: vel per absolutum sermonem, & hoc simpliciter; vel per mixtionem: vel secundum genus, vel secundum speciem, ut Animal in genere animalis est calidum: secundum speciem, ut bos, leo, can

anis. Vnde medium temperie in toto genere animalium homo est, mediū temperie in hominum specie est, quem Græci εὐπατον, id est, bene temperatum vocant, &c. Quod verò detur temperies ad iustitiam, in hoc capite ad finem ita inquit Galenus, Temperies ad iustitiam est, quæ eo quod pro dignitate conuenit, æqualitatem explorat. Auicennas latius de his omnibus pertractat cap. de complexionibus.

Demembrorum temperaturis.

Calidiora in corpore membra vicissim se comitantia sunt spiritus, cor, sanguis, hepar, caro, muscoli, splen, renes, tunice arteriarum, venarumque, & cutis.

Frigidiora sunt, pituita, pili, os, cartilago, ligamentum, tendones, membranæ, nerui, nuca, cerebrum, adeps, pinguedo.

Humidiora sunt, pituita, sanguis, adeps, pinguedo, cerebrum, nuca, caro mamillaris, testiumque, pulmo, hepar, renes, muscoli, cutis.

Sicciora sunt, pili, os, cartilago, ligamentum, tendones, membranæ, arteriæ, venæ, nerui motrices, cor, nerui sensus.

Loci consentientes ex vera

Medicina.

Galenus i. de temper. cap. vlti. Cor, tum natura, tum omnium animalis particula

rum maxime sanguineum, tum vero calidissimum, proximum illi iecur. Et sic ibi de singularum partium temperie membratim pertractat. Auicen. pri. pri. cap. 2. de complex. hæc diffusius enarrat.

De notis temperaturarum in genere.

Cognoscuntur temperaturæ ex habitu totius corporis, ex operationibus, ex regione, ex colore, ex tactu ratione, & ex ætatibus.

Loci consentientes ex vera

Medicina.

Galen. 2. de temper. cap. 4. Pinguiores omnes sunt frigidi, sicut mari fœmina: siquidem adeps ex habitu frigiditate gignitur. Corpulenti calidiores, quia carnis abundantia à multa sanguinis abundantia oritur. Mediocritas vero, quæ inter hæc reperitur, temperatæ naturæ est nota. Et sic ex habitu totius corporis cognoscuntur temperamenta. Auicen. prima primi, cap. de complexio. inuestigat etiam ipse notas temperamentorum, ibi, Fœminæ frigidiores secundum diuersitatem, &c.

Ex operationibus sic; Gale. 2. de temper. cap. 6. At ubi varia partium temperies est, ex vna earum pronunciare de toto corpore non licet, sed adeundæ singulæ sunt, æstimandūq; quo temperamento ventriculus

us, quo pulmo, quo cerebrum, ac reliqua-
um per se vnaquæque seorsum sit: atque
 hæc ex functionibus, &c. & i. temperatura-
um cap. 6. Optimè se habere aliquid pro
 sua natura ex ipsis functionibus intelligen-
 tur, quippe animal & stirpem optimè se
 habere dicimus, quum optimè suam fun-
 ctionem obeunt: igitur ex operationibus
 temperies agnoscitur.

Ex regione, Gal. 2. de temper. cap. 6. Pen-
 sitandus & continentium partium affectus
 est, quarum omniū extrema cutis est. Sed
 corporis temperies in his regionibus, quæ
 à temperie recesserunt, inæqualis visitur,
 externis scilicet, & internis partibus non
 ad eundem modum, se habentibus. Gal-
 lis enim & Germanis, & omni Thracio &
 Scythico generi frigida & humida cutis
 est: ideòque etiam mollis, alba, & pilis nu-
 da. Aethiopibus verò & Arabibus, qui ad
 meridiem incolūt: nam cutis ex ambi-
 æstu, & naturali calore foras acta, vsta, du-
 ra, sicca, nigra redditur, toto corpore natu-
 ralis quidem caloris exiguam obtinente
 portionem, sed alieno atque ascititio inca-
 lescente. Hoc etiam probatur ex Auicenna
 cap. allegato, ibi, Septentrionales sunt hu-
 midiores, & similiter nautæ, &c.

Ex colore: Gal. de tuenda sanitate, Succo-

rum

rum corporis color est certissima nota: nā rubeus, croceus, luteus, ac pallidus caliditatem demōstrant: liuēs, plumbeus, albus, frigiditatem. Aetius ser. 1. cap. de viribus simpl. Amplius verò nihilo magis ex coloribus conicere possumus de iisdem: in singulis enim coloribus inueniuntur & calida, & frigida, & sicca, & humida, & c.

Ex tactus ratione: Galenus secundo de temper. cap. 3. Ergo calidi frigidique corporis solus tactus est iudex: humidi & sicci vna cum tactu ratio, & c. Et 2. de temper. capite secundo, Calidum quod in ætatibus cognoscere cupimus, primū & maximè tactu iudicemus.

De notis temperatura optima.

Temperaturæ optimæ signa sunt, quum corpus neq; densum, neq; rarum, neque durum, neq; molle, neq; hirsutum, neque glabrum, sed medio quodam modo se habeat. De temperamēto calido, frigido, humido, sicco, in particulari non me extēdam, neq; de singulis partibus corporis loquendo. Nam Gal. in arte med. cap. 52. & Aet. ser. 4. cap. 77. & Paul. Aegi. libro secundo, capite 63. vsque ad 73. Notato tamen quòd non ex temperie vnius particulæ tantum est pronuntiandum de toto corpore, sed singulæ partes per se considerandæ sunt.

Loci

*Loci consentientes ex vera
Medicina.*

Gal. 1. de temper. cap. 9. Quod omnium extremorum, calidi scilicet, frigidi, humidi, sicci medium est, quod in duritiæ molitiæq; medio statu consistit, id corpus erit temperatum. Et in lib. de opt. corp. const. cap. 4. Porro corpus etiam quod conspicuè neque densum, neque rarum, neq; durum, neq; molle, &c. optimè temperatū est, &c. Vide etiam de his Aetium serm. 4. cap. 59. diffusius loquentem.

De ætatum temperaturis, & de earum descriptione.

Ætas siue αἰς, est spatium, in quo animal crescit, stat, decrescit, & manifestè declinat. Et diuiditur in quatuor partes, in adolescentiam, quæ est calida & humida: in iuuentutem, quæ est calida & sicca: in senectutem, quæ est frigida & sicca: & in vltimum senium, quod est frigidum & humidum.

*Loci consentientes ex vera
Medicina.*

Quòd ita describatur ætas, habes ex Alberto Magno in lib. de senectute & iuuentute, dum inquit, Ætas est spatium temporis in viuentē derelictum, in quo virtus vitæ secundum omnem suæ operationis mod

modum perficitur. Galen. 4. de salub. diet. textu 7. Aetatum temperamenta sunt quatuor, humida & calida puerorum, ficca & calida adutorum, ficca & frigida eorum qui in aetate inclinata sunt, humida & frigida senum. Et Auicen. prima primi, cap. 3. de complexio. aetatum, Aetates omnes sunt quatuor, aetas adolescentiae quae durat usque ad trigessimum annum: aetas consistendi, quae durat usque ad 40. aetas minuendi, quum virtus non amittitur, quae est usque ad 60. annum: & aetas minuendi, quum manifesta virtutis imbecillitas est, quae durat usque ad finem vitae.

Obiectio.

Plures videntur esse aetates quam quatuor, siquidem Auicennas octo, Galenus & Hippocrates plures etiam enumerant.

Responsio.

Aetates in genere sunt quatuor, sed in specie plures. Nam Hippocrates, teste Galeno, aphor. 3. apho. 26. mentionem facit de recens natis puerulis: deinde de illis qui dē-tire incipiūt: deinceps de his qui mediam aetatem habent, quae ad duodecimum & tertiumdecimum annum progreditur, & est aetas proxima pubertati. Nam pubertatis tempus incipit post quartūdecimum annum, & durat usque ad vigesimumquin-

tum

im, teste Gal. comment. aphor. 7. Adole-
 sentia igitur comprehendit sub se infan-
 tiam, pueritiam & pubertatem. Sic iuuen-
 us ac senectus alias ætates sub se habent,
 quæ tandem ad capita redacta, in genere
 sunt quatuor. Possent etiam reduci ad duo
 capita ut philosophi, ad perfectum scilicet
 & defectum: vel ad trinam diuisionem, si
 his addam statum: sed nos ad quaternam
 diuisionem ætates reduximus, eò quòd tem-
 peramenta sunt quatuor.

Authores erronei dissentientes circa ætates.

- 1 Adserere, ætatem per quandam qualita-
 tem describi debere, & non per quanti-
 tatem.
- 2 Adserere, senium esse frigidum & hu-
 midum simpliciter.
- 3 Adserere, ætates posse præfiniri.
- 4 Adserere, in ætatibus fundari tempe-
 raturas, seu dicere, ætates temperatas vel
 distemperatas absque ullius subiecti in-
 telligentia.
- 5 Adserere, ætatū doctrinam esse inutilē.

Confutatio dissent. ex vera Medicina.

Quòd non per qualitatem, probatur ra-
 tione: quia interrogatus, quotannis es, re-
 spōdetur per numerū, ut biennis, triennis,
 quæ est quantitas discreta, non qualitas.
 Prætereà ætas nihil aliud est, quàm distan-
 tia

tia à primordio vitæ vsque ad finem , quæ
distantia quâritate, non qualitate determi-
natur. Hanc tamen dico non esse veram de-
finitionem, sed quandam descriptionem
necessitate datam. Nam quod loco generis
ponitur, non conuenit rei descriptæ.

Ad secundum: Gal. 2. de temperamentis
cap. 2. Senum, inquit, temperies est frigi-
dissima & siccissima, non autem humida.
Quod probatur tali ratione ab ipso: Om-
ne id siccum dicitur, quod nutrimentum
intra se trahere non potest. Senum autem
temperies ob excrementa superflua nutri-
mentum intra se trahere non potest. Igitur
senum temperies erit sicca. Pro exemplo
sint arbores: nam quoties senescunt, ma-
gis exiccantur. Et Auic. prima primi cap.
de complex. aratum inquit, Senes & decre-
piti præter hoc, quod sunt frigidiores, ad-
huc etiam sunt sicciores.

Obiectio.

Dictum est superius ex Galeno tempe-
riem senum esse frigidam & humidam.
Quomodo nunc probas esse siccam?

Responsio.

Galenus nō iuxta propriam opinionem
loquutus est, sed id de mente aliorum dis-
seruisse voluit, sicuti vberius per totum il-
lud commentum demonstratur.

Ad

Ad tertium: Gal. 3. prognosticorum comment. 28. Ob id igitur Hippocrates quoque, inquit, trigesium commemorat, sæpe etiam trigesium quintum, quia aliæ aliis accidunt mutationes: fieri non potest, ut una mensura firma, ac cunctis promiscua finiatur.

Ad quartum: Gal. 2. de tempera. cap. 2. Intelligamus, inquit, recens formatum animal in utero matris, quo sciamus, qua ratione humidissimum, calidissimumque sit. Nam prima eius constitutio ex semine & sanguine est, quæ humidæ & calidæ res sunt: igitur hic de complexionem subiecti, non autem de ipsa ætate calida & humida loquitur. Dicitur enim ætas calida & humida, prout est in corpore calido & humido. Posset probari hoc ex mille locis, sed tantum hic locus ad probandum sat sit.

Ad quintum: Gal. 2. de temper. cap. 2. Verum quum ad ea, quæ nunc sunt proposita, magis urgeat ætatem consideratio, quæ etiam maximam nobis ad causarum inventionem facultatem suggerit: huic nunc insistamus, &c. Ex quibus verbis doctrinam ætatem non inutilem esse nobis demonstrat.

Obiectio.

Quos putas esse calidiores, puerulos an iuvenes?

C

Responsio.

In calore tria considerantur, quantitas scilicet natiuæ humiditatis & sanguinis influentis: qualitas, id est ipsa caliditas, & fomes ipsius caliditatis, quæ est caloris essentia. Dico igitur, si iuxta humiditatem natiuam quantitas caloris consideretur, quòd pueruli sunt iuuenibus calidiores: at si iuxta sanguinem influentem, quòd iuuenes sunt puerulis calidiores, quia sanguine magis abundant. Sic etiã Gal. 3. de temper. cap. 4. considerat in calore qualitatem & substantiam, quem legere poteris. Aduerte tamen has diuisiones, quoniam omne dubium remouere circa hæc poteris.

De Humorum definitione & diuisione.

Quoniam humores ex primis elementis orti, sunt causa generationis & corruptionis hominum, idcirco duplicẽ etiam definitionem sortiuntur, vniuersalem scilicet & particularem. Vniuersaliter sic, Humores sunt corpora, quæ ex prima ciborum mixtione generantur. Particulariter sic, Humor est corpus humidum currẽs, quod ad membra conuertitur. Generantur humores ex alimento, quod ab innato calore alteratur.

Loci

*Loci consentientes ex vera
Medicina.*

Gal. 2. de elemēt. Quatuor humores ex primis elemētis ortos cōstat, materiāmq; esse generationis hominis, causāmq; esse corruptionis omnimodā, si quid in generatione animalis deesset: quoniam vno quidem deficiēte humore, totū animal interit ac deperditur. Auic. prima. 1. cap. de membris, Membra sunt corpora, que ex prima humorū commixtione generātur: quemadmodum humores sunt corpora, quæ ex prima ciborū commixtione generantur. Et cap. de humoribus, Humor est corpus humidum, fluidum, liquidū, in quod in primis nutriendi conuertitur. Ac si diceret, est corpus humidum, id est, actu fluens, id est, substantia fluida. Nam aliquid esse humidū dupliciter intelligitur, natura vel substantia. Nam quædam res dicuntur in substantia humidae, quæ natura & potestate sunt sicca, & sic econuerso: quædam verò utroq; modo, tam natura, quàm substantia humide dicuntur. Idcirco dixit humidum, fluidū. Gal. aphor. 5. aphor. 39. Superfluū id, quod ex alimēto relinquitur, humor existit naturæ partis similis. Et secūdo de facult. naturalibus cap. 8. Demonstratum est, inquit, alimentū, dum in venis ab innato

calore alteratur, sanguinem quidē ex mediocri calore fieri, reliquos verò succos eodem, modum non seruante. Et sic habet quomodo generentur humores.

De alia diuisione de his qui nutriunt humoribus.

Ex his qui nutriūt humoribus, quędam sunt primę & secundę humiditates, quarum primę sunt humores. Secundę rursus bipartiuntur: nam quędam sunt superflue, quędam non. Non superflue erunt, quę à principali dispositione conuerse, ad membra relegantur: & iuxta Auicēne placitum erunt quatuor, scilicet, nomen non habens, ros, cambium, gluten. Humorum verò, à quibus hæ humiditates proueniūt, sunt quatuor genera, vt genus sanguinis, pituitę, bilis, melancholię.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Auicēna prima primi cap. de humi. Humiditates quędam sunt primę, quędā secundę. Primę sunt quatuor humores. Secundę verò, quę non sunt superfluitates, sunt humores, qui à dispositione principali conuersi, ad membra relegantur: & sunt, nomen non habens, ros, cambiū, gluten. Et Gal. 10. Meth. ad finem, loquens de hectica, de his mentionem facit, primam vocans.

locans nativam humiditatem: alteram, non habens: similiter de differēt. feb. Et Auic. prima quarti & dicitur 12. de animalibus. De his etiam vide de hectica. Quod verò humorū genera sint quatuor, probatur ex Gal. 2. de elemēt. dum inquit, Conabor ea explicare, vnde adductus est Hippoc. vt sentiret, humores quatuor materiam esse generādo homini. Et lib. finit. Med. Humores quatuor sunt, ex quibus animal consistit, sanguis, pituita, & duæ billes, flava scilicet, & atra: & sic sunt quatuor humorum genera.

De humoribus in particulari, & primò de sanguine.

Αἷμα, id est sanguis, humor est calidus & humidus, ex ipsius chyli temperationi parte progrediens: qui naturalis est & nō naturalis. Naturalis, qui mediocri substantia, rubido colore, malo carens odore, sapore dulci, mitis ac benignus existit. Non naturalis, qui ab isto degenerat, & hoc bifariam, vel sui, vel alterius ratione. Ratione sui, dum mutatur propria substantia: & hoc dupliciter, vel quia nimis crassa, aut nimis tenuis: vel quia aduritur, & sic pars tenuior in flavam bilem vertitur: crassior in atram ratione alterius, quum alius humor illi permiscetur, & tunc va-

rio modo hoc contingere potest, prout va-
ria bilis species & pituitæ & melancholi-
sanguini admiscuntur. Locus in quo con-
sistit, est hepar, in quo perficitur, cor, in
quod influit, venæ & arteriæ.

*Loci contentientes ex vera
Medicina.*

Quòd sit calidus & humidus, probatur
ex Gal. 2. de morb cau. cap. 4. quum dicat
nempe, quòd flaua bilis potestate calida est
& sicca, atra verò sicca & frigida: sanguis
calidus & humidus, pituita frigida & hu-
mida. Et primo de naturalibus facul. cap.
9. idem asserit. Auicen. prima primi cap. de
humor. Sanguis verò natura calidus & hu-
midus existit, cuius duæ sunt species, natu-
ralis & non naturalis, &c. Gal lib. de atra-
bile cap. 2. Igitur magna ex parte rubeus
color in hoc humore exuperat. & talis ex-
actè optimus sanguis existit. Et paulò infe-
rius, Sanguis maiori ex parte dulcis appa-
ret. Et secundo de temperam. cap. 3. Suc-
corum optimus, & maximè proprius ac
domesticus, sanguis est: igitur à tempera-
tiori parte progreditur. Et secundo de fa-
cult. naturali cap. 8. Sanguis fit à mediocri
calore, bilis ab immodico. Igitur sanguis
à parte temperata oritur. Et hæc de na-
turali sanguine. De non naturali, dum mu-
tatur

atur propria substantia, vt pars tenuior in
ilem, habes ex Gale. 2. de differ. feb. cap. 9.
bi inquit, Pars sanguinis subtilior ac pin-
guior omnino in flauam conuertitur bi-
em: quæ autem crassior, in atram. Itidem
ait 2. de cris. cap. 12. Quod verò sanguini
alius humor misceatur, habes ex Gale. lib.
de plenit. ad medium, Quum tumor, in-
quit, præter naturam, ad quancunque sub-
stantiam pertinere possit, siue is syncerus
sanguis sit, siue biliosus, siue serofus, siue
pituitosus, &c. Id est, quum bilis aut pitui-
ta sanguini miscetur. De loco sanguinis,
Gale. 1. de temper. cap. vlt. Sanguis ipse à
corde suum accipit calorem. Et 6. de plac.
Hip. & Plat. At qui in dextro sinu conti-
netur sanguis, eandem speciẽ habet, quam
omnis alius, & is qui in iecore habetur,
&c. Hic etiam ab ipso probatur, cor & ie-
cur esse sedem sanguinis, ipsumque iecur
vniuersam sanguinis speciẽ absolvere: &
quòd sanguis humidi tẽperamento, rubri
colore, cuius sanè in iecore est prima gene-
ratio. Riui autẽ & venæ id toti corpori tra-
ducunt distribuuntq;. At sanguinis flauo, te-
nuis, spumosi, prima in sinistro cordis sinu
est origo: verum talem arteriæ dispensant,
& in totum corpus deducunt, &c. Vide de
his etiam Gal. de facul. natural. diffusius.

De pituita diuisione & descriptione.

Φλέγμα, id est, pituita, duplex est, naturalis & non naturalis. Naturalis est, humor frigidus, humidus, substantia crudus, colore ad albedinem, sapore interdum dulci, quandoque omnis qualitatis expers. Non naturalis est qui à sui natura degenerat: & hoc biffariam efficitur, per se scilicet & per admixtionē. Per se, quum à propria substantia egreditur: nam in substantiā aquosam vel flatuosam vel admodum tenuem cōuertitur, vnde pituita aquosa, flatuosa, & tenuis dicitur. Si verò crassior ac viscosior reddatur, tunc pituita erit crassa, viscosa, & mucilaginosa. Quæ si magis indurescat, gypsea & vitrea dicetur pituita: quæ si vltra putrescat & alteretur, fiet salsa, vitrosa, & corrosiua. Per admixtionem, quum illi alius misceatur humor: nā sanguine admixto dulcis efficitur: flaua bile, salsa: melancholia, pontica, acida.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Auic. prima primi cap. de humor. Phlegmaris aliud naturale, aliud non naturale. Naturale est, quod aptū est in aliquo tempore fieri sanguis, quoniā est sanguis non plenē

lenè concoctus. Vnde Arist. 6. Topic. inquit, phlegma esse primū indigestorū à ciuis proueniens. Gale. 2. de diff. feb. cap. 6. Quicunq; humor in corpore frigidus atq; humidus fuerit, hunc nos pituitā appellamus: & sic erit humor frigidus & humidus. Et de atra bile cap. 2. Apparet pituita omnis qualitatis expers, veluti aqua. Verū naturali qualitate mutata, non modò salsa, sed acida etiā fit, quin & nō rarò dulcem qualitātē acquirit. Hunc itaq; humorem, qualiscunq; fuerit, pituitā appellant, si modò albus extiterit. Et 2. de diff. feb. cap. 6. Alia est pituitę species, quam pleriq; cum sreatu expuunt, sensibilem habēs dulcedinem, &c. Auic. prima primi cap. allegato, octo species phlegmatis non naturalis enumerat, vt videre poteris.

Obiectio.

Quomodo octo enumerat, quum iuxta Gal. sententiam ad summum tres tantum sint, vt salsa, dulcis, acida?

Responsio.

Certum est Galenū non nisi tres enumerasse differentias pituitę, vt 2. de diff. feb. cap. 6. Item 3. de loc. aff. cap. 7. Veruntamen pituitam possumus dupliciter considerare, vel in ratione saporis, vel in ratione suę substantię. Si ratione saporis, tunc

erunt tres differentiae, ut salsa, dulcis, acida: quanquam & insipida addi posset: scilicet ratione substantiae erunt etiam quatuor quae primis copulae, erunt octo. Quod Galenus etiam non negaret: nam in lib. de plenit. ad finem, humorem crudum inter pituitae species esse reponendum ait, quod crassior ac minus flatuosus est, &c. Prater ea 14. Meth. cap. 17. dixit euacuationem bilis esse facilem, sed pituitae crassioris & glutinosioris esse difficilem. Ergo datur pituita crassa, quae & mucilaginosa esse potest. Rursus 3. de loc. aff. cap. 7. mentionem facit de vitrea à porracea appellata. Item de aquosa, quae nulla qualitate infecta dici potest insipida: & sic ratione substantiae erunt aliae species. Item 3. de loc. aff. cap. citato, atram bilem differre facit, ob substantiae varietatem. Igitur à simili pituita etiam in substantia variabit.

Obiectio.

Quomodo concordabis Auicennam Galeno in iis admixtionibus? Nam Galenus salis fieri pituitam asserit, aut propter putredinem, aut propter salis serosae humiditatis miscellam: Auicennas verò ex miscela bilis cum pituita.

Responsio.

Quòd fiat propter putredinem, ut dixit Gal.

Gal. 2. de different. feb. cap. 6. etiam Auic. concedit, inquiēs, Et nos quidem dicimus putredinem ipsum phlegma falsum efficere, ideo quod in ipso adustionem facit, &c. Nec in humiditate serosa distat à Galeno. nam ipse, Sola, inquit, aquositas non facit falsum, quod verum est. Sed Galenus non solam, sed falsam & serosam dixit, quod Auicennas non negasset. Quod verò à bilis miscella fiat phlegma falsum, verum. Nā Arist. in lib. de sen. & sensa. & 2. Meth. falsum saporem affirmat esse eiusdem speciei cum amaro: nam terreę partes adustę, & amari saporis, si insipidę humiditati æqualiter misceantur, fit falsedo: si verò humiditatē superent, amaritudo. Quare cū bilis amara quidem natura ac sicca sit, & pituitę misceatur, fieri potest, vt inde pituita salsa euadat.

De bilis definitione & diuisione.

Χολή, id est bilis, est humor calidus & fccus, ex tenuiori & calidiori parte chyli, vel ex sanguine tenui & feruescente proveniens. Hęc duplex est, naturalis & non naturalis. Naturalis, est humor calidus & fccus potestate, substantia tenui, flauo colore, aut rubro ad flauitiem declināte, sapore amaro. Non naturalis est quę à iam dicta degene

degenerat:& hoc dupliciter, per se, & per admixtionem. Per se adhuc bifariam, quum putrescit & aduritur, & tunc dicitur adusta per putredinem. Altero modo, quum non naturalis, vitellina dicta, colore quodam igneo, in hepate, aut ventriculo, aut in venis concoquitur, & tunc fit porracea, quæ & præsina dicitur & æruginosa. Per admixtionē non naturalis efficitur, quum illi alius humor admiscetur, & hoc multifariam. Nam si phlegma tenue & aquosum admisceatur, citrina siue crocea efficitur: si crassum & viscosum, vitellina: si adusta melancholia, fit bilis adusta, & sic erunt sex species.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Quòd bilis sit calida & sicca potestate, probatur ex Gal. 2. de natu. fac. cap. 9. Bilis, inquit, flava, calida & sicca est, quātumvis sit ab aspectu humida. Quòd verò sint sex bilis species, habes ex Gal. lib. de atrabile cap. 2. vbi inquit, Bilis enim flava sit pallida ex serosa & tenui humiditate, quæ vbi resoluitur, λεκιδώδης, id est vitellina appellatur. Est & bilis, inquit ipse, πρᾶσσειδης, id est porracea: alia ἰώδης, id est eruginea: alia ἰσχυρώδης, id est glauca: alia rubra, sanguini tenuiori proxima: & sic erunt

unt sex species. Auic. prima primi cap.
e humor. hanc totam diuisionem habet:
ge eum vberius.

*De Melancholiæ definitione
& diuisione.*

Melancholia duplex, naturalis & non naturalis. Naturalis est boni sanguinis, æx, ac veluti limosa quædam superfluitas, siue crassior quidam sanguis, cuius color niger est, sapor verò acerbus vel acidus, in massa sanguinaria existens, ad alendas partes melancholicas progenitus. Non naturalis, qui à naturali degenerat, definiturq; in vniuersum, quòd sit humor frigidus & siccus, ex crassiori portione chyli proueniens, cuius species sunt quatuor. Prima quum melancholicus humor, naturalis dictus, in sua propria substantia aduritur & putrescit, fitque bilis exquisitè nigra, quæ acida est, & in terram effusa velut acetum feruet, & terram attollit. Secunda est bilis atra ex adustione aliorum humorū. Quæ enim fit ex flaua bile vehementer adusta, non aliter ac exquisitè atra terrā radit ac attollit. Tertia species melancholiæ nō naturalis est, quæ à lapidosa concretionem oritur. Quarta species, quū alius humor ipsi melancholiæ naturali permiscetur, dūmq; hoc fit, dulcoratur & mitescit, modò neu-

atra bilis adusta admisceatur: quia tunc vel
acefcit, vel amarefcit, & erofionis fit par-
ticeps.

*Loci consentientes ex
vera Medicina.*

Gal. 2. de temper. cap. 3. Sanguis optimus
succorum ac proprius, huius veluti sedimē-
tum ac fax atra bilis est: quæ idcirco tum
frigidior, tum crassior sanguine est, sicuti
flaua bilis longè calidior. Et 3. Prognost.
commēt. 29. Attræ bilis generatio duplex,
altera à sanguine crassiore, qui proportio-
ne in venis subsidenti in dolio vini fēculæ
respondet. Altera à flaua bile vehementer
assata, quæ atra bilis alioqui malefica est,
ac derodit partes, in quibus abundè colle-
cta est. Altera mitior quàm hæc est, maxi-
mè quoties nondum traxit in animali mo-
ram cum aliquo calore abundanti præter na-
turam. Et 3. de loc. aff. cap 7. Melancholi-
cos, inquit, esse, in quibus siccitas & frigi-
ditas dominatur. Et paulò inferius, Atra
bilis ob substantiæ varietatem non obscu-
ras habet differentias: nam alia est veluti
fax sanguinis quæ admodum spissa, & fræ-
cibus vini non absimilis: alia verò, quàm
superior, essentiæ est multò tenuioris, atq;
vomentibus causa, & olfacientibus acida
videtur: quæ etiã terram radit, attollit &
fermen

fermētat. Sed ea, quam crassæ fæci similem esse dixi, in terram effusa non inducit feruorem, nisi fortè in ardente febre ipsam præassari contingat. Hanc nominare consueui succum melancholicum aut sanguinem melancholicum. Vide etiā de his plura iuxta Gal. de atra bile cap. 2. & 3. de naturalib. facul. cap. 9. ad finem. Auic. prima primi cap. de humor. Cholerae nigræ alia naturalis, alia non naturalis. Naturalis est boni sanguinis fæx & turbulētia, & superfluitas in comparatione ad sanguinē. Melancholia non naturalis, non est ad modū hypostasis & fæcis, imò est ad modum adustionis & cinereitatis: & tūc est multiplex, vel est phlegmatis, vel cholerae, vel sanguinis, vel melancholiae cinis: & sic erūt quinque species.

Obiectio.

Quomodo dici potest cinis phlegmatis, quum Manardus dicat nō posse ex pituita tantam allationem fieri vt nigra euadat?

Responsio.

Dico, quòd pituita, si aduritur, melancholia in qualitate, si non, in colore fieri potest.

Obiectio.

Quid est frigidius, pituita an atra bilis?

Respon

Responsio.

Si considerentur iuxta earum essentiam, frigidior est pituita: si verò iuxta earum impressionem, atra bilis, quia pituita est densior.

*Authores erronei dissentientes
circa humores.*

- 1 Adferere cum Aristotele, solum sanguinem nutrire, & cæteros humores esse superfluitates.
- 2 Adferere, humorem naturalem esse malum, quum nutrire non possit.
- 3 Adferere, sanguinem dari ab aliis humoribus in aggregatione distinctum.
- 4 Adferere, virium robur sequi ad sanguinis copiam, & ad eius paucitatem minui.
- 5 Adferere, non dari quartam temperiem in succis, quæ est frigida & sicca.
- 6 Adferere, humorum generationem esse reciprocam, ita ut ex sanguine fiat pituita.
- 7 Adferere, humorum cognitionem esse inutilem cum Erasistrato.

*Confutatio dissentientium
circa humores.*

Confutat primum Gal. 3. de temper. cap. 2. dum inquit, Omne animal conueniente sibi nutritur alimento. Cõueniens cuiq; alimentum est, quicquid assimilari potest corpori, quod nutritur. Et primo de natu. fac. cap.

ap. 2. Nutritio est ad id quod nutrit eius
 quod nutrit assimilatio. Igitur melancho-
 lica membra, melancholia: pituitosa ipsa
 pituita in nutritione indigebūt, & sic solus
 sanguis non nutrit. Auic. prima primi cap.
 le humor. Qui solum sanguinem dicit nu-
 trire, mentitur: si enim solus sanguis esset
 humor qui membra nutrit, omnia in suis
 complexionibus & essentiis similia fo-
 rent, &c. Igitur solus sanguis non nutrit.

Ad secundum, probatur tali ratione, Hu-
 mor malus potest nutrire, ergo bonus &
 naturalis. Quod malus nutrire possit, pro-
 batur, quia ad benignum potest reduci.

Ad tertium: Gal. lib. de plenit. ad finem,
 Nam neq; fieri alioqui potest, ut adeò syn-
 cerus in venis reperiatur sanguis, quin illi
 aliquid aut bilis aut pituitæ aut serosi hu-
 moris permixtū sit: siquidem syncerus ab
 alio humore sanguis & impermixtus inue-
 niri nusquam habetur. Et lib. de atra bile
 cap. 5. Quod igitur in venis & in arteriis
 humores omnes vnà cum sanguine conti-
 nentur, ostēdit ipsius varietas tum in colo-
 re, tum in consistentia, &c. Probatur & ex
 Hippocrat. lib. de natura humana, quē ci-
 tat hoc in loco Galenus. Igitur sanguis ab
 aliis humoribus non distinguitur.

Ad quartum: Auic. prima primi cap. de

d

humor. Sunt quidā, inquit, qui opinantur corporis virtutem sequi ad sanguinis multitudinē, & ipsius debilitatē sequi eius paucitatem, sed non est ita. Quod verò attenditur, est dispositio eius quātitatis, quæ eo corpus ingreditur.

Ad quintum: Gal. 2. de natural. fac. cap. 3. contra Erasistratū probat autoritate medicorum & philosophorum, qui humore quatuor anni tēporibus cōpararunt. Vnde inquit, sicut quatuor sunt anni tēpora, ita quatuor erunt humorum tēperaturæ. Præterea sicut dantur morbi frigidi & sicci, ita in humoribus quarta temperies, quæ est frigida & secca.

Ad sextum: Gal. 2. de vic. in mor. ac. comment. 31. Pituita processu tēporis coquitur, & sanguis efficitur. Sed nec flaua bilis, nec atra in sanguinis substantiam redeunt: igitur eorū generatio non erit reciproca. Vel tali ratione: Frigidum à calido fieri non potest, regulatis à natura humoribus: igitur nec à sanguine fiet pituita, & sic nō erit reciproca generatio.

Ad septimum: Gal. 2. de nat. fac. cap. 8. Nunquid quæso quēadmodum cibi cōcoquantur in vētre est vtile sciuisse, ita nōne paris momēti est, vel sanguinē bonum gigni, vel nutrimentū in ventre probè in chylum.

hylum verti? Et paulò inferius, Nónne generāda hydropis causa ex sanguificatiōis lefectu puenit, sicuti ex ciborū coctionis lefectu diarrhœa? Ac si diceret, Quomodo hæc capi possunt, nisi humorū cognitionē contemplatus fueris, &c? Et sic humorū cognitio non erit inutilis.

*De diuisione Membrorum
in genere.*

Membrorū alia sunt homœomera, id est similiaria, alia organica, id est instrumētaria. Homœomera dicūtur, quæ cōicant cū suis partibus in nomine & ratione, vt os, caro. Organica verò sunt, quorū nulla pars nec in nomine, nec in ratione cum toto cōmunicat, quū manus, siue capitis pars, nec manus sit nec caput: quæ diuisio à naturali operatione sumitur. Naturalis enim operatio his tribus perficitur, scilicet rēperie, cōpositione & vnitate: quarum temperies simplicibus mēbris attribuitur, cōpositio instrumētariis, & horū vtriusq; vnititas. Cōpositorum igitur quædā sunt principalia, quorum vnum ad speciē conseruandam, vt testiculi, reliqua ad indiuiduū seruandum attribuūtur. His seruiūt, vt cerebro nerui, cordi arteriæ, hepatis venæ, testiculis vasa spermatica: ab his quoq; tanquam à principio dependēt, stomachus, renes, intestina,

omnēsque muscoli, quæ præter propria virtutes sensu & vita cū voluntario motu fruuntur.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Gal. de consti. ar. med. cap. 4. Nimirum quum corpora, quæ similia appellantur ex dissectione apprehenderimus, cōpositorum pariter membrorum, quæ instrumentaria nonnunquā nominare solemus, sciētiā assequemur: & sic duplicia sunt membra, simplicia & cōposita. Auic. prima primi cap. de memb. Membrorum alia sunt simplicia, alia cōposita. simplicia sunt, quorum quācunque sensibilem partem assumpseris, in nomine & definitione erit totī cōmunicans. Composita sunt illa, quorum quācunque partem acceperis, in nomine & definitione cōmunicās non erit, sicut manus & facies. Gal. in lib. art. med. cap. 9. Vniuersæ partium differentię sunt quatuor, nonnullę earum principia, aliquę ab his originem habent, aliquę nec aliarum gubernationi præsent, neque aliunde gubernantur, quum insitas habeant à natura potētias, à quibus reguntur: quædā sunt quę insitas simul & aliunde emanantes habēt. Principia igitur sunt cerebrū, cor, hepar, testiculi: ab his oriuntur & subministrant
nerui

nerui & spinalis medulla cerebro, cordi
arteriæ, hepatis venæ, testiculis vasa semina
ria. Et cap. 8. art. med. Vitiatorum genera ea
dem sunt his, quæ virtutē perficiunt. Tem
peries quidem in consimilibus, numerus,
formatio, magnitudo & situs in instrumē
tariis, vtrisque verò cōmunis vnitas. Et de
tot. morb. temp. cap. 7. Tria facultatum to
tum corpus gubernantiū principia sunt,
cor, hepar, cerebrum, ex quibus oriuntur
nerui, venæ, arteriæ. Hi & similes loci ea
quæ dicta sunt probant.

*De facult. naturalibus & de
earum definitione.*

Potentia siue facultas est cuiusvis operis
& actionis causa: & hæ duplex, *ἐνέργεια*, id
est actu, altera potestate. Hæc potentia siue
facultas etiam dicitur virtus, & tunc qua
drifariam describi potest. Primò, quòd vir
tus sit habitus, penes quem aliquis dicitur
bonus. Secundò, quòd sit quædā actiua qua
litas, sicut dicimus elementa habere qua
tuor virtutes, id est quatuor qualitates, sci
licet calidas, frig. &c. Tertiò describitur,
quòd virtus sit quædam forma specifica, si
cut dicimus Eupatorium habere virtutem
ad iecoris morbos. Quartò describitur,
quòd virtus sit animæ facultas, qua suas

peragit operationes.

*Loci consentientes ex vera
Medicina.*

Arist. 2. Ethic. Virtus est dispositio quædam animæ, per quam inter duo extrema tenemus medium: & hæc spectat ad moralem philosophum. Gal. 1. de cau. pulsuum, loquens de generibus pulsuum, inquit, Quando essentia incognita nobis est, hoc nomine facultatis eam appellamus. Alicuius enim est facultas, & eius notio est relationi subiecta. At si diceret, eam facultatem dici de omnibus, ad quæ referri potest, & sic de habitu & de qualitate actiua dicitur. Gal. 1. de fac. simp. cap. 1. Facultas, causa quæ est effectrix, eaque partim actu, ut calefaciendi in igne: partim in futuro tempore, ut calefaciendi pyretro, vel sic in animalibus describitur: Virtus siue facultas est animæ potentia, membris essentialiter attributa, ad suas operationes peragendas.

De facultatum alia diuisione.

Facultas etiam triplex est, naturalis, vitalis & animalis: triplex inquam in ratione, non in substantia. Nam sicut in citro color, odor, & sapor inueniuntur diuersi in ratione, iidem in substantia: ita in his facultatibus, naturalis locatur in hepate, & est facultas, quæ nutriens in similitudi

tudinem nutriti transmutat. Hac duo
præsupponit, generationem scilicet & au-
gmentationem: nam generatio ita alterationem
& formationem, sicuti auctrix habet alte-
ratricem & nutrice auxiliatrices. Auctrix
facultas est potentia, qua corpus in omne
dimensionem augetur, usque ad augmenti
terminum: vocatur ab Auicenna Crescitua. Na-
turalis siue nutrix facultas similiter agglu-
tinationem & appositionem præsupponit.
Assimilatio, quæ in nutrice reponitur, qua
tuor has facultates supponit, attractricem
scilicet, retentricem, alteratricem siue con-
coctricem, & expultricem. Facultas vitalis
siue animosa est quæ viuificat, & locatur in
corde, à quo procedit vita, ad singula corpo-
ris membra viuificanda. Facultas animalis
est potentia ipsius animæ, in cerebro loca-
ta, quæ in motricem & sensibilem, aut in
quaternas cerebri facultates diuiditur, quæ
sunt, sensus communis, imaginatrix, ratio
cinatrix, quam cogitatiuam etiam dicunt,
& memoratrix. Sensus communis est, qui
solus omnium aliorum sensuum sensata
percipit. Imaginatrix, quam Græci
φανταστικήν vocant, dicta est, eo quod inde
nobis visa proueniant. Ratiocinatrix est
quæ reuocat species sub sensum ad iudiciū,
atque rerum imagines de potentia abstra-

hit. Memoratrix est quæ omne quod à cæteris facultatibus elaboratum est & recipit, veluti nutrix conseruat & fouet.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Gal. 9. meth. cap. 10. Gubernant animæ tres diuersi inter se generis facultates, toti corpori ex suo veluti fonte quæque distributæ (eas Plato vocat animas). Est enim eorum quædam ad nutriendum animal necessaria, ac cum stirpibus communis, quæ iecur pro fonte habet: hanc appetitricem seu naturalem, seu altricem appellare licet sicuti & animam aut facultatem. Altera est, quæ non modò vt stirpibus aut vita præditus, sed etiam vt animalibus est anima insita: hæc in corde collocatur, ceu insiti caloris fonte. Tertia anima ratiocinatrix in cerebro domicilium habet, ea voluntariis actionibus vnà cum sensibus præsidet.

Loci de virtute nutrice.

Aristo. 2. de anima, Virtus nutritiua est potentia saluare suscipiens ipsum secundum quod est eius. Gale. 1. de naturalibus fac. cap. 12. At quòd necesse sit, nutritio nem esse assimilationem nutrientis ei quod nutritur, dare liquet. Auicen. prima primi cap. de virt. Virtus nutritiua est illa, quæ nutriens in nutriti similitudinem conuertit,

tritur, ideo ut per ipsum restorationem
recuperet, quod dissolutum fuit. Quod
primum in naturæ operibus sit generatio,
probat ex Galen. 1. de fac. nat. cap. 5. Ge-
neratio simplex quædam actio naturæ non
est, sed ex formatione alterationeque com-
posita. Et cap. 8. Vbi animal magnitudinē
perfectam adeptum est, usque ad ætatis vi-
rorem nutrix virtus dominatur, cui auxi-
liatrices & ministræ sunt alteratrix & nu-
trix. Et cap. 11. Ad hoc ut fiat nutritio siue
adhærentia præcedat oportet: sicuti etiam
ut illa fiat appositio. Exemplum habes de
vitilagine, quæ nutrimenti est adhærentia,
sed non est assimilatio.

*Loci de quatuor facultatis nutri-
tiuæ ministris.*

Auic. prima primi cap. de virt. ministr.
Virtuti nutritiuæ ministrantes sunt qua-
tuor virtutes, attractiua, retentiua, digesti-
ua & expulsiua. Quæ verò sit vnaquæque,
poteris ab ipso ediscere. Gale. 3. de tempe.
cap. 1. Quatuor nimirum dicimus totius
corporis proprias facultates esse, attractri-
cem, arteratricem, retentricem, & quartā
quæ alieni sit segregatrix, easdemque fa-
cultates effectus esse totius in quouis cor-
pore substantia, &c.

d 5.

Loci de virtute auctrice.

Arist. 2. de anima, Virtus augmentatiua est virtus factiua quanti. Gal. 1. de fac. na. cap. 7. Auctio est solius naturæ opus, ut corpus quod contriuitatem suam & speciem quam prius habuit, vniuersam seruet, omnem partem extendere: quæ sine nutrimento affluente adhærentēque fieri nequit. Auic. prima primi cap. de virt. ministr. Virtus augmentatiua est virtus, quæ addit in diametris totius corporis secundum proportionalitatem, quousque corpus ad augmenti finem perducatur per illud, quod ipsum ingreditur ex nutrimento. Itidem ait in sexto de naturalibus.

Loci de facultate vitali.

Gale. 5. de locis affe. cap. 1. Cor innati caloris veluti fontem esse, neque animal mori posse, nisi cor afficiatur, iam declaratum est. Igitur cor est membrum viuificans. Auic. prima primi, cap. allegato, Virtus vitalis est, quæ cum recepta fuerit in membris, præparat ea ad recipiendum virtutem sensus & motus, & operationes vitæ, &c.

Loci de facultate animali.

Gal. 5. de loc. aff. cap. 1. Ostensum est, sensum & motum vniuersis corporis partibus à cerebro suppeditari, &c. Et tertio de loc. aff. cap. 7. Rationi consonum videbatur,
anim

animam in cerebri corpore sedem obtine-
atq; in ipso & rationis vim & sensibiliū
maginam memoriam residere, &c. Et sic
animæ facultas in motricem & sensibile
potentiam diuiditur. Arist. tertio de ani-
ma cap. 2. Sensus communis est qui solus
sensata aliorum sensuum percipit. Auic.
primo can. cap. de vir. animali, Phantasia,
id est imaginatiua est virtus, quæ formas
perceptas à sensu communi custodit, & re-
tinet eas post sensus absentiam. Themist.
nā cum Aristotele Imaginatiuam esse po-
tentiam animæ à sensibus ortam dicit.
Arist. primo Ethic. facit differre virtutem
ratiocinatricem ab intellectu, eo quod cau-
sas cum effectibus conferre possit, sed in-
tellectus causas tantum comprehendat.
Gal. li. fin. med. Sēsus est affectus animæ per
corpus, nūcius rei quæ mouere idonea est.
Arist. lib. de memoria & reminiscen. Me-
moriam, inquit, est habitus phantasmatis, id
est, imaginis. Auer. ibi, Memoria est reuer-
sio in præsentem intentionis iam in præteri-
to comprehensæ. Auic. primo can. Memo-
ria est thesaurus eius quod peruenit ad ex-
timationē de intētionibus perceptis à sen-
su extra formas perceptas à sensu. Gal. lib.
fin. med. Memoria est præteriti cōprehen-
sio, cuius præsens fuit ex sensu perceptum
Dissen.

Dissentientes circa facultates dictas.

- 1 Adferere, facultates naturales non esse in qualibet parte corporis.
- 2 Adferere, facultates esse remediorum indices.
- 3 Adferere, facultatem nutricem & attractricem esse idem.
- 4 Adferere, facultates non alibi, quàm in animato corpore posse reperiri.
- 5 Adferere, facultatum cognitionem esse medico inutilem.
- 6 Adferere, facultatem vitalem non esse naturali priorem.

Confutatio dissentientium circa facultates naturales.

Ad primū: Gale. 5. de loc. aff. cap. vlt. Est igitur communis sermo, quem inuenire proposui de naturalibus facultatibus, quas in qualibet parte quatuor generatim esse dicistis: primā voco attractricem, quæ parti peculiares succos alendi ipsos gratia, & appetere & attrahere potest. Altera est, quæ alteratrix dicitur, qua succus attractus similis euadit parti, quæ aliter Crescitiua: huic dux aliæ ministrant, retentrix & expultrix, &c. Et sic in qualibet parte erunt facultates. Similis sententia est in lib. de plenit. circa medium.

Ad

Ad secundum: Gal. de opt. secta ad Thra-
bu. cap. 42. Si constans vis remedium in-
dicat, in sanis quoque quoniam constat, re-
medium indicabit: sed in sanis remedium
non indicat, ergo nec in egris constans re-
medium indicabit.

Ad tertium: Gal. primo de natural. facul.
cap. 9. Quippe summa rei sic habet, genera
o, auctio & nutritio prima naturę operũ,
c veluti capita sunt. Vbi distinguit auctio
nem à nutritione, igitur idem non sunt.
Præterea tali ratione probatur: Quæcun-
que in fine & in quantitate materiæ diffe-
runt, non sunt idem: sed auctrix & nutritrix
sunt huiusmodi, igitur idem non sunt.
Quòd differāt in fine & in quantitate ma-
teriæ, probatur ex hoc, quia nutritrix indiui-
duum tantum cōseruat, autrix verò auget.
Veruntamen dicimus vnā & eandē sub-
stantiam esse, quæ duo hæc efficit.

Ad quartum: Galen. primo de natur. fac.
cap. 13. probat in magnete & in succino esse
vim attractoriam, sicuti & in purgantibus
medicamentis, & in stirpibus, & in simili-
bus esse alias facultates: igitur alibi quā
in animato corpore reperiuntur.

Ad quintum: Gal 2. de naturali fac. cap.
3. Nisi enim à natura facultas quædam na-
turalis unicuique instrumento statim ab
initio

initio sit tributa, durare animalia non poterunt, non modò tantum annorum, sed nec paucissimorù dierum: igitur scire has facultates non erit inutile. Præterea probat Galenus citra facultatem attractoria de vrinae secretionem, neque de alimenti distributione, aut de nutritione non medico licere loqui: igitur harum cognitio non erit inutilis. Rursus quinto de loc. aff. cap. ult. Has facultates inquit, in qualibet affecta parte, utrù validæ sint, an infirmæ consideretis hortor: & sic earum cognitio non erit inutilis.

Ad sextum: Avicenna. prima primi cap. de virt. vit. inquit, quòd præparat ad recipiendum alias virtutes: igitur erit prior. Præterea id prius est, cuius instrumentum est primum: sed instrumentum virtutis vitalis, scilicet cor, est prius factum quàm hepatis, igitur erit prius.

De sanitatis ac morbi definitione.

Sanitas est harmonia siue concinnitas quatuor primorum elementorum, quæ secundum naturam in nobis sunt. Vel, Sanitas est omnium nostri corporis partiù naturalis quædã constitutio, ex qua actiones naturales edimus. Vel, est naturalium virium actio minimè impedita. Ad sanitatē requiruntur, pulchritudo, bonus habitus, integritas

ritas. Pulchritudo erit, si proportio membrorum cum coloris probitate adsit. Bonus habitus sit, non qualis exercitatorum: nam ne salubris quippe hic habitus est, sed cut superius à nobis descriptus. Integritas erit, si ne quid circa animum, mores, & robur ac symmetriam corporis desit. Morbus verò cum ex diametro sanitati opponatur, erit inconcinnitas, siue intemperies primorum elementorum quæ in nobis sunt. Vel erit partium præter naturam constitutio, ex qua actio vitiosa provenit. Vel erit naturalium virium præpeditio.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Quòd sanitas sit harmonia, &c. probatur ex Gale. i. de temp. cap. i. Nam indicium, inquit, sani hominis ac temperati est elementorum portionis æqualitas. Et tertio de mor. diff. cap. i. Sanitas est affectus secundum naturam, ad faciendā actionem idoneus. Nec refert si dixeris constitutionem siue affectum. sicut nec actionē, nec actionis causam. Et primo meth. cap. 9. Sanitatem, inquit, esse ipsarum functionum constantiam, aut affectum siue constitutionem partium, cuius ope functiones secundum naturam edimus. Et tertio meth. cap. 3. Quippe monstratum est, sanitatem in similaribus corporibus ipsarum quatuor

tuor qualitatatum esse iustam temperie:
Auic. secunda primi cap. de diuisione dis-
positionum corporis, Sanitas, inquit, est dis-
positio, per quam corpus hominis in sui com-
plexione & compositione tale existit, vt
eo operationes eius omnes proueniant in
columnes. Quod verò pulchritudo requir-
tur, &c. Gal in art. med. cap. 8. Signa opti-
mæ constitutionis sumuntur à commen-
satione, pulchritudine, ab optimo colore
ac præterea ab earum, quæ ipsis insunt, vi-
tute operationum. De morbo verò sic Gal
de constitutione art. med. cap. 12. Id quod
excellenter sanum est, sit modò illud simi-
lare vel instrumentarium, omni ex parte
moderatum existet, ægrum verò immoder-
atum: siquidē morbus immoderatio quæ-
dam est. Et secūdo de natu. hum. commē. 1.
Morbus est affectio quædam in animan-
tis corpore, quæ primū actionem lædit.
Et 3. de sympt. differ. cap. 1. Morbus est con-
stitutio quædam præter naturam, à qua
primò actio vitiatur: quin si affectum dixe-
ris, à quo actio vitiatur, idem est, &c. Et
meth. 2. cap. 1. & 3. Nam contrarium sani-
tati affectum, à quo lædi actionē diximus,
morbum tantū appellamus. Et similiter
cap. vlt. Quicumque affectus functioni offi-
cit, is est morbus.

De

De sex morborum generibus.

Sicuti naturalis operatio in his tribus consistit, scilicet intemperie, compositione, & vnitate, vt dictum est, ita morbus fit in triplici diuisione: nempe in complexionem, compositionem, & vnitate soluta. In complexionem, vt calidus, frigidus, humidus, & siccus. aut calidus siccus, calidus humidus, frigidus siccus, frigidus humidus. In compositione quadrupliciter, in positione, magnitudine, figura & numero. In vnitate simpliciter, nempe in similaribus & instrumentariis simul: & sic sex erunt in vniuersum morborum genera, vnum quippe in similarium partium intemperantia, in organicis quatuor, in vtrisque vnum, quod est soluta continuitas. Læditur etiam operatio tripliciter, debiliter, vitiosè, aut quia nullo modo fit operatio.

*Loci consentientes ex vera
Medicina.*

Auic. secunda primi cap. 2. Dicimus quod ægritudinum genera sunt tria, loquendo de simplicibus ægritudinibus. Primum est similarium, & est species malæ complexionis. Secundum est membrorum officialium quæ sunt ægritudines compositionis. Tertium est ægritudinum communium, quæ ægritudines accidunt membri similaribus & instrumentariis.

c.

riis, &c. Gal. i. de differ. mor. cap. vlt. Nēp dictum est, quòd alij sunt primorū similariūq; corporū morbi, alij instrumentorū cōpositorūq; alij vtrorūq; vt phlegmonē, &c. Et lib. de opt. corp. cōstitutione inquit, quòd tēperamentū ex calido, frigido humido, sicco, coagmēti mēsurā definitū similariū membrorū est sanitas, & quòd cōstructio partiū expositione, magnitudine & figura, & numero cōstituitur, &c. Si igitur sanitas in iis consistit, simili modo & morbus in his erit, quū in eodē genere ambo constituentur, teste Gal. meth. i. cap. 7.

Quòd verò sex sint morborum genera, probatur ex Gale. 2. meth. cap. 6. dum inquit, Ergo sunt sex in vniuersum morborum genera, vnum ipsorum similariū proprium, nempe intemperies; quatuor, vt modò dictum est, instrumentorum cuiusque, & cum his sextum, quod tum similariis, tum instrumentalibus est commune, ipsius vnitatis solutio.

De causis salubribus & insalubribus.

Causarum aliæ sunt cōseruatrices, aliæ effectrices. Cōseruatrices sunt, quæ corpus in optima constitutione præseruant. Sed quia corpus alteratur & corrumpitur, idcirco quot modis alteretur dicamus. Alteratur

tur corpus sexupliciter, primò ex aëre ambiente, secundò ex motu & quiete, tertio ex somno & vigilia, quartò ex cibo & potu, quintò ex his quæ excernuntur & retinentur, sextò ex affectibus animi. In his causis salubres & insalubres cōseruatricēsque consistunt. nā in his si modus seruetur, cōseruatrices sunt: sed ubi à modo recesserint, insalubres redduntur. De his sex rebus non naturalibus in morbis à capite usq; ad pedes deinceps pertractabimus. Causa etiam dispositionū corporis rursus alteratur ex frigore, calore, siccitate, humiditate. Cause verò morbi effectrices sunt tres, pro catarrhica, & antecedentes, & coniunctæ, quæ diuiduntur per se, vel per accidens.

Loci consentientes ex vera

Medicina.

Gale. in art. med. cap. 84. Quia salubriū nonnullæ sunt cōseruatrices, nonnullæ effectrices. Et paulò infra, Si corpus esset impertibile & inalterabile, semper optima cōstitutio perduraret: sed quia corrumpitur & alteratur, idcirco eundē prioris status tenorē nō seruat, &c. Et cap. 85. eiusdem lib. Quot igitur numero sint ea, quæ ex necessitate corpus alterāt, distinguētes, propriū in singulis eorū causarū salubriū genus inueniemus. Vnum igitur erit, ex ambientis aëris

adhæsu, secundū ex motu & quiete, &c. v. sex res nō naturales enumerat. Auic. secunda primi doc. secunda, cap. 1. causæ dispositionū corporis, &c. sunt tres, antecedente primitiua & cōiuncta: & paulò inferius cemus, quod causæ quæ mutāt dispositiones corporis, & quæ cōseruant, aut sunt necessariæ, à quibus impossibile est hominē egredi in toto tēpore vitæ suæ, aut nō necessariæ. Necessariarū sunt sex genera, genus aëris circundantis, genus motus & quietis, &c. Gal. in art. med. cap. 80. Alteratur verò substantia à caliditate, frigiditate, humiditate & siccitate.

*De causis morborum partium
instrumentalium.*

Dictum est, quod ad composita membra quatuor spectant, positus siue situs, formatio, magnitudo & numerus. Primum situs vel est optimus, vel parum variat, vel à modo recedit, vel egrum plurimo recessu reddit. Formatio quoque tripliciter læditur, vel in figura, quum à cursu naturali mutatur in meatu vel orificio, & hoc ratione obstructionis aut dilatationis: in membrorum superficie, quum adest asperitas & lenitas. Magnitudo dupliciter, excessu & defectu. Numerus similiter aut deficit aut superabundat, ut sextus digitus

in

manu. Hæ omnes causæ si modum ex-
 cesserint, insalubres dicuntur: si verò à
 mediocritate non recesserint, erunt salu-
 res. De soluta vnitae, quum de chirurgia
 tractabimus, fusius loquemur.

*Loci consentientes ex vera
 Medicina.*

Auic. secunda primi cap. 3. Compositio-
 nis ægritudines quatuor comprehendun-
 tur generibus, vt ægritudines creaturæ,
 ægritudines quantitatis, ægritudines nu-
 meri, & ægritudines situs. Aegritudines
 creaturæ, id est formationis vel sunt in fi-
 gura, vel in viis, vel in receptaculis & ven-
 triculis, vel in superficie, &c. Galen. in art.
 med. cap. 87. Instrumentalium partiũ cau-
 sæ salubres, aliæ sunt salubres erroribus,
 qui in foramine consistunt: aliæ his qui in
 magnitudine, vel numero, vel positu, &c.
 quæ fusius videre poteris. Lege etiam de
 his Gal. 1. de diff. morb. cap. 7. exempla in
 omni morbo afferentem.

*De Morborum calidorum, frigi-
 dorum, siccorum, & humi-
 dorum causis.*

Causæ morborũ calidorum sunt quinque;
 putredo, vicinitas ad corpus calidum, ob-
 structio, cibus & potus calidus, & motus
 vehemens. Causæ frigidorum sunt qua-

tuor, vicinitas frigidorū, cibi potūsque quantitas & quantitas, obstructio & raritas, ocium & motus immodicus. Causæ siccōrū sunt sex, plurima trāspiratio & pauca nutritio alimēta siccātia, sollicitudo & vigilię, aeris cōstitutio sicca, aquę nitrosę & sulphureę, aluminosę, & medicamenta exiccantia. Causę humidōrū sunt his ecōtrario oppositę, vt alimēta humida, quies, somnus, potus plurimus, &c. ex quibus facilē morborum compositorum causę intelliguntur.

*Loci consentientes ex vera
Medicina.*

Gal. 2. de morb. cau. cap. 2. Corpora quę plus satis incalescūt, ita videntur affici, vel ob motū aliquē aucto calore, vel ob putredinem, vel ob calidioris corporis vicinitatem, &c. reddūtque rationem de vnoquoque. Et cap. 3. eiusdem lib. Frigidi morbi causę sunt, vt frigidorū vicinitas, cibi potūsque quantitas & qualitas, constipatio, & raritas. &c. reddēs de singulis rationē. Et cap. 4. & 5. Similiter de sicci & humidi morbi causa etiam rationem reddit. Auic. secūda primi doc. secunda, summa secunda cap. 2. 3. & 4. idem asserit vt Galenus, quę longum esset recensere: vide tu, si lubeat, eum fusiū. Vide etiam Galenū primo de diff. feb. cap. 3. & 2. eiusdem cap. 9.

Auth

*Authores erronei dissentientes circa
sanitatem & morbum.*

Adserere, sanitatis cognitionem non
esse medico necessariam.

Adserere, morbos posse cognosci, nō co-
gnito affectu secundum naturam.

Adserere, morbos similariū partiū non
distingui ab instrumentalium morbis.

Adserere, scire morborum numerū non
esse necessarium.

Adserere, morbum in numero ab eo
quod est in quantitate non differre.

Adserere, causas morborum non esse
semper considerandas.

*Confutatio dissentientium circa sani-
tatem & morbum.*

Confutat primum Gale. meth. 2. cap. 3.
inquirēs, quōd sanitatis egemus omnes ob
actionem quæ est secundum naturā. Nam
fine sanitate actionē integram habere nō
possumus. Et nono meth. cap. 9. Sicut pri-
mū propositū est in methodo, morbi subla-
tio, ita in opere de sanitate tuēda, est sani-
tatis tuitio. Igitur erit necessaria.

Ad secundū: Gal. meth. 2. cap. 4. Necesse
tibi erit, eo quod secundum naturam est
prius præsumpto, ita quod est præter natu-
rā inquirere. Nā si ipsum quod secundum
naturā est, nō nosti, nec quod egressum est

à natura nosti. Igitur primùm sanitatē cognosces, antequam morbum cognoscas.

Ad tertium: Gal. 2. meth. cap. 6. exempli probat: Nam quum crySTALLINUS humor e intemperie laborat, omnino læditur oculorum functio. Ceterum non est, ut eorum organa sint morbus. Præterea Hippocrates constituit aliud esse in corporibus similibus morbi genus, aliud in instrumentariis: Igitur distinguuntur.

Ad quartum: Gale. meth. 1. cap. 5. Quoniam omnis morbi curationem inuenire propositum est, necesse est, morborum numerum prius sciri.

Ad quintū: Gal. de consti. art. med. cap. 12. Differt numeri morbus à quantitatis morbo, ex eo quod in hoc morbi genere particula nōnunquam integra: in illo verò portio quæpiam alicuius particulæ aut amputanda est, aut adiicienda.

Ad sextum: Gal. primo meth. cap. 8. tria rerum genera enumerans, primum genus corporum, alterum actionum, tertium inquit esse genus causarum, quæ hos affectus creant, quæ ad medendi artem incipiendam primùm sunt noscenda.

De cura singulorum sex morborum in genere.

Morbus in cōplexione per sui contrariū aufer

fertur. Nam si calidus sit, frigidus, si frigidus, calidus, si humidus, siccus, & econuerso mouebitur: si ex utroque sit compositus, utroque contrario indigebit: si quidem contraria contrariis curantur. Morbi in formatione, in nuper nato animali ad habitum naturalem tantum reducuntur, posthac emendari non possunt. Similiter morbi in auitate parui, quum adhuc augetur animal, per quietem & alligationem redduntur: magni verò per partium operationem & spiritus retentionem. Morbi in numero si ex aliqua particula deficiente fiant, eam efficere studebimus subministrando naturæ, si ex superabundanti hanc rescabimus, hæc omnia sanare possumus. Sed quòd omnia generentur, non æquè possumus: morbis in magnitudine similiter excedentibus naturæ modum: ablatio & abolitio cōuenit: deficientibus, refectio vel generatio. Morbos in situ, si quæ particule à suo situ dimoueantur, ad suum locum reducendo, sanabimus.

*Loci consentientes ex vera
Medicina.*

Gal. in art. med. cap. 89. Curatio vnam præcipuam ac communissimam habet intentionem, ad id, quod est dispositioni contrarium auferendam. Calido enim affectui causa

frigida contraria est, frigido calida, e-
 démq; in ceteris proportionē seruata. E-
 cap. 93. eiusdem libri, In his igitur qui ad
 huc crescunt, possibile est pluriū partium
 figuram emendare: in his autem qui iam
 aucti sunt, minimé. Et cap. 96. Quum mo-
 borum in numero duplex sit differentia
 quibus aliqua particula deficit, his intētio
 alteram efficere subministrando naturā.
 At quibus superabundat, hanc refecare
 oportet aut scalpello, aut igne, aut medi-
 camento quod vrēdi vim habeat. De aliis
 morbis lege cap. 97. & 98. eiusdem libri.
 Gale. 8. meth. cap. 3. Illud esse verissimum
 omnium, inquit, quod contraria cōtrario-
 rum sunt remedia. Et cap. primo eiusdem
 libri, Omnis excessus per contrarium ex-
 cessum sanatur. Similiter lib. 7. cap. tertio.
 & lib. 4. cap. 2. Curabis, inquit, calidum re-
 frigerando, frigidum calefaciēdo, & c. simi-
 lis sententia est aphor. 2. aphor. 22. & in
 mille aliis locis.

Obiectio.

Obstructio ad quem horum morborum
 referenda erit?

Responsio.

Obstructio est cōpositionis morbus in
 meatu siue in orificio, fitque ex lentis ac
 crassis humoribus, curatque per apertio-
 nem,

em, quæ fieri solet per abstergentia atq;
incidentia medicamina.

Obiectio.

Intelligisne per apertionem, vulgarem
medicorum digestionem, an aliud ab hac
distinctum? Nam digestio Auicennæ est re-
quis materiæ incrassatio, vel crassæ & len-
æ extenuatio.

Responsio.

Intelligo per apertionem, humorum ac
meatuū præparationē. Nā humores opor-
tet esse nō tam fluxui paratos, quàm etiam
aperta esse foramina, per quæ debet pur-
gatio fieri, vt Gal. aphorif. primo, cōm. 24.
Et secundo aphorismo, cōment. 9. Nā tunc
fluidum esse corpus pronunciat, quū tam
in humoribus, quàm etiam in meatibus
referatis fuerit apertum.

De Morborum indicijs in genere.

Indicia morborū vel à ratione temporis
sumuntur, & sunt tria, præsentia, præteri-
ta, & futura. Nam vel morbum præsentem
indicāt, vel futurum esse prænunciant, aut
memoriæ subiiciunt: hæc omnia interdū à
medicis prænunciatiua vocantur. Vel su-
muntur à ratione suæ essentix, & sic erunt
quatuor. Primū ab exeuntibus in quanti-
tate & qualitate mutatis, & cognoscuntur
à multitudine excrementorum, siue per
urinam

urinam, per sudorem per vomitū, per spiritum, & per secessum, & per qualitatem mutatam, sicut est totius corporis rubor vel pallor, venarū ac membrorum tumor, &c. Secundum ab operatione læsa, & cognoscitur à gravitate, à pigritia, à sensuum incertitudine, à pulsu magno & pleno, ab anhelitu, à corporis extenuatione, &c. Tertium à propriis morborū accidentibus, sicut in pleuritide, à tussi, à dolore, à febre. Quartum à membrorū positu, ut à capite, à ventre, & ab aliis locis affectis. Vel sumuntur indicia à viribus corporis, & hoc trifariā: vel à virtute animali, & cognoscitur ex motu, ex ratione, & sensibus. Vel à virtute vitali, & cognoscitur ex pulsu & ex spiratione, vel à virtute naturali, & cognoscitur ex urinis & ex egestionibus. Horum quedam sunt salubria, quæ salutem, quædam insalubria, quæ mortem prædicere solent.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Gale. in art. med. cap. 7. Signa sunt salubria & insalubria, quæ præsentem indicant ægritudinem, & futuram prænuntiāt, atque præteritam memoriæ subiiciunt. Et paulò inferius, Hæc quoque secundum tria tempora salubria & insalubria dicuntur, quorū vsus maior est de indicatiuis, quàm
ex

his quæ memoriæ subiiciunt. Galenus
 artic. med. capite 81. Quæcunque ex-
 ernuntur, nonnulla quidem sunt veluti
 partes patientium locorum, nonnulla tan-
 tam excrementa: quæ verò in ipsis con-
 nentur, singula propriam faciunt iudi-
 cationem, & sic ab exeuntibus sumitur in-
 dicium. Gal. primo de loc. aff. cap. 5. Loco-
 um notæ, ab actione læsa, & excrementis,
 & positur, & doloris proprietate, & à pro-
 priis accidentibus sumuntur: affectuum
 verò ab excrementorum specie, à loci natu-
 ra, & doloris proprietate, & propriis acci-
 dentibus. Sanè actio læsa affectam partem
 indicare potest, &c. similiter 3. de Sympto-
 matum diff. cap. 3. de his indicia habentur.
 Gal. method. 9. cap. 13. Hæc itaque cum vi-
 res indicet, maxima harum erit dignitas.
 Nam vivere ipsum nobis ex harum custo-
 dia constat, utpote quum vitam, aut ipsas
 esse vires, aut earum actiones sit necesse, &c.
 Hipp. aphorism. 2. aphorism. 33. In quouis
 morbo mente constare & bene se habere,
 ad oblata bonum, contra verò se habere, ma-
 lum. Et Gale. in hoc comment. Ex his con-
 stare mente cognosces, quæ ad cerebrum
 & omnes membranas, sicuti ad ventrem at-
 tinent hepar & cor, ubi adest promptitudo
 ad ea quæ offeruntur, &c. Gal. 1. de articu-
 rat.

rat. ad glauc. Virtus vitalis, quam ex corpore
prodire ostendimus, ex pulsum debilitate
cognoscitur: atque ex hepate oritur, natu-
ralis dicta, ex sanguineis egestionibus
aquosis & tenuibus, & quæ ex cerebro origi-
nem ducit, animalis dicta, ex motuum ve-
lutariorum imbecillitate deprehenditur, &

De alia signorum di-

uisione.

Sumuntur etiam indicia à complexio-
ne, ab humorum dominio, ab ætate, à tem-
pore, consuetudine & victu præterito con-
plexiones cognoscuntur per decem gene-
ra. Primò ex tactu, ut si calidus, frigidus. Se-
cundò ex adipe & carne addita: nam mul-
ta caro caliditatem, pauca cum multo adi-
pe, frigiditatem. Tertiò ex celeri ac tar-
di capillorum ortu: nam celer caliditatem, tar-
das frigiditatem. Quartò ex corporis co-
lore: nam color croceus, rubens, luteus ac
pallidus caliditatem, albus, liuens, plum-
beus, frigiditatem. Quintò ex membrorum
forma: nam ampla, lata caliditatem: angu-
sta verò, frigiditatem. Sextò ex membro-
rum sensu: nam citò sentiens, caliditatem:
tardè, frigiditatem. Septimò à cogitatione
hominum. Octauò ab operationibus: nam
celeres operationes caliditatem, & ecòtra
frigiditatem. Nonò ex superfluitatibus cor-
poris:

ris: nam si quid egrediens acutum ha-
 at odorem, caliditatē indicat: si minus,
 frigiditatem. Decimò ex accidentibus ani-
 mæ, vt ira, audacia, inquietudo, impietas, &
 similia caliditatem: econtrà verò, frigidi-
 tatem. De ætate id dictum est, pueros &
 iuvenes esse calidos: senes & decrepitos, fri-
 gidos. Similiter ex tempore & consuetu-
 dine & victu præterito iudicandum est.

*Loci consentientes ex vera
 Medicina.*

Gal. lib. de sectis ad eos qui introducun-
 tur ca. 4. & 5. Hoc igitur modo illi ab ipso
 effectu eius quod confert, indicationē eli-
 ciunt: similiter ab ægrotantis viribus, ab
 ætate, ab anni tempore & regione, &c.

Auic. secunda primi cap. 3. Signorū ge-
 nera, quibus complexionum dispositiones
 cognoscuntur, sunt decem, & ea enumerat,
 exempla singulorum afferens, vt dictum
 est suprà.

*De vrinæ definitione &
 diuisione.*

Lotium, est sanguinis aliorūque hu-
 morū serea quædam redundantia. Id tamē
 existimandum est optimū lotium, in quo
 residet candidū, leue, & æquale, per omne
 tempus: vel id optimū est, quod vrinæ sa-
 norum est simillimū. Tria in lotio confide-
 rantur,

rantur, substantia, color & hypostasis. Substantia sit tenuis, crassa: nam si tenuis & alba sit, vel virtutis imbecillitatem, vel nimium obstructionem significat. Si tenuis & pallida, vel tenuis & rufa, virtutis imbecillitatem, & quo ad substantiam, crudelitatem significat. Tenuis verò & flaua inclinationem, & alimenti defectum, vigilias animi pathemata significat. Tenuis rubra sanguinem incoctum: tenuis & nigra, melancholiam, vel nimiam frigiditatem, a sanguinis adustionem indicat. Crassa verò & alba, maximam crudorum humorum copiam demonstrat: si crassa & rubea, plenitudinem sanguinis: si crassa nigra, evacuationem atræ bilis significat. Color flauus, rubeus, caliditatem: albus, liuens, atque frigiditatem denotant. Hypostasis verò conuidentur secundum situm: nam si in fundo non diuulsa residet, sed pyramidalis, bene nam indicat concoctionem: si in supremo loco, diuulsa & inæqualis, imbecilliter virtutis: si in medio loco, malum portendit, maxime si diuulsa sit: nam naturam defecisse in concoctione ob distractionem significat. Consideratur etiam vrina iuxta suum colorem: nam rubea, sanguinis incoctici copiam, & morbi cruditatem indicat: idcirco morbum facit diuturnum. Nigra

cu

qualitate humorum putrescentiū signum
paruerit. Interdum igitur signum in vri
de mittendo sanguine apparet.

*De pulsum definitione &
diuisione.*

Σφύγμὸς, id est pulsus, est cordis arteria-
imque dilatatio ac contractio. Considera
r pulsus vel ratione virium, & tunc est
plex, vehemens, quando scilicet tangen
s manus validè repellitur: lāgidus, quū
ualidè imbecillū ictum edit: mediocris,
mediā seruans proportionem. Vel ratione
rteriæ, & est duplex, durus & mollis. Vel
atione diastoles, & est trinus, vt altus, lon
us, latus. Vel ratione plenitudinis & eua
uationis, & est duplex, plen⁹ & vacuus. Ple
us, qui arteriam solidiorem vndosāque
n compressione ostendit: vacuus, qui ina
itatem suo digito representat. Vel ratio
ne rhythmī, in quo proportionēs tempo
ris metiuntur, & sic est duplex, deficiēs vel
intercidēs. Vel ratione tēperaturarū, & statū.
anni, temporum, regionū, sexuum: de qui
bus satis loquuti sumus infra, vbi Galeni
loca citauimus. Vel ratione somni & vigi
liæ, vel aliarum causarum non naturalīū:
nam in somno languidiores minoresque
sunt: quum à somno expergiscuntur, vehe
mentes & crebriores sunt.

f :

*Loci consentientes ex vera
Medicina.*

Gal. 4. de diff. puls. Pulsus est distenti
& contractio cordis & arteriarum. Et ibi
varias pulsuum descriptiones ex antiqui
recitat. Quod verò ratione virium cōside
retur pulsus, habetur ex Gale. 4. de præfag
ex puls. cap. vlt. Quum, inquit, pulsus pe
se sint languidi, infirma est facultas, vbi e
rum arteriarum languidus nūc pulsus sit
nūc vehemēs, facultas nō est per se imbeci
la, sed ex copia humorum degranatur, &c
& ibi omnia ad virtutē. spectantia per pul
sum declarat. Et 3. de diff. pul. Pulsus qui cū
renisu quodam pulsat, Vehemens vocatur,
cuius causa est facultatis robur. Quod ve
rò ratione arteriæ pulsus consideretur, ha
bes ex Gal. primo de caus. puls. Reliqua,
inquit, & tertia gignendorum pulsuum cō
tinens causa, ipsum est arteriarum cor
pus, &c. Et cap. de puls. causis ex diff. instru
mentorum, Quum durius aut mollius eua
serit corpus arteriæ, ipsos pulsus duros vel
molles reddit. Similis sensus est primo de
differ. puls. & in lib. finit. med. Gale. pri
mo de diff. puls. Iam quia arteria tres di
mensiones obtinet, longitudinem, latitu
dinem & profunditatem, non potest in
singulis dimensionibus non fieri quātitas
aliqua

qua distentionis & contractionis. Gale-
us primo de different. pulsuum cap. de re
quorum diff. generum, Plenus est pulsus,
si plenior arteriam ostendit. Vacuus,
si arteriæ eleuationem facit bulosam, ut
digitorum impressioni gressus per vacua
currat, & sic plenitudinis & euacuatio-
nis pulsus datur. De rhythmo genere pul-
sum habes Gal. 1. de diff. puls. cap. de diff.
quietis & rhythmī, dum plures species
rhythmorū pulsuum enumerat, quem fu-
tus leges. Omnibus enim naturis, locis, an-
i temporibus, omnibúsq; aliis suū rhyth-
num tribuit, & inter eos rhythmos alios
ari proportionē, alios impari cōstare in-
quit. De tēperie, Gal. 3. præfag. puls. Ex in-
temperie cordis calida fiunt pulsus imbe-
cilles: ex intēperie verò frigida planè effi-
ciuntur contrarij, parui, tardi & rari. De in-
temperie sicca & humida cordis tractat co-
dem lib. cap. ult. & lib. de introductione
puls. Calidiores natura pulsuum habent ma-
iorem, celeriorē, ac longè frequentiorē,
non multò tamen vehementiorē: graci-
liores verò, maiorē ac longè rariorem, ve-
rū non multò vehemētiore. Vide de his
similiter de usu pulsuum circa finē. De pul-
sibus ætatū, Gal. in introduct. puls. cap. 9.
Mutantur per ætates: sic puerulo nuper na-

to pulsus est frequentissimus, senum rarissimus: qui verò in media ætate sunt inter hos, iis pulsus ad proportionē respondent. De pulsu anni temporum Gal. loco nupercitato, Per anni tempora pulsus mutatur nam in medio vere maximi ac vehementissimi, celeritate verò ac frequentia moderati, similiter medio autumno habentur. Progrediente vere magnitudo ac vehementia ipsius minuuntur, augentur autē celeritate ac frequentia. Autumno progrediente omnia minuuntur, magnitudo scilicet, vehementia, celeritas ac frequentia: Adueniēte verò æstate, fiunt languidi & parui, celeres & frequentes: contrā verò in hyeme, in paruitatem, languorem, tarditatem ac raritatem mutantur, &c. De regione, Gal. loco citato, Per regiones mutatur: siquidē in calidis, pulsus sunt, quales in æstate media: in frigidis valde, quales hyeme media: in mediis ad proportionem se habent, &c. Quòd pulsus virorum à foëminarū pulsu differat, habes Gal. loco citato: Viri enim, inquit, mulieribus pulsum habent multò maiorē & vehementiorē, paulò tamen tardiorē ac longè rariorē. De somni pulsibus ac de expergefacto à somno, similiter de mutatione pulsuū per exercitiū, balnea, cibos & potus, aërem ac accidētia animi: nā
ab ira

si anteceſſit liuiditas, frigiditatem: cui
rò croceitas, colorem. Liuida frigida-
m, & virtutis interitum: oleoſa, totius
corporis adipis colliquationem indicat.
urſus ſi ſedimentum citò craſſum fiat, ci-
morbum ſolutum iri ſignificat. Si reſi-
t craſſum, aſſiſtente virium robore, lon-
um fore morbum: ſi verò imbecillitas ad-
ægri mortem prænunciat.

*Loci conſentientes ex ve-
ra Medicina.*

Theoph. de vrinis cap. 1. Lotium eſt ſan-
guinis aliorū que humorum aquea quæ-
am colatura. Gal. lib. finit. med. Vrina eſt
iperfluitas ex colatu ſanguinis in magna
ena, quæ per renes & vteras in veſicam
elabitur. Hippocrat. prognof. 2. tex. 26.
ὅδε ἔργον ἀρίστον ὅτε εἰ λευκή ἢ ἡ ὑπόστασις καὶ
εἴη καὶ ὁμαλὴ καὶ πᾶντα τὸν χρόνον. Gal. 1.
e criſ. cap. 12. Ex his igitur illa optima eſt,
quæ vrinæ ſanorum eſt ſimillima: quæ ve-
rò non eſt talis ſimpliciter, vel incocta eſt,
vel præter hoc pernicioſa. Gal. 1. de criſ.
cap. 12. Oportet vrinam optimam diſcede-
et tantum ſua craſſitudine ab aquoſa, quæ
um colore, ſi bene concoqui debeat, po-
nens differentiam in ſubſtantia & colo-
re, &c. Gal. loco citato, Præua autem ſuffi-
cienter eſt, quæ tenuis & alba eſt, ſicuti

aqua: nam simplex quidem dispositio est
 sed ultimæ imbecillitatis est indicatiū. Hu
 proxima est altera vrina vini tenuis, al
 colore, quæ in multis apparet morbis. Po
 hâc est subpallida, &c. Hippo. 2. progno
 tex. 30. Dum vrina tenuis fuerit ac ruf
 crudam esse significat ægritudinem. De
 tij colore Hippo. 2. progno. tex. 32. Exitio
 fior vrina est, si aquosa, fœtida, nigra, cra
 sâq; est. vide in hoc latius Galeni cōmen
 Quod situs hypostatis cōsiderādus, & ei
 color, lege Hippo. 2. prognost. tex. 36. Co
 siderāda, inquit, in vrina nubecula, utrum
 sursum fuerit, an deorsum, itē color quer
 obtinet, &c. De oleaginosa vrina Hipp. 2
 progno. tex. 35. Si pingue de super. nate
 æraneorum speciem refērens, damnādum
 indicat enim consumptionem. Et Gale. d
 cris. cap. 12. Quod si veluti oleum minga
 tur, colliquationis est signum. De color
 Hippo. 2. prognost. tex. 27. Vrina subrubra
 cum sedimento subrubro admodum salu
 taris, sed morbum diuturnum fore indi
 cat. Et tex. 33. eiusdem lib. In mulieribus
 & viris vrina nigra, in pueris aquosa, deter
 rima est. lege fufius Galēnum. De vrinis,
 quæ vel turbidæ minguntur, & paulò pōst
 residēt, vel quæ semper turbidæ micta
 permanent, aut quæ puræ minguntur, &
 postea

ostea conturbantur. habes plura ex Gal.
de cris. cap. 12. & aphorif. 4. comment. 7.
4. super primam epidemiam.

*Authores erronei dissentientes
circa vrinam.*

Adserere, renum nutritionis excremen-
tum tantum esse lotium.

Adserere, per vrinam cognosci posse
morbos ex succis ortos, qui in venis nō
continentur.

Adserere, sedimen in vrina esse semper
bonum indicium.

4 Adserere, ex Galeno non posse per vri-
narum cōiecturam in sectionis venæ co-
gnitiones peruenire.

*Confutatio dissentientium ex
vera Medicina.*

Confutat primam opinionem Gal. 1. de
nat. faculta. cap. vlti. contra Lupum quen-
dam dum inquit, Quòd autem soli renes
tantilla corpora quatuor interim totos,
vel etiam plures habeant excrementi con-
gios, id nec confessum, nec rationi con-
sentiens.

Ad secundum: Gal. 4. de sanit. tuend. cir-
ca principium, Quoniam lassitudo vitio-
acrium excrementorū oritur, ante omnia
cōsiderandum, in solidisne tantum corpo-

f. 2.

ribus, an intra venarum sinus, succus contineatur. De his quæ intra venas sunt, nullum planè: nec manifestum, nec evidens signum, præter solam urinam coniecere licet: in reliquis, quoniam qui affligitur usu sit victu existimandum, id est, per alia signa quàm per urinam coniecturandum quum urina in hoc casu sit exiguum signum. Et quarto de vic. ratione in morb. ac. Non tutò inquit Galen. comment. 83. morbi facilitas ex urinarum concoctione prænosceatur: nam etsi febris cruditates per urinas manifestè indicentur, morborum tamen musculos infestantium, non secuta est per urinas significatio, &c.

Ad tertium: Gal. aphorif. 4. cõment. 69. Contigit aliquando vel per initia morbi, vel paulò post, urinas factis crassas propter gravitatem habere sedimen. quod bonum signum non est, sicuti in aliis quæ ab initio tenues existentes, ratione coctionis totius morbi sedimen capiunt.

Ad quartum: Gal. 2. prognost. comment. 27. Quoties serum sanguinis pariter cum urina excernitur, colore subrubra apparet: indicat enim exuperantiam sanguinis non exquisita ratione confecti, & sic sectionem venæ. Et meth. 9. cap. 4. Mittendus est sanguis, etiã si nec in lotio, aut in ipsa caloris qualita

Authores erronei dissentientes circa plenitudinis indicia.

Adserere, plenitudinem mensurari posse tantummodo ex ipsis viribus.

Adserere, plenitudinē tantum esse quo ad vasa, non quo ad vires.

Confutatio dissentientium circa plenitudinis indicia.

Confutat primum Gal. lib. de plenit. cir principium, dum inquit, Qui ex ipsis viribus plenitudinem metiuntur, videtur nunquam vtres præter modum pletoſ vidisse, nec se etiā plus quā par vnquam impleuisse cibo, ita vt ventriculus inde distenderetur, &c.

Ad secundum: Gal. loco nuper citato, Itaue, inquit, subiecimus duas esse tum notiones, tum relationes multitudinis: alteram ad robur virēsque illius qui defert, alteram ad eius qui suscipit capacitatem, &c.

De signorum notitia vniuscuiusque humoris.

Sanguinis superabundantiam indicant, epletio, grauitas capitis circa oculos, oscitatio, nausea, lassitudo absque labore, dulcedo in ore, rubor, & sanguinis à quocunque loco facilis fluxus: indicant & temperies, victus præcedens, ætas, consuetudo & insomnia circa res rubeas. Pituitæ indicia, albedo, mollities, frigiditas, sputi copia,

copia, sitis pauca, somnus multus, otium
 pigritia, pulsus tarditas, & quæcunque
 victu & ætate & consuetudine indica
 possunt. Bilis indicia sunt, color flau
 siue citrinus, oris amaritudo, sitis copio
 sarius ac linguæ siccitas, pulsus crebri
 tas, nausea & vomitus biliosus, & quæc
 que dici possunt de ætate, temperie, victu
 ratione. Atra bilis indicia sunt, corporis
 macies, vigilie multæ, crassities ac nigri
 tudo sanguinis, multa sollicitudo, corpus
 durum, fuscum, pilosum, insomnia terre
 rem inducentia, in tenebris timor, simi
 liter ætas, consuetudo, ars, tempus & vi
 ctus ratio præterita de atra bile indicantur.

Loci consentientes ex vera

Medicina.

Faciunt ad sanguinis signorum proba
 tionem quæcunque dicta sunt ex Galeno
 lib. de plenit. circa principium, vt vaso
 rum distentio, rubor, grauitas vniuersi
 corporis, pigritia ad motum, membro
 rum tentio, lassitudo, prior vita in otio,
 victus ratio transacta, & suppressæ euacua
 tiones solitæ. Auic. secunda primi cap. 7.
 Sanguinis significationes cum dominan
 tur, significationibus repletionis secun
 dum foramina vicinæ existunt, &c.
 Nam de singulis humorum signis ibi
 diffin.

ffusè pertractat. Dictum est etiam de
s fusius de febribus, & ubi de humori-
is pertractauimus, & de morbis à ca-
te vsque ad pedes: nam ibi non solum
his, sed de obstructionum, flatuum,
oscessuumque signis apertè declara-
imus.

De artis curatoriae diuisione.

Ars curatoria trifariam diuisa est, in
ατητικήν, id est, in victus rationem: in
αρμακeutικήν, id est, medicamentorum
ationem: & in χειρουργικήν, id est, in eam
quæ manu medetur. Prima auxiliorum,
quæ digerendi, apponendi & concoquen-
li facultatem habent, est administratio,
confertque non solum sanis, sed etiam
omnibus ægris, & maximè febricitanti-
bus. Secunda est φαρμακία, id est medi-
catio dicta, quæ nudis medicamentis in-
teriores affectus & exteriores, in corpo-
rum cognitionem, & remediorum natu-
ram diuisa, sanat. Tertia est quæ incisio-
nibus, vstionibus, & ossium instauratione
homines curat.

Loci consentientes ex vera:

Medicina.

Corn. Cels. lib. 1. cap. 1. Medicina in tres
partes diducta est, ut una esset quæ victu, al-
tera quæ medicamentis, tertia quæ manu
mede-

medetur, &c. Auic. quarta primi, Res medicationis ex vno trium rerum cōpletur r
gimine, portione & chirurgia. Gal. prin
de vic. in morb. ac. cōmēt. 6. de triplici h
diuisione etiā ipse loquitur, scilicet de di
ta, chirurgia, quæ per sectiones, adustione
perficitur: & de pharmaceutica, quæ pe
medicamenta perficitur, accusans priscos
qui nihil de victus ratione scripserint. Ga
lib. finit. med. Medicina victus instituti
est, quæ in sanis atque ægrotis, rationi vi
ctus instituendæ studet. Gale. de art. curat
ad glauc. cap. 1. Ars curatiua qualitate &
quantitate singulorū medicaminū perfici
tur. Et lib. de cōstit. artis med. Hæc ars in
duo capita redacta est, in corporum nempe
cognitionē, atque ipsam remediorū natu
ram. Gal. 4. meth. cap. 1. Vnū esse morborū
genus ipsam quoque continuitatis solutio
nem diximus, hæc in animalis ferè omni
bus partibus accidit, &c. Vbi docet quibus
curandū sit intentionibus, &c. de hac plu
ra, quàm de chirurgia dicemus.

De victus diuisione in genere.

Victus ratio sumitur vel à ratione morbi
tantū, vel à ratione viriū ægrotantis & ma
teria morbi simul, vel à ratiōe tēporū anni,
ætati, vel à ratione suæ quātitatis vel quali
tatis, aut in vniuersali, vel in particulari.

De vict

ira pulsus fiunt alti, magni, vehemētes,
ceres ac frequentes: à mœstitia parui, rar
languidi, rari: à metu celeres, turbulen
nordinati, inæquales, &c. habes in hoc
ocitato plura ex Galeno.

*Authores erronei dissentientes circa pul-
suum doctrinam.*

Adserere, vtilitatem pulsuum esse ma-
gis necessariam, quàm respirationis.

Adserere, certius esse indicium ab vrina
sumptum, quàm à pulsu.

Adserere, cor & arterias moueri tan-
tùm ex motu pulsus.

Adserere, pulsuum genera esse, quàm
decem pauciora, cum Auerrhoe.

Adserere, ex repletione pulsuum dilata-
ri, & non econuerso.

*Confutatio dissentientium circa pul-
suum doctrinam.*

Ad primum: Gal. de vsu puls. Si respira-
onem cuiquam adimes, illico mortē affe-
es: at pulsu si per multas particulas pri-
es, nō magnopere lædes, & sic maior erit
espirationis vtilitas, quàm pulsuum. Præ-
erea ex Hippocrat. totum corpus est con-
pirabile atque confluxile. Quare si non
er arterias, saltem certè per alia, & potif-
imùm per venas, &c.

Ad secundum: Haly Abbas 7. suæ practi

f 5

ces inquit, quòd pulsus est praxo verus qu
multa refert. Præterea id certius est, quo
ab operatione sumitur, quàm quod ab ea
euntibus: sed pulsus sumitur ab operatio
ne: igitur certior. Probatur etiam ex vul
gari quodam carmine sic dicto,

Vrinae fraudes aperit discretio pulsus
Gale. i. de different. respirationis, cap. 18.
Plus indicat pulsus, quàm ipsa respiratio
Et lib. de const. art. med. cap. 18. hoc idem
affirmat, &c.

Ad tertium: Gale. 4. de diff. puls. proba
de mente antiquorum, non solum cor &
arterias moueri motu pulsus, sed etiã pe
se, sicuti etiam cerebrum. Vnde 8. de usu
partium cap. de usu instrumenti odoratus
probat cerebri interiores ventriculos aëre
se dilatando attrahere, & se constringen
do expellere, &c.

Ad quartum: Phylar. de puls. cap. 9. Ha
bentur genera pulsuum decem, quorum
primum, &c. Et Gale. i. de differ. puls. de
cem etiam enumerat: igitur non pauciora
quàm decem.

Ad quintum: Gal. de usu puls inquit, Ne
que enim eò quod impletur, idcirco dilata
tur: verum ex eo quod dilatatur, impletur,
contra Erasistratum.

De

De signis repletionem indicantibus.

Plethora est succorum æqualiter se habentium exuperantia: differtque à cacochoymia, quæ vitiosorum humorum non replet, sicuti cacochoymia. Plethora igitur duplex est, quoad vires scilicet: altera quoad capacitatem vasorum, cuius signa sunt vasorum distentio, rubor, totiusque corporis grauitas, & in mouendis membris pigritia, cum extensio, pulsum plenitudo, visus debilitas, & somnia quæ grauitatem portant. Hæc nisi sanguinis missione curetur, vitæ naturam strangulat.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Gale. 13. meth. cap. 6. Vbi autem æqualiter inter se succi adaucti sunt, id & plethos plethorâ Græci vocant, nos succorum plenitudinem siue redundantiâ dicimus. Vbi præterea flaua bile, vel nigra, vel pituita, vel quilibet humoribus refertum corpus fuerit, cacochoymiam, id est succorum vitium dicimus. Et lib. de plenit. ad finem, Plenitudo, est copia humorum in vniuerso anima & corpore. Et paulò post, quid intersit inter cacochoymiam & plethoram, apertiori sermone demonstrat.

Gal. lib. de plenit. inter indicia, venarum
tumo

tumorem, ac earum tensionem, ruborem corporisque grauitatem & in mouendis membris pigritiam memorat. Itidē me. 9. cap. 5. obstructionē, distentionē, tumorem, ruborem, in ea, quæ ad vasa refertur, repletionē, recenset. Auic. secunda primi doctoris, cap. 3. Repletio secūdū duos modos existit: est enim repletio secundum foramina, & est repletio secundum virtutem. Repletio secundum foramina est, vt sint humores & spiritus in qualitate boni, sed quantitate sui sint superflui, ita vt foramina impleant & extendant. Repletio secundum virtutem est, vt humores sui quantitate non noceant, sed sui qualitate. De duplici hac plenitudine habes ex Gale. lib. de plenit. & meth. 9. cap. 5. & 10. eiusdem libri cap. vlti.

Hippo. aphor. 1. aphor. 3. Habitus excitatorum qui ad summum bonitatis attingunt, &c. Ibi in comment. Gal. Nimirum repletio, inquit, calorem natium extinguit, &c.

Gale. meth. 13. cap. 6. Ergo plethora tum sanguinis missione curatur, tum frequenti balneo, exercitatione, frictione, & digerentibus medicamentis. Vide fufius 3. & 6. de sanit. tuenda.

Au

De victus ratione in morbis.

Morbus vel peracutus est, vel acutus, vel longus. In peracuto, qui in quatuor diebus indicatur, vti oportet tenuissimo victu, si-
ti meliorato: ratio est, quia totus hic morbus status est: idcirco in statu tenuissi-
mo victu vtendum est, præcipuè si vires cō-
stant: in lōgo, pleniori victu, vt ouis, ali-
i, piscibus, sed nō eodem quo in sanis mo-
do vtendū: in acuto verò tenui, vt ptisanæ
ioco. Quare duo in victu extrema dātur:
primū quòd sit victus tenuissimus: secundū
quòd sit crassissimus: mediat verò inter hæc
tenuis. Ratione igitur status morbi sem-
per victus ratio instituenda est.

*Loci consentientes ex vera
Medicina.*

Gal. aphorif. 1. comment. 12. Nam mor-
bus vel est acutus, vel peracutus, vel lōgus,
& quando maximè, &c. Hippoc. aphorif. 1.
aphorif. 4. Victus tenuis atque exquisitus,
in morbis quidem longis semper, in acutis
verò, in quibus non conuenit, periculosus.
Gal. in comment. Nunc dixisse sufficit, vt
in omnibus morbis, quibus morbi vigor
& iudicatio primis quatuor diebus futura
sit, modò natura sit fortior, integrā inediā
seruare debeamus: in quibus verò non vl-
tra primam septimanā protrahantur, forti

existente natura, solo vtendum est me-
 crato, solus autem hic tenuissimus victus
 esset, non tamen in extremo, &c. Et per
 hæc victum tenuem appellat ptisanæ h-
 deaceæ succum, & plenum victum, quæ
 est qui fit per oua & alicâ & pisces. Quæ
 verò morbus peracutus totus fit status, p-
 batur ex aphorif. 7. primi lib. vbi inquit
 Hippocrates, Vbi morbus peracutus e-
 statim extremos habet labores, & extr-
 mē tenuissimo victu vtendum est. Ex quo
 aphorismo probatur etiam, quòd ratio
 status morbi instituenda sit victus rati-
 Si vires consentiant, notanter dictum e-
 nam Gale. aphorif. 1. comment. 9. inquit
 Quòd si in ipso morbi vigore aliquis c-
 sus interuenerit, nature robur dissoluen-
 nutrire cogimur: quòd verò in longo mor-
 bo, pleniori victu vtendum Gale. loco nu-
 per citato, Cùm morbus consistit, victu te-
 nuissimo oportet uti: in aliis morbis, quæ
 suum vigorem sunt posterius accepturi, no-
 licet afferre statim ab initio tenuissimum
 victum: nam prius homo morietur, quàm
 morbus in vigore cōsistat, &c. Auic. 4. can-
 de cib. feb. Si videris ægritudinem chron-
 cam, aut propinquā chronicā, nō subtilie
 regimen, &c.

Obiectio.

Quum morbus non possit cognosci, ar-
 statum

atum habere debeat in quarta, vel in se-
tima, quomodo instituendus erit victus?

Responsio.

Vera præcognitione status morbi nō co-
noscitur, sed iuxta æstimationē, quæ pro-
xima est veritati, præcognoscitur, ex qua
unc victum ordinamus. Nam Gale. de vi-
cium robore primo aphorif. comment. 12.
idem refert esse coniecturandum.

*De ratione victus à viribus & à ma-
teria morbi Hip.*

Victus vel respicit vires tantum, vel ma-
teriam morbi tantum. Si solum vires, tunc
victus plenus conuenit: si solum morbi ma-
teriam, tunc nullus cibus cōuenit, quia ci-
bare prohibet naturam in morbum agere.
Hac ratione duo erunt victus extrema,
quorum alterum solum virtutem cōseruat
& auget, & talis victus erit sanorum: alte-
rum solum virium robur in materiā exci-
tat, & talis victus erit morbi peracutissi-
mi, in quo pene nihil datur. Medium verò
inter hæc extrema duplex erit, vel maio-
rem viriū partem seruabit, & minorem par-
tem in morbum excitabit, & talis erit vi-
ctus crassus, qui in lōgis morbis conuenit:
aut minorem virium partē seruans, maio-
rem in morbum relicit, & talis erit victus
tenuis, qui in morbis peracutis institui-

tur: aut tantum virtuti, quantum morbe tribuit, & talis victus est mediocris, qui in morbo acuto exhibetur. Si igitur vires sint debiles, & humores pauci & corrupti parum & sæpe cibandum: si vires debiles, & humores temperati, vel abundantes, parum & raro: si vires multæ, humores pauci non corrupti, multum & sæpe si vires multæ & corpus plethoricum, paucum & raro.

*Loci consentientes ex vera
Medicina.*

Gale. aphorismorum primo, cōment. ii. totius morbi victus rationem in vnoquoque morbo à duabus intentionibus iussit assumere, ex futuro totius morbi vigore, & ex viribus agrotantis, &c. Hippocrat. aphor. i. aphor. 9. Coniectari autem oportet, an æger cum victu sufficiat perdurare, ubi de victu, quoad vires, intelligit Hippocrates. Galenus in eodem comment. Est autem hæc intentio vis ipsa agrotantis, cuius gratia nutrimus: neque enim morbi causa: igitur ratione morbi nullus cibus conuenit. Auicēn. prima quarti, cap. 8. Et scias, quòd si non esset illud quod pertinet virtuti, esset magis necessarium, vt subtiliaretur cibus vltima subtiliatione, sed virtus non suffert, &c. Gale. aphorismo i. cōment.

ment. 4. In sanis corporibus semper oportet naturæ robur seruare vel augere alimentis, non demoliri. Est autem augere potens alimentum, quod plenum vocatur: conseruans, quod modicum existit: quod verò comminuit. tenue. Igitur dantur duo victus extrema: alterum augens vires, alterum in quo nihil datur. Et in eodem comment. Magna verò ex parte properamus in longis quidem morbis fouere vires. in acutis verò parum debilitatas conseruare. Igitur si fouere vires volumus, victu crasso vtremur, & sic partem maiorem viribus condonabimus, & minorem in morbum concitabimus. Et sequitur in textu, in acutis si vires sint parum imbecilles, conseruamus. Igitur non minus viribus, quam morbo dabimus. Auicen. cap. citato, Nam si ægritudo fuerit valde acuta, & virtus non deficiat vsque ad statum, tunc eam incitabis super materiam, & non facies eam occupari in cibo spisso, imò subtilia regimen statim cum dimissione cibi omnino. Igitur minus dandum est virtuti, & talis victus erit tenuissimus. Galen. aphorismo 1. commen. 17. Nam si sæpius, aut rarò, siue omnino nutrire oporteat, ab ægritudine & viribus primum maximè accipitur. Post hæc autem singula recitat, quæ à me prius

enarrata sunt, vt si humores corrupti vires debiles sint, parum & sæpius cibandum, &c.

*De ratione victus per
ætates.*

Ætas puerilis minus inter alias ætates in ediam sustinet: deinde qui in ætate consistente sunt, post hos decrepiti: senes verò, qui nondum ad extremam senectutem peruenerunt, facillime in ediam tolerant. Nam pueri ob id quòd crescunt, plurimum innati caloris obtinent, idcirco plurimum indigent cibo: senibus verò parum caloris inest, quam ob rem paucis egent alimentis. Medio modo se habent qui inter has ætates consistunt.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Hippocrat. aphorif. primo, aphorismo 12. Senes facillimè ieiunium ferunt, secundo loco qui ætatem consistentem habent minus adolefcētes, omnium minimè pueri, præsertim qui inter ipsos sunt viuidiore. Et hoc probans inquit, Qui crescunt, plurimum habent calidi innati: plurimum igitur egent alimento, alioqui corpus absunitur, &c. Auicē. quarta prima cap. de cib. febr. Omnis, cuius calor innatus fortis est valde, aut plurimus, aut calor

innatus est debilis valde, non potest di-
stingere cibum, &c. Gale. primo aphorif.
in ment. 14. Omne id eger alimento,
si plurimum ex corpore defluit: sed hu-
midioribus & plus aëris participantibus
plurimum defluit: igitur plurimo egent
alimento. Quare pueri quum humidio-
res & aërei sint, plurimum cibum expo-
sulant. Senes verò & iuvenes sicci & ter-
restres non sic resoluuntur, idcirco ieiun-
ium facillè ferunt.

*De ratione victus ex temporibus
anni sumpta.*

Conducunt anni tempora mirū in mo-
dum ad victus rationem instituendam:
nam in hyeme plus dare expedit, quàm
in æstate: siquidem hyeme, calore innato
ad interiora se recipiente, cibi facilius con-
coquuntur: contrà verò, in æstate ad exte-
riora se protendente non fit tam valida
concoctio, quare minus dare conueniet.
In æstate igitur sæpe & pauca exhibean-
tur: in hyeme, rarò & multa: in vere, rarò
& pauca: in autumnò similiter, sumpta à
roboris virium indicatione: si vires vali-
dæ, sæpe & multa: si verò imbecilles, pauca
& sæpius offerimus.

*Loci consentientes ex vera
Medicina.*

Hippocrat. primo aphorismorum, aphorif. 15. Ventres hyeme & vere natura calidissimi sunt, & somni longissimi, quare ea tempora alimenta copiosiora sunt exhibenda. Etenim tunc calor innatus primus est, unde & pluribus eget alimentis. Indicio sunt ætates & athletæ. Gale. comment. huius aphorif. Non parum, inquit, conducunt anni tempora ad victus rationem inueniendam: nam hyberno tempore plus appetunt homines, & cibum facilius concoquunt: contrà in æstate, & Hippocrat. aphorif. 1. aphorismo 18. Aestate & autumno cibos difficillimè ferunt hyeme facillimè, secundum locum ver habet, &c. Hippocra. aphorism. 1. aphorif. 17. Et quibus semel & bis, & quibus plura, ne cur pauciora particulatim oporteat afferre considerandum, condonandum est aliquid tempori, ætati & consuetudini. Gale. in commen. huius aphorismi, A tempore & ætate, & aliis, quæ sunt proportionalia victus, accipitur hoc modo æstiuo tempore, quantum ad temporis rationem attinet, sæpius & pauca danda sunt. Hyberno tempore ob virium robur multa sed rarò, &c.

D

*De victus ratione à ciborum
qualitate sumpta.*

Quæcunque præter naturam sunt, contrarias in victus ratione indicationes extulant: quæ verò secundum naturam sunt, similes. Nam morbus calidus & siccus cibum frigidum & humidum expostulat: calidus & humidus frigidum & siccum, frigidus & siccus calidum & humidum. & de reliquis. Similiter similia similibus conseruantur, seruata tamen quantitate & qualitate eadem inter se.

*Loci consentientes ex vera
Medicina.*

Hippocr. aphor. 1. aphor. 16. Victus humidus omnibus febricitantibus confert, maxime verò pueris, & aliis qui tali victu uti consueuerunt. Gale. in comment. Primum qualis sit adhibendus victus febricitantibus monstrat: deinde quòd victuum *ὁμαλύνει* indicationes iis quæ præter naturam sunt, contrarias: iis verò quæ sunt secundum naturam similes facere oporteat, &c.

Gal. 8. meth. cap. 9. Dictum sæpenumero est, id quod secundum naturam est, similia semper postulare, quod præter naturam est, contraria: siquidẽ quod naturaliter se habet, custodire: quod præter naturam

est, tollere oportet. Porro febris præter-
turam est, ideóque victus rationem frigida
& humidam exigit, &c.

*De vniuersali ac particulari
victus ratione.*

Vniuersalis totius victus ratio est, quæ
ad duos medendi scopos, ad morbi scilicet
vigorem, & ad agrotantis vires respici-
tur. Sed particularis est, quæ morborum acce-
ssiones in cibando cauere studet, ita vt ne
quando accessiones adsunt, nec quando tollun-
tur sunt, quicquam exhibeatur, cauend-
um ea interim quæ in ædiam ferre non
possunt corpora, nam & in ipso febris pri-
ncipio cibanda sunt.

*Loci consentientes ex vera
Medicina.*

Gal. aphor. I. aphor. II. totius victus ra-
tionem à duabus intentionibus, ex totius
morbi vigore, & ex viribus agrotantis assu-
mere iussit. Quod autem quispiam particula-
rim cibum afferat cōuenienter, in hoc docet
sermone, cauere iubens morborum acces-
siones. Et comment. 12. Totius victus figu-
rā ad duas respiciens intentiones faciebat,
quarū altera vis agrotantis, altera cōstitu-
tio morbi: particulares autem oblationes
ex accessionibus cōiecturabātur, &c. Hip-
poc. aphor. I. aphor. 11. In accessionibus
abstin

linere oportet: nam cibū dare, nocuum:
 quibus per circuitus fiunt accessiones,
 ipsa accessione abstinere oportet.

huius quarta primi, cap. de cib. feb. Et de
 moribus sunt corpora cholericā, quæ re-
 runt regimen diuersum ab illo quod
 timus. Ipsi enim quum non cibantur in
 febris principio, aut in hora status,
 est prauior, tunc nō vacuæ sunt dispo-
 sitiones eorū à duobus rebus: nam si sunt
 bilium virium, superuenit syncopis, &
 oriuntur in paroxysmo: si verò fortium
 rium, cadunt in extenuationem. Igitur
 ec corpora cauenda sunt, quæ ferre ine-
 am non possunt. Galen. meth. 10. cap. 5.
 liquos verò eorum cibabis, & quum inua-
 ira adhuc est febris, & quum incipit: sint
 orrò hi sicco ac calido temperamēto, & c.

*Authores erronei dissentientes
 circa rationem victus.*

Adferere, plenum victum in omnibus
 morbis conuenire.

Adferere, tenuem victum in omnibus
 morbis esse pleno præferendum.

Adferere, victum plenum vt crassum in
 diuturnis morbis non esse necessarium.

Adferere, victum tenuissimum in nul-
 lis morbis esse exhibendum.

Adferere, victus scopum sumi tantum
 debere

- debere à viribus, non à morbo.
- 6 Adferere, esse incipiendum à tenui victu in principio morbi, & procedendum ad pleniorē.
- 7 Adferere, qualitatem & non quantitatem esse tantummodo consideranda, & econuerso.
- 8 Adferere, in febribus carnem, præstī delicatis, non esse præbendam.

*Confutatio dissentientium circa
rationem victus.*

Ad primum: Hippoc. aphorif. 1. aphor. 7. Vbi morbus peracutus est, statim extremos habet labores, & extremè tenuissimū victu vtendum. Igitur plenus victus in omnibus morbis non conuenit. Galenus præterea hoc ipsum attestatur in comment.

Ad secundum: Hippoc. aphor. 1. aphor. 7. Victus tenuis atque exquisitus in morbis quidem longis semper, in acutis verò, in quibus non conuenit, periculosus. Igitur in omnibus morbis pleno nō est præferendus. Præterea Gal. in hoc comment. In sanis seruandum robur vel augendū, monet in ægris rarò augēdum, in longis morbi conseruandum, in acutis mediocriter debile seruandū. Quare sicuti in acutis tenuis, ita in longis plenus erit præferendus.

Ad tertium: Hippoc. aphorif. 1. aphor. 7. Tantum

Tantum cibi indulgendum est, quāto mor-
bus extremis molior est. Galenus in com-
ment. præcipit tantum à victus tenuitate
declinare, quantum morbus ab extremis
edit. Igitur quanto tardiores ferè mor-
bi statum iudicabimus, tanto magis craf-
ti victu utemur.

Ad quartum: Hippoc. aphor. 1. aphor. 6.
Extremis morbis extrema exquisitè reme-
dia optima sunt. ubi Gal. inquit, Hippocra-
tes præcipere, exquisitissimam curatio-
nem & victum pariter adhiberi tenuissi-
mum. Igitur victus tenuis in his morbis
est exhibendus.

Ad quintum: Gal. 1. aphor. comment. 12.
Cum igitur tres essent intentiones ad per-
fectam & indeficientem victus rationem,
prima quidem sumpta ex viribus aegrotā-
tis: Secunda, ex morbi cōstitutione: Tertia
ex particularibus accessionibus, assumi de-
bet, &c. Igitur non tantum à viribus, quan-
tum à morbi cōstitutione, scopus rationis
victus assumi debet.

Ad sextum: Gal. aphor. 1. comment. 7. In
morbis, qui sunt suum vigorem posterius
accepturi, nō licet ab initio afferre tenuis-
simum victum. Nam prius homo è vita mi-
grarit, quàm morbus in suo vigore con-
sistat.

Ad

Ad septimum: Hippoc. aphor. 1. aphor. 13. Coniectari oportet, an æger cum victu sufficiat perdurare, &c. Et aphor. 13. Senes cillimè ieiuniū tolerāt, &c. Et aphor. 13. Ventres hyeme & vere natura calidissimi &c. In omnibus his locis loquitur de quantitate victus instituendi, quæ à virtute, à ætate, à tempore sumenda est. Igitur quantitas est consideranda. Et particulariter Gal. 1. de art. cur. cap. 9. Quātitas cibi tanta, ut bene concoqui valeat. De qualitate iam dictum est superius.

Ad octauum: Gal. 1. de art. cur. ad Gl. 3. cap. de feb. tertiana, concedit ex piscibus aquaticatiles, ex volatilibus quæ molli carne consistunt, ita & gallorum testiculos, & suum pedes & cerebra, præsertim deliciosis.

De parte Pharmaceutica.

Medicatio bifariā diuisa est, in euacuationem & in alterationem. Euacuatio multifariam, vel per sectionem venæ, per clysteres, per vrinas, per secessum, per sudores, per diuersionem & deriuationem, per menstrua, per hæmorrhoidas, per nares, per palatū. Alteratio verò erit duplex, vel secundum qualitatem, vel secundum locum. Alteratio secundum qualitatem nihil aliud est, quàm mutatio eius, quæ prius fuit, qualitatis: mutatio verò secundum locum non altera

eratio dicitur, sed potius latio, quæ est
oris loci mutatio: alterationis verò spe-
s concoctio existit.

*Loci consentientes ex ve-
ra Medicina.*

Indicatio huiusmodi est euacuatio &
eratio, inquit Gal. in art. med. cap. 89.
uacuationes verò fiunt & per sanguinis
sionem, & clysteris vsum, & per urinæ
as, atque eam, quæ fit per cutem, transpi-
tionem, ac per eam, quæ fit ad partes op-
positas, attractionē, & ad alias propinquas
riuationem, &c. Gal. primo de naturali-
is fac. cap. 1. Nec ea modò quæ in colore
sapore mutantur, alterari dicimus, sed
quid ex calidiore fit frigidius, & ecōtra:
am commune nomen alteratio est. At ge-
us aliud est in corporibus quæ situm mu-
nt, cui latio nomē est: hi duo motus sunt
mplices, scilicet alteratio & latio, sed cō-
ofiti ex quibus alteratur substantia, sunt
iminutio, auctio, generatio & corruptio,
&c. Vide etiam de his secūdo meth. & pri-
mo de loc. aff. Quòd verò alterationis

species sit concoctio, vide Ga-

lenum in art. med. cap.

89. & fusius secūdo,

& tertio de

nat. fac.

Qua

*Quomodo alteratio, concoctio, & humorum
preparatio ac digestio inter
se differant.*

Quid sit alteratio iam dictum est. CO-
coctio verò duplex est, altera quæ penes
menta perficitur, & est mutatio in proprio
eius quod mutatur qualitatem: altera, quæ
impropriè maturatio dicitur, est quædam
in concoquentis substantiam eius quod
coquitur deductio: vnde Concocta etiam
dicuntur, quæcunque à natura euiecta sunt.
Cruda verò quæ nondum euiecta. Digestio
verò est veluti quædam alimenti distributio.
Nam Græci *αὐτάδωσι*, id est, cibi distribu-
tionem per totum corpus à nativo ca-
re facti dicunt. Interdum sumitur diges-
tio pro discussione excrementorum
pro segregatione, quæ à facultate expur-
trix & attractoria perficitur, vnde à conco-
ctione differt in particula. Differt etiam
quia concoctio ad digestionem præire so-
let, vel quia à diuersis facultatibus utraq-
ue fit: alteratio autem, quum sit humorum
qualitate mutatio. quomodo ab his dif-
ferat, iam notum est. Solùm enim in iis me-
bris alteratio conuenit, qui non amplius
aliqua causa fouentur, sed tantum contri-
tibus remediis indigent, vt hectica & dia-
febris: & hæc perficiuntur absque conco-
ctione.

ne, digestionē, & præparatione. Quid
em sit præparatio, vide de obstructione
superius.

*Loci consentientes ex ve-
ra Medicina.*

Gal 2. de fac. nat. cap. 4. Concoctio est al-
mentatio quædam, ac nutriētis in propriam
utilitatem eius quod nutritur, mutatio. Si-
militer 3. de nat. fac. cap. 4. & 7. & 8. eius-
dem libri asserit. Quòd verò concoctio si-
gnificet maturationē, videri potest apho-
rismi comment. 12. vnde Galenus, Si aliqua
erit inflammatio cum tanta meatuum
constrictione, vt nihil extra effundatur, ne-
cessè est illam esse & cōcoctū difficilem, &
longo tēpore perdurare, vbi terminos con-
coctionis paulò inferius docet. Nam cru-
dissimus, inquit, morbus est, in quo nihil
expuitur: secundus in quo sanies tenuis est:
tertius in quo crassior: quartus in quo per-
fectam habet concoctionem, id est matura-
tionem. Vide tamē etiam Galenum de hac
maturatione secundo de victu in morb. ac.
comment. 45. fusius loquentem. De dige-
stione Gal. 6. de sympt. cau. cap. 2. Igitur ali-
menti per corpus digestio, Græci *αὐτὸ δόσις*
vocat, inter naturalia opera numeratur,
quum ex ventriculo in iecur, atque ex hoc
in vniuersum corpus alimentum digeri-

h

tur: & sic digestio sumitur pro distributione Gal. 1. prognost. comment. 23. in fine comment. Humores tenuiores ac calidiores a excretionem parati sunt. crassi verò & crudi ad abscessum vel ad digestionem: porro id ipsum ut per concoctionem medeatut excretio quædam est, quæ ex urina plerumque, raroque per aluum efficiatur. Quod concoctio præcedat digestionem siue segregationem, hoc habes ex primo aphor. comment. 22. Siquidem, inquit Galenus, ante concoctionem non medicari oportet: nam post concoctionem natura euacuationi adminiculâs humores discernit, & superfluitates expellit: quare concoctio ad digestionem præcedit. Præterea Gal. aphor. 4. comment. 22. Quando aliquis morbus incipit, si quid excernitur, nihil excernitur tunc naturæ ratione: quia cum à causis morbum facientibus grauatur, & cruditas humorum adest, tunc aliquid bene euacuari est impossibile: siquidem oportet concoctionem præire, subsequi verò discretionem, deinde euacuationem, &c. Gal. meth. 11. cap. 9. Quum dictum sit contrariorum contraria esse remedia, quid vetat omnibus febricitantibus frigidam vno ordine exhibere? Nam ostensum est, ipsius febris, prout febris est, aquâ frigidam semper esse remediū: quod verò
ad

alia spectat, non semper, id est, febris
aut calor est, frigidus indiget, id est, alte-
ri ad frigidum: sed ubi alia fuerit causa
etiam calor, non alteratione, sed & prępa-
ratione indigebit, &c.

Obiectio.

Quum quis dixerit excrementum cru-
m vel concoctum, de qua cōcoctione in-
telliget, pręsertim si tale excrementū mu-
tum nutrire non valeat?

Responsio.

De vniuersaliori significato intelliget:
am Gal. 2. de vic. in morb. ac. cōment. 4 5.
Generali, inquit, concoctionis significato
timur, quum vel catarrhū, vel coryzam,
vel fluētes ex his humiditates, vel eas quę
ex oculis manāt, aut crudas aut coctas esse
dicimus, quę concoctio est, quum natura
humores euincit.

*Authores erronei dissentientes circa
digestionis, concoctionis, &
humorum prępa-
rationem.*

- 1 Adserere, digestionem esse humorum
alterationem.
- 2 Adserere, concoctionem à frigidis fieri.
- 3 Adserere, pręparationem à digestionem
& à concoctione non esse alienam.

- 4 Adferere, humores calidos ac tenues præparatione prius indigere, quàm euentur.
- 5 Adferere, humores crassos cū extenu-
tibus ac inuidentibus esse maturandi
& concoquendos.

*Confutatio dissentientium circa
concoct. & digest.*

Gal. lib. finit. med. Digestio est concoctio
ac confecti, & in sanguinē conuersi alime-
ti in corporis particulas omnes attractio
quam natius color molitur. Igitur non
humorum est alteratio.

Obiectio.

Quum duplex sit digestio, altera alimen-
torum, altera humorum siue excremento-
rum, cur exemplum tantū affers de dige-
stione alimentorum?

Responsio.

Exemplum tantū adduxi de alimētis,
quoniam digestio etiam excrementorum
est veluti segregatio, quæ nō minus quàm
prima à calore innato perficitur: nec per
alterationem, ut nonnulli putarunt, con-
ficitur, sed per ea quæ calorē innatum ro-
borant.

Ad secundum: Galen. 3. de ratione vic. in
morb. ac. comment. 29. Cōcoctioni perpe-
tuò calidum opitulatur, confertque: fridi-
dum

in verò renititur & aduersatur.

Obiectio.

Ergo biliosi humoris concoctio non fiet
in frigidis.

Responsio.

Circa nomen deciperis: nam biliosi humoris non dicitur concoctio, sed potius aliter ratio, quæ nullo pacto vel cōcoctio vel digestio dicitur: nam nec flaua bilis, nec atra sanguinis substantiā redire possunt, teste Galieno 2. de vict. in morb. ac. commēt. 3. 1. sed in contrarium alterati, nisi fortè per digestionem vel cōcoctionem intellexeris à natura euinci, quæ euictio dici potest maturatio, siue imperfecta concoctio.

Ad tertium: Quæcūque fiunt à diuersis causis, inter se sunt aliena: sed præparatio, concoctio & digestio fiunt à diuersis causis: ergo sunt inter se aliena. Quòd verò fiunt à diuersis causis, probatur: nam cōcoctio & digestio fiunt à natura, præparatio autem tantum ab arte.

Ad quartum: Gal. 1. de sanit. tuend. circa finem. Quòd si vel crassitudinis, vel abundantiae, vel lentoris excrementorum vitio meatus obstructi sunt, tenuatoria victus ratio his competit.

Obiectio.

Nō possum capere, quo pacto in humore

h 3

tenui præparatio fieri debeat, quum hu-
mori nec incisio, nec alia præparatio
competat, sed ratione sui possit euacuari.

Responsio.

Præparatio quatuor in partes diuisa est,
quarum prima est crassorum humorum præ-
paratio siue extenuatio: secunda est meatuum
obstructorum reseratio: tertia est quæ hu-
mectantibus ac laxantibus, ut puta quæ
& alimentis, & balneis perficitur, de qua
loquitur Hippoc. aphor. 4. aphor. 13. ubi in-
bet ante epotum veratrum corpus præhume-
ctandum esse cibis, balneis & quiete. Quar-
ta est humorum multitudinis obstruentis, &
omnia vasa replentis apertio. Quare dici-
mus si non ratione humoris crassi, vel ra-
tione meatuum obstructorum, siue à crassi-
tie, siue à copia, saltē ob eam quam nobis
monstrauit Hippocrates, ut mollius cor-
pus reddamus, præparationem molimur.

Ad quintum: Quæcunque maturantur
coguntur ac incrassantur, teste Galeno 4
de ratione vict. in mor. ac. ubi inquit, Ne-
cesse est, quæcunque concoquuntur ac euir-
cuntur, cogi ac incrassari. Igitur non exte-
nuari nec incidi debent. Præterea Gal. lib.
de totius morbi temporibus, adserit, vri-
nam, sputum, lippitudines, & omnes hu-
mores, qui à cerebro per palatum & ner-
uos de

is defluunt, esse ab initio aqueos tenués-
se: quum verò temporis processu conco-
tionem adsumunt, crassiores euadere &
tuciores. Et sic quæcunque maturantur,
crassiora euadunt. Similis sententia habe-
r ab ipso Hippoc. prognost. 2.

*De euacuatione per sectio-
nem venæ.*

Venæ sectio, est vniuersalis euacuatio,
quæ auctiorem humorum super æqualita-
tem venis exuberantium euacuat. Verum
est, quòd plenitudo nō semper de sectione
venæ indicat: nam hæc ipsa ab humoribus
rudis fieri potest, qui sectionē venæ haud-
quaquam exposcunt. Indicatio sectionis
venæ sumitur à magnitudine morbi, à vi-
tium robore, considerata tamen ætate pue-
ri vel senili, & aëre nos ambiente calido
vel frigido. Sumiturque indicatio ab ipsa
patientis temperie, ab habitu totius corpo-
ris, à loco habitationis, ab anni tempori-
bus. Fit sectio venæ ob duas causas: aut
quia sanguis inutilis est, & suam qualita-
tem non seruans, nutrire non valet: aut
quia vires premit, aut venas & arterias
distendit, findit & obstruit. Tempus in-
cisionis erit, si fieri potest, à principio mor-
bi: si minus, dummodo morbus sectionem
requirat, nullus dierum numerus erit con-

siderandus, sed vsque ad quatuor dies er
 factitanda sectio. Quantitas extrahendi
 sanguinis erit, quousque color mutabitur
 aut virium robur sustinebit, & in virium
 imbecillitate aut dimittenda est, aut parti
 ri expediet. Venæ secandæ sunt in capiti
 passionibus exteriores, à collo infrà inte
 riores, à renibus infrà quæ per malleolo
 ac poplites decurrunt.

*Loci consentientes ex vera
 Medicina.*

Auic. quarta primi, cap. de phlebot. Phle
 botomia est euacuatio vniuersalis, qua
 multitudinem euacuat. Multitudo est au
 gmentum humorum super æqualitatem
 ipsorum in venis. Gale. de cur. ratione per
 sang. missionem, Sin infesta sit degrauans
 plenitudo, haud semper sanguinis molliē
 da detractio est, cuius rationem paulò in
 ferius reddit. Auic. loco allegato itidem
 asserit, inquiens, Et debes scire, quòd quo
 tienscunque fuerit plethora, non debes
 phlebotomare, quoniam repletio quando
 que ex humoribus crudis fieri potest: quòd
 si minueris, non maturabis eos, & timebi
 tur ne æger perdat, &c. Gal. de cur. ratio
 ne per sang. miss. cap. 20. Scopi in mitten
 do sanguine sunt, morbus ingens, robúr
 que virium, excepta ætate puerili, & aëre

ambiente valde calido. Et cap. 13. eius-
dem lib. Morbi itaque magnitudo cum vi-
ri in robore, primi erant mittendi sangui-
scopi. Idemque asserit meth. 4. cap. 6. &
meth. 9. cap. 5. Itidem quarto de ratione
et. in mor. ac. commēt. 24. Similiter Hip-
ocr. eodem lib. cap. 19. attestatur. Gale. de
cur. ratione per sang. miss. cap. 13. Deinde
considerandum, quæ sit naturalis hominis
temperies: nam quibus amplæ sunt venæ,
quæque modicè graciles sunt, nec candidi,
nec tenera carne præditi, copiosius euacua-
ntur, &c. Et meth. 9. cap. 17. enumerat cōsue-
tudinem, ætatem, locum habitationis, an-
te tempus, & laborantis vires. De tempo-
re sectionis habetur Galeni textus de opt.
et. ad Thrasybu. cap. 37. Plerumque, in-
quit, remedia ut purgationem & sangui-
nis missionem adhibemus, quum morbus
quidem non adest, sed futurus timeretur. Et
paulò inferius, Age enim, inquit, in decre-
mento inunctio, cataplasma & cibus abhi-
betur, & istorum cuiusque est propriū tem-
pus: sed in initio ac morbi incremēto san-
guis mittitur. Et de cur. ratione per sang.
miss. Non numero tantum animaduertes,
quod quidam faciunt, sed & corporis habi-
tui: nam sunt qui septuaginta annos nati
sunt, & sectionem perferunt. Gal. 9. meth.

cap. 11. Sanguis, inquit, naturæ inutilis fieri potest bifariam, vel sui qualitatem non mutans, ut ampli⁹ nutrire non possit, aut vim premat, aut venas & arterias distendat, obstruat. Gale. de cur. ratione per sang. miss. cap. 20. Igitur vniuersim hoc sciendum in sanguinis missione, dierum numero haud attendendum, &c. Et paulo inferius. Quocunque die mittendi sanguinis scopos in laborante inueneris, in eum auxilium illud adhibeto, etiam si is vel vigesimus ab initio extiterit. Et Auic. quarta primi, cap. de phleb. Non attendas quod quidam dicunt, quod non est bonum post quartum diem ut fiat phlebotomia, quoniam bonum est, ut fiat etiam si fuerit post quadraginta dies. Hippo. 2. de ratione vict. in morb. ac. cap. 10. Eousque auferendus est sanguis, donec rubidior multò, vel pro puro rubidiorque liuidus fluxerit. Similiter Auic. quarta primi, cap. de phleb. à coloris mutatione, & à leuitate & laxitate pulsuum signum ponit. Almanfor lib. 7. cap. de phlebot. & Haly Abbas lib. 9. cap. de phleb. dicunt, quod non debemus considerare mutationem sanguinis, nisi in calidis apostematibus, ut in pleuresi, quod verum est. Nam Gal. lib. de curandi ratione per sang. miss. cap. 14. inquit, In quibus iuxta sectam
venam

nam phlegmone est ingens, optimum sanguinis & in colore & consistentia mutationem expectare, &c. Et paulò inferius, Non semper hæc expectanda est, sed nequam mutatio fiat, cessare conuenit, tum ob infirmas vires, tum ob phlegmonis paruitatem. Gal. de curâdi ratione per sing. mist. cap. 12. Vbi multa euacuatione opus, & vires sunt imbeciliores, in his euacuationem partiri expedit. Et Auic. ca. de phleb. Cùm phlebotomia fuerit necessaria cum debilitare virtutis, partire phlebotomiam sicuti diximus. Gal. loco allegato cap. 16. Igitur interior utilis est in his, quibus inferiores collo partes patiuntur: exterior verò in iis, quibus quæ his superiores sunt, vt facies & caput, &c.

*Authores dissentientes circa
sectionem vena.*

- 1 Adserere, sectionem venæ non nisi manè esse committendam.
- 2 Adserere, obstructionem & putredinem esse causam mittendi sanguinem.
- 3 Adserere, sectionem venæ non competere morbo non assistente.
- 4 Adserere, in die iudicatoria sectionem venæ fieri debere.
- 5 Adserere, sanguinis detractionē visum hebetare.

Adser

6 Adferere, in plenitudine sectionem vnae semper esse perpetrandam.

7 Adferere, fluente aluo esse mittendum sanguinem.

8 Adferere, nullum esse temporum ante discrimen in secunda vena.

Confutatio dissentientium circa sectionem venae.

Ad primū: Gal. de cur. ratione per sanguinem. cap. 12. Quamobrem nec per noctem sanguinem mittere verearis: siquidem ridiculum est, quod quidam facit, à secunda diei hora ad quintā aut sextam solummodo sanguinē mittentes, haud alio quouis tempore, &c.

Ad secundum: Gal. 2. meth. cap. 14. Nec obstructio, nec putredo causa est mittendi sanguinem, sed succorū redundantia: nam nec obstructio, nec putredo per sanguinis missionem curari possunt, ut quæ alia remedia desiderent.

Ad tertiū: Gal. de opt. sect. ad Thrasyb. cap. 37. Plerunque, inquit, remedia, ut purgationem & sanguinis missionem adhibemus, quum morbus quidem non adest, sed futurus timeatur.

Ad quartum: Auic. quarta primi, cap. de phleb. Neque phlebotomia, neque ventris solutio fieri debet in die motus ægritudinis,

is, nec quum ægritudo est crīsim habi-
ta, sed si possibile fuerit, quies est haben-
da. Habes etiam in hoc aphorismum vige-
nti primi, ibi, Quæ iudicantur vel iudi-
cata sunt, &c.

Ad quintū: Gal. de cur. ratione per sang.
lib. 1. cap. 7. Sunt quidam imbecillioribus
visceribus aut scotomacis, in quibus sanguis
mandare dicitur: hos omnes euacuabis,
medicamento purgante, si alij à sangui-
nis humoribus sint, aut diminutione sangui-
nis. Et sic sanguinis detractio cōuenit, nec
debetat, sed viuidiores reddit.

Ad sextum: Gal. 4. de vict. in morb. ac.
comment. 19. Pletoria non semper sangui-
nis missione curanda, sed & frictione, bal-
neis multis, abstinentia: faciunt etiam quæ
ante recitata sunt superius ex Galeno
et Auicenna ad hoc probandum.

Ad septimū: Hippo. 4. de vict. in morb.
lib. 1. cap. 118. Si cupiam sanguinem auferre
conferat, ventrem cōfirmare oportet, & ita
auferre, &c. Et Gal. hoc in loco, Fluente
humore, inquit, sanguinē ne detrahes, ne perse-
uerante fluore virtus prosteratur.

Ad octauum: Gal. ad Glauc. cap. 14. Qui
minimo de temporum statu nihil cogitan-
tes sanguinem abstulerunt medici, hos om-
nes interemerūt. Et quarto de vict. in mor.
ac. com

ac. comment. 19. Si abunde aer calidus
ficcus fuerit, tunc à sanguinis missione
stinemus, etiam si morbus magnus fuerit
& ætas florens.

*De purgatione per medica-
menta soluentia.*

Purgatio est humorum, qui sua qualitate molestant, euacuatio, ob idque purgatio dicitur, quia sanguinem ab excrementis purgat. Hæc purgatio ab ipso Hippocrate vocatur vasorum inanitio, ab euentu: nam omnia vasa inaniri euenit in omni euacuatione. Intentio euacuationis non solum humorem superabundantem respicit, sed et vires & naturam illius qui debet euacuari. Ad euacuationem quatuor requiruntur primū, robur virium: secundū, quod materia non sit crassa nec viscosa: tertiū, quod meatus non sint obstructi, sed aperti: quartum, quod nullū adsit apostema intus secum, nec illa sint extensa, nec materia sit in aliqua parte firmata, sed à natura sit euicta. Quantitatē purgantis medicamenti quæ præberi debeat, ignoramus. Verū tantū medicamenti erit propinandū, quantum in plurimis mediocriter euacuari non ueris. Nō fiat igitur euacuatio nimia, quod etiam periculosa est. Qualitas verò medicamenti ea sit eligenda, prout natura redundat.

etis succi exposcit: nam si flaua bilis, vel
sita abundet, quæ flauam bilem vel pi-
uam educat, tempus purgandi erit ab ini-
morbi, si humores turgeant: si verò in
qua parte firmentur, vel crudi sint, eouf-
morandū in purgando, donec à natura
incantur siue concoquantur: vel eo tēpo-
euacuādū, quò superfluitates natura ex-
lere conatur: nam tunc ad id, in quo na-
a deficit, supplere debet medicus. Tem-
verò particulare erit, vt purgationes
accessionibus morbi fiant per superio-
& in remissionibus per inferiora. Si
ulta simul purgātia pharmaca miscueris
sint congenera, vt simul eodē tēpore sol-
nt: vitandāq; est medicamēti insuauitas,
eius vehemētia moderāda: quanquā de-
m sint, quæ in purgatione sunt confide-
nda, vt repletio, virtus, cōplexio, acciden-
n, figura, ætas, tempus, dispositio aëris &
gionis, consuetudo euacuandi, &c.

*Loci consentientes ex vera
Medicina.*

Gal. aphor. 1. comment. 2. Euacuatio est
morū, qui sua qualitate molestant, pur-
tio. Et in lib. de purg. med. fac. Purgans
pharmacū ob id dicitur, quia à recremētis
urum sanguinem reddat Gal. aphor. 1. cō-
ment. 3. Intentio quantitatis euacuationis
non

non solum humorem respicit superabundantem, sed & vires hominis, qui debent auacuari. Nam alij minus, alij magis preferunt euacuationes. Idem etiam asserit aphor. 4. comment. 2. Gal. aphor. 1. comment. 24. Considerare oportet, nunquam aeger idonee se habeat ad purgationem. Nam quicunque multa cruditate laborant, vel qui tenaces ac crassos cibos assumpserunt, & quibus *ὑπερβολὴ* extenta atque inflata sunt, aut aliqua viscerum adest inflammatio, omnes ij non sunt apti ad purgationem. Et aphor. 1. comment. 3. In omni euacuatione vires aegroti oportet attendere, & donec laborans tolerat, humorem exuberantem educere: quum vero dissoluantur, etiamsi remaneant superfluitate cauere oportet eorum euacuationem. Idem Auic. quarta primi, cap. 5. asserit. Ad iungit etiam, quod fastidium habentibus molestae sint purgationes. Gal. de cur. ratione per sang. miss. cap. 12. Quod laboranti prebendum sit medicamen, aut bilem tui flauam tum atram, aut pituitam, aut ferculum excrementum euacuans accurate nouimus. Ceterum quantum praebere debeamus. Similiter in lib. de sect. ad eos qui introducuntur, cap. 5. asserit. Et aphor. comment. 23. Quantitatis euacuationi nullum

nulum habemus indicatiū, nisi ex toleran-
 ti facilitate. Gal. Aphor. 2. comment. 22.
 Evacuatio nimia morbum parit. Et Hipp.
 Aphor. 1. Aphor. 3. Sic & euacuationes, quæ
 extremū deducunt, periculosæ. Et Auic.
 quarta primi, cap. 3. Et scito, inquit, quod
 iduum materiæ dimittere, quod necesse
 est euacuare, est minus nocuū, quàm ex-
 cessitè euacuare: ibi etiā omnis euacuatio
 perflua secundum plurimū febres gene-
 rat. De qualitate euacuationis Hipp. apho.
 Aphor. 2. Si alia purgētur, qualia purga-
 oportet, confert, & leuiter ferunt. Gal in
 comment. Sermo est de eorum qualitate,
 quæ euacuantur. Si igitur pituita super-
 undet, hanc omnino oportet euacuari:
 bilis autē bile vel atra infestante, demissa
 pituita, bilem euacuandā, &c. Hipp. Apho.
 Aphor. 22. Concocta medicari, atque mo-
 ere non cruda, modò non turgeant, pluri-
 ma verò non turgent. Et Gal. in comment.
 Tales humores euacuare cōuenit, qui agi-
 antur, & de loco ad locum mouentur ac
 transfluunt: qui verò in aliqua parte firma-
 ti sunt, neque alio auxilio moueri oportet,
 neque medicari ante cōcoctionem. Et pau-
 lō post, Si natura mediocrius atque imbe-
 cillius agat, id quod deficit, oportet supple-
 re: nam natura expellente, & medicamento

attrahēte, humoris noxi euacuatio fiet.
Auic. quarta primi, cap. 3. In acutis agri-
dinibus maturationem expectare melius
est, quā euacuare, præcipuè si quietæ fue-
rint. Quod si moueantur, ad euacuandum
festina: nam impedimētum eius motus
maius, quā suæ euacuationis. Gal. in lib.
quos purg. oportet, Purgandi occasio
temporibus morbi sumitur, vt puta pur-
gationes in accessionibus per superiores par-
tes, in remissionibus per inferiores con-
niunt. Gal. in lib. quos purg. oportet. Pu-
gantia medicamenta, si simul misceantur,
congenera esse debent, id est, eiusdem na-
turæ, vt eodem tempore soluant. Gal. lib.
comp. med. Per genera purgantis medic-
amenti insuauitas ac eius vehemētia mo-
randa est. Auic. quarta primi, cap. 3. Dece-
rent in euacuando consideranda: & enum-
rat omnia quæ dicta sunt. Primū est reple-
tio: nā nisi repletio supponatur, nulla op-
esset euacuatione. Robur virtutis: nam vbi
virtus deficeret, inanis esset euacuatio. Cō-
plexio: nam vbi nimis calida vel frigida
foret, non competeret euacuatio. Similiter
accidentia vehementia prohibent euacua-
tionem: sic figura si sit raræ texturæ, ne spi-
ritus resoluantur: sic ætas nondū parata: sic
hora regioque nimis calida vel frigida, vt
septen

entrionalis & meridionalis, sic ars la-
 iosa euacuationem non admittunt. Et
 lib. de sect. ad eos qui introducuntur,
 .5. Euacuatio est plenitudini contraria,
 contraria contrariorum sunt remedia:
 um vires, ætatē, tempus anni, & regio-
 n, & alia antè enumerata prius confide-
 re oportet, &c. Et de feb. ad Glau. cap. 14.
 si fuerint vigiliæ vehementes, aut dolor
 ensus ægrotum infestans, cauendæ sunt
 vitæ ac malæ euacuationes, &c.

*Authores erronei dissentientes
 circa purgationem.*

Adserere, pharmaca non proprios hu-
 mores attrahere.

Adserere, purgantia medicamenta à nu-
 trimento non differre.

Adserere, nullo modo purgantia phar-
 maca in principio morbi esse exhiben-
 da, nisi materia turgat.

Adserere, purgantium pharmacorum vsum
 etiam non valde indigentibus esse utile.

Adserere, in die critica nullo modo
 pharmacum esse præbendum.

Adserere, pharmacum nulla habita tē-
 poris anni ratione posse exhiberi.

Adserere, ob igneam caliditatem in fe-
 brium principio esse verenda pharma-
 ca, etiam si materiæ copia adsit.

8 Adferere, pharmaca purgantia æquè
mnes indifferenter humores purgare

9 Adferere, euacuationē optimam esse
copia humorum peccantiū extracta si

*Confutatio dissentientium circa
purgationem.*

Ad primum: Gal. de element. 2. circa
nem: Exeuntia ostendunt quàm propriu
humorem quodlibet pharmacum attr
hat. Quotiescunque enim quis medic
mentum hauserit, quod vim habeat bile
euacuandi, vomitu huiusmodi hum
rem eiiciet. Et paulò infra, Ex quibus
cet manifestè inferre, vnumquodque me
dicamentum, cui vis purgatoria inest, pro
prium attrahere humorem. Hoc idē etia
asserit primo de fac. nat. cap. 14. & de attr
bile cap. 6. & 9.

Ad secundū: Gal. 3. de nat. fac. cap. 7. Po
rò in hoc dissidet medicamentum à nutr
mento: nam medicamentum vim corpori
vincit, nutrimentum verò ab hac vincitur
Et 3 de temp. cap. 2. At quæ quidem assimi
lantur, omnia nutrimenta vocantur, reli
qua omnia medicamenta: vnde quatuor
species medicamentorum enumerat. Pri
ma, quæ non mutatur à corpore, sed corpori
mutat ac vincit. Secunda, quæ initium mu
tationis habet à corpore, deinceps putre
scit

& , & putrescendo corpus corrumpit ac
refacit: & hæ duæ species medicamen-
tum venenosorum sunt. Tertia est , quæ
corpus alterari facit, sed mali nihil infert.
Quarta species eorū est , quæ agunt & pa-
tentur aliquid, sed per spatium temporis
decuntur & assimulantur: & hæc sunt tam
medicamenta, quàm nutrimenta, &c.

Ad tertium: Hippoc. Aphor. 2. Aphor. 29.
Cum morbi inchoant, si quid videtur mo-
dum moue: cum verò consistunt ac vi-
sent, melius est quiescere. Vnde Gal. in
comment. Vt melius hoc eueniat, melius
est circa principium euacuare, quò mino-
rem factam materiam natura possit faci-
lius concoquere. Vnde hic de multitudine
dicitur Galenus, quæ euacuari in princi-
pio expostulat. Verum est, quòd etiam eua-
cuatur in principio, si humorū mala quali-
tas adsit, vt in pestilenti morbo videtur.
Nam Galen. 9. de meth. præcipit, in corru-
ptela humorum cum viribus imbecillis
cautelatim quod vitiosum est euacuare. Si-
militer quarto de sanit. tuend. Sin, inquit,
vires imbecilliores dehortantur, sanguis
cautelatim mittendus est, sed deiectio medio-
ris adhibenda. Euacuatur quoque in prin-
cipio morbi, si locus læsus urgeat, vt pleu-
ritis, aut si in aliquo alio principe loco

materia decumbat. Nam Hippoc. 2. & 4. de vict. in morb ac. tex. 76. Si dolor sub thorace fuerit, & valde infestauerit, pleuretico ventrem subpurgabis. Similiter Gal. in comment. Si vehemens febris non sit, hominisque naturam noueris, ad medicamentum purgantis potum te conferes, &c. Euacuatur etiam maximè si vehemens dolor alicubi fuerit. Nam Gal. aphor. 1. comment. 23. In maximis doloribus nullum maius inueni remedium, quàm vsque ad animi defectum euacuare, &c.

Ad quartum: Gal. aphor. 3. comment. 15. Euacuatio per purgantia pharmaca valde indigentibus & ex longo interuallo vix utilis est. Nam si quis vti voluerit bis vel semel in mense, veritus ne superfluitatum multitudo aggregetur, præter id quod morcebit, corpora etiam in malam trahet consuetudinem (quàmquam Gal. de pharmaco valde purgatorio intelligat) sed vti solutiuis, quæ sunt veluti siliquæ Aegyptiæ, Manna, Dactyli, Indi, quos Tamarindos vocant, succus rosarum violarum, Myrobalani, Rheubarbarum & similia, non esset tam grande peccatum, maximè si morbus fieret, factus vel faciendus hoc exposceret.

Ad quintum: Hippoc. 4. de euct. in morb.

ac.

text. 76. pharmacum exhiberi in quarta iubet. Vnde, inquit, si dolor valde infestaverit, pleuretico ventrem subpurgabis: ventrem tamen purgans medicamentum quarta die ministrabis. & tribus primis diebus clysteres exhibebis. Et Gal. in comment. non tantum in prima, sed in tertia, & quarta se præbuisse pharmacum ait. Verum id nota, quod ipse inquit, Si minus dies indicatorius expectetur, quocunque die hæc tuto præbebuntur, &c.

Ad sextum: Hipp. Aphor. 4. Aphor. 5. Sub cane & ante canem difficiles sunt medicationes. Vnde Gale. reddens rationem, inquit: Nam purgatio prava fiet, quum calor aëris ambientis in partem trahat extrinsecam, contrariam ei, ad quam medicina ducit humores. Ex quibus dictis Galeni collige duos motus contrarios esse in medicina verendos.

Ad septimum: Gal. 9. meth. cap. 5. In quo morbo adest humorum abundantia & calor vehemens, ibi est inter ipsa sanandi remedia discrimen, ut si abundantiam euacuare velis, febrem augeas: si febrem refrigerare, abundantiam moreris: & in hæc consilij inopiam deueniunt, qui statim ab initio non euacuarunt, &c.

Ad octauum: Gale. de atra bile cap. 6.

At si verum esset, omnes humores qui
vasis continentur, alteratos quidem à
dicamento pro illius facultate æquè
cuari, simile vtrique fuerit auxilium
aliquo horum medicamentorum purgum
& secta vena exinaniri. Cur igitur
γῡγα hydericis exhibemus, quum li
vena secta sanguinem euacuare? Sim
quoque sententia habetur eodem in
cap. 9.

Ad nonum: Hippocrat. Aphorif. 1. Aph
23. Deiectiones non multitudine sunt
stimandæ, sed si talia deiciantur quæ
conueniunt, & ægri faciliè tollerant. Vi
Gal. in comment. Quare non promptè
eorum quæ euacuantur quantitatem op
ter attendere, sed duas, quæ dictæ sunt
gnificationes, si qualia oportet euacu
tur, & si facile tollerant.

Obiectio.

Antequam pharmacum soluat erit
dormiendum? Aut si solutionem tardat
rit, eritne aliquid vltra exhibendum?

Responsio.

Auic. quarta primi, cap. 5. respondet tu
obiectio, inquit, si medicina sit fortè
super eam dormiat, alioquin natura med
cinar

im digeret, nec illico se mouere de-
bet cum sedata fuerit anima, ambulet
oucatu

d secundum, Auic. Si solutionem pro-
gauerit, bibat hydromel, vel suppona-
ur clystere, cauendo tamen, ne duas
medicinas ventrem soluentes in
vna die coniungas: quoniam
periculosum est & ex-
tra rectitudinem
iudicij.

i s

IOANNI

BACCHANELL

REGIENSIS,

De consensu Medicorum in curandis morbis, Lib. II.

Cephalæe descriptio.



EPHALÆA est dolor diuturnus, difficultérque solubilis, qui per quosdam excutitur intolerabilem capitis passionem affert.

Loci consentientes de Cephalæe descriptione.

Gal. 3. de loc. aff. cap. 9. Est enim affectus hic, dolor diuturnus difficultérque solubilis, qui à parua occasione vehemente habet accessiones, vt neque strepitum neque vocem, neque luminis splendorem neque motum tollerare possit infirmus sed tranquillitatem obscurúmque cubiculum quærat, &c. Similis sententia est in Gale. 2. de comp. med. per loc. cap. 2. Hanc passionem vocat Auic. prima tertij, cap. 35. Ouum & Cauthati siue Alechud.

hic quod interpretatur Galea, ut in corone ex Andream Belunensi, vel potius ex Auic. commentatoribus apparet. Nam illa omnia tribuit, quæ à Galeno de cephala recitantur. Aët. ser. 6. cap. 48. ita belunitari Galenū videtur, ut nil aliud quàm a Galeni verba exprimat, quod identitè, sed breuiusculè agit Paulus Aeg. lib. 5. Cornel. Cels. lib. 4. cap. 2. In capite interdum acutus ac pestifer morbus est, quem κεφαλαίαν Græci vocant, dolorque intolerabilis circa tempora vel occiput, &c.

De loco affecto.

Cerebrum afficitur aut eius membra, quas Græci μύρινας vocant: interdum dolor intra caluariam se continet, interdum extra.

Loci consentientes de loco affecto.

Gal. 3. de loc. aff. cap. 9. Quæ cephalæa à ledicis nominatur, nemo dubitat quin cerebri sit morbus. Alexan. lib. 1. cap. 17. Fit inflammatio in caluariæ membranis & cerebri pelliculis orta. Paulus lib. 3. cap. 1. Quibus intra caluariam morbus constitit, his dolor oculorum radices porrigitur: quibus extra est, circa caluariam dolent. idem Gale. 2. de compo. medi. per loc. capi. 2. asserit. Auicē. prima tertij, capit. 35.

Fit

Fit ab ipso phlegmone in cerebro, aut
velaminibus existente, &c.

De causis cephalæ.

Causæ sunt vel per se, vel per consent
Si per se, vel erit primitiua, à Græcis *παρακρίσις* dicta, velut est ardor, frig
tas, ebrietas, plaga, &c. Antecedens, à
Græcis *προηγμένη* dicta, erit sextuplex: primi
humorum multitudo: secunda, parti
pitis imbecillitas: tertia, obstructio n
tuum: quarta humorū mala qualitas: qu
ta, intemperies simplex: sexta, sensus e
berantia. Vel causa erit coniuncta, à Gr
cis *συνάκτιον*, id est, concausa, cephalæ
actu efficiens, & erit triplex: mala co
plexio, soluta continuitas, vel vtraque
mul. Rursus mala complexio vel erit ca
da, vel frigida, sicca vel humida. Causæ
læ complexionis calidæ, sunt sanguis, b
lis, pituita salsa. Causæ malæ complexion
frigidæ, sunt humores & vapores frigida
Causæ malæ complexionis siccæ, sunt di
cuniculares, motus corporei & animal
De causis humidis nulla fit mentio, ex
quòd dolorem non pariunt, nisi cum al
qua acrimonia, vel alia mala qualitate co
iunctæ sint, &c. Solutæ continuitatis cau
sæ sunt omnia quæ continuitatem disso
munt, &c. Si verò causa sit per consensum
tum

vel erit ab aliquo membro mittente,
à ventriculo vteroue, aut ab hepate,
aliquis: aut à præcedentibus morbis.

Loci consentientes de causis cephalæ.

Gal. 2. de comp. med. per loc. cap. 1. Cause
iucientes sunt quinque: prima est iu-
ntemperiem simplicem, citra humo-
complexum: alia iuxta humorum qua-
rum humorum contingit: quarta, quã
titudo hæc transitus humorum ac va-
um obturat: quinta quum in quibus-
a capitis partibus ob imbecillitatem
ritus flatuosus innascitur. Sexta quam
unximus habetur ex Gal. 3. de loc. aff.
ibi. 9. ibi. Neque absurdum est, inquit, ut
osdam ob sensus exuperantiam dolor
fester, quemadmodum in ore stomachi
cidit, &c. Auic. similiter prima tertij,
p. 35. huius ægritudinis causam ponit ce-
bri imbecillitatem, & fortitudinem sen-
s eius, &c.

De causa procatarctica loquitur Gal. 2.
de compos. medi. per loc. cap. 1. ibi. Quan-
doque etiam ob causam aliquam externam
procatarcticam laceissentem, velut est ar-
dor, frigiditas, ebrietas, plaga capitis,
dolor contingit. Avicen. prima tertij, de
uniuers. ser. Cause primitiuæ calefacien-

tes

tes sunt, sicut sol, ignis, vinum potus
crapula, &c. De causa coniuncta ibi etiam
loquitur Auicen. loco citato dicens, quod
causa doloris immediata aut est mala co-
plexio, aut solutio continui, aut utraque
sicut in apostemate, &c. De mala compl-
xione loquitur Gal. 2. de composi. medi-
per loc. cap. 1. ibi. Vehementissimi dolo-
res fiunt iuxta caliditatem & frigidita-
tem, moderati iuxta siccitatem, ad humi-
tatem, nullus consequitur dolor, &c. Gale-
Aphor. 4. comment. 70. Fiunt enim dolo-
res capitis etiam ex calore solo, nonnun-
quam ex flaua bile, quæ vel in capite vel in
ventriculo continetur, ut ex abundantia
humorum caput opprimente: vel propter
aliquam loci obstructionem, vel à spiritu
flatuoso, habente in parte ipsa generatio-
nem. De causa per cōsensum loquitur Aui-
cen. prima tertij, cap. 35. ibi. Et multotiens
contingit à morbis antecedentibus, qui sub-
stantiam cerebri, & eius velamina tam in-
trinseca quàm extrinseca debilitarunt. Fit
etiam ex vaporibus stomachi ad caput elat-
tis, &c. Alexand. lib. 1. de dol. cap. Dolor,
inquit, capitis non semper primario affe-
ctu efficitur, sed per consensum nonnun-
quam alterius mēbri: unde si ad nimium
iecinoris calorem dolores capitis oriātur,
multo

quo vehementiori cruciatu laborantem
gunt, ob fumos eiusdem visceris ca-
metentes, &c.

De signis cephalæ.

imum si dolor fuerit à causa procatar-
, cognoscitur ex affectu derelicto. Si
r fuerit per essentiam in capite, dolor
inuò agrum lædet, læsionemque in ali-
cerebri parte cõprehendemus, & cum
quis cerebri operationibus manifesta
apparebit, sicuti in sensu visus vel a-
sensibus. Quod si dolor capitis per con-
um fieri cõtigerit, tunc per consentien-
membrum læsionem magis vel minus in-
sam, dolor magis ac minus crescet mi-
que. Cognoscitur etiam à primordio
us læsionis: nam quod primum læditur,
eri læsionem infert. At si ab intemperie
dolor, citra humorum complexum, tunc
manifestus calor vel frigus absq; vlla in ca-
e grauitate sentietur. Quod si ab intem-
rie humoralis, tunc vnius cuiusque humo-
aderunt particularia signa: nam sangui-
is sunt septem, rubedo, tensio, grauitas,
ctus calidus, pulsus magnus, somnus ob-
porum copiam, vrina crassa, rubea. Bi-
is signa sunt sex, dolor acutus, mordicans,
ictorius in anteriori & dextra capitis par-
, vigilie, coloris flauities, parua graui-
tas,

tas, tactus acris, calidus, pulsus velocis-
 fitis. Pituitæ signa sunt quatuor, color
 bus, dolor obtusus & perseverans in occi-
 te, somnus profundus & pigritia. Melan-
 choliæ signa sunt, liuor, in facie nigritas,
 sensuum corruptio, dolor obtusus perse-
 rans in parte occipitis sinistra. Flatus sig-
 na sunt loci extensio, nulla adest gravitas:
 interdum fit cum sonitu & tinnitu, perma-
 net dolor de loco ad locum, & multipli-
 cato vapore maior fit in capite pulsus: in-
 gignatio interdum corrumpitur, & sequi-
 tur vertigo. Dolorem qui fit à soluta con-
 tinuitate, ipsa solutio indicat, quæ nisi
 trinscus appareat, per puris ac sanguinis
 excretionem cognoscitur. Si fiat dolor à
 aliquo abscessu, aderunt signa lethargiæ
 vel phrenitidis: si fiat à febre, tunc ipsa co-
 nsciente dolor augebitur, & declinante mi-
 nuetur.

Loci consentientes de signis cephalæ.

Gal. 2. de compo. medic. per loc. capit.
 2. Habet hæc affectio interdum continuo
 dolores, interdum exacerbationes & in-
 terualla, siue ordinata siue inordinata: in-
 termittunt exacerbationes veluti in comi-
 tiali morbo correptis. Dolores igitur cum
 gravitate humorum multitudinem signif-
 cant: cum mordacitate, aut humorum vel
 vaporum

porum acredinem: cum pulsu inflammam
nem: cum tensione citra grauitatem ac
osum, tenuis ac ventosi flatus multitudi-
nem demonstrant: si verò cum pulsu, mem-
branosi corporis inflammationem: si verò
in grauitate distentio fiat, humorum mul-
titudinem intra membranas contentam.
Eodē in libr. cap. 1. Qui ex ardore caput
dolor, cutis tactus aridior, oculosque ru-
ros habent, frigidisque tum perfusioni-
bus, tum illinitionibus gaudent. Quod si
biliosum humorem caput doleat, accedit
maior morbus, & faciei pallor, & aliquan-
do oris amaritudo contingere solet. Porro
maiora dolentium caput ob frigiditatem con-
traria sunt eis, quę ex ardore oriuntur, &c.
Vide de his Paulum lib. 3. cap. 5.

Obiectio.

Ob quam rationem hæc affectio dolores
interualla habet velut morbus comi-
nalis?

Responsio.

Hac ratione, quia hoc contingere potest
specifica proprietate in humoribus in-
creta: nam ex bile extra vasa mora fit do-
lor tertianarius, & in venis contenta mora
alterata prouenit dolor continuus: &
hoc contingit ex specificabilis propieta-
te, vel hoc euenit ob quantitatem auctam

k

aut diminutā humorū, vel ppter corū crassitudinē, tenuitatē fluxibilitatē, & viscositatē. Et hoc habetur ex Gal. 2. de diff. feb. de febre sextana, & ab Auic. prima quarti, tra. 4. ca. de febr. apostematum, &c. Auic. prima quarti de feb. Ephemeris causa primitiua cognoscitur per eius presentiam & ablationem, & ab effectu derelicto, &c. Et prima tertij, cap. de signis ostendentibus, species foda, habet omnia quæ antè recitata sunt, &c. Lege etiam Aët. ser. 6. cap. 48.

De cura cephalæ ab humore calido.

Eliciuntur ex Gal. quinque ad curandum intentiones: prima est vniuersalis euacuatio, quum à multitudine dolor fiat: secunda est reuulsio: tertia male qualitatis repulsio: quarta capitis particularis purgatio: quinta capitis roboratio, & si quid derelictum est, resolutio, &c. Vniuersalis euacuatio fit per sectionem venæ: primò per saphenam, si in causa sint hæmorrhoides, vel menstrua retenta: vel per venam basilicam vel communem, si adhuc sanguis abundare videatur: deinde per cephalicam: postremò per venas frontis, aut eius loco applicentur naribus sanguisugæ. Reuulsio fit pluribus modis, sicut per enëmata, per extremarum partium frictiones, ligaturas, per sanguinis detractionem, per cucurbi

curbitulas, per hirundines ad hæmorrhoidas & ad nares applicatas, per suppositoria. Nam interdum sub reuulsione etiam deriuatio conuenit, quæ ad vicina loca tantum fieri solet: vnde per ἰσχυρά, id est, per nares euacuantia, vt sternutatoria gargarismata, masticatoria, aurifusoria & similia fiunt. Repulsio male qualitatibus fit dupliciter, per exteriora, & per interiora. Exteriora fiunt per repellentia epithemata, inunctiones, cerata, cataplasmata, odoramenta, suffumigia, instillationes, lotiones, & similia: ita tamen vt repellentia sint adstringentia & frigefaciencia primum, deinde repulsoria, quibus addendum est aliquid ex mitigatoriis ac concoctoriis medicamentis: deinceps ad discussoria paulatim accedendum, detractis omnino repellentibus. Interiora malam qualitatem remouentia sunt syrapti, zulapia siue Iuleb, eclegmata apozemata siue decocta, pulueres, &c. Syrupi sunt, acetosus simplex, violaceus de endiuia, rosaceus de succo acetosæ, de agresta, de granatis, de limonibus, de acetositate citri, &c. Zulapia varia sunt, vt violacea, nenupharina. Fiunt etiam cum ptisana & vino granatorum, cydoniorum malorum, vel cum Iuleb rosaceo, aqua hordei & aqua

coriandrorum præparatorum, &c. Electu-
ria sunt diarrhodon Abb. Triasandali
conserua violacea, rosacea, confectio d
prunismes. Manuscripti, diacoralis, &
Decocta fiunt ex rebus frigidis ad capu
spectantibus, vt sunt viola, nenuphar, ros
salix, cucurbita, mala granata, lactuca, sar
dali, myrthus, plantago, semperuiua, port
laca, & similia. Capitis purgatio multifa-
riam fieri potest, siue per simplicia medic
mina, vel per cõposita. Simplicia sunt rheu-
barbarum, aloës, agaricus, succus rosarum
diagridium, myrobalani citrini, calsia, fil
qua, succus violarum, manna, succus iridis
tamarindi, succus fumi terræ, & similia. Cõ-
posita sunt varia, sicuti electuaria, cõfectio-
nes, pilulæ, trochisci, potiones, boli, pulue-
res. Electuaria sunt electuarium de succo
rosarum Nic. electuariũ ros. Mes. Diapru-
nis sol. Nic. Diaphinicon Mes. electuarium
de pũlio sol. Mes. Calsia & manna cũ rheu-
barbaro, cum agarico, cum scamonio præ-
parato. Confectiones sunt, cydoniata soluti-
ua, nebula solutiua, & mille confectiones
quæ parari possunt, sicuti passulæ cum dia-
gridio, &c. Pilulæ sunt aureæ Nic. de hiera
simplici Gal. pilulæ lucis Mes. de hiera cõ-
posita Nic. De Rheubarbaro Mes. Aggre-
gatiua. Mes. aleophangina Mes. Trochisci
sunt

sunt, Trochiscus de diarrhodon de rheubarbo, de cāphora, addēdo aliquid rheubarbari vel diagredij. Potiones fiunt ex electuarijs ac decoctis superscriptis: similiter boli cum electuariis & saccaro. Pulveres sunt ex rheubarbo, aloe, agarico, cucumere sylvestri, &c. Apis roboratio perficitur cum stypticis infrigidantibus ac constringentibus, ut oleo rosaceo, myrthino, &c. Residui resolutio fiat cum resolventibus modicè calefacientibus, sicut sunt semina Altheæ, fœnugræci, lini, meliloti cum camomilla, anetho: aut cum oleis camomillæ, anethi, &c. vel cum pulmone agni vel arietis catulorum, & pullorum columbarum, &c.

Loci consentientes de cura cephalææ.

Auic. prima tertij, tra. 4. cap. 35. Si causa est sanguis, phlebotoma: & si tu in principio administrasti id quod repellit, deum utere embrocis ex aquis, in quibus resolventia sint modicè calefacientia cum percussione modica & stypticitate, ut flos squinanti, camomilla, &c. Deinde euacua cum eis qua eueniunt: & scias, quòd quum purgasti, superest ut confortes crebrum & eius velamina, &c. Ex quibus verbis omnes intentiones à me iam dictæ eliciuntur. Præterea Paulus Aegi. libr. 3. capit. 5.

& Aet. ser. 6. cap. 50. & Mes. cap. de soda, & Arcul. de cura cephalæ: similiter Michael Sauonarola de cura sodæ calæ. Gerardus de solo, Gordonius ac ipse Marcus Catinarius omnes in has intentiones curandi concurrunt. De reuulsione loquitur Galenus 2. de compos. med. per loc. ca. 2. inquit, Reuulsio itaque fit per clysteres, per extremitat ligaturas, & per plures infernarum partium frictiones: interdum per sanguinis excubito detractionem, & ex naribus, aperta vena, & apophlegmatismis, & medicamentis, quæ naribus induntur, &c. Similiter Hippo. 3. de morbis circa principium Si dolor capitis permanet, ut sternutet curato, lenibusque ac odoratis caput & ventrem purgato, ptisanæ succum sorbeto, vinum ne potato, &c. De repulsione malæ qualitatis loquitur etiam Gal. loco citato ibi, Repellit oleum rosaceum omphacinum per se, & cum aceto ex capitibus papaueris, &c. Et 2. de compos. med. per loc. cap. 1. Quod si in capite ipsa affectio calida existat, in primis repellendum cum refrigerantibus, deinde ex mitigatoriis ac concoctoriis aliquid admiscere ad repulsoria oportet, deinde discussoria adhibenda, ita ut paulatim repulsoria pharmaca detrahantur. De interioribus exhibendis consule

ūle neotericos authores. De purgatione
 capitis retigit Gale. 2. de compos. med. per
 loc. cap. 2. ibi, Dabimus hieram exacu-
 am, &c. Quomodo verò hiera exacuatur,
 docuit Galen. eodem in lib. cap. de Alope-
 cia, dicens se veratrum nigrum addere, si
 atra bilis sit expurganda, aut scamonium,
 si amara bilis sit euacuanda. Vnde Græcè
 habetur *τὸν ἰσχυρὸν ἰξυόεντα δόττω*. Et 2. de
 compos. medicamen. per loc. cap. 1. Eua-
 cuandus est biliosus humor per absinthij
 cremorem, aut per aloën, & per ipsam pi-
 cram antidotum, aut modica addita sca-
 monia, aut per catapotia ex aloë confe-
 cta, &c. De capitis roboratione & residui
 resolutione satis habes ex Auicenna, Mes.
 & Almanfore, capite de soda calida. Galen.
 cap. cit. Discutit oleum dulcissimum cali-
 dum & magis inueteratum, itémq; Sycio-
 nium. Nota non dici Sycionium ἀπὸ συκίου
 id est, à cucumere, vt nonnulli putant,
 sed potius à Sycionia patria, vbi paraba-
 tur: nam Dioscorid. primo libro de oleo
 Sycionio loquens nullā de cucumere men-
 tionem facit, & hoc prius annotauit Cor-
 narius in suis annotationibus. Discutiunt
 etiam, inquit Arcul. pulmo arietis, agni,
 item catuli lactentes, ac pulli columba-
 rum, &c.

Observationes de venæ sectione.

Auicē. prima tertij de cura sodæ cal-
 dæ absque materia, In sectione venæ pri-
 mum caue, ne venter sit stypticus: ibi tu a-
 curandas ægritudines capitis lenificatio-
 ne multum naturæ indiges, &c. Similiter
 Razes lib. diuis. cap. 3. asserit: Secundò ca-
 ue ne adeò vehemens sit dolor, vt curand-
 ordinem permutet: & hoc voluit Mes. &
 Auicē. quarta primi, cap. 3. ibi, Quumque
 ad diuersum trahere volueris, dolorem il-
 lius membri prius seda. Gal. met. 12. cap. 1.
 Qui dolori neglecta curatione tantum est
 intentus, non id ex topicis artis ratione,
 sed in ægri gratiam facit: at si ex dolore
 vires resoluantur, atque ex eo periculum
 impender, & mitigari prius dolor & vi-
 res roborari debent. Similis sensus est eo-
 dem in lib. cap. 7.

Observationes de repulsione.

Galen. 2. de compos. med. per loc. cap. 1.
 Aptissimus locus est ad applicanda reme-
 dia iuxta capitis sinciput: siquidem ob la-
 xitatem coarticulationis iuxta coronalem
 futuram, & ob ossium tenuitatem & rari-
 tatem facile, tum caliditatem cum fri-
 giditatem omniumque adhibeatur, intrò
 distribuit.

Auicē. de vniuers. cur. sod. Alienanda
 sunt

nt hęc frigida à posteriori cerebro, quod
 origo neruorum. Gal. loco citato, A pa-
 ueris succo & mandragoræ est abstinendum:
 non enim citra damnum refrigerat:
 itandâque quæ cum refrigeratione ma-
 ifesta adstringunt, vt solani succus, mali
 unici, cotonei, & mespili: & si quando ne-
 cessitas expostulat, parum ex eis admisce-
 re oportet.

Mesues cap. de cur. sod. cal. Quum topi-
 is vsus fueris, fac ne priuentur his tribus
 virtutibus: prima, quod in gradu altera-
 tionis competant: secunda, quod membri
 virtutem coadunent, ne superfluitates ca-
 put recipiat: tertia, quod sua proprietate
 caput roborent, &c. Rursus idem Mes. Ad-
 hibenda sunt alterantia frigida, præterquàm
 in quatuor casibus. Primò, quum soda cali-
 da fit in febribus materialibus: nam so-
 dam multiplicat vsus epithematum, vapo-
 res exire non permittentium, vt testatur
 Auic. prima tertij, cap. ii. Secundò, quum
 soda fit propter vapores acutos, qui ex to-
 tius corporis consensu, vel partis, ad caput
 perueniunt, etiam caput eos recipit: nam
 diuersio ad oppositum ex vna parte com-
 petit, & ex alia receptorum resolutio, non
 autem alteratio. Tertiò, quum soda fit à
 multitudine materiæ, & tunc euacuatio

k s

sedat. Quartò, quum fit à multitudine vaporum, existentium in capite per consensum totius vel partis: tunc resolutio & particularis euacuatio conuenit, & non alteratio.

Gal. de compos. med. per loc. cap. i. notat, quòd ubi frigidior & crudior fuerit humorum multitudo, tepida applicentur: ubi calidior & biliosior, frigida. Arcul. Presente rheumate fomentationes, sternutatoria, & gargarismata, & lotiones pedũ & capitis non sunt omnino, nisi post perfectam euacuationem admittenda. Auicē, prima tertij, cap. de can. vniuer. cur. Cauēdum est in cerebri inflammationibus, ne maturantia adhibeamus, &c.

Observationes de purgatione capitis.

Auicē. prima tertij, de euacu. cur. A faciliioribus est inchoādum. Similiter Mes. cap. de sod. cal. Auic. prima quarti, cap. de cura putridarum in genere, Ad euacuationem præcedat digestio. Et Hippoc. aphor. 1. aphor. 22. Concocta medicari atque mouere, non cruda, modò non turgeant, &c. De his vide de purg. sup.

De cura Cephalæ ex humore frigido.

Curationis scopi erunt quinque: primus, modus regiminis: secundus, materiæ præparatio: tertius, humoris præparati euacuat

euacuatio: quartus, diuersio: quintus, cerebri roboratio ac residui resolutio.

Modus regiminis, si materia sit pituitosa, frigida scilicet & humida, erit circa sex res non naturales calefaciens & exicans. Materię præparatio fiet, si pituita fuerit crassa ac viscosa, per incidentia ac attenuantia capiti conferentia, vt est rhodomel, oxymel simplex, compositum & scilliticum, syrupus de duabus radicibus, syrupus de quinque radicibus, syrupus de stechade, de betonica, cum decoctis incidentibus, vt ex hyssopo, origano, pulegio, saluia, maiorana, betonica, ruta, peonia, saturegia, stechade, sileri montano, ex chamedrio, chamepithi, castorio, cinnamomo, ligno aloës, laudano, melliloto, calamo aromatico, verbena, fœniculo, foliis lauri cum mosco, ambra, nuce myristica, rosmarino, quæ omnia summopere capiti opportuna esse videntur. Si verò materia fuerit tenuis & fluens, calidis stypticis, quæ crassiorem materiam reddât, vt emur, sicuti est mastiche, nux mosch. lignum aloës, &c. Posset etiam fieri materię præparatio cum cataplasmate ex rebus prædictis, minus calido & frigido, prout expedire videbitur. Euacuatio fiet, vt supra dictum est, per simplicia ac composita pharmaca. Simplicia sunt

sunt colocynthis, agaricus, aloës, vebu-
 sarcacola, turbit, chartamus, esula, polyp-
 diū, hermodactylus, scylla, radices irec-
 ciclamen, &c. Composita sunt, cōfectione
 electuaria, pilulæ & pulueres. Confecti-
 nes sunt diarob, diaturbit, & mille ali-
 quas per te cum melle & saccharo poter-
 componere. Electuaria sunt, diaphinice
 Mes. electuariū indū Mes. diacartami m-
 gift. egetea Mes. electuariū elefscoph Me-
 diarob cum turbit & rheubarbaro & sim-
 lia. Pilulæ sunt cochia Alman. pilulæ fœt-
 dæ Mes. de serapino Mes. de rheub. Mes. d-
 sarcacola Mes. hieralogodion Nic. pilula
 aggregatiuæ Mes. sine quibus Nic. pilula
 de hiera magna Gale. de hiera cū agarico
 magist. pilulæ aleophāginæ Mes. pilulæ de
 agarico & de hermodactylis Mes. &c. Pul-
 ueres componi possunt ad libitū, sicut pul-
 uis turbit, præparati rheub. agarici, carta-
 mi, &c. Diuersio & deriuatio, quæ est alte-
 ra euacuatio, fit per extremarum partiū li-
 gaturas, per suppositoria enæmata, cucur-
 bitulas, lotiones, frictiones. Deriuatio fit
 per gargarismata, sternutatoria & masti-
 catoria, caput purgantia. Ligationes fient
 validiores quàm in calida cephalæa. Sup-
 positoria parantur ex specierū hieræ com-
 positæ ʒ ij. salis gemmei ʒ j. cum melle,
 qui

cibis addi potest colocynthis, agaricus,
 tauri, stercus muris, euphorbium, esu-
 diagridium, &c. Enemata parari possunt
 decocto saluiae, stechados, mercurialis,
 aluæ, furfuris lb j. cassiæ, hieræ, logodio-
 s ana 3ß. Rhodomellis, olei communis
 3 iij. salis 3ß. Validiora fiunt cum co-
 cynthide, agarico, cētaurio, cartamo &c.
 cucurbitulæ applicantur cum scarificatio-
 ne, prout tibi videbitur. Fricationes fiunt
 manibus oleis, mantili aspero vel leni. vi-
 do albo & decocto asparagorum & herba-
 rum calidarum, &c. Gargarismata fiunt
 cum oxymelle simplici & cōposito & scil-
 licet decocto origani, hyssopi, cui addi
 potest, vt sit validius, synapis, piretrum, cor-
 ces thuris, ac piper, &c. Sternutatoria cū
 ipere, condisi, helleboro albo fiunt. Caput
 urgia cum nigella per 24. horas infusa in
 ceto, & exiccata, & in puluerem redacta
 unt, aut ex felle taurino aut caprino cum
 modico castorei, & parte vna croci, cum
 qua maioranæ fiat collirium. Masticato-
 ria fiūt simpliciter cum mastice, addito pi-
 ere vel piretro, vel radice capparorū, &c.
 Capitis roboratio fiet cū calidis stypticis.
 Residui resolutio fieri potest per linimen-
 ta, epithemata, attractiones, sacculos, instil-
 lationes, confectiones, & suffumigia, & ce-
 rata.

rata. Linimenta fiūt ex oleo, camomillir
rutaceo, laurino, de spica liliiorū alboru
de cheirinardo sanfucino, de amygd
amaris, de croco: quibus addi possunt ol
rosaceum, violaceum, & similia: vel si ca
diora desideratur, cum oleo de castorio,
euphorbio, de pipēribus. Epithemata fi
ex aquis maioranæ, vel oleis, aut ex dec
cto stechados, foliorum lauri, camomi
læ, rosarum cum oleis ad caput spectanti
bus. Attractio per nares fiet cum aqua m
ioranæ muscho addito vel ambra (quan
odorifera in mulieribus sunt vitanda, c
conuersionem vteri ad superiora) vel cu
aliis aquis capitalibus addendo calamu
aromaticū, & nuçem myristicam. Saccu
fiunt ex camomilla, maiorana, stechade, f
liis lauri, pulegio, origano, corticibus ca
dri, cinnamomo, spica, mace, gallia mu
schata, &c. Instillationes fiunt ex laudano
storace cal. cum oleo camomillino, rut
aceo, &c. Confectiones fiūt ex diambra, dia
margaritone, diamuscho dul. confectione
de gētis aromatico ros. moschato electua
rio regū mytridato, theriaca, diacoro, &c.
Suffumigia fiūt ex thure, sandaraca, ligno
aloës, laudano, muscho, storace, calamite
caryophillis, &c. Cerata fiūt ex camomil
læ, maioranæ, stechades, rotarum ana P. j

cor

cticū citri, garyophyllorū, cinnamomi,
cis muschatæ ana P.ß. galliæ muschatæ,
indani parum, cum oleo de spica & res-
pini ad libitum fiat ceratum, &c.

*Loci consentientes de cura cephalæ ab
humore frigido.*

Galen. 2. de compo. med. per loc. cap. 1. Si
scosus aut crassus humor, aut flatus va-
profus in angustiis meatuum infarcitur,
ut ut multo tempore opus sit ad curatio-
nem, tunc quæ sic infarcta sunt, attenuare
oportet, meatusq; dilatare, per quos excer-
nitur, habita providentia, ne quid humo-
ris vel flatus amplius infarciatur, & ad hec
roborandum est affectum membrum.
Ex quibus verbis curandi intentiones eli-
possunt. Consule tamē in iis omnes neo-
ricos practicantes. De sex rebus non na-
ralibus loquitur Paulus lib. 3. cap. 4. ibi,
inum, inquit, subtilius propinandum, cor-
oris motio adhibenda, item balneum pro-
est, &c. Quod materiæ preparatio fiat per
icidentia ac extenuantia, habes in 9. apho.
libri: nam in fine commen. Gal. Erit flui-
um corpus omnibus reseratis meatibus,
umoribus verò incisis, absterfis atque ex-
enuatis, si quis fuerit humor in corpore
rassus ac glutinosus. Quod verò tales sy-
upi iam enarrati sint ad propositum, lege
ex

ex Mesue, vel ex Gal. 2. de compos. med. p.
loc. cap. 1. vbi acetum, mulsum in potu
simplex aut Iulianicum appellatum ex
gano hyssopo commendat. Auicen. pri
tertij, de cura sodæ frigida, Et admini
stratur subtiliatiua vel maturatiua & eu
acuatiua determinata, &c.

De diuersione loquitur Auicen. loco c
rato, vbi eam fieri in principio imperat,
humor fuerit in eo communicans. Quo
verò hæc tot modis, quot iam diximus, fia
expresse habetur ab Arcul. Marco Catin
rio & ab omnibus practicantibus. De r
borando capite lege Galen. loco nuper c
rato. Item Auicen. prima tertij, vbi mod
epithematum caputpurgiorum oleorum
ac herbarum docet: inde enim omnia e
me dicta intelliges. Auicen. de cura sodæ
frigida: Omnes qui habent sodam ex fri
gore post purgationem, si ea indigent, iu
uant vnctiones, caputpurgia, suctiones na
rium, odoramenta, embrocæ & emplastr
calefacientia, &c. Habes similia ex Gale
no 2. de compos. medic. cap. 2. de cura ce
phalæ ex Archigene & Asclepiade & plu
rimis aliis, vt apophlegmatismos, sternu
tatoria, & amuleta, quæ capiti circumpo
nuntur: similiter irrigationes, masticato
ria, pastillos, &c.

Ob

*Observationes de regimine
in cephalæa.*

Auic. prima tertij de vniuer. regimine
soda, Tu scis quòd soda est exemplū re-
quis ægritudinibus in necessitate abscis-
sionis suæ causæ & oppositione ei cū con-
trario. Et post hæc scis, quòd ex rebus in
memoratione sodæ iuuantibus est pauci-
tas comestionis, & potus propriè vini &
multitudo somni: verū nimia paucitas co-
mestionis in soda calida nocumentum af-
fert, augmentum in ipsa faciens. & in vni-
uersali can. Et scias, quòd qui conqueritur
de ægritudine frigida in capite, nocetur à
vino, & qui habet ægritudinē in velamini-
bus, nocetur ab aqua frigida. Arcul. Fercu-
la sint facilis cōcoctionis & paucarū super-
fluitatum: item comedātur aliqua styptica
post cibū, vapores reprimentia, sicut cydo-
niata cum speciebus, vel pira, vel fructus
styptici. Somnus sit minor quàm in aliis
sodæ speciebus: dormiat leuato capite, loco
exercitij fricationes vicē suppleant, animi
accidentia vitentur excessiua, &c.

*Observationes de materie
preparatione.*

Marcus Catinarius de cura sodæ phleg-
maticæ, Ab imbecillioribus, inquit, inchoā-
dum ad validiora procedendo. Ratio est,

quia valde extenuentia in principio exhibita magis naturam dilatant, quàm in digerendo adiuuent, &c.

Observationes de euacuatione

Mesues de sod. frig. ab humore melancholico, Tria considerata sunt in euacuatione, primum, quòd nò semel, & multà subitam faciamus euacuationem, sed per interualla, habètem temperiem, vt natura euacuationem, non autem euacuatio naturam regulet: nam ex subita ac violèta euacuatione vix natura regulariter operatur sicut impetus flammæ, quæ subitò agit subtile, & prætergreditur crassam. Secundum est, quòd euacuatio sit commensurata, nò excedens mediocritatem, sed sit extensio eius eleuationis non recedens à gradu medicinarum incolumiũ. Tertium est quod nò expolientur solutiua à rebus lenificatiuis & humectantibus, nam hæc operationem beatificant. Itidem asserit Auicenna prima tertij de can. vniuers. curat. Adde tamen his tu quartũ, quoniã quum phlegmategoga indifferenter ab omnibus partibus euacuãt, idcirco aliquid quod membrũ euacuandũ respiciat, his semper addere conuenit, vt virtus pharmaci ad id tendat, quod euacuare intendis, vt si caput, capitalia, pectus, pectoralia, &c.

Obse

*Observationes de topicis
applicandis.*

Gal. 2. de comp. med. per loca, ca. 1. In intereratis capitis affectionibus ac doloribus validis ac frigidis necessario capillos radimus, aut valde vsq; ad cutē resecamus. Paulus lib. 3. cap. 4. Topica mutantur singula cōtinuè, nam vetustate fiunt inefficacia. Galen. 2. de compos. med. per loc. cap. 2. inquit, quòd in principio morbi à debilio-ribus est auspicandum, quum statim efficacissima adhiberi non conueniat, vt suprà dictum est.

De Hemicrania.

Ημικρανία siue *εξσπονγανία* est, vbi vel in parte sinistra vel dextra dolor capitis accidit, qui interdum intensiorem, quandoq; remissionem infert. Locus doloris interdum extra caluariam percipitur, aliquibus ad capitis vsquē profunditatem penetrat, quibusdam verò temporum musculos vehementer infestat, &c.

Loci consentientes de Hemicrania.

Gal. 2. de compos. med. Per loc. cap. 2. Hemicrania est affectio dolorosa, circa dimidiam capitis partem, aliquando dextrā, aliquando sinistram, quæ iuxta futurā secundum eius longitudinem terminatur, & vt plurimum exacerbatur. Auicenn. prima ter

rij. Hemicrania est dolor in vna medietate capitis excitatus, &c. Razes, quem multi sequuntur, nullum agit de hemicranio caput, volens fortasse pharmaca, quæ in iterato capitis dolori medentur, hemicranicis etiã affectionibus auxiliari: sed non mirum, quum nec Apollonius Archigenes, & Asclepiades vnà cum Critone, vt refert Galen. scripserint. De loco affecto loquitur Gal. loc. citat. ibi, Quidam circa tēporum musculos dolitant, & pleraq; sanè ipsorum pars hoc modo affligitur: quidam verò dolorem lōgè vltèrius progredientē habent & quidam adeò vehemēter dolent, vt neq; manus contractum facile ferant. Act. ser. 6 cap. 49. Et aliquibus contingit, vt extra cavariam doloris sensum perceptēt, quibusdam in capitis profunditatē penetrat, &c. Similiter Paulus lib. 3. cap. 5. Quanquam vnum & idem caput de cephalæa & hemicrania ipse faciat.

De causa Hemicranie.

Causa est plenitudo, vel humorum aut vaporum influxus. Fit nōnunquam etiã hemicrania ab intemperie nuda, absque humorum complexu: sæpius tamen fit ex aliarum corporis partium consensu, & denique ab his omnibus quæ dicta sunt superius de cephalæa.

Loci

*Loci consentientes de causis**Hemicrania.*

Gal. 2. de compos. med. per loc. cap. 3. Hemicrania fit ex influxu humorū, siue multorum, siue calidorum, siue frigidorū, causam doloris suggerente. Hoc idem asserit Aet. ser. 6. cap. 49. itidem Paulus. Alex. lib. 1. cap. 18. nonnunquam fieri, inquit, ex solo temperamento, sæpius ex cōsensu aliarum corporis partium, &c. Negat tamen Auic. posse fieri hemicraniam à malitia complexionis singularis. id est, ab intemperie nuda, sed quum nullam adducat euidentem de hac re rationem, plus tribuendum esse Alexandro authoritatis assererem in hac re, quàm Auicennæ.

De Hemicrania indicij.

Quauis vberius de indicijis suprā dictum sit, quū de Cephalæa verba fecimus, nihilominus, vt in summa referam, grauitas molesta, plenitudinem indicat, dolores cum erosione, humorum vel vaporū acrimoniam, dolores cum pulsibus, inflammationem, dolores verò ad radices oculorum se extendentes, intra caluarium morbum denotant: si verò circa caluariam doleat, dolores extra sunt. De humorum qualitate sumi potest indicium à iuuantibus & nocentibus applicitis, &c.

Loci consentientes de Hemicranie indicij.

Aet. ser. 6. cap. 48. Dolores cum grauitate humorum multitudinem indicant, cum mordacitate, humorum vel vaporū acredinem, cum pulsu inflammationem, &c. E paulò inferius, Dolores quidem in superficie hærentes membranæ os caluariæ ambientis affectionem significant: quibus verò affectio intra caluariam est, dolores vsque ad radices oculorū procedunt, &c. Hoc idem asserit Galen. 2. de compos. medic. per loc. cap. 2. & Paulus Aegi. lib. 3. cap. 5. Auic. prima tertij, cap. 37. Quum fiat hemicrania modò à frigidis, modò à calidis, frigidus esse dices, si cum calefactione quietem inueneris: calidos, si quietem cum infrigidantibus, &c. Vide etiā de his latius Gal. 3. de loc. affect. cap. 9.

De cura Hemicranie.

Tres sunt in crura hemicranie intētionēs medendi, prima est euacuatio, secunda est reuulsio ac deriuatio, tertia male qualitatis permutatio. Euacuatio fiet vel pharmaco, vel venę sectione, prout æger magis opus habuerit: & de his superius vberimè dictum est in capite cephalæ. Reuulsio ac deriuatio per eadem perficientur, vt suprā dictum est. Verum ante access

sionis

onis tempus hæc perpetranda sunt : iu-
at in hoc fricare partem , quæ circa tem-
porum musculum est , tam diu , vt excale-
fat , præsertim si à frigida causa dolor pro-
eniat. Mala intemperies, siue humorum
qualitas per sui contrariū permutabitur,
et calida cum frigidis, frigida cum calefa-
cientibus: vtrifq; tamen semper ea addēda
sunt, quæ adstringentē facultatem habent,
eo tamen seruato, quòd in vehementi cali-
ditate modicè refrigeres , in frigida mul-
tum excalefacias , dolor verò sine humorū
complexu per alterantia tantū extrinse-
cus adhibita, curabitur.

Loci consentientes de cura

Hemicrania.

Galen. 2. de comp. medic. per loc. cap 3.
Vbi quis hemicraniam curare aggredi-
tur , prius quali purgatione, aut venæ se-
ctione æger opus habeat, consideret, atque
ita ad capitis auxilia progrediendo, tum
per digitos suæ manus, tum per linteū di-
midiam frontis partem , & eam maximè
quæ circa temporum musculum est con-
fricando excalefaciat : atque id ante acces-
sionis tempus faciendum est, post exacer-
bationem verò pharmacis hemicranicis
utendum. Quòd si multa caliditas in do-
loribus percipiatur, iis quæ modicè refri-

gerant: citra verò hanc, iis quæ multū e
 calefaciunt: verū vtrifq; ex his quæ fir-
 tatem ac robur addunt, misceantur quæ
 adstringentem habeant facultatem, &
 Auicen. prima tertij, cap. 38. Eius cura e
 phlebotomia, & propria venę frōtis & te-
 poris, & solutio, & clysteria, & attri-
 ctio, & totum cum eo quod conuenit ipsi
 vt dictum est. Quum periodus adest, opor-
 tet vt purgetur corpus ante ipsum, & per-
 mutetur complexio post purgationem.
 Quòd si materia fuerit calida, pones nar-
 cotica super tempora, &c. Et paulò in-
 frà, Aegritudo, cuius tempus est prolo-
 gatum, est frigida secundum dispositio-
 nem, & indiget resolutione, & quod cale-
 faciat cum fortitudine, &c. Alexan. lib. 1
 cap. 8. Si hemicrania citra materiam ab in-
 temperie fiat, solis extrinsecis vtēdum est
 præsiidiis. Si verò cum materia conside-
 randum est, quis nam humorum adau-
 ctus redundet: quòd si sanguis modum ex-
 cesserit, sectione venę vtendum, si alius
 humor sortito medicamine statim eua-
 cuandus est, &c.

*De cura cephalæ & hemicraniæ
 per consensum.*

Si ab vniuerso corpore caput afficiatur,
 quatuor erunt curādi intentiones. Prima,
 euac

uacuatio aut purgatio: secunda, reuulsio
 & malæ qualiratis impressæ repulsio: ter-
 tia erit eius, si quid adsit in capite, conco-
 ctio: quarta erit partis affectæ roboratio
 ac discussio. Si verò vni alicui parti
 condoleat, binæ tantum erunt intentio-
 nes, altera scilicet ad membrum, ex quo hu-
 mores vel vapores mittuntur, altera ad mē-
 brum in quo recipiuntur. Euacuatio fiet, si
 multitudo humorum in venis fuerit, per
 sectionem venæ: si verò qualitate tantum
 humores inualeant, purgante pharmaco
 utemur, &c. Reuulsio fiet in partem con-
 trariam reuellendo. Repulsio malæ quali-
 tatis impressæ fiet per sorbitiones aut ir-
 rigationes moderatè refrigerantes. Con-
 coctio eius quod capiti impactum est, fiet
 per attenuantia & incidentia, vt dictum
 est suprà. Roboratio fiet etiam per eadē,
 vt suprà dictū est. Quod verò attenuatum
 est & incisum, tunc discutiendum erit. Si
 verò vna pars mandet, & altera suscipiat,
 quòd altera non transmittat, stypticis re-
 frigerantibus procurandum, & quòd caput
 ne recipiat, iis quæ firmitatem ac robur
 indunt, vtendum erit. Quot modis autem
 aliquid per consensum fiat, lege fusius ex
 Auicen. secunda primi, cap. de complendis
 dispositionibus, &c.

*Loci consentientes de cura Cephalæ
& Hemicrania.*

Gal. 2. de compos. medic. per loc. cap.
 Si ab vniuerso corpore caput afficiatur
 prospiciendum intemperiei & materi
 prædominanti, instando, easque vrger
 do: & si multitudo humorum circa vena
 fuerit, venam secabimus, si qualitas ma
 gis inualuerit, purgante pharmaco vte
 mur: quod si vni alicui parti condoleat, ex
 stente calida intemperie, panem ex diluto
 vino dabimus, exhibendo etiam sorbitio
 nes ex alica, & foris irrigationes modera
 tē refrigerātes, & firmitatem addentes, v
 dictum est, &c. Et paulò superius dixerat
 Si aliunde humor vel vapor deriuat, in
 fluentem in primis repellere necessarium
 est, impactumq; concoquere & attenuare,
 idque ipsum discutere, & circa partem af
 fectam firmitatem inducere, vt ne quid in
 fluens amplius suscipiat. De reuulsione lo
 quitur Hippoc. aphor. 5. aphor. 68. ibi, Do
 lenti partem capitis posteriorem in fron
 te vena incisa prodest. De cōctione, Gal. 2.
 de compos. med. per loc. cap. j. vbi inquit,
 Si verò ob crassos & viscosos humores
 in stomacho contentos caput doleat, hos
 extirpabimus, acetum mulsum exhiben
 do, aut simplex, aut Iulianicū appellatum
 ex

hyssopo & origano portionibus, &c.
quod verò membrum ne transmittat, iu-
et Razes buccellas panis in succo grana-
aut vix acriba, aut horum similium ex-
beri: qua de re frigidis stypticis opus est
his uti, &c.

De his quæ ledunt caput.

Galen. 2. de compos. medic. per loc. cap. 1.
iuxta finem, Viticis semen, absinthij suc-
us, lac in potu, glandes quercinæ, oliuæ ni-
ræ, eruñ: hoc enim articulos dissolvit. Of-
fendant etiam caput myrrha, thus, hederæ
acumina. Perturbant etiam mentem len-
isci fructus, crocus, peucedanum, cyclami-
us sicca cū vino potata, styrax. Medicus po-
us tristitiam discutit, multus autē turbu-
entos somnos efficit, &c. Dioscor. Lædūt
preter hæc, palma, arbutus, ferula, meu, mā-
lagora, vinum gypsatum, &c. Auicē. præ-
ter hæc damnat lac, allium, cepas, & omnia
acumina. Et prima tertij, de ser. vniuer.
sod. omnia aromata siue calida siue frigi-
da. Item damnat carnem vaccinam, & reli-
quas carnes crassas, fabas, auellanas, &c.

*De prognosticis cephalææ &
Hemicraniæ.*

Hippoc. aphor. 6. aphor. 10. Caput dolēti
& circundolenti pus, vel aqua, vel sanguis
effluens

effluens per nares aut os aut aures, mori
soluit. B. Intellige, si dolor ab inflāmati
ne, aut ab humorū multitudine fiat, ali
qui si à flatuoso spiritu, aut ab intemper
contigerit, non per hos modos sanaretur
vt Gal. in comment. Et aphor. 3. aphor. 1
Si æstas sicca fuerit & aquilonia, autū
verò pluuiosus & australis, dolores capit
ad hyemem fiunt. Hoc idem etiam adser
Auic. prima tertij, cap. de vniuers. ferme
ne soda. Et aphor. 4. aphor. 70. Quibus v
næ perturbata, quales sunt iumentorum
iis dolor capitis vel adest vel aderit. B.
Nota ex Galeni cōment. quòd quædā vr
næ, longo tēpore manent perturbatę, que
dam citò sedimen crassum habent, & citò
morbū finiri denotant: quæ verò non res
dent, si vires adsint, longum fore morbum
prænuunciant, si imbecilles, ægri mortem
prædicūt. Auic. similiter de his pertractat
de signis nunciatiuis soda cap. 8. ibi, Vrin
similis asinorum vrinis, significat, quòd si
da fuit, aut sit, aut erit, & similiter rubedo
vrinæ, & subtilitas eius in febribus, & he
ra crisis significans permutationem ad ca
put, &c. Hippocra. aphorif. 6. aphorif. 51.
Quicumque sani dolore capitis repente
capiuntur, & statim muti fiunt & stertunt,
in septem diebus pereunt, nisi febris ap
preh

rebenderit, &c. Et 3. prognost. cap. 7. Capitis dolor vehemens & continuus cum febre, siquidem ex indiciis extiterit exitiosus, lethalis admodum est, &c. Hoc idē etiā habet de coactis prænotionibus, & plura multa. Et 3. prognost. cap. 12. Si quis perferrem non exitiosam dixerit caput dolere, ut etiam tenebricosum quid ob oculos buersari, si ventriculi dolor in eo extiterit, biliosa vomitio aderit, &c. Et post hæc res capitis dolorum differētiās assignat, ubi, Si quibus horum cœpit dolor, &c. lege iussus, & plura inuenies ad hanc rem vtilia. Arcul. Dolor capitis continuus, prolongatus, frequēter ad cerebri abscessum, aut incitatem agrum perducit. Item, Cephalalgia in febribus continuis, quæ non inclinante febre remittitur, phrenitidē pronunciat. Hippo. 3. de morbis circa principium. Quum grauis capitis dolor repente per exordia mutum facit, præsertim cū temulentia, hic in septem diebus perit. Habes etiam plurima prognostica ex prædictione secunda ipsius Hippocratis: quam esse Hippocratis librum falsò ascribant nonnulli, &c.

*Authores erronei dissentientes
circa dolorem capitis.*

I Adferere, cephalæam à cephalalgia non differ

differre.

- 2 Adserere, alterationem esse solam tantummodo causam doloris, cū Auerrho
- 3 Adserere, humidū quatenus humidum nullo modo efficere dolorem.
- 4 Adserere, solutionem continui esse tantummodo causam doloris.
- 5 Adserere, quòd tenues vrinæ dolores pitis significant.
- 6 Adserere, sectionem venæ non in omni capitis dolore conuenire.
- 7 Adserere, reuulsionum modos esse tantum, & non plures.

*Confutatio dissentientium circa
dolorem capitis.*

Ad primum: Gal. 3. de loc. aff. cap. 9. Constat quòd sicut in cephalalgia, ita & in cephalæa caput facillimè afficitur, atque hoc est ipsius commune: verum per cephalæam affectæ partes multò debiliores quàm in cephalalgia redduntur. Igitur intense differunt.

Ad secundum: Gal. 2. de cōp. med. per loc. cap. 1. Dictum est, ob dissolutionē cōtinuitatis similarium partium dolorē oboriri: dissoluunt enim erodentia, dissecantia, distendentia, & vehementer calefacientia, refrigerantia, &c. Si igitur dissolutio continui causa est doloris, non ergo sola tantummodo alteratio, &c.

A

Ad tertium: Gal. in arte med. cap. 80. Al-
ratur substantia à caliditate, frigiditate,
imiditate, siccitate. Itidem adferit secun-
do de vic. in morbis ac. comment. 1. Igitur
imiditas alterando efficiet dolorē, quod
intelligendum est, si non per se, saltē hoc
ficere per accidens.

Ad quartum: Auic. prima tertij, de vni-
er. ser. sod. Causa doloris aut est mala cō-
lexio, aut solutio continui, aut vtraque, si-
ut in apostemate. Itidē ait Gal. 12. meth.
12. 7. Necesse est, vt affectus, qui dolorem
excitat, vel diuisio sit, vel alteratio, &c. Iti-
dem in art. med. cap. 80. Igitur non sola so-
lutio continui est causa tantummodo dolo-
ris, sed etiam alteratio.

Ad quintum respondet Gal. aphor. 4. cō-
ment. 7. 0 esse falsum, quòd vrinæ tenues
int κεφαλαλγία, id est, dolorem capitis si-
gnificantes, &c.

Ad sextum: Hippoc. aphor. 5. aphor. 6. 8.
Dolenti partem capitis posteriorem in fron-
te recta vena incisa prodest: qua de re si nō
ratione euacuationis, ratione tamē auersio-
nis ne aliquis abscessus fiat, semp cōueniet.

Ad septimum: Gal. 5. meth. cap. 3. Reuul-
sio in his quæ suprā sunt omnibus, deor-
sum semper agitur, sursum in iis, quæ sunt
infra. Præterea à dextris ad sinistra, sicuti
ab

ab iis rursus ad illa, similiter ex iis quæ in-
tus sunt ad ea quæ foris habentur: & sic sunt
sex modi. Sed hic Gal. reticet modum d
antè & retrò, quem aphor. v. comment. 6
recitauerat, & sic sunt octo.

De Phrenitidis descriptione.

Phrenitis duplex est, vera & notha. Vera
est inflammatio membranarum cerebri
cum febre acuta, deliriū & mentis percu-
sionem inducens. Mendosa, quæ paraphre-
nitis dicitur, est non inflammatio cerebri
vera, à consensu totius vel alicuius parti-
dependens. Phrenitidis tres sunt differe-
tiæ, vna, qua læditur cogitatio, & seruatur
ratio & memoria: secūda, in qua solum læ-
ditur ratio, seruata imaginatione & me-
moria: tertia, in qua læditur memoria, ra-
tione & imaginatione seruata. Quart
etiam addi potest, in qua nihil horum ser-
uatur. Si igitur imaginatio læditur, tunc
pars sincipitis læsa est: si memoria, pars o-
cipitis: si ratio, medius ventriculus, &c.

*Loci consentientes de Phreni-
tide & eius diff.*

Gal. lib. finit. med. Phrenitis est menti
delirium, cum febre acuta, ac floccorū col-
lectu & mētis emotione. Paulus lib. 3. ca. 6
ἡ φρενίτις φλεγμὸν ἢ τὸ μύγρον ἐστίν. Anic. prim
tertij, tra. 3. cap. 1. Charabitus, id est, phre-
nitis

itis est apostema calidum, in velamine cerebri, subtili ac crasso absque corpore cerebri, licet quandoque cerebro accidat. Vocatur etiam ab ipso firsen calidum. Quod vero fiat cum acuta febre, lege Hippoc. lib. 3. in epidemicis morbis, ibi, *φρενίτις* Græci dicunt, qui cum febre acuta desipiunt: *μαίνομαι* vero, qui citra febrem insaniunt. Hoc idem sentit Gal. 5. de sympr. cau. ubi inquit. delirium esse motum principis facultatis depravatam à pravis succis, siue à cerebri intemperie ortum habens: cui si febris accesserit, phrenitis vocatur, si citra febrem, mania, &c. Quod verò tres sint vel quatuor phrenitidis differentiæ, innuit Gal. 4. de loc. aff. cap. 2. ubi inquit, Tres sunt differentiæ, quarum quidē simplices, ex quibus tertia componitur. Prima quæcunque oculis offeruntur, quantum ad sensitivam notitiam pertinet, rectè iudicat, cogitando verò à naturali iudicio aberrat. Secunda rectè cogitat, sed à sensibus difformiter movetur. Tertia, quæ simul & sensus & cogitationis vitio laborat. De memoria amissa in hoc casu habes ex Galeno exemplum de quodam, qui cum matellam petiisset, meiere tamen neglexerit, aut quum lotium emisisset, matellam prodere non meminerit, &c. Quod verò quarta species siue differentia

m

addi possit, habes ex Auicenna capite
signis charabiti. De his etiam mentione
facit Aet. ser. 6. cap. 2. ibi, Proinde anteri
re cerebri parte læsa, imaginatio solū pe
uertitur, &c.

De causis phrenitidis.

Causarum aliquæ antecedentes, aliquæ
coniunctæ. Antecedentes sunt, succi calidi
veluti sanguis & vtraq; bilis, in cerebri m
embranas penetrantes. Cōiunctæ sunt iidem
& succi inflammationem ad actum deducen
tes. Paraphrenitis verò fit à vaporibus
calidis & mordacibus, à toto velut in febre
acuta ad caput elatis. Interdum fit etiam
simplici & nuda alteratione, interdum al
fecto diaphragmate, vel alia quapiam cor
poris parte. Verū ea quæ à septo transuer
so prouenit, adeò similis veræ phrenitidis
existit, vt quis facile in hoc decipi possit, &c.

*Loci consentientes de cau
sis phrenitidis.*

Gal. 5. de sympt. cau. cap. vlti. Phrenitis
non solum ob calidos succos, vel calidio
rem cerebri temperaturam accidit, sed
quum phlegmonē in cerebro, vel in ipsius
membranis ij succi pariūt, &c. Paulus. lib.
3. capit. 6. Causa morbi est sanguis exupe
rans, vel biliosus humor, interdum flaua
bilis adeò perusta, vt in nigram degenera
uerit,

uerit, quæ etiam grauissimam phrenitidem contrahit, &c. Gal. 5. de loc. aff. cap. 4. Atque delirare etiam solent nonnulli ob vitium, quod in ore ventriculi consistit, & febribus ardentibus, & pleuritide, & peripneumonia: sed quæ ob septi transversæ accidunt deliria, non multum distant à phrenitide.

De Phrenitidis indicia.

Quum tria sint phrenitidis indicia, præcedentia scilicet, demonstratiua ac rememoratiua, de præcedentibus ac demonstratiuis hîc tantum mentionē facimus. Signa præcedentia sunt, vigiliæ prolixæ, somnus turbulentus, obliuio agrestis, dolor capitis, promptitudo ad iram & odium, alius adstringitur, vrinæ sunt tenues, biliosum humorem ad superiora petentē demonstrantes. Signa demonstratiua sunt sex, vt febris continua conclusa, magna capitis & oculorum grauitas, vehemens in facie & oculis rubor, dolor capitis, horror luminis, & pulsus frequentia cum duritie. Signa inter veram & spuriam interstinguentia sunt, vt si quid ex dictis sex defecerit, non amplius sit vera, sed spuria. Præterea si ab altera corporis parte, vel à toto, vt in febribus fieret, tunc mendosa est: nam febre curata etiam ipsa curatur. Præterea

mendosa statim fieri solet, vera autem paulatim accedit. Signa causarum sunt, nam sanguine peccante, oculorum aderit rubor, venæ sanguine tumefactæ, risus, motus morbi vniformis (vniformiter moueri inquam, quum nec de tertio in tertium nec de quarto in quartum accessionem habet) sanguis destillat è naribus, somnus longus, imaginationes rubæ. Signa bilis sunt audacia, temeritas, oculorum vultusque flauities, vigiliæ multæ, linguæ ariditas: qui verò tam immaniter sæuiunt, vt coerceri nequeant, iis ab atra bili phrenitis procedit. De signis quæ affectam particulam demonstrant superius dictum est. Signa inflammationis in cerebro, aut in eius membranis, sumuntur ex dolorum ac oculorum affectionibus: nam maior est dolor, quum in membranis inflammatio existit, quàm in cerebro, &c.

Loci consentientes de signis

Phrenitidis.

Gal. 5. de loc. aff. cap. 4. de omnibus his signis mentionem facit, ibi, Interdum vigilia præcedunt, & somnus manifestis imaginibus turbatus, ita vt clament & exliant: interdum adeò agrestis obliuio, vt ne meiere, sed nec matellam prodere meminuerint, &c. Lege fusius, & inuenies multa à

à me pridem recitata. Leges etiā in hoc
 ipse differentiam inter veram & mendo-
 sam phrenitidem.

De signis sex demonstratiuis loquitur
 Azzarides. 9. Almans. ibi, Quum aliquem fe-
 bris conclusa continua inuaserit, cum for-
 titudo capitis & oculorum grauedine, & in fa-
 cie atque in oculis vehemens fuerit rube-
 do, & capitis dolor, & horror luminis fue-
 rit, & in pulsu velocitas, & frequentia su-
 perfluitas, sunt certissima phrenitidis in-
 dicia. Quòd si lingua fuerit nigra, vel ci-
 rina, & permisceatur intellectus, & mul-
 tum fuerit alienatus, & multum vigilaue-
 rit, iam phrenitis perfecta est, &c. Sed Gal.
 prorrhet. comment. 4. à principio vsque
 ad finem methodum inueniendi phreni-
 tidis indicia docet, vbi quæ propria, quæue
 inseparabilia esse signa dicantur, facile in-
 telliges. De paraphrenitide loquitur Pau-
 lus lib. 3. cap. 6. ibi. Quæ consensu stoma-
 chi gignitur, non est phrenitis, sed hoc so-
 lum puta delirium. Facit etiam mentio-
 nem de signis causarum, ibi. Quibus san-
 guineus humor morbum facit, ij cum risu
 insaniant: quibus flaua bilis, ferociter, qui
 bus atra, tam immaniter sæuiunt, vt coer-
 geri nequeant, &c.

De vera ac mendosa phrenitide loqui-

tur etiam Cornel. Cels. lib. 3. capit. 18. ibi
 Phrenitis tum demum est, quum continu
 dementia esse incipit: sed perfecta est, ubi
 mens imaginibus addicta est, &c. Itidem
 Gal. aphor. 7. cōment. 14. Desipiētia agno
 scitur loquentibus agentibúsue nihil con
 sentaneum rationi, &c. lege etiam de hi
 Hippoc. 3. de morbis circa principium, &c.

De cura ipsius phrenitidis.

Considerādum in primis, num facta ve
 fienda sit inflammatio: quòd si non facta
 prohibendum ne fiat, his videlicet quin
 que modis. Primò, cum victu tenui, ac aliis
 sex rebus non naturalibus in contrarium
 ordinatis. Secundò, reuulsione & deriuatio
 ne, vel si adsit plethoria, euacuatione. Ter
 tiò repulsione. Quartò, sanguinis & alio
 rum humorum alteratione. Quintò eua
 cuatione. Regimen sex rerum non natura
 lium tale sit, primùm quiescat in aëre puro
 ac temperato, nec in thalamo sint picturæ:
 victus sit in primis tenuis, ad frigidum de
 clius, abstineat à potu aquæ frigidæ, præ
 fertim si morbus in septo transuerso fue
 rit, sed potus sit aqua hordeacea cum oxy
 mellite. Reuulsio fiet per sectionem venæ
 cephalicæ. Deriuatio per hyruidines nari
 bus applicitas, vel per sectionem venæ in
 fronte, vel per caustica quædā, vesicatoria
 nuncup

uncupata. Euacuatio nimia existente ple-
thoria fiet incipiendo à saphenis, deinde à
communi & à basilica. Repulsio fiet per
epithemata, instillationes, & cetera topica,
sicut suprà relatum est in cura cephalæ
alidæ. Epithemata fient cum oxyrhodi-
o, quod vario modo parari solet. Nam ali-
qui aquæ rosaceæ ad alia ingredientia por-
tionem duplam immittunt, sicut ℞. aquæ
ros. ℥ viij. olei ros. & aceti ana ℥ ij. Alij
verò volunt, vt ex his tribus aliud sit sub-
duplum ad reliquum, vt verbi gratia, ℞.
aquæ ros. ℥ viij. olei ros. ℥ iiij. aceti ℥ ij.
Alex. verò trac. quintā aceti partem oleo
ros. adiungit. Alteratio sanguinis vel bilis
fiet per infrigidantia styptica, & hæc perfu-
ritur per cibum aut potum, per Iuleb aut
syrupos vocatos aut cōfectiones. Cibi sint
frigidi styptici. Potus sit vinum granatorū
malorum, vel cydoniatus succus, ompha-
cium, limones, & arantia mala. Iuleb sit ro-
saceum, vel cum aliquibus syrupis concin-
natum, miscendo vnā aquas vel decocta
plantaginis, solatri, portulacæ, cichorij.
Vel sic paretur: Accipe syr. de aceto citri
℥ iiij. sy. de papauere ℥ ij. aquæ ros. florum
nenupharis, cichorij ana ℥ v. vini granato-
rum ℥ j. vini coroneorum malorū ℥ v. fiat
Iuleb cum sandalis rubeis aromatizatum.

Syrupi sunt sy. de ribes, de limonibus, de
succo acetosæ, sy. rosaceus, violaceus, de
pauere, de citro, de agresta, oxysachara. si
de granatis. Confectiones sunt, conseru
ros. viol. boraginacea, diacoralis, diarhodo
Abb. &c. Euacuatio fiet si morbus sit san
guineus, per sectionem venæ, vt suprâ ret
limus: si verò biliosus, per pharmacū cho
lagogum, quod fiet per electuaria, vel pi
lulas, vel potus, prout opus fuerit, de qui
bus suprâ in capite cephalææ fusius perti
ctauimus. Peculiaris tamen est aqua fru
ctuum Mes. distin. 7. Antidotarij & infusio
rheubarbari, &c. At si inflammatio facta
sit, tunc duo erunt medendi scopi: alter ad
materiæ fluxæ resolutionem, alter ad tol
lenda symptomata. Resolutio materiæ ita
fiet, primò, euacuando materiã exuperantẽ
cum rheubarbaro, myrobalanis, vel pilulis
iam dictis. Secundò, resoluendo cum topi
cis temperatæ caliditatis, sicut cum colum
bis, pulmone arietis, & catulis scissis ac
evisceratis, cum natua eorū caliditate, aut
aduentitia, præsertim parata cum rebus
anodinis, modicè calidis, veluti sunt violæ,
maluæ, melliloti, foliis lauri, corticibus
papaueris, camomilla, anetho, foliis fenæ,
& stechade, &c. Remotio symptomatū fiet,
si vigilie adsint, cū somnū prouocantibus,
veluti

eluti cum syrupo de papauere, cum lotio-
ibus extrinsecis soporiferis, vt cum cor-
ticibus capitū papaueris albi, cum hioscia-
no, floribus nenupharis, violis, anetho, &
cum foliis vitium, salicis, lactucæ, mandra-
goræ, rosarum, populi, &c. Vel cum semini-
bus papaueris albi, aut semi scrupulo pilu-
larū de cynoglossa, &c. Quod si retineatur
urina, eam prouocabimus cum oleo scor-
dionū, inungendo circa vesicæ regionem,
vel cum cataplasmate ex parietaria, &c.

Loci consentientes de cura, &

primo de regimine.

Auicenna, prima tertij, cap. de charabito
loquens, De regimine sex rerum natura-
rium inquit, Et fac eum quiescere in domo
temperata, & in aëre puro.

Obiectio.

Aër esse debet frigidus, quum sit morbo
contrarius, & cordis intemperiem magis
euentet. Quomodo igitur erit tempera-
tus, vt Auicenna?

Responsio.

Aër ratione morbi potestate debet esse
frigidus, sed non actu, quia poros ac mea-
tus cutis nimium constiparet: calidus verò
nimium caput repleret, & resoluendo vi-
res debilitaret. Quare magis temperatus
esse debet quàm frigidus. Hoc etiā habes

m 5

ex Gal. 10. meth. & ex Alex. & Raze. 1. co-
 tinentis. Mesues cap. de phrenit. & Auic.
 loco citato, Domus in qua locatur patiens
 sit exuta à formis & succiditate: nam phre-
 neticus intueri eorum vertigines diligenter
 & ex earum intuitu læditur cerebrum.

Obiectio.

Quomodo hinc luciditas prohibetur
 quum Alex. cap. de phrenit. dicat, quod in-
 gis lucidus debeat esse aer, quã obscurus.

Responsio.

Si patiens ex tenebris timorem conci-
 pit, aut amoto lumine in imaginatione
 incurrat, aer esse debet lucidus: si vero eco-
 trã, in obscuro quiescat. Vide in hoc casu
 Cornel. Celsum lib. 3. cap. 18. De victu lo-
 quitur Paul. lib. 3. cap. 6. inquiens: Cibus pri-
 mum esto aqua mulsa, deinde ptisanæ cre-
 mor, & sorbitiones condro cum quadam
 dulci portione, vt rhodomellite. Panis quo-
 que aqua lotus recte exhibetur, similiter
 intubum, lactuca elixa. Ab aquæ frigida
 potu arcendi sunt, præsertim si seipsum
 transuersum consortij lege malo dedisse
 originem cognoueris. Razes similiter 9. al-
 man. Nutrimentum eius sit aqua hordei,
 semel aut bis in die sumpta, secundum cõsue-
 tudinem, quã in tempore sanitatis habuerit.
 Arcul. iubet ptisanam quater in die esse su-
 men

endam, Auic. Incipe nutrire ipsum sub-
 li nutrimento, ita ut sis contentus oxy-
 mellite: deinde permuta ipsum ad aquam
 ordeï subtilem cum oximellite, deinde
 permuta ad crassum, & considera ægritu-
 dinem & virtutem. Et loquens de potu, Alie-
 a, inquit, eos ab aqua vehemētis frigoris.

Obiectio.

Dogma Auicennæ de cibandis ægris
 minino cōtrariū videtur Hippo. 1. aphor.
 Nam iubet quod à principio morbi victus
 sit crassior, & versus statum sit tenuior: hic
 erò ecōtra iubet primū quod sit tenuior,
 & versus statum crassior.

Responsio.

Modus cibandi in morbis acutis cum
 apostemate est diuersus ab eo, qui tantum
 in morbis acutis sine apostemate fieri so-
 let. Nam morbus acutus cum apostemate
 requirit in principio victum tenuiorē, ut
 membra magis conficiant & retineant, &
 motus humorum ex hac retentione sup-
 primatur: hocque habetur ex ipso Auicen.
 sen. 16. cap. de cura fluxus cum excoriatio-
 ne, & cap. de tinesmo. Sed in aliis morbis
 acutis seruatur dictum Hippoc. De diuer-
 sione ac sectione venæ loquitur Galen. 13.
 meth. cap. 21. ibi, Itaque incidenda est in ta-
 libus affectibus vena statim ab initio, si
 modo

modò tam valens fuerit virtus, vt sine ne-
 xa miffionem sanguinis toleret. Et paul-
 pòft, Et hoc vtrique vitio cōmune est, & e-
 quod cum fopore, & ei quod cum vigili-
 incidit, &c. Similiter Mef. cap. de phren-
 In primis fi nihil prohibeat, phlebotome-
 tur cephalica, deinde phlebotoma vena
 frontis, vel fanguisugas naribus applica-
 to, &c. Razes. 9. alman. Aegro igitur, ante
 quam prædicta compleantur accidentia
 est subueniendum ex sanguinis detractio-
 ne, & ventris folutione cum fucco fru-
 ctuum, &c. Aduerte quòd Azaraius non
 vult fieri fectionem venæ in biliofa phre-
 nitide, fed tantum hemorrhoidarum pro-
 uocationem. Auic. prima tertij, cap. de cu-
 racharab. Fiat phlebotomia ex cephalica,
 & egressio sanguinis aliquātula, imò mul-
 ta valde: deinde phlebotoma venas fron-
 tis, &c. & cū phlebotomaueris, tum oportet
 vt ipfum clyfterizes clyfteri valde leni,
 cum oleo fcilicet rofaceo & aqua hordei,
 deinde trahere materiam ad interiora cum
 fricatione pedum, &c.

Obiectio.

In principio morbi conueniuntne fri-
 ctiones?

Responsio.

Dico, quòd repletionem imminente, ne
 mate

ateria plus agitetur quàm auertatur, nō
inducat, sed remota hac causa, si fuerint
biles frictions, & à longinquis parti-
is incepta, fortè conducent, &c. De hac
ctione omnes ferè practici loquuntur. Si-
iliter Cor. Cel. lib. 3. cap. 18. ibi, Quod si
res patiantur ægri, sanguis quoque mit-
ndus. Itidem ait Aet. ser. 6. cap. 2. &c.
e repulsione loquitur Gale. 13. meth. cap.
ibi, Commune præterea vtriusque est,
oxyrrhodium in principio admo-
eas, &c. Similiter Auic. prima tertij, cap.
t. ibi, Et pone super caput eius in princi-
io oleum rosaceum cum aceto, in frigidat-
niue, &c. & oportet vt in principio ad-
ministres repercussiuâ purâ, nisi sit de ge-
ere magno, ex quo apostemantur venæ
uæ sunt extra caput, &c. Nam in morbi
ugmento purâ non conueniunt, sed cum
esoluentibus mixta, &c. Itidem fatetur
Cor. Cel. loco citato, ibi, Cōuenit caput ad-
utem tondere, &c. De alteratione per sy-
upos & confectiões habes plura ex Mes.
Arcul. Marc. Cat. Sauonarola &c. Simili-
er de euacuatione: nam Arcul. Si cholera
uerit in causa, euacuabis eam cum medi-
cina leniente, quæ etiam digesta materia
erit reiteranda, &c. De remotione acci-
dentiū loquitur Cor. Cel. lib. 3. cap. 18. ibi,
Si nih

Si nihilominus vigilent hi, quidam forum moliuntur, potui dando aquam qua papauer aut hyosciamos decocta. Et paulò post, Seruanda est alius quàm nerrima, remouendi terrores, & potius na spes afferenda, quærenda delectatio fabulis ludisque, quibus capi maximè nus assueuerat. Paul. lib. 3. cap. 6. Quòd vrina ipsi delirij vitio cohibeatur, calētis hydrelei imbre pubem & vesicam fobimus. Itidem ait Auic. loco citato, Inu gens oleo pubem tepido.

*Observationes de venæ
sectione.*

Auic. prima tertij. cap. de charab. inqu quòd phlebotomia fieri debet ex cepha ca, seruatis quatuor cōditionibus. Prim quòd nihil sit quòd prohibeat, sicut ten pus anni, ætas, robur virtutis, &c. Secund quòd copiosa fiat, si à sanguine phrenit dependeret: pauca si ab alio humore, ib Cholericum indiget in sui cura eductior choleræ plurima, & phlebotomia minor & cum cautela, &c. Tertia, quòd cauēda e syncopis, ita vt ne actu accidar. Quart. quòd sit cautela in ligando, ne ex magn commotione fieret hypospasma, id est v næruptio. Haly abbas vnum tantum ac uertit, vt ne post tertium diem sui euentu fia

at venæ sectio. Hoc idem videtur attestare Hippo. in eo aphorismo, Medicari in valde acutis, si materia turget, eadem die: tartare enim malum est. Auic. loc. cit. videtur etiam innuere, quod vniuersalis venæ sectio particularem præcedere debeat, obseruatis tamen tribus conditionibus: prima, quod virtus sit valida: secunda, quod dispositio capitis hanc requirat: tertia, quod aliqua accidentia non adsint, &c.

Observationes de repulsione.

Auic. de cura charab. Conuenit oxyrhodinū niue infrigidatū & non calidum.

Obiectio.

Quomodo frigidum, si Aët. ser. 6. cap. 2. licet, Caput rosaceo tepido irrigetur, nam in crebri membrana inflammata frigidas rosacei non est tuta?

Responsio.

In phrenitide duplex esse potest medendi scopus quatenus ad topica, alter scilicet ad inflammationem, alter ad reliqua indicantia. Si igitur ad inflammationem tantū sit tua intentio, tunc oxyrrhodinum conuenit actu frigidum, si ad reliqua indicantia, tepidum, &c.

Observationes de euacuatione.

Mes. in cholericā phrenitide, Statim fiat euacuatio cum aqua fructuū, nec in moræ sit

fit medicus: nam induciæ non dantur
præparanda materia: vnde versus,
Sinocha cum colica, phrenesis, squinans
& antrax.

Materias crudas euacuare iubent.

Et de topicis loquens, inquit: Scito quod
sanguinea indiget resolutione plus, & e
tinctione minus, cholericæ verò econtra
hoc idem ait Auicennas.

De prognosticis phrenitidis.

Hippocr aphor. 6. aphor. 53. Desipie
riæ, quæ cū risu fiunt, securiores: quæ ve
cum studio, periculosiores. B. Securior,
est, minus periculosa, & hæc fit à sanguine
sed quæ fit à flaua bile, timor est ne exult
insaniam satis furiosam generet, &c. aphor. 2. aphor. 2. Vbi somnus deliriū
dat, bonum. B. Hoc delirium non fit p
riente cerebro, sed tantum à caliditate
da. Vnde mirum non est, si id somnus
medio tollat. Et aphor. 7. aphor. 12. A pu
monis inflammatione phrenitis malum
B. Etiam econtra malum est, si ex phrenit
de inflammatio pulmonis sequatur. Ver
quod tunc phrenitis mala est, quum ad c
rebrū permutatur, vel si adeò excreseat, v
meningæ cerebri patiantur. Galen. 3. d
loc. aff. capitu. 7. Phrenitis mitior est
quum à pallida bile ortum cōtrahit: veh

me

entior, quàm à flaua: ferina verò, quum à
 uua bile perassata. Hipp. pronost. i. cap. 9.
 qui in febre acuta, aut delirio, aut pulmo
 a, aut capitis dolore, manus subinde ad
 fert, aut frustra venatur muscas, aut col
 git festucas, aut euellit pilos, id exitiale
 t. B. Lege fusius Gal. comm. de delirio. Et
 Hippo. aphor. 4. aphor. 72. Quibus vrinæ
 lbæ & perspicuæ, malæ, præsertim si in
 phreneticis appareant. Et Auicen. prima
 tertij, cap. de charab. Nullus visus est ha
 ens apostema in partibus cerebri, cuius
 vrina fuerit aquosa, qui euaserit. Nã tunc
 quosa esse dicitur vrina, quum, teste Gal.
 erispicua simul sit & alba. Hæc enim ma
 nam cruditatem ac flauam bilem ad ca
 ut solummodo rapi ostendit, &c. Mesu.
 ap. de phrenit. Cura huius ægritudinis, si
 iam impressit, cassa est: si verò adhuc per
 fecta non est, curatur, sed non apud negli
 gentes & stultos medicos, &c.

*Authores erronei dissentientes
 circa phrenitidem.*

- 1 Adserere, cerebri substantiam nullo mo
 do posse inflammari, vt Serapio.
- 2 Adserere, phrenitidem absque febre fie
 ri posse.
- 3 Adserere, paraphrenitidem à nuda cali
 ditate non posse effici.

4 Adserere, phrenitidē à sanguine extam, non esse signum periculosum.

5 Adserere, aquam frigidam in phrenide posse exhiberi, vt Razes.

6 Adserere, in omni phrenitide sectione venæ non conuenire.

Confutatio dissentientium circa phrenitidem.

Confutat primum Auic. cap. de chara dicens: Quidam medicorum existimant quod ipsum cerebrum non apostemat quia quod lene est vt cerebrum, vel durum vt ossa, nō extenditur, & sic non apostemat. Sed hic sermo est erroneus, quonia lene viscosum extenditur, & ossa etiā apostemantur, &c. Quod intelligendum est per viam congestionis, non autem per viam rheumatis: & hoc idem sentit Auer. 4. collig. & Gal. 6. Aphor. comment. 53. ibi, Fium omnes patiente cerebro, &c.

Ad secundum: Gal. 3. de loc. aff. cap. 7. Igitur quemadmodū phreniticis febris vni quoddam accidens dispositionem cerebri censetur, sic econuerso in ardentium februm dementia, multis elatis ad ipsum vaporibus. Idem sentit Hipp. in Epid. mor. & Gal. 5. de sympt. cau. &c.

Ad tertium: Gale. 6. Aphor. comment. 5. loquens de paraphrenitide, inquit, Quæcunque

aque enim ex sola caliditate sine humo-
vioso fiunt, similes quodammodo sunt
s, quæ ex ebrietate contingunt. Igitur
ædam fiunt à nuda caliditate.

Ad quartum: Gal. Aphor. 2. comment. 2.
ed satis fuit ei periculosissimū morbum
renitidem nominare. Et Aphor. 6. com-
ment. 53. Nulla, inquit, desipientia segura
t. Igitur nec à sanguine exorta.

Ad quintum: Auic. prima tertij, cap. de
arab. & Alex. cap. de phrenit. Gelida au-
em aqua, quoniam parum frugi, omnino
itanda: nam internæ phlegmoni nocet,
eliriūmque auget, & omnia in deterius
onuertit, materiæque resolutionem pro-
ibet, & nervis nocet: & sic nullo modo
onuenit.

Ad sextum: Conueniunt Alex. Razes &
lenique omnes, quod fieri debeat, si non
uacuandi, saltem reuellendi gratia, & hoc
in principio morbi, cauendū vt suprà.

De lethargi descriptione &

loro affecto.

Lethargus est dormiendi inexpugnabi-
lis quædā cupiditas, eoque λέθαργος dictus
est, quod abiaccidente, id est, ab obliuione
frigidum cerebri apostema sequente fiat.
vnde & aliās. Veteranus morbus vocatur,
eò quod qui tali ægritudine laborant,

aterno veluti sopore afficiantur. Fit
hic morbus vel in meatibus substantiæ
cerebri, & hoc ut plurimum: vel fit in pan-
culis, vel in eius substantia, & hoc rarò
modum contingit, in ventriculis verò
cerebri nequaquam. Quòd si fieri contingit
non amplius lethargi nomen, sed potius
apoplexiæ vel epilepsiæ obtinet, fitque
plurimum in occipitio, interdum in sin-
ipiti, vel in medio, sed rarò admodum.

Loci consentientes de lethargo.

Gal. lib. finit. med. Lethargus est delat-
in somnum non facile excitabilem, qui
cum coloris vitio & flatuoso œdema-
nec sine ipsarum quoque solidarum partium
repulsifici spiritus languore prouenit fe-
indebili febre ac maligna. Auicen. prin-
tertij, cap. 16. Lethargia dicitur aposten-
phlegmaticum intra cranium factum
& est sirsen pituitosum, &c. Et hæc qui-
dem ægritudo nominatur nomine
accidentis, id est, ab obliuione aposten-
cerebri sequente, &c. Cel. lib. 3. cap. 20.
Lethargo marcor est, ac inexpugnabili sp-
nè dormiendi necessitas, &c. De loco læ-
loquitur Paul. lib. 3. cap. de leth. ibi, τὸν
ἵκει τὸ αὐτὸν τῇ φρενίδι φημι τὸ ἐκείνου, &
Auicen. prima tertij, cap. 16. Et plurimū
quidem fit in meatibus substantiæ cer-
bi

ri, & rarò in velaminibus & substantia
 rebri, quia phlegma rarò penetrat pan-
 culos cerebri, propter eorum duritiem
 propter eius viscositatem, &c. Gale. 3. de
 c. aff. cap. 5. In lethargo & in omnibus so-
 rosis affectionibus ratio & memoria
 ereunt. Quare quum memoria in occipi-
 o, & ratio in medio ventriculo repona-
 ur, hoc sequi necesse est, lethargum scili-
 et plerunque in his duobus locis contin-
 ere, &c.

De lethargi causis.

Quum cerebrum primario affectu la-
 orat, binas tantum causas antecedentes &
 coniunctas habere dicitur, ex quibus pro-
 arctica intelliguntur. Antecedentes sunt
 ehe mentia frigora cum multa humidi-
 te complexa, sicut in pituita & in nimia
 eplectione cernitur. Vel antecedentes di-
 untur quacunque pituitosum humorem
 generare possunt, sicut comestio fructuum
 ceparum, aut nimia potio. Causæ verò
 onijunctæ sunt humores lethargum ad-
 ctum producentes: si verò cerebrum per
 onsensum afficiatur, tunc vel fit ex muta-
 ione alicuius acuti morbi, velut à phre-
 nitide & à febre continente, vel à stupefa-
 cientibus pharmacis nimis refrigeranti-
 bus cerebro adhibitis, aut fit à diaphrag-

mate, vel ab aliquo alio viscere affecto.
 rus igitur lethargus à pituita tantum
 nothus verò à pituita cum bile admixta
 capite putrescente, oboritur, vnde symp-
 mata habet etiam admixta.

Loci consentientes de causis

lethargi.

Gal. 3. de loc. aff. cap. de morb. comit.
 thargus ortū trahit à vehementi frigore
 Et 2. Aphor. comment. 3. Somnus, inquit,
 refrigerato primo sensitivo, id est, ce-
 bro, quæ refrigeratio si mixta fuerit hu-
 miditati, facit lethargicas passiones, si cū
 citate *κατὰ φύσιν*. Et 4. de sympt. cau. cap.
 Fit lethargus à frigida multaque humi-
 ditate grauante. Vide etiam Gal. 2. de loc. aff.
 cap. vlti. Nam ibi quotquot, inquit, affectus
 sunt soporosi ac somnolenti, tot omnes
 frigida causa oriri. Itidem 3. de loc. aff. c.
 5. Paulus lib. 3. cap. de leth. Ex pituita quæ
 frigore nimio & humiditate cerebrū in-
 buerit, contrahitur. Auic. prima tertij, ca.
 16. Et hæc ægritudo generatur ab omni
 quo generatur humor plegmaticus, &
 quo sunt euaporatio & putrefactio, & c.
 plurimum, inquit, generatur ex comesti-
 ne cepearum, & ex nimia repletione stom-
 chi, & multitudine potus, & comestio-
 fructuū intellige frigidū humidarum

01

Obiectio.

Quidam damnat cepas Auic. quum ex sua
soliditate potius proficere, quàm nocere
deberent?

Responsio.

Cōsiderat in cepis duas esse partes, quas-
dam scilicet crassas, ex quibus pituita ge-
neratur, & quasdam acres, quæ euaporatio-
nem ad caput mittunt, quæ simul vnitæ po-
tius capiti nocent, quàm prosunt. De causis
per consensum loquitur Aët. ser. 6. cap. 3. Fit
ethargus ex mutatione alicuius acuti
morbi, vt ex phrenitide, & à continente fe-
bre, & ex aliis plurimis morbis, in quibus
præsertim euacuationes sequutæ sunt, &c.
Gale. lib. finit. med. Lethargus euenit par-
tim affecto principio, id est, cerebro, par-
tim abscessu. Alex lib. i. cap. 20. Si pituita
sola deliquerit, lethargiam veram intro-
ducit: notham verò pituita cum bile mi-
xta in capite putrescente, & sunt in ea sym-
ptomata permixta.

De lethargi indicijs.

Indicia lethargi sunt 13. vt dolor levis
quasi extendens, febris lenta, somnus, gra-
uis, obliuio vehemens, respiratio imbecil-
lis & rara, crebra oscitatio, singultus ob-
stomachi cōsensum, albedo linguæ, pigri-

ria in motu palpebrarum, pulsus rari
tremuli, alius interdū humida, intercom
sed rarò arefcit, vrinæ quales inuentom
interdū tremores & sudores apparente

*Discrimen phrenitidis & lethargi
ex Auicenna.*

Vterque affectus similis in hoc effe
detur, quòd patientes aliena ac varian
quuntur. Differunt verò quadrifariam:
mò, quia in lethargo somnus est graui
phrenitide paucus vel nullus: secundò
thargici in suis lectis præcipitati iace
phrenetici resurgunt: tertio, in lethar
pars posterior, in phrenitide anterior
ditur: quartò, in lethargo est febris len
leuísque dolor capitis, in phrenitide ve
vehementia sunt omnia, &c.

*Discrimen lethargi & apoplexia syn
copis & vteri strangulatus.*

Differt lethargus ab apoplexia ex e
quòd lethargus paulatim ac pedetenti
fiat: apoplexia verò statim. Differt ab vte
strangulatu, quum excitatus respondeat
strangulata minimè. Differt à syncop
quum in lethargo facies sit viuida, in sy
copi veluti mortua. Differt à subet & con
gelatione per febrem, quæ nec in subet ve
cong

congelatione accidit, intellige, præfer-
tim si ægritudines & non accidentia per
se sint.

*Loci consentientes de signis
lethargi.*

Paulus lib. 3. cap. 9. In lethargo adest fe-
bris lenta, nō admodum acris, cum animi
in somnū profunda delatione, pulsus ma-
gni, turbulenti, respiratio rara & imbecil-
is, & cætera omnia à me exposita. Auic. si-
militer prima tertij, de signis leth. ibi, So-
da leuis, febris lenta, necessaria enim est
febris in omni apostemate facto ab humo-
re putrefacto: & propter hoc separatur à
subet, & c. Vide insuper Gala. 5. de loc. aff.
cap. de septi trāsuerſi affectibus, & 3. de loc.
aff. cap. 5. Itidem Aet. ser. 6. cap. 3. ibi, Proin-
de considerare oportet speciem delationis
in somnum, & c. De signis discriminum le-
thargi cum phrenitide, apoplexia, & cæte-
ris similibus lege ex Auic. Arcul. Sauona-
rola, & ab ipso Gordonio.

De lethargi cura.

Scopi in curando lethargum quinque
enumerantur, primus euacuatio, secundus
reuulsio, tertius materiæ repulsio, quartus
symptomatum emendatio, quintus victus
ratio instituenda. Euacuatio, si adsit reple-
tio, aut pituita cum sanguine abundaue-

rit, fiet per sectionem venæ cephalicę: que si minus sanguis redundet, per phlegmogogum, per secessum, vel per vomitum edicens moliri potest. Educunt pituitam hiera simplex, hiera cōposita, pilulæ chochia electuariū indum, & quęcunque in cephalæa ab humore frigido exarata sunt. Vomitum fiet ex decocto raphani cum sesquiuncia oxymellitis scillitici. Reuulsio fiet per cucurbitulas, lotiones, clysteria, quę multum in hoc casu laudantur, per frictiones, ligationes, &c. Clysteria parantur ex rebus ad caput spectantibus, sicut ex decocto saluie, maioranę, rutę, betonicę, stachados, cui mellis rosacei tres vnciæ, & totidem olei communis adiectę sint: vel si acria volueris, adde prædicto decocto radicem cyclaminis, colocynthidos, cartami, centaurij quantum lubet, addito etiam sale gемео, aut hiera composita, electuario indo, &c. Lotiones fiant ex prædictis rebus à cubito ad extremam manum, & à genu vsque ad plantas pedum, &c. Repulsio materię perficitur per exteriora & interiora. Per exteriora in principio repellentia, per interiora materiam præparantia. Exteriora in principio repellentia sunt oxyrrhodinum: in augmento repellentibus adde resoluentia, vt est aliquid castorei,

orei, & à medio statu vsq; ad lethargi de-
 linationem resoluentibus puris vtendum
 cuti est emplastrum Mesues, quod recipit
 iretri, sinapis, scillæ, castorei, euphorbij,
 &c. Interiora materiam præparantia sunt
 syrupus de stechade, oximel scilliticū, rho-
 omel, & cætera quæ dicta sunt in capite ce-
 phalææ ab humore frigido, cum aquis vel
 decoctis saluæ, stechados, maioranæ, hyssō
 pi, betonicæ, &c. Emendatio symptomatum
 fiet per ea, quæ à somno profundo ægrum
 reuocant, vt est fumus humorum capillo-
 rum, item frictio pedum cum acuto, sale,
 vel farina synapis, vel cum succo rutæ, ace-
 to & sale. Reuocat etiam à somno pilorum
 euulsio partiū inferiorū, clamor & tumultus:
 obliuio verò loquēdi, mingendi, ac ege-
 rendi, incitando, vesicam comprimendo,
 oleisq; aspergendo, membræque inferio-
 ra vehementer comprimendo, reuertitur.
 Victus sit tenuis, incisorius ac resicans, cū
 condimentis quibusdam paratus, vt panis
 contritus in aqua cum saluia, paucis pipere,
 vel cinnamomo, vel ptisana, sale vel pu-
 legio vel oxymellite parata, vel aqua ci-
 cerum vel lupinorum: potus sit hydromel.
 In declinatione morbi victus sit qui vires
 recolligat ac recreet: vnde dandum est vi-
 num aquosum, tenue, album, subastringēs.

Carnes

Carnes sint gallinarū, columborum, mor-
tanarūque auicularū, pisces petrosi, ole-
um sint porri, asparagus, petroselinum, &c. A-
limentum sit lucidus, splendidus, domus tepida, for-
nus non permittatur nisi per mediam ho-
ram, deinde excitetur, ita ut de media
mediam horam dormiat & excitetur: fr-
actiones vicem suppleant exercitij, &c.

Loci consentientes de cura

lethargi.

De omnibus his ferè intentionibus lo-
quitur Gale. 13. meth. cap. 21. & primū de
euacuatione, ibi: Incidenda est in talibus
affectibus vena statim ab initio, si virtus
valeat, &c. De humorum preparatione, ibi:
Excitare eos oportet, & crassitiem humo-
ris incidere & excalefacere, incoquentes
in aceto thymum, & pulegium, & origa-
num, &c. De deriuatione, ibi: Mox palatū
valentibus & acris medicamentis vnge-
mus, deinde sternutamentis utemur. De re-
pulsione, ibi: Tum capiti similes præsidio-
rum facultates imponemus, adaucta sem-
per eorū usque ad ipsum sinapi vehemen-
tia. De reuulsione, ibi: Quinetiam cucur-
bitulis utemur, &c. De euacuatione loqui-
tur Auic. etiā prima tertij, cap. de cu. leth.
ibi: Si non fuerit quod prohibeat, phlebo-
tometur prius: & si alia fuerint tibi neces-
saria,

ria, da ei ad potandum hieræ picræ, 3. j. quartam vnius drachmæ de pulpa colonthidos, & tres drachmas myrobalanorū danic vnum masticis. Aet. ser. 6. capi. 3. Si sanguis fuerit redundans secetur vena, & ro viribus euacuetur. De reuulsione loquitur Paul. lib. 3. cap. 9. ibi. Si minus sectio vena competit, eius loco clysteriis acris alium ducemus. Acria enim huc spectant, quia tum febris mitis est & lenis, tum quia materia crassa, non apta fluere, in ventriculo continetur, à quo clystere acutū diuertit & euacuat. Similiter Auic. loc. cit. Administra eis clysteria acuta, & trahatur materia ad inferiora, & fac eū vomere cū pēna melle & sinapi illita, & frica extremitates eius donec rubescant & doleant, &c. De repulsione & materie præparatione loquitur Auic. cap. cit. & in principio. Repelle materiam cum oleo rosaceo & aceto, & post duos dies à principio sui misceatur eis castoriū, &c. Alex. lib. 1. capi. 20. Vniuersam curationem capiti applicare oportet, quò vapores, qui eò deferuntur, promptius supprimantur. Danda est insuper opéra, vt humores ibi coacti concoquantur, incidantur, & dissipentur, &c. De sympt. emendatione facit mentionem Cels. lib. 3. cap. 20. ibi. Hos quidam excitare nituntur ad motis his, per quæ sternutam

nutamenta euocantur, & his quæ odore f
do mouent, qualis est pix cruda, lana suc
da, piper, veratrū, &c. Auic. loco cita. Quu
in fubet profundi fiunt, euelle capillos ei
rum, & pone apud nocram ventofas mu
tas cum igne & absque incisione, & quu
eis acciderit obliuo vrinx & stercoris, eu
broca vtraque emunctoria, & vētrem cu
decocto camomillæ, meliloti, violarun
& comprime vesicam, &c. De victus ratio
ne instituenda lege Aët. sor. 8. capit. 3. ibi
Cibi porrò fiat tenues, & incisoriij, ac res
cantes, & cum condimentis parati, anise
cumino, apio, pipere: sunt tamen qui ar
sum damnent, quum sit somniferum. Pad.
lib. 3. cap. 9. etiam de his loquitur, ibi, Al
mentum sit cremor ptisanæ cum oxymell
te, vel salibus, vel pulegio, & hoc in pri
cipio. Nam in declinatione victus sit qui v
res recolligat, &c. Auic. loco cita. Et quu
nutris, nutri eos cum aliquibus quæ sint si
cut aqua lupinorū, ciceris cum hordeo fra
cto: deinde quum finitur ægritudo, admi
nistra restaurantia. Lege fusius hos aūtho
res, & plura, quæ hîc recitari non pos
sunt inuenies, &c.

Lethargum generantia.

Cepe, ozimum, semina nigri & albi pa
paueris, poma mandragoræ.

De

De prognosticis lethargi.

Hippoc. aphor. 2. Aphor. 1. in quo morbo
 mnus laborem facit, mortale: si verò iu-
 it, non mortale. B. intellige somnum, qua-
 nus somnum, esse mortalem, sed quate-
 us accidens alicuius morbi. Et Aphor. 2.
 phor. 3. Somnus atque vigilia si modum
 xcesserint, malum. B. Excedit modum tri-
 liciter: primò ex parte quantitatis, unde
 ultus vel deficiens malus: secundò ex par-
 e qualitatis, qualis est somnus inexpugna-
 ilis & superfluous, cerebrum infrigidans
 e humectans: tertio, ex parte temporis,
 ualis meridianus & nocturnus. Auicēnas
 rima tertij, ca. de signis lethargiæ. Quūq;
 ortia fuerint accidentia lethargiæ, & mul-
 iplicatur sudor valde, est tunc perimens,
 propterea quòd sudor deiicit virtutem, &
 quum spiritus dilatatur & fit bonus & de-
 clinant accidentia, tunc tendit ad salutem,
 & propriè si apparent apostemata post au-
 res, &c. Cels. lib. 3. cap. 20. Lethargus est de
 genere acutorum, & nisi succurratur, cele-
 riter, iugulat, &c.

*Authores dissentientes circa leth. & ver-
 tig. quare infra.*

De vertigine.

Τὸ σκορομαχτικὸν πάθος, id est affectus scoto-
 maticus, qui & vertiginosus dicitur, quid
 sit

fit, ex ipsa appellatione manifestatur. enim scotomaticus is dicendus, cui oblationes contingunt, ac ei videtur circumferri, ita ut firmari non possit, parua occasione cadat. Differt verò vertigo à scotomatico affectu, eò quòd omne roma vertigo sit, sed non econuerso. *σκοτώματι* dictum Latinè turbo, à *σκοτέω*, id est vertiginor, siue à verbo *σκοτέω*, id est tenebro, siue à *σκοτίω*, id est obscuro: scurantur enim præ caligine oculi, ut nihil videant. Sed in vertigine simpliciter dires videntur tantùm circumuolui, absque casu & tenebris. Differunt etiam in causis ut infra videbitur.

Loci consentientes de vertigine.

Galen. Aphor. 4. comment. 17. Vertigo quando simul videntur circumuolui quæcunque conspiciamus, & sensus visus dereper destruitur, quum videantur tenebre circumfusæ. Auic. prima tertij, tra. 5. Vertigo est: habens ipsam imagnetur quòd res super ipsum voluantur, & quòd eius cerebrum corpus ipsius reuoluantur: quare non regit se ita ut firmetur, imò cadit, &c. Ba. Intelligit scotomaticum affectum (& si nulla de tenebris fiat mentio) hinc ab Auicena definitur, sub quo vertigo tanquam minor dispositio continetur. Definitur verò vertigo

Raz

aze hoc modo, Razes 1. comment. capi. 2. vertigo est dispositio, in qua apparet res re-
solui, tamen homo non cadit, sed regit se,
c. Ba. Adde, sed perseverante morbo diu-
us ex facili occasione concidit, maximè
si in circulum circūuertatur. Vnde. Gal.
de loc. aff. A parua occasione hebetatur,
a vt interdum cadant, si circunrotentur.
Ioc idem adserit Paul. capi. proprio, &c. &
ët. ser. 6. cap. de vertig.

De vertiginis causis.

Causæ vertiginis primitiue sunt omnes
ex res præter naturales, ex quibus vapores
rassi egredientes, vt cepæ, vinum, cerebrū
nalè afficiunt. Similiter vna in sole, mala
temperies, capitis percussio aut cranij
fractura solita, excretiones retentæ, crudi-
tates, ebrietates, & consideratio rerum quæ
circumaguntur. Antecedentes sunt omnes hu-
mores, à quibus vapores eleuantur, qualis
est vtraque bilis, pituita & sanguis. Coniun-
tæ sunt vapores spiritibus admixti, existē-
tes actu in regione visus. Hæc affectio etiā
per consensum alicuius partis vel totius fie-
ri potest, ex vaporibus ad caput elatis, aut
ex ore ventriculi à malis humoribus mor-
to, ab iisdemet causis deniq; prodeunt ver-
tiginis, à quibus morbus comitialis, & eas-
demet sedes occupant, &c.

Loci consentientes de causis vertiginū.

De causis primitiuis loquitur Gale. 3. locis aff. ca. 8. ibi. Id maximè accidit, quum vel sub sole æstuauerint, vel aliam ob causam calefacto fuerint capite, aut ex caliditate vaporosóq; spiritu caput opplente, &c. A. fer. 6. capi. 7. Facile capiuntur ab hac affectione, quibus consuetæ excretiones sunt oppressæ, sed & cruditas & ardores adui, & ebrietates affectionem hanc eliciunt. Auicen. prima tertij, cap. de cau. vertig. Fit propter considerationem ad res quæ voluntur, ita vt figatur forma illa sensa in anima. Et paulò post inquit. Interdum fit à malitia complexionis, & fit ex motu spiritus exterius, sicut ex percussione capitis & fractione cranij, &c. De antecedentibus causis lege Galen. Aphor. 3. com. mēt. 27. ibi, Quotidianæ cōstitutiones, & ubi inquit. Fit vertigo ab humore cum spiritus crassitie in capite moto, ideoque proxima est comitialibus morbis & apoplexiis, &c. Paul. lib. 3. capit. 11. Nascitur vertigo, quum frigidus & glutinosus humor cerebrum occupat, &c. Auicen. prima tertij, tract. 5. Vaporis materia quandoque est cholera, quandoque phlegma, & vertigo phlegmatica similis est epilepsia, & De atra bile & sanguine non meminit, n

i vbi de signis vertiginis loquitur. De
causis coniunctis loquitur Galen. Aphorif.
. commenta. 31. ibi. Vertigines accidunt
propter spiritum vaporosum, qui in parti-
bus cerebri inordinato motu cietur, &c.
Auicen. prima tertij, capi. cit. Ex causis fit
corporeis presentibus in vacuitatibus cere-
bri, contentis in ipso ex vaporibus proue-
nientibus in venis, quæ sunt in ipso & ner-
uis, &c. De causis per consensum plura ha-
bet ex Galen. Aphorif. 4. comment. 17. ibi.
Fit ab ore ventriculi à malis humoribus
morfo, &c. Item Aphor. 3. commen. 31. ibi.
Aut in ventriculo vitiosis superfluitatibus
aceruatis ad cerebrum fertur exhalatio va-
porosa. Item 3. de loc. affect. capit. 8. Ori-
basius Aphorif. 3. comment. 10. de hac re
mentionem & ipse facit, ibi, Sicut ven-
tus sese eleuans, & puluerem in sublime
rapiens, &c. Auicen. prima tertij, tra. 5.
Et quandoque fit ex vaporibus ascendenti-
bus ad cerebrum, &c. lege eum fusius, nam
ibi enumerat omnes partes, à quibus se
extollere potest. Galen. in libr. qui intro-
ductio siue medicus nuncupatur, Caligi-
nes, inquit, oculis offusæ & vertigines co-
gnata sunt vitia morbo caduco, ab iis-
demet causis prodeunt, atque easdem se-
des occupant, &c.

De signis vertiginis.

Indicia quę distinguunt vtrum primari
affectu, an per cōsensum efficiatur vertigo
hec tria sunt: primū non præcessit alterius
membri nocumentum: secundum est ver
go assidua, quę nō excitatur ex repletion
alterius mēbri, nec remouetur ad alterius
membri euacuationem: tertiū, quia omne
ferē sensuum actiones læsæ sunt. Si igitur
alterius membri læsio præcesserit, ad cuius
incrementum vertigo augeatur, & ad eius
decrementum decreascat, & ad eius ablati
onem auferatur, tunc per consensum est. Vbi
igitur per consensum ventriculi fieret ver
tigo, tunc præcedet praua conconctio, app
etitus deiectio, grauitas, nausea, vomitus, &
anxietas quædam stomachica, dolorq; eri
in anteriori parte cerebri vsque ad mediū
propter neruorū reuersiuorum consensum
&c. Si verò primario affectu, tunc præce
dunt hebetudines in oculis, aurium soni
tus, auditus grauitas, dolor capitis, & si
vniuscuiusque sensus oblæsio aderit. Indi
cia humorum, præcipuē sanguinis sunt, ve
narum inflatio, oculi rubei, capitis graui
tas, somnus & pulsatio. Bilis sunt vigilie
inflammatio sine grauitate multa, imagi
nationes citrinæ, &c. Pituitæ, sunt graui
tas, tumor, multitudo somni: & sic de re
liquis

liquis humoribus etiam intelliges, &c.

Loci consentientes de signis vertiginis.

Galen. 1. de loc. affect. ca. 8. loquens de signis primarij affectus & per consensum inquit, Vertigo quum per se fiat, aut per ventriculi consensum, sicut & Archigenes fateatur, sic signa distinguere oportet. Nā si vertigo ex primaria cerebri affectione fiat, tūc aurium soni, & capitis dolor, & grauitas, & sic olfactus & cuiuscunque sensus à capite prodeuntis oblæsis aderit. Vbi verò per consensum oris ventriculi, præsentietur cordis morsio, quam Græci dicunt *καρδιωμύς*, & nausea, &c. hæc eadem recitat Paul lib. 3. capi. 12. Auicenn. prima tertij, tra. 5. Vertigo facta ex reuolutione hominis, aut consideratione ad res reuolutas, nota est per se & similiter, quæ fit à percussione & casu. In ea quæ fit à retentione materierum in cerebro, signa sunt, quòd ægritudo est assidua, non sequens ægritudinem aliorum membrorum, nec est excitata cum repletionem, nec sedata cum euacuatione, & antecedit ipsam dolor capitis, sonitus & tinnitus, & grauitas est in capite, & inuenit tenebrositatem in visu, & in sensibus abbreviationem, &c. Lege eum fusius: nam si omnia vellem in vnum congerere, essem longitudine longè longior. Lege etiam

ipsum de signis cuiusque humoris, ibi, Et fuerit humor, &c.

De cura vertiginis.

Primum id in cura notato, an per se, a per compatiendi rationem morbus fiat. Si per se, an actu vertiginosus sit, an fatuitate. Primò expedit, curatio, alteri præseruatio. Præterea etiam id intuere, nunc in ipsa vertiginis accessione sit patiens, an extrà. Si in accessione, tunc frictionibus cucurbitulis, ligationibus & medicamentis odore mouentibus æger excitandus est: si verò extra accessiōem, tunc primò causa diligenter considerata, curandus erit. Vnde si fuerit causa primitiua, qualis est visus rerum circinuoluentium, aut auditus vocum ingentium, aut percussio & crapula, tunc ita remouenda erit causa, & nec res mobiles videat, nec sonos ingentes audiat: & tunc motus spirituum & eorum disiunctio moderetur cum quiete animi & corporis in loco obscuro, interit remouendo si quæ mala fuerit intemperies in cerebro derelicta, cum contrariis intrà & extrà applicatis. Si verò aliqui humorum causa fuerit, tunc quintuplici medio indiget, primò euacuatione, secundò reuulsione simul & deriuatione, tertio alteratione siue humorū preparatione quartò

uarto accidentium remotione, quinto vi-
us ratione. Euacuatio fiet per sectionem
enæ, si sanguis superabundauerit, per re-
iores venas, incipiendo à saphena, deinde
basilica, postremò ab ipsa cephalica & à
enis, quæ post aures locantur, præsertim si
urgationes mēstruorum vel hæmorrhoi-
arum oppressæ sint. Si verò sanguis cum
liis humoribus in qualitate redundet,
prout natura humoris requirit, euacuabi-
tur cum rheubarbo, myrobalanis, cas-
ia, &c. Reuulsio fiet cū omni reuulsionū ge-
ere, vt suprà dictum est in cap. cephalææ,
procedendo vsq; ad cauteria. Alteratio, siue
humorum præparatio, perficitur per exte-
riora & interiora. Exteriora parantur in
principio cū his, quæ repellunt ac infrigi-
ant, quale est oleū rosaceum & acetum. In
medio tempore cum repellētibus ac resol-
uentibus mixtis, & in fine cum puris resol-
uentibus, prout habuisti in cap. cephalææ.
Interiora per ea, quæ immobiles reddunt
piritus, sicuti sunt frigida styptica, qualis
est syrupus ros. de granatis, de ribes, de ci-
doniis, & quæcunq; apozemata ex his para-
ta, vbi materia sit calida, & spiritus in mo-
tu fuerint. Valēt etiā in hoc casu eclegma-
ta ex saccharo rosaceo, mina cydoniorum,
item cotoneata à prandio statim vel ab

ipsa cœna comesta. Remotio accidentium erit, si nec apud ignē, nec in scalis, nec prope flumina patientes sint, ne interdum vertigine oborta præcipitentur: si verò aliquæ etiam tenebræ adhuc remaneant, cum his quæ clarificant, statim curabuntur, & Victus ratio, si ab humore calido fieret vertigo, erit quæ bilis aut sanguinis feruore extinguat, sicut sunt acetosa, styptica, quales est succus cotoneorum malorum & granatorum, in quo buccella panis immergi potest, sitq; victus non flatuosus, non caco stomachicus, sed facile concoctilis. Aër tamen magis obscurus, quàm lucidus, ne spiritus agitentur. Potus sit modicum vini albi tenuissimi, præsertim si vertigo per compatiendi rationē fieret. Somnus sit notabilis quies non solum corpori, sed etiam animi cōfert. Vitanda insuper sunt accidentia animi, sicut ira, tristitia, nimia cogitatio, & Venereis quantum potest se abstineat, &c. Si causa fuerit per cōsensum, tunc triplici sepo curabitur, primò cum causæ remotione secundò cū mēbri mittentis & recipienti roboratione, tertio cū reuulsione vaporū adhibito tamen regimine congruo, ut supra: quæ omnia longè vberius habita sunt in cap. cephalææ per cōsensum, &c. Quare non est, ut hîc denuo recitentur, &c.

Loc.

Loci consentientes de cura vertiginis.

Paulus lib. 3. cap. 12. Vertiginosos in ac-
sione excitabimus cum medicamentis,
ia odore mouent, item frictionibus, & id
enus aliis, &c. lege etiam de hoc Marc.
at. Auic. prima tertij, tra. 5. Vertigo facta
reuolutione hominis super ipsum, & con-
deratione eius ad reuolutiones, & cōfide-
atione à loco alto, cū quiete & traquilli-
te curatur & somno, si non citò sedatur.

De cura à causa humoralis, & primò de
psa euacuatione loquitur Auicē. loco nu-
er citato ibi: Quæ verò facta est ex san-
guine, aut ab humore contento in corpore,
urat phlebotomia ex cephalica, deinde ex
ena quietis, quæ est post aurem. Et Paulus
oco citato: Vbi morbus conquieuerit, san-
guis discutiendi gratia extrahatur, & pur-
gatio ex hiera præstanda. & Razes 9. almā.
Quòd si non appareant, & facies sit rubra,
sanguis ex cephalica vel basilica erit mi-
nuendus. De reuulsione etiam loquitur Pau-
lus ibi, Interpositis diebus acri clystere &
cucurbitulis ad occipitium cum scarifica-
tione, mōxque apophlegmatismis & ster-
nutamentis vti debemus, &c. Auic. loco ci-
tato: Et cauterizatur arteria, & propriè ea,
cuius causa est ascensio vaporum: & ventro-
sæ conferūt nocrati, &c. Si verò fuerint hu-

mores diuersi à sanguine, incipe ad curandum cū pilulis de hiera & infusione aloē vel in humoribus calidis cum decoctione myrobalanorum, epithimi, pilulis stomaticis, &c. De alteratione plura habes: Aet. ser. 6. cap. 7. ibi, His verò qui calidum caput habent, etiam rosaceum cum aceto adhibeas, &c. Et Auic. cap. cit. Et confortabis caput cum oleo rosaceo & aceto, & oleo camomillino, & post cōfirmationē cū oleo camomillino singulari, &c. Loquens etiam de interiori inquit, Et malitia complexionis curatur per contrarium, vt temperetur cōplexio naturalis, vbi Hugo Senensis vtitur syrupo de stechade, de epithimo, oxymelle composito & scillitico cum decoctione hāsce origani, hyslopi, stechadis, &c. De aciderium remotione loquens etiam Auic. inquit, Et habens vertiginem alienet à consideratione ad omnem rem citò reuolubilem, & ab aspectu profunditatum fouearum, & verticum mōtium. Lege etiam de his omnibus Arcul. Marc. Cat. Michaēlem Sauo. & Gordonium. De victus ratione fit mentio ab Aetio ser. 6. ibi, Cibi sint boni succi, facile concoctiles, flatus exortes, omnino stomacho ac ventri commodi, vrinam cientes, vinum modicum sit, album & tenuissimum, & non valde vetus. De cura
per

p. consensum, Mes. cap. de vert. inquit, In primis materiam abscinde, deinde membrum mandans rectifica, & regimen ad aualitatem administra, cerebrum & caput cōforta, ne recipiat, deinde diuerte vapores & fumos cum constructione doloro-ventosatione, clysteriis, &c.

Observationes de sectione venæ.

Actius ser. 6. capite 7. monet, ne aceruam euacues, nam ex facili occasione condunt, &c.

Vertiginem generantia ex Dioscor.

Cardamomum, hyosciamus, mandragora, falernum, aconitum, cicuta.

Remedia ad vertiginem ex eodem.

Valent pēucedanum, galbanum, ampe-
s leuce acetum scilliticum, vinum scil-
liticum.

De prognosticis vertiginis.

Auic. prima tertij, tra. 5. Quandoque fit vertigo & scotomia secūdum semitam crisis, & vertigo frequens, & propriè in decretitis nunciat apoplexiam: & similiter vertigo eueniens successione stuporis communicantis membrum, & quandoque solit vertiginem sōda accidens. Ille cui frequenter accidit scotomia, de seipso sollicitus sit, & humiorem euacuet crassum, ne ad pilepsiam aut apoplexiam perueniat.

Quum

Quum vertigo prolongatur, signum
quòd fiat à causa frigida, &c.

*Authores dissentientes circa lethargum
& vertiginem.*

- 1 Adserere, lethargum non principale
in cerebro, sed in corde fieri, vt Ari-
steles, qui primam vim sentiendi in
de esse dicebat, & non in capite.
- 2 Adserere, lethargum à melancholia
generari posse, vt Razes.
- 3 Adserere, in lethargo à frigidityte &
miditate proueniente, sectionem
non comperere.
- 4 Adserere, in lethargo occipiti esse a-
benda repellentia.
- 5 Adserere, scotomaticum affectum
differre à suffusionibus oculorum, quum
utrobique imagines videantur.
- 6 Adserere, vertiginem quæ fit per c-
sensum, non esse attribuendam capiti.
- 7 Adserere, omnem vertiginem per ar-
riarum sectionem esse curandam.

*Confutatio dissentientium circa lethar-
gum & vertiginem.*

Impugnat primum Gal. 4. de symp. ca-
pit. 8. ibi, Cæterum quòd capitis reple-
somnum conciliet, iam Aristot. satis mo-
strauit: sed quamobrem oppleto capite
ma sentiendi vis quiescat, quum ipsa (vt i-

rat) in corde resideat, nullam probabi-
li inuenire potuit rationem, igitur, &c.

Ad secundum respondet Auicen. prima
tij, cap. 16. ibi, Sunt quidam Medici, qui
iminant lethargiam omne apostema fri-
dū in cerebro, siue sit melancholicū, &c.
rem videre poteris. Prætereà Galen. loco
citato, Lethargus, inquit, fit à frigidityte
humiditate: sed melancholia frigida est
sicca, igitur, &c.

Ad tertium: Alex. lib. 1. cap. 20. Si nec vi-
s agrotantis, nec ætas, regio & tempus
consistere videatur, sanguinem detrahare
principio statim expedit, &c. Auicen. Si
non fuerit quod prohibeat, phlebotome-
ntur: intellige saltem reuulsuam sectio-
nem competere, si non euacuatiuam.

Ad quartum: Galen. 13. meth. cap. 22. Sed
non solum futuræ, & præsertim coronariæ,
non solum impositi medicamenti qualita-
s, sed etiam substantiam, (si tenuis est) in-
telligit transmittit: nam præter reliqua, tenuis-
simum est hoc loco craniū & rarissimum:
ergo quoties medicamenti cuiusque vim
vehementer descendere voles, hoc maxi-
mè loco impones, &c. igitur non occipiti &c.

Ad quintum: Gal. in lib. qui Introductio
que Med. nuncupatur, respondet dicens, q
aligines oculis offusæ & vertigines co-
gnat

gnata sunt vitia morbo caduco, sed inter se differunt, quod experientia demonstratur: nam in scotomatico affectu leui occasione hebetantur & concidunt, sed non in suffusionibus oculorum, &c.

Ad sextum: Galen. 3. de loc. affect. cap. 8. Verum ut iam antea saepenumero monuimus, licet caput per alterius partis consensum afficiatur, affectio tamen ipsi ascribenda est, &c.

Ad septimum: Galen. 3. de loc. affect. cap. citato, Quamobrem nonnulli horum ab arteriarum sectione praesidium petierunt, arterias pone aures secantes, sed constat non omnes huius auxiliij beneficio fuisse curatos, &c. Nam fieri potest, quod inequalis cerebri intemperies huiusmodi spiritum producat, &c.

De morbo comitiali.

Morbus comitialis, Graece *ἐπιληψία* dictus, est totius corporis non omnimoda convulsio, ex qua operationes, motus & sensus in membris prohibetur, per temporum intervalla accidens, fitque cum repentino casu ac exitu spiritus oris. Talis vero convulsio sequi solet vel à multitudine grauante, vel ab acri materia cerebrum mordicante: quod quum tale molestum reiicere conatur, tali motu convulsivo concutitur, &c.

Loci

Loci consentientes de morbo comitiali.

Galen. 3. de loc. affect. cap. 7. Morbus comitialis est omnium corporis partium conuulsio non perpetua, sicut in emprosthotono, opisthotono & tetano, sed quæ ex temporum accidit interuallis. Et lib. fini. med. Comitialis morbus est oppressio mentis sensoriorumq; cum repentino casu, ac spumæ oris exitu. Auicen. prima tertij, tra. 5. Epilepsia est egritudo, prohibens membra animata ab operationibus sensus & motus in erectione non integrè: & illud est propter oppilationem contingentem, &c.

Obiectio.

Quum Galen. de symptom. differ. cap. 3. dicat, Si non totum corpus conuellitur, sed principes functiones detinentur, hoc symptoma morbus comitialis appellatur: si igitur symptoma est, quomodo ab Auicena, ægritudo dicitur? Præterea conuulsio est symptoma, sed morbus comitialis est conuulsio: igitur symptoma & non morbus, ut Auicen.

Responsio.

Morbus comitialis sumi potest primò pro obstructione cerebri ventriculos opplente, vel pro mala intemperie, vel pro mala compositione, & sic his tribus modis est ægritudo: at sumptus pro motu conuulsuo, est

est symptoma siue accidens, &c. Quur motus conuulsius fiat in cerebro, reddit rationem Gal. 3. de loc. aff. cap. de mor. comit. ibi, Proinde existimaui similem motum cerebro euenire, qualis stomacho interdum a re quapiam molestato accidere solet, &c. Vide etiam de hac re Aet. ser. 6. cap. 13. De generatione spumæ vide Galen. aphor. 2. comment. 43. ibi, Strangulati, &c. & Auic. ibi, Spuma verò accidens in epilepsia est propter agitationem motus, &c.

De causis morbi comitialis.

Causæ primitiue sunt victus deprauatus ac potus multitudo, mora in sole nimia, coitus plurimus, exercitium super repletionem: accidentia animi, vt tristitia, irarumor, euentus, tumultus, auditus vocum terribilium, odor hepatis cerui vsti & gages lapis, bitumen & cornu ceruinum. Causæ antecedentes sunt, intemperies mala totius corporis, cōplexio cerebri frigida & humida, ex qua flatuosus spiritus generatur, vel malus humor, vt pituita, atrabilis, sanguis vel materia venenosa. Causæ coniunctæ sunt, vapor vel flatus crassus, vel talis humor actu obstruens. Causæ verò per consensum, omnia membra, à quibus vapores ad cerebrum mittuntur, sicut totum corpus, stomachus, lien, & cetera membra, à quib

quibus vapores eleuari possunt.

*Loci consentientes de causis mor-
bi comitialis.*

Gal. 5. de loc. aff. cap. 6. Iam alios vidi-
us (loquens de causa primiriua) conuul-
sione comitali ob oris stomachi vitium
correptos, quū aut non probè cōcoxissent,
ut vini meracioris plurimum potassent,
ut Veneri immodicè operam dedissent.
Iuic. prima tertij, tract. 5. Et causas mouē
es epilepsiam plerunque adiuuant causæ
extrinsecæ, sicuti immoderantia cibi & po-
tis, & satietas nauseatiua, & mora pluri-
ma in sole, & coitus plurimus, & exercitiū
aper repletionē, & id quod debilitat cor
timore, &c. Aet. ser. 6. ca. 14. Epilepticos
collabi faciunt suffita, bitumē, lapis gaga-
es, cornu ceruinum, odor hepatis caprini
assati, & ipsum hepar dū editur. Hoc idem
habet Paul. lib. 3. cap. 13. Gal. aphor. 2. cōm-
45. Magna ex parte victus deprauatus hāc
passionem generat. Matthæus de Grado
historiā de suo filio recitat, qui ex magno
tubarum sonitu in epilepsiam ceciderit.
De causis antecedentibus & coniunctis lo-
quitur Gal. 3. de loc. aff. cap. 7. ibi, Non ab
ariditate vacuationēq; sed à crasso semper
humore hanc affectionē induci argumēto
est, quòd & subitò fit, & soluitur cōfestim:

P

nam subitariam meatuum obstructionem
 à crasso viscosoque humore fieri constat
 Paulus lib.3. cap. 13. Morbus comitialis
 habet causam partim in ipso cerebro, par-
 tim in vniuersis ventriculis subsistentem
 modò humorem pituitosum, modò melan-
 cholicum. Itidem ait Gal.3. de loc. aff. cap. 1.
 de Mania. Auic. prima tertij, tract.5. Tunc
 restat vt eius causa sit, aut contractio cerebri
 ad expellendam rem impediētem, quod
 est aut vapor, aut qualitas mordicatiua, aut
 humectatiua malæ substantiæ, aut humores
 faciens oppilationē & spasmus non inter-
 grum in ventriculis cerebri, & principium
 originis neruorum, &c. B. Nota quòd hec
 tres causæ, scilicet vapor, humor & qualitas
 vel mordicans vel substantiæ venenosa
 mutuam adeò beneuolentiam in se agunt
 vt vna sine altera effici non possit, & si
 intelligitur Auic. Ipse verò loquēs de cau-
 sa materiali inquit, Fieri à sanguine plu-
 rimo dominante, aut à phlegmate, aut
 à melancholia, aut à cholera, & est par-
 ua valde, &c. Hippoc. de sacro morb. Pit-
 uitosis sit natura non biliosis. Galen. 4.
 de loc. aff. loquens de sopore, apople-
 xia, & morbo comitali, inquit, Horum
 trium morborum frigiditas, ac crassus
 aut omnino viscidus humor causa est. Si
 mili

aliter 2.aphor.comm.45.dixit.De causis
 r cōsensum habes plura ex Gal.5.de loc.
 .cap.de affectu oris ventriculi,vbi exem-
 um de grammatico affert, qui quotiens
 ceret,cogitaret, irasceret, morbo co-
 itiali corripiebatur.Item differētiās hu-
 is habes ex Gal.3.de loc.aff.cap.de morb.
 omit. Similiter habes exemplum de pue-
 o, qui principium affectionis sentiebat in
 ure.Præterea quomodo ille humor ad ca-
 at ascendat, habes etiā exemplum de ictu
 orpionis, quāuis hæc tertia species raro
 ōtingere soleat, prout notauit Aer. ser.6.
 p.13.Paulus lib.3. cap.13.Ore ventriculi
 nquit affecto cōsortij lege oboritur, quē-
 dmodum in colicis. Itē & ab aliis inquit
 artibus nascitur, quum veluti aura quædā
 rigidior ad cerebrū ascendat, aliās à cru-
 e, aliās à manus digitis, aliās ab vtero mu-
 ieris grauidæ, &c.Auic.prima tertij, trac.
 . Membra ex quibus vapores eleuantur
 ad cerebrum, epilepsiam faciētes, sunt aut
 totum corpus, aut splen, aut stomachus,
 aut myrach, & contingit etiam illud in re-
 liquis membris, &c.

De signis morbi comitialis.

Signa cōmuniter præcedentia, sunt mu-
 tatio corporis à cōplexione sua, grauitas
 capitis, tristitia, & eorum quæ iuxta sunt,

obliuio, imagines infomniorū turbulē,
 pallor faciei, inordinatus linguæ motus,
 ira. Signa morbū demonstrātia, sunt spu-
 oris, repētinus casus, oris ac faciei disti-
 ctio, ceruicis ac totius tremor, dentiū co-
 strictio, stercoris ac vrinæ ac etiā spern-
 tis inuoluntaria emissio. In vehemēti morbo si spuma ab ore abstergetur, denuo
 surgit, in debili verò nō amplius reuer-
 tur, vel in debili citò resoluitur, in vehemēti nequiquam. Signa pituitę sunt, si spuma
 sit crassa ac multa, si vrina vitro liquefacta
 sit similis. Cognoscitur etiā ex vomitu,
 etate, à regione, à regimine præterito, à
 lore faciei & ab aliis vt dictū est in primis
 lib. Signa demonstrantia morbū esse in
 pite vel in aliis membris sunt, quia si in
 pite, præcesserunt sensus & motus læsi-
 ones, aut obliuio, aut amentia, &c. Si in stom-
 macho, cognoscitur ex nausea, vomitu, er-
 fione, & sic de reliquis morbis, &c.

Loci de signis morbi comitialis.

De signis præcedentibus Auic. ibi loqu-
 tur & plurimum antecedit mutatio corp-
 ris à cōplexione sua &c. Paulus lib. 3. cap.
 13. Præcedunt quædam, animi tristitia, ec-
 rum quæ iuxta sunt, obliuio, turbulēte in-
 fomniorū imagines, dolor capitis, eiúsque
 repletio continua, & ob iracundiam fa-
 cie

ei pallor, inordinatus linguæ motus, &c. e signis morbum demonstrantibus loquitur Razes 9. alimā. cap. de epilep. Quum quis cadit in terram, & torquetur, & commouetur, & intellectum amittit, dicitur esse epilepticam: quòd si spuma exit ex os, aut se commingit, aut sperma egreditur, aut egestio, palsio tunc est grauior & vehementior, &c. Paul. cap. cit. Quamprimum morbus inuadit, concidunt ægri, & quæque interrumpitur, peculiaris morbi nota est, oris spuma non desunt quibus urina & stercus præter voluntatem exceritur, &c. B. Hæc signa de vehementi epilepsia intelliguntur: nam in debili non omnia adsunt. Vide de iis tamen fusius Arul. Sauonarolan, Gordonium & cæteros tractantes.

De signis humorum lege Auicen. prima tertij, tract. 5. ibi, Et signa eius cuius causa est phlegma, &c. vide eum fusius: iam omnia annotasse longum ac præterem foret.

De signis per consensum loquitur ibi, Qui non ex propria cerebri affectione, sed per cōsensum comitiali morbo laborant, & citra perpetuā conuulsionē, veluti saltimulo per interualla cōcuti videntur. Manarulus in epist. 6. lib. 3. Quando per consen-

sum patitur, non accidunt vehementiores
assiduae conuulsiones, sed per interualla
breuibus quibusdam saltuosis motibus
tens concutitur. Galen. 5. de loc. aff. cap.
oris vetriculi affectione. & Paul. lib. 3. cap.
13. Similiter Alex. ca. de sacro morbo
per consensum stomachi eueniat, cog-
noscitur ex nimia ventriculi repletione,
ex inedia, aut syncopi, ex nausea, vomitu
erosione, &c.

De cura morbi comitialis.

Id in primis prauidendum est, an
ipsa morbi exacerbatione æger actu sit
extra. Si in exacerbatione, tunc vnica ti-
tum curandi intentio erit, scilicet ab ex-
acerbatione liberatio, quæ fieri potest con-
uulsione vaporum ad alia loca per cuti-
bitulas, frictions, clysteres, supposito-
ria, aut per odores sensum irritantes, cum
stoeo, succo, cirenaico, id est, assa foetida,
succo rutæ, &c. Si verò patiens fuerit ex
exacerbationem, tunc considera num in-
ceperit, vel incipienda sit ægritudo: quæ
si non inceperit, sed incipienda timeat,
tunc vna tantum erit curandi intentio,
præseruare scilicet ne patiens disposui-
t in hanc ægritudinem incurrat, quod fit
si superuicaneas humiditates abstule-
mus cum electuario ex saccharo & an-
gda

dalino oleo aut sisamino parato, aut ea quæ à proprietate comitiali morbum expellunt, dederimus, sicut peoniam, &c. aut infantes ab omni strepitu & timore custodierimus: aut si nutrix à coitione, à crapula, & ab his quæ lac malum generare possunt, sese abstinerit, &c. Si erò morbus iam dudum inceperit, causam tunc primùm inquirito, quæ si fuerit pituita tanquam maiori ex parte contingens, vide num per primariam affectionem, aut per consensum efficiat: si affectio primaria sit in cerebro vel in ventriculo eius, tunc quinque erunt medendi intentiones. Prima, victus ratio. Secunda, humoris preparatio. Tertia, euacuatio. Quarta, reuulsio. Quinta, cerebri roboratio, ac residui resolutio: quanquam si ad Galeni dogma accesserimus, vnicus tantum erit curandi scopus, qui est obstructionis remotio. Victus ratio sit incidens ac extenuans, qualis est capparum usus, sitque laudabilis chymi, non superflue humectans. Cauenda est insuper repletio, & mala digestio, semel in die reficiatur æger si tolerat. Caue etiam ne ventriculo pleno superueniat exacerbatio, caueant etiam à crassis carnibus multæ superfluitatis, & à leguminibus vinoque co-

piofiori: nā paucitas vini dilatat animam, inquit Auic. & excusat à multitudine. Itē à venereis liberalioribus, à balneis ante purgationem, à finapi, eo quòd cerebrum sua acrimonia percutit. Caueant infuper à calore & frigore superfluo, à ventis, si possibile fit regionem permutantes. Quies & tranquillitas laudatur, & exercitium post euacuationem. Somnus super repletionē vitandus, & vigiliæ superflue: nam spiritum refoluūt ac debilitant. Præparatio humoris perficitur per ea, quæ incidēdi ac extenuandi vires habent, quale est oxymel simplex & compositū & scilliticū, syrupus de abſinthio, apozema ex hiſſopo & origano, ſyrup. de ſtechade de hiſſopo, rhodomel. &c. cum decoctis ſaluiæ, hiſſopi, rutæ, maioranæ, radicū iridis, ſcillæ, viſci, quercini, peoniæ, florum roſmarini, ſtechados, glycyrrhizæ, acori, paſſularum, nucis moſchata, cinnamomi, betonicæ, &c.

Euacuatio erit, ſi repletio vniuerſalis exiſtat cū pituita, & nihil aliud prohibeat, per ſanguinis à cubito miſſionē: ſi minus, fiet cū turbito agarico, cum hiera Ruffi, cū pilulis chochiis fœtidis, polypodio. Si verò fuerit affectio atrabilaris, cū helleboro, pilulis indis. de lapide lazuli, cum myrobalanis & ſimilibus, &c. Vel euacuatio fiet
cum

cū electuariis dissolutis in aliquo decocto, sicut cū diaphinicone, electuario indo, &c. vt suprā relatū est in capite cephalææ. Reuulsio, id est, ad inferiora materiæ deductio, perficitur cum cucurbitulis dorso & præcordiis etiā cute incisa affixis, aut ençmate ex centauro, colocynthide, additis quibusdā electuariis ad hoc propositum facientibus, vt hiera diacolocynthidos, hiera simplici, & oleis, & rhodomelle, deinde frictionibus, lotionibus circa crura, quibus annecte deriuationes quæ fiunt per sternutatoria, masticatoria, gargarismata, &c.

Roboratio ac resiliui resolutio fieri possunt per exteriora & interiora, remouēdo malam intemperie derelictā, ne ipsa remanēte, noua materia denuò aggregetur. Interiora sunt diacorus, diamusculus dul. confectio pliris, arcotico Nic. theriaca, mitridatum, acorus conditus, & quęcūque à proprietate occulta conferre dicuntur, de quibus plura à nobis dicta sunt in fine capituli, & sunt, peonia, ruta, corium frontis asini, &c. Exteriora sunt sacculi, commissuræ coronali & sagittali appliciti ex maiorana, stechade, ruta, peonia, nuce moschata: vel fiat eodem in loco sinapismus, aut cauterium aliquod potētiale vel actuale vsque ad ossis superficiem, & vlcus per

aliquot dies apertum cōseruetur. At si p
 alicuius partis consensum morbus com
 itialis acciderit, procurandum, vt men
 bri, à quo malus vapor ad caput reptat, n
 la dispositio remoueat, vel ascensu
 prohibeatur cum ligatione arcta, vel ci
 curbitulis, vel loci apertione, prout ma
 gis expediet: deinceps cerebrum, ne va
 pores suscipiat, roborandum, & quod su
 sceptrum est, resoluendum, &c.

*Loci consentientes de cura
 morbi comitialis.*

Aet. ser. 6. cap. 13. Cura tempore exa
 cerbationis erit, partes obtortas deliga
 re, inungere, & dirigere odoribus, sen
 sum irritare, & perseuerante exacerba
 tione castorium aut succum cyrenaicum
 ori cum aceto mulso infundere, &c. B
 intellige de his qui post annos puerile
 in morbum concidunt. Arcul. de cura epi
 lepsiæ, Quædam administranda in tem
 pore paroxysmi diuertendo cum frica
 tionibus, ligaturis, & suffumigium ex
 assa citò remouet paroxysmum, &c. Vi
 de in hoc cæteros practicautes, sicut Gord.
 Marc. Cat. Sauona. itidem habes Auicen.
 ibi, Et finis actionis causæ eius est, alle
 uatio à prauitate paroxysmi, &c.

De præseruatione lege Mesuen, ibi:

Præser

præferuant quæcunque à proprietate re-
ardant paroxysmum, aut prohibent ad-
uentum eius omnino, aut occultant, si-
cuti dicemus, &c. Auicen. prima tertij,
tracta. 5. Epilepsia in infantibus curetur
ita, vt nutrimentum lactantis rectifice-
tur, vnde lactans alienet à se omne quod
generat lac aquosum, aut corruptum,
aut grossum, & prohibeat sibi coitum
& prægnationem, & alienetur infans
ab omni re, in qua est timor, & vo-
ces magni sensus, vt vox tonitruï, ful-
guris, &c.

Razes primo comment. cap. de epilep.
scribit plures medicinas morbum prohi-
bentes, calefacientes scilicet & exiccantes,
quas etiam habet Auicen. loc. cit. & sunt
peonia, quam Gale. 6. de fac. simp. tanto-
pere laudat, suspensa vel in potu data, &
quæcunque infra ex mente Dioscor. reci-
tabuntur, &c. Quòd primùm in omni
morbo inquirenda sit causa, habes vltra
Auicen. & Galeni textum, etiam duos Au-
sonij versus, in quibus omnes ferè inten-
tiones curandi habentur, & sunt,

*Quis morbus, quæ causa facit, qui casus
ab illo*

*Nascantur, quæ cura modo, quis denique
finis.*

Mesu

Mesu. in cura epilep. Sunt quinque intentiones: Prima regimen in vita ponit, secunda æquat & coaptat materiam, tertia astringit & scindit eam, &c. in hoc consule non solum Græcos omnes, sed etiam ceteros Arabes, nam fusi de his pertractant. De victus ratione loquitur Paulus lib. 3. cap. 13. ibi: Vt victus ratio utilis est, quæ incidit & extenuat, idcirco capparis esus & falsamentum prodest. Auic. prima tertij, tract. 5. Communis est omnibus epilepticis, ut utatur cibus laudabilibus, quibus inest humectatio laudabilis, non superflua, caueant à repletionibus & custodiant se à malitia digestionis. Quia verò non tolerant ut semel reficiantur, dividant cibum suum in tres partes, & sumant duas tertias in prædico, & tertiam in cœna, &c. B. Hic Auicennæ locus effecit, ut discrimen illud inter neotericos nasceretur, utrum cœna maior prandio esse debeat, sed quum utrinque robustæ ac validæ rationes afferantur, tu tamen aduerte, ne adueniente exacerbatione siue vesperi, siue mane, quod ventriculus sit valde plenus. Vnde Auicē. Et oportet ut occurrat paroxysmus cum mundatione stomachi, &c.

Paul. lib. & cap. cit. Fugere, inquit, oportet carnes, legumina, vinum copiosius, Venerem liberaliorem, balnea, sinapim, &c.

Auic

uicen. loc. cit. Oportet vt alienent omnes
 uctus humidos & grossos, nisi stypticos
 per cibum, quia roborant stomachum,
 repletio vini multum nocet, sed parum
 & ipso sumptum dilatat animam, & con-
 ortat spiritum &c. Mes. Hydromel est po-
 us elegatior, quam vinum. Auicē. Et opor-
 et vt alienēt à se omne acre & vaporosum,
 & vitent cibos graues, vt sunt raphanus,
 aules, bauciæ, id est pastinacæ, &c. lege hūc
 ocum fusius, & plurima à me dicta inue-
 nies. Celsus lib. 3. cap. 25. Cauēdæ sunt cru-
 ditates, locique præcipitis conspectus, om-
 nia terrentia, vomitus, lassitudo. sollicitu-
 lines & negotia omnia, &c. De humorum
 præparatione loquitur Auicen loc. cit. ibi,
 Et ex syrupis est oxymel squilliticum, &
 similiter syrupus de absinthio, & apoze-
 ma hysopi cum origano, &c. Itidem Mes.
 ibi, Adaptant materiam, vt eius facilis fiat
 expulsio, qualia sunt squilla & acetum eius
 & oxymel, &c. Et Paulus, Auxiliatur his
 oxymel scilliticum quotidie potum, &c.
 De euacuatione loquitur et ser. 6. cap. 14.
 Si nihil dicēs prohibeat, venā secare opor-
 tet, & intermissis quatuor aut quinque die-
 bus corpus reficere, ac sic infrā euacuare,
 maximè per veratrum nigrum aut colo-
 cynthidem, &c. Itidem adserit Paulus &
 Auic.

Auicen. ibi, Melius quò purgetur illa, c
 ius causa est phlegma, est hiera & pulpa
 loquinthidos, & hiera hermetis. Quò
 cum phlegmate est repletio vniuersal
 tunc phlebotomia, secundum quod narr
 uimus, est ei iuuatiua, & c. De reuulsione
 deriuatione verba facit Mes. cap. de epil
 psia, ibi, Cōpetūt gargarismata & sternut
 toria, & propriè vomitus, & masticatori
 & fricationes, & ligaturæ in extremitat
 bus, & ventosationes in eis, & amplast
 rubificantia, super mēbrum mandans, &
 Itidem Auicen. & Paulus ibi, Synapismi
 capiti inducatur, & c. Et Auic. ibi. Ex eis
 rò quæ materiam ad inferiora trahūt, &

De roboratione cerebri ac residui res
 lutione habes plura ex Auic. prima tert
 trac. 5. ibi. Et post illud permuta compl
 xionem cerebri cum confortatiuis, calef
 cientibus, ex emplastris & sinapi, & c. Pau
 lib. 3. cap. 13. iubet ad hoc caput esse tond
 dum, & ex peucedani liquore, cui spondy
 lium sit incoctum cum aceto diluto, per
 gēlum, & c. Mes. Et in omnibus his recti
 catio cerebri debet esse intētio prima, &
 Arcul. Vnum est vt fiat attractio materi
 rum de profundo capitis ad cutim, ad que
 valet hoc emplastrum. ℞. ammoniaci di
 soluti cum pinguedine anatis vel mil
 yncia

icias duas, fermenti vnciam vnam, finas
 3β. cantaridarum 3β. peonia 3ij. fiat
 nplastrum, quo remoto, inungatur cum
 nguedine milui, & iterum apponatur &
 iferatur, donec crustæ apparuerint, &c.

*Quæ excitare possunt mor-
 bum comitiale.*

Excitant epilepsiam apium, & in hoc cō-
 ntiunt Plinius lib. 20. Auicen. Serapio,
 Mes. Item alium, asphaltum, nidor, cor-
 u capræ, vel hirci, vel cerui. Item ostraco-
 um, & sulphuris suffumigium, lacque om-
 e nocet secundum Serapionem.

Morbum comitiale curantia.

Cardamomum, balsanium, populus ni-
 tra, ficus, iuncus odoratus, lepus terre-
 tris, mustela, iecur, & vnguis asini, lichen
 qui, iecur hirci, hirundines, lac huma-
 num, coagulum, fel, sanguis, fimum, plan-
 ago, eryngium, ruta, f. feli, libanoris, spō-
 lylium, peucedanum, laserpirium, galba-
 num, segapenum, ammoniacum, trifoliū.
 oniza, anthyllis, symphyton, cestron, pen-
 aphyton, viola purpurea, helleborum ni-
 grum, ampelos leuce, oxymel, acetū scil-
 lite, lapis selenites, lapis ætites, &c. Con-
 fectiones ad hunc morbum idoneæ sunt,
 aromaticum moschatum, confectio Nic.
 confectio de moscho, diacastoreum Nic.
 potio

potio sancti Pauli, pliris arcoticon Nic. pilulæ indæ, pilulæ Alex. de sex rebus, pilulæ ex artemisia, &c. Si quis scire voluerit, quo pacto applicari debeant simplicia legat de singulis, Diosc.

Quæ curant à proprietate.

Hugo, Curantia à tota specie sunt, hepar lupi, hepar milui, pellis frontis asini portata super carne nuda, cingulum ex pelle caudæ lupi, aut frontis eius, vesica apri cum urina puluerizata, omnia coagula & propriè leporis, pyretrum conditum, peonia, viscus quercinus, caput cuculi, ova corni, far smaragdus portatus, lapis spongiæ, phylipendula in cibis, os hominis, &c.

De prognosticis morbi comitialis.

Hippoc. aphor. 2. aphor. 45. Quicumque iuvenes morbo comitali laborant, mutatione ætatis, temporum & locorum, & vitium quoque liberantur. B. id est. Quæcumque possunt patientis temperaturam permutare, ea à morbo ipsum liberant. Et aphor. 5. apho. 7. Quibuscunque morbis comitiales fiunt, ante pubertatem, mutationem accipiunt: quibus autem vigesimo quinto, comoriantur. B. Nota quod pubertas durat à 14. usque ad 25. annum. Gal. 3. de loc. aff. ca. de morb. comit. Porro in his
omn

omnibus affectibus, in quorum numero est epilepsia periculi magnitudinem ex anhelitus nocumento conicere oportet. Pau. lib. 3. cap. 13. Si acutissimus fuerit effectus, tum ob crebras accessiones, tum ob symptomatum vehementiam statim iugulat. Iridem Aet. & Auicen. ibi, Et quando continuantur paroxysmi epilepsiae, interficit, &c. Pau. lib. de dinamidiis. Si quis lunaticus spumat, & oculos conuertit, & fremit, & mugit, & cadit, & membra contraxerit, & colorem similem croco habuerit, moriturus est. Razes. 1. comment. autoritate Hippoc. Multi pueri moriuntur ex eo, quia eorum venae arctae sunt, & phlegma plurimum recipere non possunt. Auic. prima tertij, tract. 5. Et quando apostemata apparent in eo, fortasse resoluunt eam, & minuunt materiam eius, & multotiens mutatur epilepsia ad melancholiam, & multotiens resoluitur propter febres, quae sunt longae, & epilepsia melancholica est deterior, quam phlegmatica, &c. Michael Sauonarolus inquit, quod si infans est genitus tempore menstruorum, vel praesente epileptico, quod incurrit in epilepsiam incurabilem, sed quid ita sit, diuinare non possum, & forte pace sua diexerim, hoc somniauit. Hippoca. de mor. sac. Quum inueterauerit, amplius

sed quæ corpus tantum ad has qualitates
peruertit, &c.

De apoplexia descriptione.

Apoplexia, est quædam ventriculorum
cerebri, obstructio, per quam membra
tu & sensu priuantur. vel ἀποπληξία, quæ
Latinè dici potest Sideratio, est priuatio
motus & sensus totius corporis, vnà cu
læsione principalium actionum de repe
te incidens, in qua non tantum motus
sensus, sed etiam interdum ipsa spiratio
hementer impeditur, & hæc acutissima est
apoplexia.

*Loci consentientes de descri-
ptione apoplexiæ.*

Auic. prima tertij, tract. 5. Apoplexia, est
otiositas membrorum, à sensu & motu
propter oppilationem contingentem in
ventriculis cerebri, & in cursibus spiritu
sensibilis & motiui, &c. Paul. lib. fini. med.
Apoplexia, est detentio mentis cum priu
atione sensuum & corporis resolutione, &c.
Cels. lib. 3. cap. 27. mentionem facit de apo
plexia simul & paralysi. Paul. lib. 3. cap. 18
& Aet. ser. 6. cap. 27. describunt etiam apo
plexiam ibi. Est affectio cerebri, priuatio
motus & sensus totius corporis, &c. Simi
liter Gal. aphor. 2. comment. 42. ibi, Vbi
in

apoplexia totum corpus sensu & motu
 uiatur, solus restat anhelitus. Qui si etiã
 se prohibeatur, maxima est & acutissi-
 ma hæc apoplexia, &c. Auer. 3. collig. ca. ult.
 apoplexia est, quum homo cadit in terrã,
 cessat eius vox, & priuantur omnes ope-
 rationes motus totius corporis, &c.

De causis apoplexiæ.

Quum apoplexiæ causa sit obstructio,
 dictũ est, duplex erit obstructionis cau-
 sa, vel clausio, vel repletio. Clauditur cere-
 brum, vel ex causa virtutem stimulante,
 unde fugit & contrahit: vel ex causa dolo-
 rem inferente: vel ex mala qualitate fri-
 gida, styptica, ventriculos cerebri oppri-
 miente. Repletur cerebrũ vel ab apostema-
 te calido vel frigido, vel ex materia pitui-
 osa vel melancholica vel sanguinea, raro
 à pallida bile: fit etiam à percussione,
 aut casu, aut per consensum, &c.

*Loci consentientes de causis
 apoplexiæ.*

Auic. prima tertij. tra. 5. Hæc quidẽ op-
 pilatio fit aut propter clausionem, aut pro-
 pter repletionem. clausio fit, quum id ad
 cerebrum perueniat, quod dolorem facit,
 aut impediat, & moueatur motu contra-
 ctionis, aut qualitas perueniens ad ipsum
 stypticum, faciens, &c. Repletio aut est

apostemans, aut non, &c. lege fusius, &c. tera habebis. Gal. aphor. 2. comment. Omnes autem apoplexiæ fiunt ni animi non potente ad partes infra caput existentes defluere, aut propter aliquam dispositionem inflammationi similem, quæ fit ipso cerebro constituto, aut ventriculis ipsius humore pituitoso oppletis, &c. Pau. lib. cap. 8. Origo vitij est ex frigidiore pituita, quæ principalissimo cerebri ventriculos vna vice & cumulatim replet, &c. Gal. aphor. 6. com. 56. Apoplexiæ & cõuulsiones fiunt propter humorẽ pituitosum aut melancholicum, quoniam cõmunis vtriusque est crassitudo. B. Hac ratione motus Hippoc. in aphor. 57. eiusdem dixit apoplexiæ fieri à quadagesimo vsque ad sexagesimum, quoniam in his maxime temporibus abundat vterque humor, &c. In reliquis le. Act. ser. 6. ca. 27. in principio: item Gale. 4. de vict. in morb. acut. comment. 27. & de loc. aff. ca. 7. Item Alexand. & Arcul. Gord. &c.

De signis apoplexiæ.

Signa præcedentia sunt, dolor capitis, vertigines & scotomiæ, venarum circa guttur inflatio, totius corporis tremor & stidor dentium in somno, grauitas ac pigritia, frigus extremarum partium, motus
dis

fficillius, vrina æruginosa, atra, & modica. Signa actualis apoplexiæ sunt, quia subito infirmus cadit, & veluti attonitus iacet, vox amittitur cū totius corporis sensu & motu citra febrem, in somno stertit, vocatus non respondet, nec diuulsis pilis vel stimulo punctus non sentit.

Signa apostematis sunt febris superueniens dolor, &c. Signa loci affecti sunt, quia si fuerit in ventriculis prioribus, aut in meatibus qui *inducibiles* dicuntur, tunc resolutæ erunt faciei partes, aut odoratus initiatur: si in ventriculis posterioribus, tunc resolutio erit in spina principio. Signa humorum non est vt totiens repetantur, quum à nobis aliàs satis superque relata sint. Signa quibus apoplexia à suber, à syncope, epilepsia, vteri strangulatu, & à defuncto corpore differat, intelliges ex locis allegandis infra. Signa eius quæ fit à percussione, aut à casu, cognosces ex narratione infirmi, &c.

Loci consentientes de signis apoplexiæ.

Pau. lib. 3. ca. 18. loquens de signis præcedentibus, inquit: Præcedunt capitis turbatio, acutus dolor, & iugularium venarum suspensio, tenebræ oculis offusa, extremarum partium sine ratione algores, totius

corporis palpitatio, motus difficilis, & stertium in dormiendo stridor, vrina aru-
nosa, atra, modica, &c. Et Auic. prima t-
rij, tra. 5. ibi, Antecedunt soda & infla-
guidez, &c. qua habet Paulus, sed rudic-
bus verbis expressa. De signis presentibus
habes locum in Raze. 9. alman. ibi, Qu-
aliquis quasi dormiens iacet, & sine som-
nolentia stertit, & quum pungitur, non sentit, tu-
iam patitur apoplexiam: quantitas egrit-
udinis est secundum quod fortiter aut de-
liter stertit. Oribasius 2. aphor. comme-
47. Cognoscimus esse apoplexiam, du-
spumam edit, & extensionem molitur
oppressionē, &c. Itidem Pau. ibi, Procu-
bunt, id est, attoniti iacent, vox intercipi-
tur, &c. Gal. 1. meth. ca. 9. ibi, Si quis tri-
horis, siue quatuor, siue horæ dimidio, t-
to corpore sit vehementer arreptus, ut
que sentiat, nec moueatur, hunc apople-
cton siue attonitum esse dicimus. Signa
apostematis habes etiam ex Auicenna pr-
ma tertij, tract. 5. ibi, Quæ autem est
apostemate, non euacuatur à febre, &c.
Idcirco febris fit, quia dum pus conficitur
dolores & febres accidunt, teste Hipocr-
te aphor. 2. aphor. 47. Signa humoru-
peccantium similiter ab eodem et Auicenna
recitantur ibidem, & illa quæ fit e-
san

sanguine significant signa sanguinis præ-
 sta multis vicibus, & est facies rubea, &c.
 a verò quæ fit ex phlegmate, significat
 color & forma oculi, &c. lege de his Alex.
 Arcul. & Gord. De signis quibus apoplexia
 differt à subet, &c. loquitur primum Auic.
 i, Differentia inter apoplexiam & subet
 est, quòd apoplecticus clamat, &c. Arcul. Dif-
 fert à syncopi, quia facies veluti mortui &
 pulsus debilis valde & summersus: in apo-
 plexia verò facies & pulsus consuetus. Dif-
 fert ab epilepsia, quia hæc cum periodis, &
 cum motu cōuulsivo citò soluitur, & ad pa-
 ulesim non terminatur vt apoplexia. Dif-
 fert à vuluæ strangulatu, quia præfocata
 sentit, audit, & habet omnes interiorū sen-
 suū operationes, nō autem apoplexia. Dif-
 fert à mortuo per quatuor signa ab ipso
 recitata, sicuti per cotum subtilissimè car-
 minatū ori ad motum, aut per speculū luci-
 lū ac tersum naribus appositum, &c. Vide
 Marc. Catin. Auic. loc. cit. Et tardetur se-
 pulchra ambigui ex mortuis, donec perpē-
 latur eius dispositio, & nec sit minus 74.
 horis, &c. Quis insepultus rāto tēpore re-
 manere debeat, in hoc consule conciliato-
 rem: mihi videtur potissima ratio, quia in
 hoc potissimum tempore fœtor apparet,
 qui mortuum hominem proclamat, &c.

De cura apoplexiæ sanguineæ.

In apoplexia primum coniectari oportet, an patiens mortuus sit, an adhuc superest cum hisdem signis nuper à me recitatis. Deinde si in causa fuerit sanguis, tunc triplex erit curandi scopus: primus reuulsio, secundus euacuatio, tertius malæ complexionis derelictæ remotio. Reuulsio statim fiet per sectionem venæ saphenæ aut basilicæ, præsertim si corpus fuerit pletoricum, aut solitę purgationes oppressæ sint: si minus, fiet sectio venæ cephalicæ, aut vertex frontis & sufficiet etiam pro euacuatione. Remotio malæ complexionis derelictæ fiet cum epithemate ex aceto & oleo roboris, & hoc in fine, ne in principio morbi ficta magis obstruat.

De cura apoplexiæ pituitosæ.

Cura apoplexiæ pituitosæ requirit quatuor intentiones, scilicet euacuationem, reuulsionem & deriuationem, residui resolutionem, & sex rerum non naturalium regimen. Euacuatio fit per sectionem venæ, si cum pituita signa sanguinis adfuerint: si minus, statim per pharmacum, absque vlla humorum præparatione. Nunc tardare in acutis malum est. Aut fiat per enemata, suppositoria, vomitoria, aut per pilulas chochias, fœtidas de euphorbia cum

in syro. de stechade aut aquis capiti dic-
s dissolutas. Clysteres parari possunt cū
decoctis saluix, maioranæ, rorisinarini,
rigani, calamenti, centaurij, abrotoni,
eoniæ, pulpæ colocynthidos, additis hie-
lo godionis, cæfix extra. sacchari parti-
us opportunis, & cū oleo camomillino,
utaceo. Iaurino, al lito sale conficiantur,
&c. Suppositoria parentur cum veratri vel
olocynthidos puluere, vel cum speciebus
hieræ picræ sale gemmeo, &c. Vomitoria
fiant cum penna in oleo liliaceo intincta,
&c gutturi immissa, &c. Reuulsio & deriua-
tio fiet cum cucurbitulis, occipitio cū sca-
rificatione affixis, modò vires permittant.
Item cum ligaturis sæpe reiteratis, & cum
apophlegmatismis, cum aceto ex origano
& thymo decoctis. Item cum sternutato-
rijs, cū hellebore & pipere, aut cū fricatio-
nibus pedum, cū oleo quopiam calido, aut
cum suffumigijs ex castorio, oppopanace,
galbano, &c. aut cū synapismo, aut vesica-
torio capiti admoto, &c. Resolutio residui
perfici poterit, tum per exteriora, tum per
interiora. Exteriora fiant cum epithema-
tibus calidis, quæ parantur ex rebus capi-
talibus, item cum linimentis, inungendo
cum oleo de costo, de euphorbio, de casto-
reo, cum emplastris, in quorum numero
laud

laudatur emplastrum de synapi Mes. a
cum candenti ferro capiti admoto. Inter
iora perficiuntur per cōfectiones, electu
ria, pulueres, masticatoria gargarisma
nam ad resolutionem simul ac diuersior
hæc faciunt. Confectiones sunt diacor
confectio anacardina, item quæcunque c.
lida sunt & sicca febrem euocantia, &
Victus ratio sit calida & abstersoria, i
principio tenuis atque exquisita, capiatur
tantum hydromel vel aqua hordeacea, m
dò sanguinea sit apoplexia, procedatur de
inde à tenuissima ad crassiusculam, ita v
solo pane patiens vescatur, quousque mor
bus iam se remittere incœperit: deinde ci
bus mollis & succulentus, concoctu facili
dandus: similiter vinum aqua dilutum &
carnes exhibeantur. Exercitium ante cibi
commendatur, vel loco eius fricationes
Somnus modò conceditur, modo damna
tur, si fuerit multus, aut si assumpto statim
cibo quis dormiat: conceditur verò ex eo
quod concoctionem adiuuat, & cerebrum
roborat, & vaporum resolutionem perfici
cit, &c. Conferunt etiam quandoque ani
mi accidentia, sicuti est irasci, &c.

*Loci consentientes de cura apo -
plexia sanguinea.*

*Auic. Aliquādo accidit, vt homo in epi -
lepsiā*

epſiam incurrat, & non ſit differentia in-
er ipſum & mortuum, idcirco in primis
um ager viuatur vel mortuus ſit. Meſ. cap.
e apoplexia, Conaberis à principio ma-
eriam ſubtrahere, in quantum poſſibili-
as exigit: & ſi ſanguineam videris, vtriuf-
que partis illico phlebotoma cephalicam,
imul cum emiſſione multi ſanguinis, &
onſequenter crura & pedes ventofari fa-
ias, &c. Paul. itidem habet lib. 3. cap. 18.
ibi, Qui curationem admittunt, ijs ſtatim
anguis ex vena detrahendus eſt eadem
lie. Itidem adſerit Gal. in introduc. ibi,
anguis ſtatim mittendus, &c. Auic. ſimi-
ter prima tertij, tra. 5. ibi, Regimen illius
uax ſit ex ſanguine, eſt phlebotomia in
ora illa, & miſſio ſanguinis multi: ſanat
nim in diſpoſitione, id eſt, citò, & poſt
phlebotomiam clyſteriza, cum eo quod
ciuiſti de clyſteribus, vt deponatur mate-
ia à capite, &c. De remouenda mala com-
plexione loquitur Paul. loc. cit. ibi, Ga-
ut inungatur oleo camomillino vel ane-
hino, in quo ſpondilium decoctum ſit
ic. Et fac ipſum olfacere, quod con-
fortet cerebrum, & non calefacit cum eo
quod docui te, id eſt, in cap. ſodæ, &c. ſimi-
liter omnes practici in hanc concurrunt
opinionem.

Loci

*Loci consentientes de cura
apopl. pituitose.*

Auicē. prima tertij. tra. 5. Si verò en-
ea quę facta est ex phlegmate inueniuntur
signa sanguinis, phlebotometur, deinde
clysterizetur cum clysteribus fortibus
supponantur collyria fortia, in quibus p-
nuntur gumę & fel bouinum, postea bibat
quod soluit, &c. Cels. lib. 3. cap. 27. Pro-
rit malo corporis vel sanguis missus
alius ducta, &c. Aet. ser. 6. cap. 27. Qui
rò ad venę sectionē inepti sunt, primò
ad vomitū cōmoueantur, & sedes ipsorum
illinatur ijs quę flatus educunt, &c. Pa-
lib. 3. cap. 8. Oportet & ori per vim apertam
digitum vel pennam oleo madefactam in-
serere, vt ea quę insunt eiiciantur. Auicē
loc. cit. Et si possibile est, fac eum vomere
cum penna immissa gutturi, illita cum
oleo liliaceo, & proprie quum existimatur
quòd in stomacho, aut in eius ore rep-
tio, &c.

Obiectio.

Celsus videtur esse huic opinioni contrari-
us, cum dicat, Nō oportet in hoc casu
movere, neq; vrinam medicamētis mouere.

Responsio.

Intellexit Celsus, si neruorū dolor aut t-
mor, qui aliquando accidere solet, in pra-
fentia

entiarum adesset, quia tremor neruorum
 x vomitu magis intēderetur, alioqui vo-
 mitū & ipse à cœna vtilem non proposuif-
 et, &c. De reuulsione & deriuatione loqui-
 ur Aet. ser. 6. cap. 27. ibi, Post purgationē
 cucurbitæ præcordiis aut capiti affigatur
 ū scarificatione. Similiter Auic. prima ter
 ij. tra. 5. ibi, Et nō est malū post euacuatio-
 nem ipsius cū clysteribus & similibus, vt na-
 ribus aliquid approximetur, & propriè cō-
 lisi & caput purgia fortia, &c. Itidē Paul.
 oc. cit. ibi, Si vires permittāt, cucurbitulæ
 occipitio cū scarificatione defigantur, & si
 fieri potest, etiā præcordiis. Valetudini etiā
 faciunt quæ sternuramenta excitāt, & apo-
 phlegmatismi ex thymi & origani deco-
 ctis parati, &c. De resolutione residui ha-
 bes plura ex Auic. loc. cit. ibi, Et si nō pōst
 super caput eius vaporations calefaciētes,
 sicut ex anetho, amaraco, foliis citri, cala-
 mento, origano, &c. Vel fiant inunctiones
 ex oleis calefaciētibus & confortatiuis, &
 ignitū ferrū apponatur capiti, vel aliquod
 emplastrū ex resolutiuis quæ sciuisi, &c.
 Et hæc de exterioribus, nā de interioribus
 postea medicamētis loquēs dixit, Et cū vi-
 deris alleuationē, fac gargarisinata. sternu-
 rationes, & pone ventosas super collū, &c.
 De regimine victus, Aet. ser. 6. cap. 27. in-
 quit,

quit, Curandū est vt accipiant cibos quot
 die quidē, verū paucos, leues & calidos,
 exterforia vi præditos, plerunq; cū mel
 edulcatos, intellige in pituitosa apoplexi
 Auic. prima tertij, tra. 5. Et subtilia regin
 ipsius, & sis contentus in eo Iuleb, & aqu
 hordei subtili & aqua casei. Intellige i
 prima die, & in sanguinea apoplexia: na
 de pituitosa postea loquēs dixit, Et potu
 eorū sit aqua mellis, & panis cū ficibus f
 eis est bonus eis. Quidā verò dicūt ex e
 esse bonū organū cū lentibus, & vna pa
 fa, & amygdala, & ficus sunt ex fructibu
 cōueniētibus eis, &c. Paul. lib. 3. cap. 18. Vt
 morbus se remiserit, cib⁹ mollis, distribu
 ficilis & succulētus assumetur. Et paulò i
 frā, Vinū tenerū calente aqua temperatur
 potui exhibebitur, &c. Auenzoar, Sint ca
 nes syluestres, nō in domibus pingues fa
 ctæ, vnde passerēs & omnia minutarun
 auium genera in declinatione morbi con
 ueniunt. Auic. loquens de vino inquit. Ne
 nouum sit, ob eius superfluitatem: non an
 tiquum, ob velocem eius penetrationem
 sed inter vtrunque eorum magis erit con
 ueniens: intellige inclinato morbo, nam
 in principio nusquam conuenit. Cels. lib.
 3. capit. 27. Potus sit sine vino aquæ ca
 lidæ, id est, in principio. Auenzoar, Nec
 potent

otent aquam frigidam, nec aquam per se,
sed aquam tepidam cum syrupo corticum
ironiorum cum melle, si verò dederis vi-
um, da solùm vnciam vnā in fine pro con-
ortatione membrorum, &c.

De motu loquitur Auic. ibi, Quum au-
em voluntas adest vt cœnent, non est ma-
am, si antè præmittatur exercitium leue,
& moueant membra laxata motu aliquo,
&c. Paul. Gestentur ægri curru aut lectica
ut lecto pensili, &c. De somno & vigilia
Auic. dixit, Quum aliquid assumunt, non
ormiant super ipsum velociter, sed expe-
tent aliquantulum, donec descendat & di-
geratur digestionē aliqua, nec etiam plu-
imū vigilent: illud enim iuuat cerebrum,
& resoluit ex cibis vaporem non digestum
prohibentem digestionē, &c. B. Hinc pen-
le quorundā errores, qui nullo pacto apo-
lecticum dormire permittunt. Caueat ta-
men etiam medicus, ne ex hac Auic. licen-
tia ægrum in somno postea perdat: vnde
apprehenso manibus pulsu, si nimis sentiat
calorem profundari, statim infirmum ex-
citet, ne amplius dormiat, &c.

Observationes de sectione venæ.

Aet. ser. 6. cap. 27. Copia sanguinis qui
detrahitur, diuidatur: cōmouere enim tan-
tū oportet, nō vires exoluere, & calorem

extinguere, &c. Marcus Catinarius, Ne laces venas guidez, id est, iugulares, sic præcipit Razes, nam difficillimè consolantur: & recitat historiam de quodā scholari in his venis vulnerato qui mortuus est Paul. 4. de vic. in morb. ac. cōment. 27. Primum ante sectionem vult per omnes corporis particulas frictiones fieri, vt sanguis extenuatus facilius exeat, &c.

Observationes de topicis.

Auicē. prima tertij, cap. de apople. 1. oportet vt incipias à debiliore vñctione confert: & si non, adde, & permuta ad quod est fortius.

Obiectio.

Auicē. primo can. fen. quarta, cap. 1. 1. forti morbo debemus, inquit, à fortiori medicamento incipere, quomodo hic afferit contrarium?

Responsio.

Tux obiectiōni respondet Concil. differentia 154. inquit, esse hanc curam Auicennæ tentatiuam, &c. Vide eum fusiùs lubeat.

Observationes de potu.

Auic. loc. cit. Et potus super cibum est e rebus magis nocitiuis, ac si diceret, à prandio vel à cœna nullo modo bibant, &c.

Ap

Apoplexiam excitantia.

Excitant apoplexiam fungi, mandragora, & pomorum nimius vsus & odoramentum.

Apoplexiam curantia.

Conferunt apoplexiæ absinthiū, anacardus, acorus, betonica, colocynthis, galliæ dorummentum, euphorbiū, piretrum, confectio anacardina, theriaca, diatefferon, heriaca magna, hieralogodiū, & quæcunque dicta sunt in capite epilepsiæ, huc referantur. Vide insuper aggregatorem capite apop. Itē Gulielmum Varignanā, capite proprio. Itē cōsilia Bertholomæi Mōtagna, præsertim vbi de epilepsia loquitur, &c.

De prognost. apoplexiæ.

Hipp. Aphor. 2. Aphor. 42. Soluere morbum, quem apoplexiam vocant fortem, impossibile, debilem verò non facile. B. Fortis apoplexia magna ex parte curatiorem non admittit, ob respirationis læsionem, aut virium imbecillitatem: debilis verò non facile, quia terminatur in paralytism. Vnde Auic. Paul. Aet. Razes, Vt plurimum in paralytidem terminatur, &c. Et Aphorif. 6. Aphorif. 51. Quicumque sani à dolore capitis derepente capiuntur, & incurrunt apoplexiam, ij in septem diebus pereunt, nisi febris apprehenderit. B.

Intellige si dolor fiat à spiritu flatuoso, apoplexia à materia pituitosa, quia tunc febris superueniens dispositionem solu calefaciendo, extenuando ac resoluendo spiritum flatuosum, & humorem pituitosum. Pereunt in septimo, inquit Galenus quia pars principalis non diu tolerat fortiores simul & diuturnas passiones. Auic. prima tertij, tra. 5. Et quum acciderit febris tunc spes sit, ut cum ea resoluatur superfluitas, &c. Aet. ser. 6. cap. 27. Exhibet spem salutis ipsa calamitas febris. Paul. lib. 3. cap. 18. Apoplexiæ morbus nequaquam aut raro curatur, ut qui minetur mortem in propinquo. Si verò etiam remedia admittant plurimum cum partis cuiusdam corporis resolutione discedit, &c. Razes 9. alma Si spuma ab ore exeat, non est medicamentum. Adiicit his Arcul. Quod si admotis valenter sternutationem mouentibus, & non stertat, neque impressionem sentiat, quod est mortale, &c. Cels. lib. 3. cap. 27. Post sanguinis missionem, si non redit motus & mens nihil spei superest. Gal. lib. de dinamidia Apoplecticus quum ex multis rebus desiderat sibi cibum afferri & potum, & statim habet abominatur, mortem sibi imminere significat. B. In hoc tamen tu considera robur virium, & æquum iudica, &c. Auic. loc. cit. F
scia

ias quòd plurimū accidit apoplexia ha-
entibus ætates, & corpora, & regimina
umida, & propriè quum adest cum humi-
tate frigus. Si autem accidit cum calidi-
te complexionis & siccitate, tunc est res
raua: ægritudo enim contraria comple-
xioni non accidit, nisi propter magnam
causam, &c. Cū senī etiam accidit verti-
go comitans iterata, tunc illud nunciat
apoplexiam, &c. Mesu. cap. de apoplex. in-
quit, Illico administretur omnis cura: nam
dilatio ducit ad mortem festinam, quum
morbus per se parum curam recipiat. Id-
circo cum protestatione mortis medicus
ad curam intromittat.

*Authores dissentientes circa
apoplexiam.*

Adserere, apoplexiæ species esse tantū
tres, vt Auicennas.

Adserere, apoplexiam à frigido tantū
humore fieri, & non à calido.

Adserere, in apoplexia musculos pecto-
ris ob necessitatē respirationis moueri.

Adserere, apoplexiam à nudo & simpli-
ci frigore posse fieri, cum Auicenna.

Adserere, in acutissima apoplexia omni
no deficere spirationem.

Adserere, apoplexiam fortem nunquam
posse curari.

*Confutatio dissentientium circa
apoplexiam.*

Ad primum, Quæcunque sunt quatuor non sunt tres tantum, sed species apoplex sunt quatuor per Gale. Aphor. 2. comment. 42. igitur non tres tantum. Quod sint quatuor, ibi enarrat Gale. dicens, quod primum est, quum anhelitus prohibetur: secunda est quum respiratio fit cum magna vi: tertia est quæ nec intentum nec violentum, sed inæqualem ac exordinatum, ac præterea intermittentem habet anhelitum: quarta est in qua anhelitus aliquem seruat ordinem & est debilior & citò curatur.

Ad secundum respondet Auic. 3. can. quod causa apoplexiæ potest esse sanguis & pituita. Quare non solum à frigido, sed et à calido humore fiet. Item Gal. lib. de san. miss. cap. 6. Apoplexiæ proueniunt multum nimirum sanguine in principium animæ confertim incumbente. Itidem ait de vic. mor. ac. comment. 27. & in lib. introduct. siue medico appellato, & sic etiam calido fiet.

Ad tertium: Gal. Aphor. 2. comment. 4. Verum in apoplexiis non ob id quod inadaucta necessitas respirationis, sed quia vis est imbecillis, idcirco muscoli pectoris coguntur operari, &c.

A

Ad quartum respondet Gal. 3. de loc. aff. p. 7. ibi, Apoplexiæ quòd subito eueniat et frigidū, aut crassum, aut viscidū quidam, quod principes cerebri ventriculos statim implet, non autem totius substantie intemperiem, causam esse manifestum est. Idem confirmat Aet. ser. 6. cap. 27.

Ad quintum: Galen. 6. de loc. aff. cap. 4. quippe in cōfesso est, & spirationem à vitam à spiratione separari nō posse, sed ut viuentem nō spirare, & spirantem non viuere, sit impossibile. Igitur spiratio omnino non deficit, nisi vellemus apoplexiæ mortem appellare: verūm, ut ipse inquit Gal. adeò potest esse exigua ista respiratio, ut sensum omnino effugiat. Itidē ait de loc. aff. cap. 7. & c.

Ad sextum: Gale. 2. Aphor. comment. 42. videtur innuere, quòd interdum possit curari, per id quod dixit, magna ex parte curationem non admittit. Præterea regulæ medicorum non semper, sed ut in plurius intelliguntur: igitur interdum curatur. Præterea Hippo. 6. Aphor. 51. Aphor. inquit, apoplexiam fortem in septem diebus ægrum perdere, nisi febris apprehenderit, igitur febre superueniente curatur. Quòd verò de forti apoplexia intelligat, lege Galen. in commenta. ibi, Mutos solet

Hipp. nominare, &c. Item Auic. prima te
tij, tra. 5. cap. de apople. Accidit, inquit,
homo epilepsiam incurrat, & non sit dif
ferentia inter ipsum & mortuum, & non a
paret anhelitus, deinde reuiuiscit & san
tur, & tamen intelligit de forti apoplexi
igitur, &c.

De paralytidis descriptione.

Quum paralytis binas habeat descri
ptiones, propriam scilicet, & communem
ista erit propria. Paralytis est mollificatio
totius medietatis corporis cū priuatione
sensus & motus: communis est ista: Paraly
tis est ablatio vel diminutio in sensu
motu voluntario, aut mixto in aliqua cor
poris parte, non in toto. Motus ubi depe
ditur, & si sensus integer remaneat, semper
paralytidem efficit. Quum autē interdum
remanente sensu, solus amittatur motus, &
ecōtra, triplices assignantur causæ. Prima
quia ex paucitate spiritus, motus potius
quàm sensus deperditur. Secunda, quia ali
qua materia est in neruis motus, & nō sen
sus. Tertia, quia temperies pro vno magis
quàm pro alio corrumpitur: nā si corrup
patur ab humido, motus deperditur: si ve
rò à sicco, sensus, &c. In hoc morbo inter
dum cerebrum, interdum nerui musculi
ad motionem deputati afficiuntur. Quod
si mat

materia obstruens in ambobus cerebri
 entriculis foret, tunc apoplexia diceretur:
 verò in vno tantum latere, hemiplexia: si
 in parte nuchæ, omnes corporis partes præ-
 ter faciem resolvuntur: si in parte spinæ sint
 extra siue sinistra fiat obstructio, tunc in
 una parte erit resolutio, &c.

*Loci consentientes de descri-
 ptione paralytidis.*

Quod binæ sint paralytis descriptiones,
 lege Auic. secunda tertij, cap. de paraly. ibi,
 paralytis quandoque dicitur sermone ab-
 soluto, quandoque sermone proprio, &c.
 Gal. lib. finit. med. Paralytis est affectio vo-
 untarium motum offendens in partibus,
 vel parte quadam contingens. Item Pro-
 phet. 3. cōment. 26. Paraplegia talis est affe-
 ctio vnius partis corporis, qualis paraple-
 gia totius, &c. Et quarto de sympt. cau. cap.
 .Si nerui à principio fiant stupidi, deinde
 omnino sensum & motum amittant, para-
 lysis, id est, nervorum resolutio dicitur. B.
 Pendet ex hoc loco, quod paralytis à stupore
 non differt, nisi in magnitudine. Auic.
 secunda tertij, cap. cit. Et multotiens re-
 manet cum ea sensus, quoniam materia est
 in nervis motus & sensus, & una est causa,
 quare motus deperditur, &c. Vide de his la-
 tius Auic. loc. cit. & Arcul. De loco affecto

loquitur Gale. 3. de loc. aff. cap. vlti. Igitur quemadmodum ubi vniuersæ corporis partes quæ sub facie constitutæ sunt, resoluitur, faciei partibus illæsis, affectionem spinæ initio esse certum est: quod si hæc quæ afficiantur, cerebro noxam iam illatam esse ostenditur. Act. ser. 6. cap. 27. plura habet de his, ibi, Si omnes nerui sensum motum amittant, &c. Itidem Paul. lib. 3. c. 18. adserit. Lege etiam Gal. 4. de symp. cap. 5. fusius: Item 4. de loc. aff. cap. de lingua aff. ibi, Quum vtraque cerebri pars &c. Item Auic. loc. cit. ibi, Si materia a læsio fuerit, &c.

De causis paralyticis.

Causæ sunt tres, primitiua, antecedens & coniuncta. Primitiua sunt regimen frigidum & humidum in sex rebus non naturalibus, incisio neruorum, dislocatio spodium, ligaturæ comprimentes, percussio in partibus neruosis, & accidentia animi ut timor, ira. Item ægrotudines præcedentes sicut apoplexia, epilepsia, cholica, ut strangulatus, &c. Causæ antecedentes sunt quatuor humores, inter quos plerunque causa est pituita, interdum sanguis, raro melancholia. rarissime omnium bilis, nihil aliis humoribus admisceatur. Causæ coniunctæ sunt repletio vel inanitio, vel apostem

ma in principio nuchæ, vel in vna parte
au contenta obstruens: item immodera-
temperies frigida & humida cum ma-
ria & sine materia, licet etiam immode-
ra temperies calida & sicca sensum &
motū ex sua immoderantia debilitet, &c.

*Loci consentientes de causis para-
lytidis primitiuis.*

Auic. secunda tertij, tra. 1. cap. de cau. pa-
ly. de causis primitiuis loquitur, ibi, Por-
rum contractio quandoque accidit pro-
pter ligaturam, aut quandoque fit ex com-
pessione vehementi sicut accidit apud
percussione aut casum: aut accidit quum
declinant spondyli & rumpuntur, &c. Item
scissio quæ est in latitudine prohibet sen-
sum & motum in membris, & cui accidit
percussio & ictus, aut motus subitò ex ti-
more, pauore, ira, deliciis, angustia amit-
tatur, &c. Gale. itidem ait 4. de sympt. cau.
ap. 5. ibi, Idque vel ob luxatam quandam
vertebram, vel alio quouis modo. Si qui-
lem ingens fuerit affectus, partes infe-
riores subitò & sentiendi & mouendi fa-
cultate priuantur, &c. De casu & percus-
sione habes ex Galen. 3. de loc. aff. cap. vlti.
exemplum de Pausania Syro, qui ex ca-
su in initio dorsi læsus duo sinistra ma-
nus

nus digitos amiserat, &c. Similiter ha
ex hoc capite Gal. plura de incisione spi
Gal. 5. de symp. cau. cap. 2. Corripuntur,
vehementer fuerunt refrigerati, & qui
meraco vino ingurgitarunt, & qui diu
otio vixerunt, & qui intempestiue mult
aquã frigidam biberunt, &c. De causis
recedentibus habes Aet. ser. 6. ca. 28. ibi.
flatur hæc affectio humoribus multis, vi
fis ac crassis, nervos obturātibus, per qu
motus voluntarij perficiuntur. Auic. loc. c.
Et scitum est, quod destructio motus & i
sus fit, quoniam spiritus sensibilis aut m
rius retinetur à penetratione ad membra
&c. Gal. 3. de loc. aff. cap. 7. Vbi verò depe
dito sensu quis cōciderit, nō accidēte mot
quo vel cōuelli vel salire videat, id à veh
menti frigore ortū trahere sentio, &c. I
aphor. 5. cōmēt. 17. Immodicū frigidū ha
facit, cōuulsiones, distensiones ob nervor
refrigerationem, &c. De causis coniunct
loquitur Auic. secunda tertij, cap. cit. ibi, I
paralysis faciēs abscisionē spiritus à men
bris, aut est repletio aut apostema, aut solu
tio singularitatis, &c. Gal. aphor. 2. com
20. loquens de immodica intemperie in
quit. Quoniam omnis immodica intem
peries, imbecillum reddit aut exoluit op
rationem propriæ virtutis. Et in lib. intro
du.

siue medi. Hemiplexia fit ex humorum
afflorum copia, qui capitis vasa, vnde cor
ori sentiendi mouendique facultas adue-
t, obstruunt. Itidem adserit 3. Aphor. cō-
ent. 23. in fine commentī, loquens de a-
plexia. Paul. lib. 3. cap. 18. Si partes reso-
tæ conuellantur vel relaxentur, id ab in-
itione vel repletionē proueniet, &c.
uc etiam spectant quæcunque de causis a-
plexiæ nuper recitata sunt, &c.

De signis paralytidis.

Quum quis sensum & motum in vna par-
te, vel in pluribus corporis partibus ami-
rit, tunc paralytidem pati dicimus. Signa
fiât à primitiuis causis, habentur partim
x relatione infirmi, partim ex quadam cō-
ectura. Signa ex causis antecedentibus, si
nt humores, cognoscuntur, quia si san-
guis, adest inflatio venarum, totius re-
letio, oculorum rubedo, &c. Si pituita,
dest albedo, mollities, vrina alba, pulsus
lebilis, tardus, &c. Signa ex causis con-
iunctis, si adsit apostema, cognoscitur ex
febre, dolore, tumore & duritie in loco
percepta. Si immmodica intemperies cum
materia replens, cognoscitur ex tactu, vel
ex his quæ iuuant & nocent, item ex habi-
tudine, victu præcedente & similibus, &c.

Locū

Loci consentientes de signis paralytidis.

Razes 9. alman. Quum aliquis se mor-
re non valet, aut vnum, aut plura membra
ex suis, & sensum illius membri siue mem-
brorū amiserit, incurrisse paralytim pro-
ciamus. Auicen. secunda tertij, tra. i. cap. i.
sing. paraly. Illa quæ est à tortuositate,
à casu & percussione, aut sectione, cognos-
tur ex præcedenti causa. Et primo lib. ii.
secunda, cap. de signis dominij humoris
& loco citato, habet omnia signa humo-
rum, præsertim ibi. Et si materia est crassa
sanguine, significat eam guidez, & venæ
oculus, & repletio, &c. lege fusius in
loco, & intelliges cætera à me dicta: loci
etiam Arcul. & Gord. & Sauona. & Auic.
ibi. Si fieret ab apostemate calido, tunc
tensio & febris, &c.

De cura paralytidis.

Ad curationem quinque expediunt, vi-
licet victus ratio, humoris præparatio, e-
cuiatio, reuulsio & deriuatio, residui re-
lutio, & membrorum roboratio. Victus
ratio fit attenuatoria, sicca, non viscosa, non
virosa, sed ventri accommoda, urinam cito
in quantitate his, quæ roborandi nerui
facultatem habent: toleranda est fames
sitis, in potu exhibeatur hydromel potius
quàm vinum: nam materia ad neruos vi-
per

penetrare facit, & procul sit acetum: nam
 inde nocet in morbi recessu: vinum anti-
 cum paucum exhiberi debet, eò quòd ca-
 faciens & exiccans ægritudinibus neruo
 confert. Similiter & frictio & gestatio
 lectica aut vehiculo, & banea commen-
 untur. Humorū præparatio fiet cum ca-
 facientibus & exiccantibus, ut puta cum
 hydromelle, syrupo de stechade, rhodo-
 melle cum aquis saluæ, betonicæ rosmari-
 ni: huc etiam spectato oxymel simplex, sed
 rectificatione aceti cum syrupo mellino rectifi-
 candum est. Euacuatio fiet per ea quæ re-
 moventem humorem euacuant, ut cum
 simplicibus & compositis, hiera herme-
 nis, hiera logodione: nec ab re existima-
 mus, si à venæ sectione inciperemus, mo-
 deratamque detractionem moliremur, ut
 ægri nimis perfrigerentur, fiatque de-
 tractione per antithesim à sanioribus parti-
 bus, nisi quid aliud impediatur. Reuulsio &
 deriuatio, si ea quæ à cerebro ad nucham
 confluunt, ad alias regiones trahamus cum
 cucurbitulis affectis, patibus affixis, enæ-
 matibus, masticatoriis, crinis siue sternu-
 toriis frictionibus, & his similibus. Re-
 solutio residui paratur per exteriora & in-
 teriora. Exteriora fiunt linimentis, ceratis,
 emplastris & balneis. Linimenta parentur
 cum

cum oleo camomillino de spica, de co
de terebintho, vulpino, de castoreo, &c.
rata similiter fiunt cum puluere lumbric
rum, galanga, piretro, castoreo, add
oleis, cera & pice. Emplastra profunt, q
le est emplastrum de sinapi Mes. vel fi
cum herbis capitalibus, additis oleis &
quali farina. Balnea conferunt tam na
ralia sicut sulphurea, quàm etiam arte
rata. Interiora sunt electuaria, confecti
nes, pulueres, & similia. Electuaria sunt
muscus dulcis, theriaca, & omnia denier
quæ calefaciunt, siccant & resoluunt. Con
fectiones sunt acorus conditus, pulueres,
mæpitheos, stechados, &c.

Loci consentientes de cura paralytidis.

Aët. ser. 6. cap. 28. loquens de diætâ inqu
Sit attenuatoria ventri commoda, nih
scosi aut virosi habens, &c. Paul. lib. 3. ca
Cibi conueniunt ad concoctionē expedi
nec recrementij. Et paulò infra. Victus
cior utilis est, potio modica & frictio,
Mesu. capi. de paralyfi. Utantur cibis,
proprietas habeant confortandi neru
qualia sunt grana pinni, leporis cerebrum
origanum, hyssopus, piper, gingiber, s
fucus, salvia, &c. hoc intellige in cas
frigida, & in processu morbi. Auic. sec
da tertij. Stude ut facias pati famem, &

a cum cibis siccis, & fac tolerare sitim:
& in secunda mensa iuuat uti medulla
nucleorum pinni, & scias quòd aqua me-
ior est eis quàm vinum: nam materiam
in neruis penetrare facit, & ut plurimum
celscit: acetum verò est ex rebus quæ sunt
neruis nocibiliores, &c. Conciliator diff.
44. Non competit vinum, si materia cru-
da & in fluxu sit: si verò digesta, & factæ
sint euacuationes, paucum vinum antiquũ
conferat: nam materias resoluit & exiccat.
. Nota paucum dixisse ex eo quod Mes-
uicebat, scito vinum esse neruis inimi-
cum & oculis per se: ipsius enim abusus
causa est morbi per se. Itidem Auicenna
oc. cit. Paul. Vomitus à cœna conuenit,
item gestationes curru, lectica au vehicu-
lo, &c. De præparatione humorum me-
minit Auicen. secunda tertij, quando dixit,
ut in hac hora sis contentus rebus subtili-
us ex his quæ leuiter digerunt & soluunt:
inde dixerat, quòd quandoque exhibetur
xymel cū sua dispositione, & oppopanacũ
cum syrupo de melle, &c. Act. ser. 4. cap. 28.
tendendum est etiam potionibus relatis ad
morbum comitiale. Quòd verò per po-
tiones intelligat syrupos, & ea quæ inci-
dendi vim habent, manifestum est ex his,
quæ ab ipso suprà relata sunt, &c. Mesu. Ad-

æquatio fit materiei, cum administratio-
ne rerum morbi materiam carminantiur
& maturantium, &c. Vide de hac præpara-
tione humorū plura iuxta neotericos præ-
sticantes, &c. De euacuatione facit men-
tionem Aet. ser. 6. cap. 28. ibi, Manifestur
igitur est, quod redundantem humorem
euacuare oportet, nec aptius principium
in his reperire datur, quàm à venæ sectio-
ne, si permiserit ætas, habitus, tempus
progressus victus, &c. Oportet autem mi-
deratam detractionem facere, ne venæ pe-
frigerentur. Quapropter minuēda est ma-
teria paululum, detractio verò fiat à sanio-
ribus partibus, &c. Auicen. In illa autem
in qua est spes, oportet incipere à phlebo-
tomia, &c. Paul. loc. cit. Quoniam partes
resolutæ vel conuelluntur vel relaxantur
idque à repletionem vel inanitionem, atten-
dendum rursus est partim sanguinem de-
trahi debere, partim non, &c. Mes. cap. pro-
prio. Euacuatio fiat cum administratione
propriorum euacuantium sicut cum hiera-
diacolocynthidos, pilulis fœtidis, hiera-
hermetis, &c. Similiter Aet. loc. cit. Interpo-
sitis dieb⁹ alius subducatur, primū clysteri-
bus, deinde per aloës & polypodij & colo-
cynthidis cremorē, cōuenit etiā hiera Ar-
chigenis, &c. De reuulsione loquitur Auic.
ibi,

bi, Oportet vt clysterizentur enæmatibus
 fortibus, & colyria fortia supponantur, vt
 inclinentur eorum materiæ ad inferiora:
 confert etiam positio ventosarum super ca-
 uita lacertorum absque incisione, sed post
 euacuationem, &c. Similiter Aet. ser. 6. ca.
 cit. Post purgationem cucurbitulæ affectis
 partibus adhibeantur: si verò hæc ineptæ sint
 vicinis affigantur, &c. Et paulò post. Detra-
 cta materia etiam sternutatoriis, pituitam
 per os ducentibus, vtendum est, &c. Itidẽ
 Paul. lib. 3. ca. 18. asserit. Mes. cap. de par. Di-
 uersio completur, cum gargarismatibus,
 masticationibus, caputpurgiiis & sternuta-
 toriis, &c. Quomodo autem hæc fiant ha-
 bes suprâ de cephalæa à causa frigida, &c.
 De resolutione residui Auicen. secunda ter-
 tij, cap. cit. Cùmque membrum redit ad se,
 oportet vt ipsum excites, post id & constrin-
 gas ipsum, vt ad integram redeat sanitatẽ,
 &c. Et paulò infrâ, Oportet vt resolutio fiat
 cum aliquibus, quæ sint vt anisum, sigia, id
 est, storax liquida & castoreum. Et suprâ di-
 xerat, quòd emplastrum de sinapi est ex eis
 quæ ipsis conferunt, & fricatio cum oleo
 & nitro, & aqua sulphurea, & administra-
 tio acori, & quòd nihil est ita conferens
 vt theriaca & mitridatum, & assa fœtida
 est vehementis iuuamenti bibita vel lini-

ta, &c. Mesu. Vltimam rem complent v
 ctiones, emplastra, fricationes & balne
 &c. Aet. loc. cit. laudat ad resolutionem r
 fidui vstiones quatuor fieri, vnā circa c
 uitatem occipitis, tres in vertice, ex qu
 bus, inquit, non despero perfectam res
 tutionem, &c. Paul. lib. 3. cap. 18. Cucurb
 tulæ resolutis partibus agglutinentur:
 paucae fuerint distinctim, post cucurbit
 las delinantur medicamenta ex pice, res
 na, &c. Vide etiam Auicē. ibi, Quandoqu
 iuuantur à febre & à balneo sicco, &c.

Observationes de humorum præparatione.

Marcus Catinarius capi. de par. Caue
 dum est, inquit, ne nimis præparemus cu
 fortibus digestiuis nimium calefacient
 bus, vsque ad quartam diem, sed gradati
 procedendum à debilioribus ad fortior
 eò quòd magis materiam dilatant, quā
 præparent.

Observationes de euacuatione.

Auicē. secunda tertij. Et non prope
 in vsu medicinarum fortium in principi
 rei, imò tarda vsque ad quartum & septi
 mum: quòd si fuerit ægritudo fortis, vsqu
 ad decimum quartum.

Obiectio.

Quar Auicē. & Mes. incipiunt à debili
 ribus, quum Razes dicat, Cuius curan
 incipit

incipiemus cum pilulis foetidis, quæ inter
eumentia pharmaca reputantur?

Responsio.

Intellige ad vtriusq; concordiam, quòd
ic coactè, illi magis regulariter proce-
unt. Paul. incipit à semidrachma hieræ, &
nterpositis diebus exhibet integram dra-
hmam, dehinc vnam & semis, postea duas
que tres. B. Notandum est etiam ex Pauli
& Aetij textu, quòd in hoc morbo interpo-
itim medicinas exhibeamus, ne natura
medicinis assuescat & laxetur. Idcirco die-
us interpositis, modò vno, modò altero
medicamine vti præcipiunt, & interim vi-
es resumendas iubent, &c.

Observationes de resolutione.

Auic. cap. de cur. par. Et vbi necesse est,
esolvere oportet, & non sint resoluentia
um lenificatione pura, sed cum aliquan-
ula stypticitate, quia laxatitia substantiam
nèbri debilitant, & resoluentia spiritũ re-
oluunt, idcirco cū stypticitate fienda, &c.

Observationes de topicis.

Galenus est placitum 3. de loc. aff. cap. vlt.
ut consideretur locus originis neruorum
nde exemplum refert de Pausania Syro.
Auic. lo. cit. Positio medicinarum super lo-
cum paralyticatum est ex eis, quæ non affe-

runt iuuamentum, de quo fit curādum, se
oportet cognoscere originem neruorum
&c. & oportet cum resoluētibz procedi
re à debilibz ad fortiora, & cū medica
tur cū calidis, augmentatur ægritudo, quia
niam materia subtilis dilatatur per ea pl
rimum: idcirco oportet miscere cum inf
gidantibus aut temperatis, vt succo liqui
tiæ: & de emplastris loquēs dixit, Quū
sensus est debilis, fortasse emplastrum for
te nocet, & non sentit id, & ducit ad læsior
& vlcerationem fortem: oportet igitur
omni custodia ab illo caueatur, & vt con
deretur dispositio impressionis emplastr
&c. Paul. lib 3. capi. 18. In relaxatis, quide
membris adstringentia iis quæ laxant mi
scere, & frictionem intensam moliri cōue
nit: in conuulsis verò laxantibus duntaxa
vtendum est, & frictione molli, &c.

Paralytidem generantia.

Generant paralytidem vapor argenti v
ui, carnes porcinae, & tubera.

Paralytidem curantia.

Faciunt ad paralytidem, & à propieta
te tam occulta, quàm manifesta valent, ab
rotonum chameoris, betonica saluia, ari
stologia, artemisia, costus, maiorana m
ter sylua, colocynthis, laurus, rosmarinū
acorus, calamentum, origanum, hyssopus
melli

belliophyllon, rutha, fauina, mel, cinnamomum, anacardus, assa, helleborus, pyrethrum, peucedanum, diptamus, cyclamen, extractum alexandrinum, aqua sulphurea, aluminosa, vnguentum de bdellio Mes. vnguentum basilicon Mes. vnguentum Marciaton lic. oleum de piperibus, de cinnamomo, de castoreo, oleum laterinum, vulpinum, de costo, de cistichina, de sinapi, de pyrethro Nic. unguento gliris, blancha Nic. confectio pyrethri Mes. ca. de epilep. confectio anacardina Mes. cap. de ægritu. neruorum, diacathartica Auic. in 5. tra. diacalammentum, diacatharticon Nic. syr. de stechade, theriaca, hiera Ruffi, hiera Hermetis, hiera logodion, hiera picra, confectio de musco, diapliris Nic. pilule foetide, de euphorbio &c. corroborant nervos nuclei pinearum conditum, castoreum, nux indica, prœonia, &c. Vide Galien. in lib. de secretis, cap. de paral. Item Barth. Montagnanam conf. 48. Item Arcul. Sauon. c. de cur. paral. Vide etiam Gord. et alios practicautes.

De prognosticis paralytidis.

Paulus loco supra citato, Quæ à nerui diuisione oritur particularum resolutio, insanabilis est: quæ verò à temperie vel ab humore, commune ex facultatibus prædictis præsidium recipit. Auicennas secunda

tertij, cap. cita. Vrina infantis si sit viridi
nunciat paralyfim siue spasmus, & paraly
fis eueniens à remotione spondilium mo
tifera est secūdum plurimum, B. Ratio est
quia spondiles eos neruos, qui à se exeun
facile comprimūt: qui nisi ad suum locum
reducātur, insperata est salus, Celsus lib.
cap. 27. Morbus qui fit in partibus, nūqua
acutus, sæpe longus, & ferè sanabilis est
Razes cap. de paral. Quòd si paralyfis
percussione aut casu euenerit, & accidit
subitò, ita quòd nerui aliquialiter contu
dantur, taliter permanebit, nec vnquam
nabitur. B. Intellige, nisi sit in ætate, in qua
membra spermatica restaurari possint. Hi
pocrat. 3. prorrh. Paraplecticis parotid
vitiosæ, B. Parotides sunt abscessus post a
res, vitiosi que sunt, quia ad inferas partes
non deuoluuntur, sicuti ceteri abscessus bene
ni. Auicen. loco citato: Et quodcunq; mem
brum mollificatorū & paralyticorum si
cundum colorem reliqui corporis existē
non minoratur nec extenuatur, est de quo
maior habēda est fiducia, quàm illud quod
est diuersum ab hoc: nam quum minoratur
aut extenuatur, signum est quòd non
nutritur, &c. At si nihil horum acciderit
bene sperandum. Item febris superueniens
soluit paralyfim. B. Intellige, si ab humid

ta

te & frigiditate fiat. Arcul. Tremor & dolor in paralyfi superueniens, bonum: si uero paralyfis annum pertransit, ut plurimum non recipit curam. B. Intellige tremorem & dolorem idcirco esse bonum incitium, quia ubi tremor & dolor, ibi sensus & motus, &c.

Authores dissentientes circa paralytidem.

Adserere, tunc resolutionē vocari, quum sensus deperditur, & non motus.

Adserere, impressionem sensus in membris à calore impediri.

Adserere, frequentem usum calidorum mirum in modum prodesse neruis.

Adserere, vehementia pharmaca in principio curæ paralytidis conuenire.

Adserere, tunc paralyfim vocari, quum vis sentiendi & mouendi omnium neruorum amittatur.

Confutatio dissentientium circa paralytidem.

Ad primum respondet Gal. 3. de loc. affe. ap. pen. dicens, Quod neruorum tunc uera sit resolutio, ubi motus deperditur: ubi uero aliquarum partium sensus perit, eam partem sensus expertem vel stupidam potius dicimus, quàm resolutam.

Ad secundum dicit Auic. secunda tertij,

tra. I. Quòd membra sensus non recipiunt impressionem propter complexionis corruptionem: complexio verò corrumpitur à calido, aut frigido, aut humido, aut sicco, sed calidum, inquit, non prohibet impressionem sensus, &c.

Ad tertium, Hippocrat. aphorismorum aphorismo 16. Calidum, inquit, ubi eo simplicius utatur, hæc mala affert, carniū emollieminationem, nervorum incontinentiam, &c. ubi Galenus in comment. intelligit nervorum imbecillitatem fieri, eorum substantia à calore dissoluta, & sic calidus frequens usus nervis nocet, substantiam nervorum dissoluens.

Ad quartum, Communis est opinio, v. regulariter procedendo non euacuemus cum vehementi pharmaco, maximè quum paralyfis de materia pituitosa non sit morbus acutus, sed ubi subitanè mortem minetur, coactè cum vehementi pharmaco purgabimus.

Ad quintum, Gal. 3. de loc. affect. cap. 10. Quum omnes igitur nervi quum sentiendi tum mouendi vim amiserint, apoplexia huiusmodi affectio appellatur, igitur non paralyfis, &c.

De conuulsionis descriptione.

Conuulsio est nervorū ac musculorum affectio

fectio, per quem interdum totum corpus, interdum pars, citra voluntatem ad eam originem contrahuntur. Huius species sunt tres, scilicet *τέτανος*, id est, tentio qualis: *ἐμπροσθέντος*, id est, tentio ad interiora: *ὑπὸ πρὸς*, id est, tentio ad posteriora: locus verò affectus cognoscitur, quia in uerso corpore conuulso infra faciem, ne prima spinalis medullæ pars affecta sit: si verò cum vniuerso corpore etiam facies conuellatur, tunc cerebrum affectum se dicimus: si autem quæpiam corporis pars conuellatur, tunc eorum neruorum originem esse affectam iudicamus, &c.

Loci consentientes circa conuulsionis descriptionem.

Gal. lib. finit. med. Conuulsio, est affectus in neruis ac musculis accidit, quum modò corpus totum, modò pars eius citra voluntatem trahitur. Oribas. aphor. 2. comment. 30. Spasmus est, inquit, motus inuoluntarius, voluntaria obtinens loca. Auic. secunda tertij, cap. de spasm. Spasmus, est rigiditas nervosa, qua mouentur lacerti ad principia sua, & inobedientes sunt in dilatactione: nam alij remanent secundum suam dispositionem, & non dilatantur: alij facile redeunt ad dilatationem suam, sicut in oscillatione & singultu, &c.

Obiect

Obiectio.

Quomodo est ægrotudo, si Galenus 5. sympt. cau. referat esse accidens?

Responsio.

Tria considerantur in conuulsione, n. motus, & sic est accidēs: vel mala membri figura, & sic est morbus officialis: vel causa cuius fiat hoc accidens, & sic est temperies sicca, idcirco ægrotudo dicitur, & Galen. aphor. 6. comment. 39. Conuulsio est passio inuoluntaria ad similem venientibus nervosis partibus dispositionem, quæ etiam in motibus factis secundum appetitum assumebāt. Itidem ait in lib. de tremitu & palpit. in fine, Et aphorif. 4. com. 57. Tres sunt numero conuulsiones, opisthotonica, emprosthotonica, & tetanos. Itidē ait in lib. de tre. & pal. Similiter Auic. ibi, Sic mollitudo diuersificatur in mēbris. Et ibi, Quod corpus declinat ad anteriora. De loco affecto loquitur Gal. 3. de lo. af. c. 6. ibi, Conuulsio enim vniuerso corpore infra faciem omnium infra faciem nervorum originem affectam esse putandū est, quæ sunt primæ spinalis medullæ partes: si verò cum vniuerso corpore facies etiā conuulsa sit, non solum eam partem, quæ ex spina procedit, verum etiam ipsum cerebrum curamus, &c. Itidem 4. de sympt. cau. cap. vlt. adserit.

D

De causis conuulsionum.

Quum duplex sit spasmus, alter ad materiā proportionatus, alter non proportionatus, causa non proportionati duplex, intrinseca & extrinseca. Intrinseca sunt accidentia animi, sicut timor, mœstitia, dolor, vel mala qualitas à materia vermium, vel mala qualitas per consensum aliorum membrorum, ad neruos, vt ventriculi, vterus &c. Extrinseca est mala qualitas frigida styptica, membrum comprimens, vt frigus aëris, vel frigus nerui vulnerati. similiter punctura cæca, casus, percussio, incursio, vel mala qualitas venenosa, qualis est morsus venenosorum animalium, vel præteritatio, & quicquid cerebrum imbecille percutit, mordicat, ac dolorem infert, ex quo nerui fugiant ac contrahantur, &c. Proportionatus verò ad materiā duplex, alter de repletionione, alter de inanitione. Causæ præteritue de repletionione sunt, crapula, ebrietas, consuetæ euacuationes retentæ, balneum, exercitium in corpore phletorico, &c. Causæ antecedentes sunt vt plurimum pituita & sanguis, rarò melancholia, rarissimè animum bilis. Causæ coniunctæ sunt ipsi humores in neruis existētes, neruos iuxta longitudinem dilatantes, interdum abscessus, vel flatuosus spiritus, crassus, qui vbi fuerit parti

particularis, vulgò dicitur granfo. Causæ
conuulsionis de inanitione sunt quæcunq;
strenuè exiccant, quales sunt febres arde-
ntissimæ, ieiunia, vigilia, alui profluium,
nimius cōcubitus, euacuationes persolu-
tia pharmaca, nimius labor, & quæcunq;
possunt humiditates in nervis naturaliter
existentes dissipare ac extenuare, & omni-
no exiccare, &c.

Locæ consentientes de causis conuulsionum.

Auic. secunda tertij, ca. de spas. Et quæ-
doq; fit spasmus qui ad materiam non pro-
portionatur eueniēs causa rei impediē-
tē à qua nervi fugiunt & congregātur ad
pellēdum ipsum: & causa illa aut est dolor
& multoties ex vapore calido mordica-
uo, aut à qualitate venenosa perueniēte
cerebrum, aut propter qualitatem nō ven-
enosam, sicut quum spasmus accidit ab in-
gidatione vehementi, congregante nervum
& lacertum, & cōtrahitur ad caput suū, &
Paulus lib. 3. cap. 20. Porro facit affectum
quavis rarò lassitudo, humi dormitio,
ponderis eleuatio, casus, vulnus, ardor
ictus, & alia quæ eandem nervis offensa-
inferre possunt, &c. Vide de his latius Au-
cennam loco cita. Quod verò spasmus pro-
portionatus sit duplex, lege Gal. aphor.
commen. 57. Omnes conuulsiones sunt a

repletione, aut ab evacuatione partium,
 velicet nervosarū. Itidem adserit aphor.
 60m. 39. & 5. de sympt. cau. cap. 2. ibi; Atq;
 ones, Hippoc. authore, in duo capita re-
 duntur, plenitudinem & inanitionem. Et
 Hipp. aphor. 6. aphor. 39. Convulsio, inquit,
 vel ex repletione & inanitione, &c. De
 his huius convulsionis proportionata pri-
 ntius loquitur 3. de lo. af. cap. 6. Si temu-
 lito cuiuspiā ac omnino pleno homini, qui
 ntio degit, id evenire conspexeris, ex re-
 ptione iudicabis. Et apho. 5. com. 5. Solet
 um vinum nervos replere, quibus reple-
 fit convulsio, &c. lege fusiū de hac re
 Aul. c. de spas. Gord. Ant. Guaine. De cau-
 antecedentibus & coniunctis loquitur
 ic. secunda tertij, cap. de spas. ibi, Causa
 spmi aut est cum materia, aut sine mate-
 ria, sicut caliditas & siccitas: & materia
 spmi secundum plurimum est phlegma-
 ta, aut melancholica, aut sanguinea, &c.
 Epaulò post, Causa essentialis spasmī ex
 repletione est, aut humiditas & frigiditas
 auans secundū congelationem & gros-
 siem, aut caliditas & siccitas, &c. Hippoc.
 aphor. 5. aphor. 17. Frigidum convulsiones,
 tentiones, liuores, rigores febriles fa-
 c, &c. B. Quia omne nimium siue cali-
 dum siue frigidum nervis nocere solet:
 nam

nam ex immodico calore eorum substantia
dissoluitur, & ex immodico frigore cog-
tur ac cohibetur. Galenus 2. de sympr. ca-
cap. 2. Causam huius rei quippe demo-
strauimus, dum neruum aut stupore a
resolutione infestari dicebamus, si frig-
illum constringat, aut crassi lentique hu-
mores obstruant, aut aliqua causa exter-
ipsum suo pondere comprimat, &c. Itide-
ait in lib. de trem. & palpitatione, cap. vi-
ibi, Itaque neruos tendinésque in anim-
lium corporibus ex humore superfluo re-
fos, &c. Quòd fiat etiam à flatuoso spirit-
habet ex Auicen. loco citato ibi, Et non e-
longum, quin sit spasmus eueniens à ve-
rositate inflatiua, spissa. Ipse enim est ex e-
quæ plurimum accidunt, & remouetur
hora, intelligens de eo, quod dicitur gra-
fo. Itidem ait Paul. lib. 3. cap. 20. vbi tribu-
originem musculis repletis spiritu & ac-
crasso nebulosoque, &c. De causis conuul-
sionum ex inanitione plurima refert Au-
cennas secunda tertij, cap. cita. ibi, Spasmi
autem sicci, alius quidem qui fit succe-
sione febrium adurētium, & propriè in fi-
bribus sirsen, & successione motuum labo-
riosorum corporalium, & animalium sicut
angustia, vigilia, timor, & ille est ex ei-
à quibus fit euasio.

Ob

Obiectio.

Quomodo fit euasio, si ab Hippocrate
& Galeno lib. de tre. & palp. in fine existi-
matur incurabilis?

Responsio.

Duplex est spasmus, alter quidem cōfir-
matus, in quo omnes substāiales mēbro-
rum humiditates consumptæ sunt, & hic
dicitur incurabilis, quia humiditates illæ
deperditæ haudquaquā restaurari possunt.
Alter nō cōfirmatus, in quo primæ tantum
humiditates consumptæ sunt, sed spei ali-
quid superest vt restaurentur, & sic interdū
ab his fit euasio. Galen. 3. de loc. aff. cap. 6.
Quippe cū cōuulsio fit vel à labore, vel vi-
giliis, vel fame, vel solitudine, vel arida
æstuatēq; febre, qualē in phreneticis videre
est, causam eius esse ariditatem vacuatio-
nēq; rectē putaueris. Et 5. de sympt. cau-
sis, Phlegmone plenitudinem parit, arden-
tissimæ ac aridissimæ febres inanitionē,
&c. lege etiā aphorismū, Ex superflua pur-
gatione conuulsio, &c. lege etiā Gal. 5. de
sympt. cau. cap. 2. & in lib. de tre. & palp. &
aphorif. 6. cōment. 39. vbi affert exemplum
modò de chordis, quæ ob nimiam humidi-
tatē rumpuntur: aut de loris, quæ ad ignē
longius calefacta cōtrahuntur. Itidē Auic.
Sic dispositiones chordarū, quæ elōgantur

in hyeme propter humiditatem, & atre-
uiantur in æstate propter exiccatione.

De signis conuulsionum.

Signa præcedētia sunt angusta ac leu-
sa respiratio, pulsus rarus, durus, exi-
mus sardonicus, tremor manus ægri-
cultus: aluus siccessit, vrina aquæ si-
milis vel cruēta esse videtur: tument oculi,
facies rubescit, præcedūt tremores & si-
tus, dolor capitis, lumborū ac clauicorū
accidit, dentes strident, oculi peruer-
tiuntur. Signa præsentia sunt membrorū con-
tractio ad suā originē, diuersitas in pul-
satione, ut in principio sui motus sit humi-
lis, in medio sui motus ascendat, & in fine
arteria aliis mēbris est calidior, &c. Signa
conuulsionis erūt, si in sanis repentina
conuulsio adueniat ac permaneat. Signa
conuulsionis de inanitione sunt conuulsio
multos sudores, vomitus, alui proflu-
us, sanguinis fluxū, vigilias, fames, aut
ardētissimas accidētes, &c. Signa con-
uulsionis nō proportionatę ad materia-
lem causę eius antedictę. Signa humori-
bus gnoscutur ex coloribus & reliquis
antedictis. Signa apostematū sunt
febris, pulsatio, &c. Signa conuulsio-
nis cōsensum alicuius membri sunt, quod
cedit læsio illius membri, &c.

*Loci consentientes de signis
convulsionum.*

Paul. lib. 3. cap. 20. de signis præcedentibus verba facit, ibi, Notæ horū sunt angusta respiratio, pulsus rarus & exiguus, nō nunquam & risus sardonius oboritur, rubet facies, oculi intumescunt, & id reliquū quod à me nuper relatum est. Auic. quasi de verbo ad verbum eadem recitat. Galen. prognost. 3. cōment. 34. Potissimū convulsionēs futuræ cognoscuntur, si partes in vultu pervertantur, aut dētes stridēt, aut oculi crebrō mouētur ac pervertuntur: sed in pueris sufficit, si tantūmodo vigilēt, si admodū metuant, si mente lugeant, ac alius nō deiiciat, &c. Memento etiam aphor. 54. lib. 6. videlicet, In acutis passionibus, quæ cum febre sunt, luctuosa suspiria malum. vide de pulsu duro & de aliis huc spectantibus, Gal. in cōment. De signis præsentibus lege Razen. 9. alman. cap. de spas. ibi, Quū aliquod membrū alicuius contrahitur, & ad suum redit originem, aut plura mēbra sic disponuntur, spasmata esse pronunciamus. Auic. secunda tertij, cap. de sig. spas. Pulsus spasmatorum est extensus & diuersus in situ, ascendens & dimittens, sicut sagittæ euadentes de arcu sagittarij, &c. De signis spasmi, de inanitione & reple-

tione. Gale. prorrhet. 2. cōment 69. inquit
 Conuulsiones ex euacuatione post sudores
 multos, vel vomitus, vel deiectiones,
 sanguinis eruptiones, vel inediam, vel
 giliis, vel motiones rum multas, tum ven-
 mentes fiunt, &c. Itidem Paul. lib. 3. cap.
 Aet. ser. 6. cap. 38. Si statim ab initio morbi
 conuulsiones fiant & permanferint, tu-
 plenitu sine ortum habet: si verò à mu-
 sudoribus, vomitibus, &c. tunc ex in-
 tione oriuntur. Itidem Auic. loc. cit. ibi
 spasmus à repletionem fiat, signa sunt, quod
 subito prouenit, & non discedit veloci-
 si à siccitate fit paulatim & successione
 gritudinum euacuantium, &c. Idem ser.
 Gal. aphor. 2. cōmē 26. Signa humo-
 rangit Gale. prognost. 3. cōment. 34.
 Colores præter naturā habentur indi-
 tes humorum prauitatem, ex quibus
 uelli assolēt. Pallidus enim aut liuidus
 uum qualitate significat humorē, ruber
 verò sanguinis copiā, &c. De signis sp-
 ex apostemate loquitur Auic. secunda
 tij, cap. de sig. spas. ibi, Et quandoque
 spasma sunt pulsatio & saltus, & est
 malum. Pulsatio vnam duarum reru
 gnificat, aut apostema in visceribus
 Similiter loquēs de signis per consuetudinem
 alicuius partis inquit, Cū nocume

Ex stomacho, comunicat ei cerebrum,
inde nerui, & fit spasmus successione vo-
mitus, qui est sicut succus porri, aut arugo
ris, &c.

De cura conuulsiuum.

Ad curā spectāt quatuor intētiōes: pri-
ma, est victus ratio: secunda, euacuatio, sub
ua reuulsiō cōprehēditur: tertia, resolutio
c mēbrorū roboratio: quarta, est sympto-
matū remotio. Victus in cōuulsiōe de re-
solutione existēte materia pituitosa sit cali-
lus, tenuis & siccus in principio & in viriū
obore: si verò imbecillitas viriū adsit, etiā
n statu cogimur ei succurrere, cū cānibus
qualitate siccis, vinum non bibatur vsq; ad
morbi remissionē, nam tūc ad resolutionē
antiqū facit. In conuulsiōe de inanitiō-
ne victus sit frigidus, humidus, pinguis, te-
nuis, quū malē transglutiāt, & viæ sint fri-
ctæ: magis tamen humectet, quā infri-
det, qualis est aqua carnis cū quatuor semi-
nibus frigidis alterata, lac recēter mulcū,
sorbitiones ex chōdro, & alica, cremor pri-
sanæ. Potus sit aqua hordei, aqua cucurbitæ
& mellonis indi cū luleb, si adfuerit febris:
si minus, his addatur parū vini tenuis & a-
quosi, facit enim ad penetrationē &c. Eua-
cuatio fiet primū per venæ sectionem, si
sanguis vel humorū copia in causa fuerit:

si minus, iuxta humorū exigentiā euacua-
to, de quibus in capite de paralyſi ſatis di-
ctum eſt. Sed vbi morbus inducias dederit,
tunc primū materia erit præparāda cū rho-
domelle, ſyrupo de ſtechade, cum aquis ac
decoctis capiti ſpectātibus. Cōueniūt inſu-
per clyſteria cū rebus capiti dicatis. frictio-
nes ad partes ſubiectas, item maſticatoria,
ſternutatoria, cucurbitulæ affectis parti-
bus cū ſcarificatione, multa exiſtēte mate-
ria, vel ſine ſcarificatiōe, pauca exiſtēte. Re-
ſolutio ac membrorum roboratio perfici-
tur cū emollientibus ac reſoluētibus, cūm
materia ſit craſſior quā in paralytide, &
hæc per exteriora & interiora. Exteriora
ſunt linimēta ex oleo liliorum alborum,
lumbricorū, oleo vulpino, coſtino, & c. vn-
guenta ex bdellio, balnea tam naturalia
quā artificialia. Naturalia, ſulphurea, ſal-
ſa, aluminofa. Artificialia ſicut in oleo cō-
muni, vel in balneo, in quo decoctę ſint vul-
pes catuli cū herbis capitalibus, ſcilicet ca-
momilla, anetho, maiorana, ſaluia, roſma-
rino, ſtechade, & ſimilibus. Interiora ſunt
electuaria reſoluentia, vt diamuſcus, dia-
corus, mitridatū, confectio anacardina, &
quæcunque febrem prouocare poſſunt.
Remotio ſymptomatum fiet, ſi dolor qui
interdum vehementiſſimè moleſtare, ſo-
let,

1. auferatur, & hoc perficitur cum anodi-
 2. s, cum balneo 53. ex oleo cōmuni, in quo
 3. cocta sit lumbricorum quædam quanti-
 4. s, vel cum oleo camomillino de semine
 5. li, vel balneo arte parato, & membra cō-
 6. necta ad suum locum reducantur, & inor-
 7. nato motui resistatur. Cura conuulsio-
 8. nis de inanitione tantummodo cōsistit in
 9. humectando & restaurando, modò cū bal-
 10. neis ex lacte, modò artificialibus, cum fo-
 11. lis salicis, hordeo, violis & seminibus fri-
 12. dis, &c. Post balneum statim membra ex
 13. eo rosaceo liniantur, ne humiditas im-
 14. effa exhalet, sed sua stypticitate cohibea-
 15. r. Clysteria fiant ex rebus similibus, ad-
 16. tis quibusdam impinguatibus. Somnus
 17. super accersendus est. Euacuatio nulla
 18. at nisi naturalis, & nutriatur vt dictū est.
 19. Cura conuulsionis non proportionata ad
 20. materiā sic fiet, Primū si fuerit à percus-
 21. sione, cum laxantibus balneis, ex hordeo,
 22. camomilla & malua, fœnugræco, &c. Si fue-
 23. rit ex vulnere, in primis dolorem remoue,
 24. & sanies inducatur, cum emplastro altheę,
 25. vel cum vitello oui, & terebinthina, & to-
 26. ta spina liniatur cum humectantibus tem-
 27. peratis, sicut oleo amygdalino dulci, &c.
 28. Si fuerit à ventositate, resoluatur cum fri-
 29. ctione & oleis calidis. Si fuerit à pun-

Etura venenosa, extrahatur illa humiditas venenosa, vel cum cucurbitula apposita, vel cum emplastro ex scabiosa & vitello oui. Si fuerit punctura ex ferro, tunc aperiat locus, ita ut virus quoquo modo transpiret, cum vnguento exiccante & corrodente, quale est vnguētum apostolorum ægyptiacum, sed prius sedetur dolor cum terebinthina & oleo rosaceo, aut cum balneo ex oleo lumbricorum, aut cum pane in lacte infuso, aut cū aliquo quod locum stupidum reddat, qualia sunt opiata, &c. Si fuerit ab apostemate, curetur eodem tramite, quo solent tales abscessus curari. Si fuerit per consensum ventriculi, curetur vomitu vel euacuatione per secessum, roborando cerebrum & spinam, ne amplius quidpiam suscipiant, & sic intelligito de aliis particulis, &c.

*Loci consentientes de cura
convulsionum.*

Habes de victu primūm Auic. secūda tertij, ibi. Et si habēs spasmū humidū debilis sit virtutis, non abscindantur ab eo carnes sicca, sicuti carnes minutarū auium, & cubegi, & cheruberi, id est, perdicis & alaude: & si virtus non fuerit debilis, sint cibi eius panis cum melle, & aqua ciceris cū anetho & sinapi, &c. & sic calidum ac tenue vi-

um.

tum imperat Paul. lib. 3. cap. 20. Porro vitu-
 tuserit tenuis, qui expedite distribuatur,
 & recremetis omnino vacet, &c. Et loquēs
 de victu conuulsionis, de inanitione, dixit,
 Qui ex inanitione conuelluntur, nutrien-
 di sunt ex chondro & alica, vinoque tenui
 & aquoso, quod facile per omnia corporis
 membra distribuitur, nisi febris adfuerit,
 tunc ptisanę cremor utilis est. Et Auic. loc.
 cit. Et infirmo detur in potu lac recenter
 mulctum, secundum mensuram cōuenien-
 tem, si non fuerit febris, & aqua hordei, &
 aqua cucurbitæ & aqua melonis indi cum
 Iuleb, & si commisceatur cum aliquo ho-
 rum parum vini albi, vt penetrare faciat,
 erit conueniens. Et paulò pòst, Cibus ha-
 bentium spasmus siccum, sit totum quod
 humectat & lenit, & omnes sorbitiones
 pingues, lenes, factæ ex aqua hordei, assum-
 pta ex carnibus agnorum & hœdorum, &
 quandoq; ponitur ex oleribus humectati-
 uis, frangenti- us nocumentū carnis, si illic
 fuerit caliditas, &c. De euacuatione lege
 Paul. loc. cit. ibi, Quibus ceruix recta intē-
 ditur, ab initio sanguis detrahendus est, &
 partes lanis oleo sycionio imbutis & casto-
 reo contegantur, & cucurbitulæ sic admo-
 uendæ, vt cutis exasperetur: lenes enim
 noxam inferunt, &c. Auicen. secunda ter-

tij, cap. de cur. spasmi, Si spasmus est humi-
 dus, oportet vt curetur cum euacuantibus
 & purgantibus, &c. & cum videris san-
 guinis signa dominantia, tum phleboto-
 ma, &c. Aet. ser. 8. cap. 39. Post venæ sectio-
 nem vtendum vnguentis lancinantibus,
 & cucurbitulæ cum scarificatione locis o-
 mnibus affectis affigantur: in potu conue-
 niūt apomelli & radicis silphij decoctum,
 & ipsa trita, & hyssopi decoctum, &c. B.
 Intellige non tantum ratione potus, quan-
 tum præparationis materiæ. Itidem Paul.
 & Auicenn. loc. cit. asserunt. De resolutione
 postea loquens Aet. loc. cit. inquit, Deinde
 cataplasmata locis affectis adhibeantur,
 quæ laxare ac discutere possunt, simulque
 lenire. horum autem materia sit scœnugre-
 cum, semen lini, farina hordeacea ac lolia-
 cea, &c. Paul. lib. 3. cap. 20. Quod si tetanus
 ad vetustatem inciderit, in oleum
 bis quotidie descendere oportet, nec diu-
 tius immorari, quum maximè vires con-
 uellat. B. Nota quod tetanus non differt à
 conuulsione, nisi vt genus & species, vel si-
 cut compositum à simplici. Sunt enim in
 tetano binæ conuulsiones diuersorum mu-
 sculorum & neruorū, ad oppositas partes
 sese trahentium. Auicenna secunda tertij,
 cap. de cur. spasma. Et cessio in pelli vul-
 pium

& luporum iuuat, & inunctio cum
 bus luporum, & oleo de lilio, si nō fue-
 ris: & decoctum catulorum, aut ses-
 aquis, in quibus decoctæ sint medici-
 cibiles, sicut abrotanum, aut folia ra-
 iunci, & calamus aromaticus, & fo-
 auri, &c. lege eum fusius, & plura ad
 aea & inunctiones spectantia ab ipso
 lliges, &c. De remotione accidentium
 es ferè omnes practiçantes, sed præci-
 Paulum lib. 3. cap. 19. ibi, Primum par-
 x contrahuntur, valenter continen-
 unt, & inordinatis resistendum mori-
 oleo perfricare oportet rutaceo aut sy-
 nio, &c. Itidem Auic. ibi, Et applanetur
 d spasmatum est leniter, &c. Et antea
 erat. Et si fuerit dolor, seda dolorem,
 otquam cōsideraueris quid sit, & abscin-
 causam eius. Lege de his Arculanū. De
 ra spasmī ex inanitiōe loquutus est etiā
 ic. ibi, dicens, Conuenientior cura est ti-
 & inunctio in oleo humido post ipsam,
 ei⁹ iteratio multotiens. Si autem pos-
 ile est, tina fiat ex lacte: si non, ex aquis,
 i quibus cocta sint folia salicis, hordeum,
 ola nymphaea, cucurbita, & citruli: aut sit
 tum illud ex aqua rosacea, in qua decoct.
 ut aliqua horum: & si feceris, clysteria
 ant ex istis expressiōibus & oleis ali-
 quib

quibus dissolutis, humectantibus & impinguantibus, &c. Iridem Pau. loc. cit. adserit ibi, Eos qui ex inanitione conuelluntur oleo vel hydreleo calido fouere competit, &c. De cura per consensum habes plura apud neotericos omnes, quos recensere esset præter longitudinem satis graue. Vide tu Arcul. Marc. Catin. Gord. &c. Legi insuper Auic. ibi, In eo qui factus est à percussione, oportet vt administreretur embrocæ quæ laxant, factæ ex hordeo, camomilla, &c. Si fuerit à dolore, seda dolorẽ, &c. Et si est propter puncturam, curetur, &c. Et si fuerit à nocumento, propter alicuius reuenerosæ potum, curetur cum eo quod cognoscitur in cap. de venenis, &c.

*Observationes de sectione
ne venæ.*

Aet. ser. 6. cap. 39. Primum si à repletione fiat, secunda est venæ. Auic. de cur. spasmodicis loquens, de sectione venæ inquit, Non extrahas totum, quod necessarium est ex sanguine: imò retine ex eo aliquid, vt resistat spasmus, & resoluatur resolutione motu spasmus: & hæc observatio etiam habetur Raze 1. contin. cap. de spas. &c.

Observationes de balneis.

Auic. loc. cit. Et scias quod longitudo spasmus moris in tina est ex eis quæ nocent pro
pre

pter mollificationem virtutis, tu autē pone multitudinem numeri in loco longitudinis spatij, & fac sedere ipsum bis in die, &c. hoc idem annotauit etiam Paul. lib. 3. cap. 20.

*Observationes in ponendis
cucurbitulis.*

Auicē. Et ille qui vitur ventosis, oportet vt vtatur sine scarificatione, si res est levis: & si non ita est, scarificatio fiat, & loca ventosarum custodiantur & conseruetur, ne corpus infrigidetur, &c. Vide de hoc latius Paul. Aeginet.

Observationes de aqua frigida.

Paul. lib. 3. cap. 20. Frigidæ superfusionem, quum sit (quemadmodū ait Hippo.) periculosissima, eoque posteris credo vituperata, & nos damnamus deuitamúsq;. B. Hęc dicta sint in Marcum Catinariam, qui per immersionem aquæ frigidæ curam fieri iubet. Similiter de febre prouocanda: nam non solum Auic vt suprā sed etiam Paul. in hoc loco optimum esse inquit præsidium febrem, quæ per initia non fuerit, peruenientem: & hoc contra Michaëlem Sauonarolā qui nullo modo prouocandā ait esse, quū postea nostri non sit arbitrij eam expellere.

Con

Conuulsionem excitantia.

Excitant, eique nocent coturnix, borus albus, tribulus marinus. Prohibet proprietate spasmus iuxta Auicennam Plinium, Fel adipis, cinis mustelæ, spuma serpentis, storax bibita, &c.

Conuulsionem curantia.

Curam spasmus ex repletionem, acuta assa, aristologia, bdellium, calamitum, medrys, castoreum, centum capita, cynthys, epitimum, euphorbium, galbanum, peucedanum, pyrethrum, satirion, scordium, rhos, absinthium, oleum amygdalarum, de been, de piperibus, de costo, de croco, alchechenfigi, de semine lini, syrinx, stechade, de betonica, rhodomel, piper, tida, de serapino, de sex rebus Alexandria, vnguentum aragon, balsamum, sectio anacardina, diamusculus, diambage etiam remedia, inunctiones, &c. Varig. cap. 10. de dispos. capitis. Item tho. Montagnanam cons. 244. in fine de etiam Aggregatorem, Arcul. Gord. Act. &c.

De prognosticis conuulsionum.

Hippocr. aphor. 2. aphor. 26. Febris conuulsioni superuenire, melius est quam febris conuulsionem. B. Nam si febris superueniat humorem calefaciens, exten-

dissoluit: si verò post febrem conuulsio acci-
dat, statim ob sui acutiem vires dissoluens,
exitium affert, nisi ab initio quis huic op-
portunis remediis resistat. Et aphor. 4.
aphor. 5. Ex purgatione superflua, conuul-
sio aut singultus superueniens, malum. Et
aphor. 4. aphor. 49. In febre nō intermit-
tente si labrum, vel oculus, vel nasus, vel su-
percilium peruertatur, vel non videat, aut
iam debili existente corpore, quodcumque
horū fiat, iam propè est mors. Et aphor. 4.
aphor. 57. Qui à conuulsione vel distentio-
ne neruorum tenetur, febre superueniente
liberatur. Et aphor. 4. aphor. 66. In acutis
febribus conuulsiones & circa viscera do-
lores fortes, malum. Et aphor. 4. aphor. 67.
In febribus ex somnis timores vel conuul-
siones, malum. Et aphor. 4. aphor. 68. In fe-
bribus spiritus offendens, malum, conuul-
sionem enim significat. Et aphor. 5. aphor.
1. Conuulsio ex helleboro lethalis. B. Non
eam intelligit Hippoc. quæ per cōsensum
oris, stomachi, neque eam quæ per nimiam
euacuationem accidit, sed fortè eam, quæ
ab impulsâ hellebori virtute, violentius
neruorum substantiam exiccat, alioqui fru-
strâ legeretur alter aphor. Ex superflua
purgatione, &c. aphor. 5. aphor. 2. Conuul-
sio ex vulnere lethalis. B. Quia ad vulnera
sequi

sequi solet inflammatio, quæ ubi nunc
 attigerit, conuulsiones accidunt quidam
 que vniuersales, ex quibus mors. Iam
 aphor. 5. aphor. 3. Vbi sanguis plurimū
 xerit, singultus aut cōuulsio superuenit
 malum. Et aphor. 5. aphor. 5. Si ebrius
 piam repente obmutuerit conuulsus
 tur, nisi febre corripiatur, aut ad hominem
 uenerit, qua soluantur crapulæ, voca
 cuperet. Et aphor. 5. aphor. 6. Quicumque
 distentione corripiuntur, in quatuor
 bus pereunt: si verò hos effugerint
 fiunt. B. Morbus hic in primo diurno
 indicatoriorum circuitu finitur, non tunc
 re diu natura laborem. Et aphor. 5.
 18. Frigidum inimicū ossibus, derb
 neruis, cerebro, spinali medullæ, calidum
 verò utile. Et aphor. 5. aphor. 57. Idem
 muliebri, si conuulsio & animi de
 aduenerit, malum. Et aphor. 5. aphor.
 quartanis capti, non admodum à con
 sione capiuntur: si verò prius capiant
 quartana superuenerit, liberatur. Iam
 7. aphor. 9. A profluuiō sanguinis di
 tia & conuulsio, malū. B. Dictum est
 sionem ex euacuatione esse malū, se
 to magis, si ambarum fuerit con
 Et aphor. 7. aphor. 10. Ab illo vomit
 singultus, desipientia vel conuulsio.

lum. Et aphor. 7. aphor. 13. Ab æstibus fortibus conuulsio aut distentio, malum. B. Intellige pro æstibus siue febrem, siue aërem ambientem, vel feruorem, vel cauteria, vel escaram: nam ob neruorum siccitatem hæc proueniunt conuulsiones, quæ difficillimè curantur. Et aphor. 7. aphor. 18. In vigilia conuulsio vel desipientia, malum, &c. Et aphor. 7. aphor. 25. Ex medicamento portione conuulsio. Et aphor. 7. aphor. 27. Mulieri utrum gerenti si tentio superuenerit facit abortum. Razes. 9. almā. Spasmus qui non repente, sed suauiter accidit post febrem, aut post multam ventris solutionem, aut multum vomitum, aut sanguinis fluxum, malus est. & vix curabilis. Itidem habet Paul. loc. cit. Et Aet. & Auic. Mes. Cur sit hic deterior, quàm distentio est, quia iuxta omnes dimensiones contrahit. Gal. lib. de tre. & palp. in fine, Conuulsiones, quarum siccitas causa est, minimè medicaberis: nam sic affecti citissimè intereunt, nec medicamenta sibi ipsis utilia excogitare permittunt: at quæ ex humorum copia, aut ab inflammatione eueniunt, humorum euacuando repletionem & inflammationem propriis remediis medendo ipsas curare poteris, &c. Similiter aphor. 5. comment. 7. Conuulsio. quæ fit ab euacua-

tione, acutissima est & perniciofiffima
quæ verò à repletione nervosarum
tium, neque acutissima, neque simili-
riculosa,

*Authores dissentientes cir-
ca convulsionem.*

1. Adferere cum Aristotele, nervos cum
corde.
2. Adferere, convulsionum species elu-
res quàm tres, quum corpus etiam
dextram & sinistram curvari possit.
3. Adferere, convulsiones de inanitione
esse semper mortales. Nã pueri,
Avic. liberantur à spasmico sicco vel
4. Adferere, omnem convulsionem à
repletionem posse semper à febre curari.
5. Adferere, convulsioni motum an-
tiali motu non differre.

*Confutatio dissentientium cir-
ca convulsionem.*

Confutat primum Gal. 3. de loc. a
6 probans duobus mediis non oriri
de. Primū per exercitatissimos mi-
qui non cordi in hoc morbo, sed cerebri
vel circa spinam, remedia adaptant
ex arte anatomica, in qua evidētissi-
nitur, nervos oriri à cerebro, & nō à
. Ad secundum respondet Gal. lib.
& palp. cap. vlti. enumerans tantū

species, inquit, Huiusce passionis modos hunc quidem emprosthotonum, illum verò opisthotonum, tertium autem tetanum (vt omnes fatentur) appellari cognosces, reliquos modos laterales tanquam impossibiles propter firum neruorum & corporis imbecillitatem, tacens, quos si cognouisset vtilis, non vtique sicco pede pertransiisset.

Ad tertium inquit Gal. aphor. 2. cōment. 26. Si verò ex ardentibus febribus totum corpus exiccet & neruis: deinde ex siccitate conuulsio accidat, hoc maximum est malum, & penè infanabile, cuius ratio ab ipso redditur, &c. Quod verò dicit Auic. ita intelligendum est, quòd pueri liberantur à spasmus sicco velociter: id est, pueri immunes sunt, ne de facili in conuulsionē de inanitione incidant ob eorum edacitatē, &c.

Obiectio.

Gal. 3. prognost. inquit. Quòd cōuulsio accidens pueris cum acuta febre, facilè curatur, & tamen sequitur febris: igitur non omnes moriuntur.

Responsio.

Duplex est febris. Altera totū corpus & neruosam cōpaginem desiccans, & hæc est incurabilis & lethalis. Altera est dissoluēs humores pituitosos, frigidus, quia facilè cu-

rantur pueri, & sic intelligit Gal. ibi.

Ad quartum respōdet Gal. in lib. de
& palp. non curari conuulsiones ex
tione, tantū ex febre, sed quæcunq;
tummodo ex frigidorum humorum
proueniunt, repletionem tamen euacu
do: sed quæ ab inflāmatione eueniunt
nimè per febres curantur, sed inflām
tionem propriis auxiliis: igitur conuul
de repletionem nō semper à febre curantur.

Ad quintum inquit Gal. 3. de loc. feb.
6. Conuulsionem in conuulsis partib;
Etam hac sola ratione à motu naturali
ferre, quod præter voluntatem fit. In
lis verò motus voluntarius est. Et
fert à motu materiali qui inuoluntarius
semper fit.

De Melancholia descriptione.

Melancholia est quædam sine feb
tis alienatio ex humore melanchol
pendens. Hæc duplici specie insigni
altera quā Græci *μλαγχολία*, id est
bilem: altera *μηνία*, id est, insaniam
Melancholia ratione locorum affect
duplex est: prima, quum cerebrum
rio affectu afficitur: altera, quum p
sensum vel totius, vel partium præ
scilicet affectis molestat, unde p
dialis siue hypochondriaca melancholia

occur. Complures verò & harū existunt
 differentiae quas enarrare longum foret.
 Na quidam semper vident, nonnulli plo-
 rant alij mortem expetūt: alij mori timēt,
 futura vaticinantur, quos *ἰνδίατροις*
 Graeci vocant, &c.

*Loci consentientes de Melan-
 cholia descriptione.*

al. lib. finit. med. Melancholia, est qui-
 sine febre affectus mentem lædens, nō
 ingraui molestia animi, atque auersio-
 rebus charissimis. Ibi etiam describi
 insania, dum inquit, est alienatio men-
 mutatioque à communi hominum ritu
 canorum moribus, sine febre.

huic. Melancholia, est mutatio existima-
 tum & cogitationum à cursu naturali
 corruptionem, & ad timorem, & ad ma-
 iam, propter complexionem melanco-
 um, facientem spiritum cerebri sylue-
 sem interius, & facientem ipsum timi-
 an propter tenebras, &c. Oribasius aph.
 70 comment. 10. Atra bilis est affectio cere-
 bi, & ex melancholica fit materia, &c. Ga-
 li. 3. de loc. aff. cap. 7. Vbi atra bilis in cor-
 pre abundat, eam insaniae speciem, quam
 Graeci *μελαγχολία* vocant, efficit. Quem-
 modum alter atræ bilis succus, qui præ-
 lata flava bile nascitur, ferina delira-

menta inducit, modò cū febre, modò sine febre. Alexan. Tra. cap. 22. Sed ex loco etiā affecto aliā atque aliā sortitur speciei nomenclaturā: afficitur enim interdum cerebrum primario affectu, nonnunquā per cōsensum singularū corporis partium, interdum ventris & præcordiis adfectis, quā speciem hypochondriacam nominant. Gal. 5. de sympt. cau. in fine, Melancholicæ dementiæ variæ sunt species, prout in ipsis particulatim dolosæ suspectæ quæ apparent. In omnibus commune vnum habetur, quòd omnes præter rationem mœsti sunt, nequamobrè tristentur, rationē possunt redde-
dere, ac non pauci eorum mortē, & alia nō timenda timere videntur, &c. Vide fusius infra de signis melancholiæ, &c.

De causis melancholiæ.

Causæ vel sunt in cerebro, vel extra cerebrū. Si per se in cerebro sunt, & non aliis dependeant partibus corporis, tunc vel sunt initiatrices siue primitivæ, vel antecedentes, vel coniunctæ. Causæ primitivæ sunt aër frigidus & siccus, turbulentus aut calidus siccus adurens, sicut aër æstatis & autumnii, cibi potūsque atrabilarij, quali est caro bubula, caprina, lētes, vinū crassum, exercitium exiccans, ac balneum, immoderata vigilia, timores, tristitiæque, vehem

men

ins studium, longi carceres, menstrua ac
hemorrhoides oppressæ, &c. Causæ ante-
cedentes sunt mala intemperies, frigida
& sicca sine materia, quæ tum cerebri, tum
spiritus animalis complexionē ac substan-
tiam tenebrosam efficit. Itidem facit mala
intemperies calida & sicca, nam adurendo
cū substantiā obtenebrat. Itē mala tem-
peratura frigida & sicca cum materia me-
lancholica naturali vel non naturali, vt ex
coctione sanguinis. Mania similiter ex bi-
praassata generatur. Causæ coniunctæ
sunt, vel ipsa intemperies cerebri frigida
& sicca, naturalis & non naturalis, melan-
choliā ad actum producens, vel ipsa me-
lancholia in cerebro contenta. Causæ ve-
ro per consensum à toto corpore sunt, vel
febres quartanæ præcedētes, vel aliæ agri-
tudines in melancholiā desinentes.
Causæ per consensum à partibus erunt
multæ: nam si proueniat malum à splene,
tunc causa erit vel eius imbecillitas, segre-
gare ac expurgare atram bilem nō valens,
vel obstructio, aut apostema. aut mala in-
temperies. Et similiter intelligito de he-
pate, stomacho, præcordiis, ex quibus hu-
mor aut vapor tenebrosus tandem ad cere-
brum eleuatur.

*Loci consentientes de causis
Melancholia.*

Auic. loc. cit. Et melancholiae causa aut est in ipso cerebro, aut extra cerebrū. Aet. ser. 6. & Paul. lib. 3. cap. 14. & Gal. 3. de loc. aff. cap. 5. Interdum sine febre vitium est, ut in mania & melancholia, id quod modò per consensum, modò primaria affectione, cerebro laborante accidit. Idem ait cap. 7. 8. Ex hoc Galeni loco cognoscitur, quorū scūque aliquid per se & per consensum afficiatur, & hoc exactè discernitur per propria accidentia perpe. De causis primitiuis melancholiae loquitur Gal. aphor. 3. comment. 20. ibi, Furores enim & atrabilis, & morbi comitiales, & anginae sunt morbi autumnales. Similiter & commēt. 22. eiusdem est sententia, &c. Auic. prima terrij, tra. 5. Et quandoque causa generationis eius est aër exterior, & quandoq; sunt in generatione eius cibi generati cholerae nigrae, & ex causis fortibus in generatione melancholiae est superfluitas tristitia & timoris. Gal. 3. de loc. aff. cap. 7. Facile in temperie melancholicam incidunt, qui & vigiliis & multis laboribus, & solitudine, & tenui victu fuerint educati. Ad hec accedūt, si hemorrhoidis aliqua restricta sit, aut alia quaedā congesta sanguinis euacuatio, aut mulie

merum menstrua: insuper si quis vsus
illis qui suapte natura sanguinem me-
lancholicū efficiunt, vt caprina bubulāque
magisque hircinæ & taurinæ, asino-
rum ac camelorum carnes. Item vulpinæ,
ma, atque magnam vim in huiuscemo-
li generatione ex lepore cibus est, sed mul-
tius, ac frequenter limaces comestæ,
nēsque terrenorum animalium carnes sa-
conditæ. Ex aquatilibus thunni, balenæ,
ili marini, delphini, canis atq; cetaceo-
rum omnium. Ex oleribus brassica sola ferè:
per legumina lentes, mox panis fursura-
es, & qui ex vitiatis seminibus confici-
unt. Præterea vina crassa nigrāque aptissi-
sunt, vt ex ipsis melancholicus humor
ciatur: vetus denique caseus, &c. Vide
his etiā Gal. de atra bile cap. 4. & 6. &c.
causis antecedentibus loquitur Gal. 1.
od fiat sine materia, aphor. 6. cōment. 53.
Auic. prima tertij, tra. 5. Causa est mali-
n complexionis frigida & sicca, sine ma-
ria permutate substantiā cerebri, & com-
plexionem spiritus luminosi ad tenebras:
at est cum materia, & illa aut est in venis,
eniens ad eas ex loco alio, & conuertitur
cholera nigram per adustionem, aut
est materia imbibita in corpore cere-
bri, &c. Et paulò infrā inquit, Et oportet

vt scias, quòd cholera nigra faciens melan-
 choliā, quandoque est cholera nigra na-
 turalis, aut phlegma, quando conuertitur
 in cholera nigram ob spissitudinem, aut
 ob aliquā adustionem, quāuis hoc sit rarū
 & parum, &c. B. Nora ex Manardo in se-
 cunda epistola noni libri, pituitam adeo
 assari non posse in corpore humano, vt ni-
 gra in totum euadat. Et Gale. 3. de loc. aff.
 cap. 7. Igitur ea quam atra bilis constituit
 in melancholiā transit: quæ verò à pitui-
 ta parta est, in aliam affectionem permut-
 tur, melancholiā haudquaquam effi-
 ciens, &c. Gal. 5. de sympt. cau. in fine, Sol-
 autem melancholica dementia à frigido
 ri succo, vt causa, euenire solet, &c. Et 3. d.
 lo. aff. ca. 7. Prouenit huiuscemodi humo-
 in quibusdam plurimus, vel à temperie a
 initio comparata, vel à cibis in hūc humo-
 rem conuersis. Et paulò antè, Melanchol-
 ci sunt, in quibus siccitas & frigiditas don-
 natur, &c. Vide etiam caput sextum de atra
 bile. Aet. ser. 6. cap. 9. Generatur autem ci-
 liditate multa indigena, aut flauam bilen-
 aut crassiorē sanguinem adassante, &
 Vide etiam Galenum 3. de locis affect. &
 artis curatiuæ, &c. Causæ coniunctæ rec-
 tantur ab Auicē. loc. cit. ibi, Et vnāqua-
 que specierum cholerae nigrae, quum

ceret

Cerebro est, modo prædicto facit melan-
cholicam. Gal. 5. de sympt. cau. in fine libri,
Prò omne delirium deprauatus est prin-
cipalis facultatis motus, à prauis succis, aut
cerebri intemperie ortum habens. Et in
1. cap. Quod nobis extrinsecus accidit,
cum ambiens nos aer vastissimis tene-
bris fuerit obscuratus, id melancholicis ab
intimo corpore erumpere videtur occu-
pante cerebrum, vel ipsamet atra bile, vel
vapore quopiam melancholico, &c. De cau-
sa etiam per consensum loquitur Galen.
1. de loc. affect. cap. 7. ibi, Interdum cere-
bro accidit, vt nonnunquam vniuerso in
corpo sanguine melancholico effecto, ob
commune vitium ipsum quoque lædatur:
nonnunquam verò reliqui corporis san-
guine prorsus innocuo, solus qui in cere-
bro continetur, vel aliunde in ipsum deri-
uans, aut in ipsomet humor melancholi-
cus genitus est, &c. Et paulò post, Sunt
etiam nonnulli, qui per febriles morbos
melancholicum humorem contraxerunt, &c.
Alicuius prima tertij, tract. 5. cap. de melan-
cholic. Cui causa est extra cerebrum, com-
municat res aliqua ex qua humor aut va-
por tenebrosus eleuatur ad cerebrum, &
res illa aut est in toto corpore, quum ei do-
minatur complexio melancholica: aut præ-
cesse

cesserunt ægritudines, quibus succedit melancholia, ut febres tēporales & pexmixte: aut quū sit permutatio ex epilepsia: aut est in splene, quum in ipso retineatur melancholia, & nō potest ipsam purgare, vel trahere nigram ex sanguine: aut quia in ipso peruenit apostema vel opilatio, &c. Lege fusius eum, & inuenies etiam caliditatem hepatis esse causam, &c. Aet. ser. 6. cap. 9. Perducit etiam ad consensum cor ipsum ob vicinitatem. Et ibi, Plerunque partes circa præcordia primario affectæ caput ad consensum perducunt, & delirium efficiunt, &c. Galen. 3. de loc. affect. cap. 7. Videtur quidem in ipso ventriculo inflammatio esse: sanguis enim in parte inflammata contentus crassior & atræ bili magis conformis: & sicut ex ventriculo halitus fumosus ad oculos eleuatus suffusori accidentia efficit, pari ratione sublata ac cerebrum ab atra bile euaporatio, melancholica accidentia excitat &c.

De signis melancholiæ.

Signa principij melancholiæ, sunt timor & mæstitia sine causa, solitudinis dilectio, iudicium corruptum, iræ velocitas. Signa cōfirmatæ melancholiæ sunt, si quis cogitare cœpit, ore promat, & permisceat actus & verba, ut si dicat time re casum co
li, v.

li, vel putet se esse regem, & sic adest timor
& existimatio mala, & sermonis aliena-
tio, sollicitudo & angustia, & non timen-
da timet, &c. Signa melancholiæ in cere-
bro sunt superflua cogitatio, & assidua so-
licitudo melancholica, firmusque aspectus
ad terram, vel ad aliam rem. Item capitis,
faciei, & oculorum color niger, capilli cras-
si & nigri, præceduntque malæ cogitatio-
nes ac insomnia, vel aliquæ cerebri agri-
tudines, vt epilepsia: nec adsunt indicia per
consensum afficientia. Signa, quum à toto
per consensum fiat, sunt gracilis corporis
habitus, qualis est niger, hirsutus, & ex to-
to melancholicus per naturam vel per ac-
quisitionem, sicuti per sollicitudines, vigi-
lias, malorum ciborum esus, vel per men-
struorum vel hæmorrhoidarum oppres-
sionem: adest insuper multitudo pilorum
vehementer nigrorum atque crassorum, &c.
Signa hypochondriacæ melancholiæ, quæ
Auicennas Mirachiam vocat, sunt inflatio-
nes, rugitus, ructus accidi, ardor, & hypo-
chondriorum grauitas, aluus restringitur,
vomitus, dolor ventriculi, & propriè à ci-
bo, quousque digestum sit. Accidunt etiam
ex acceptione cibi multa accidentia, quæ
facta digestionem minuuntur, iuuanturque
à vomitu, ructu, flatibus, & excretionem
alui,

alui, ac à concoctione. Signa humorum
 fuerit atra bilis sanguinea, primum
 niunt cū risu vero vel ficto, nec vlla le-
 mœstitia: si melancholia fuerit pura, mo-
 mœrent, plorant, mortē expetunt: si li-
 perassata, tunc vehemēter insaniunt, et
 nes ad modum ferarum euadunt, & ven-
 ter homines verberant, &c.

*Loci consentientes de signis
 Melancholiæ.*

Hippoc: aphor. 6. aphorisi 23. Si tris-
 atq; mœstitia longo tempore perse-
 ex eo atra bilis significatur. Auicen. pro-
 tertij, tra. 5. cap. de sig. melanch. Signa
 cipij melancholiæ sunt, existimationis
 & timor sine causa, & velocitas iræ,
 lectio solitudinis, & tremor, et verti-
 sonitus, et tinnitus et propriè in-
 rach, &c. Razes 9. alman. Quum alie-
 læ cogitationes sine causa acciderint
 mor, et mœstitia in eo præualuerint,
 principium melancholiæ. Galen. 3. de
 affect. cap. 7. Differunt inter se mel-
 lici: nam omnes timent, mœrent, et
 damnant, odio habent homines, se-
 omnes mori cupiunt. De signis cōfir-
 melancholiæ loquitur Auicen. loc. cit.
 Quum autem confirmata est, tunc a-
 mor et malitia existimationis, et ang-

et sollicitudo, et alienatio sermonis, et fastidium propter multitudinem ventositatis, & species timoris ex eis quæ non sunt aut sunt penè infinitæ. Nam quidam timent casum cœli supra se, alij quòd terra eos absorbeat: alij timent latrones, & quâdoque imaginantur se factos reges, &c. Razes loc. cit. At si quæ cogitare cœperit, ore promat, verba sua actûsque permisceat, iam perfectæ est melancholia. Faciunt quoque ad hunc locum quæcunque ex Gal. in 5. de sympt. cau. & 3. de loc. affe. ca. 7. suprâ recitata sunt. Itidē habet Paul. lib. 3. ca. 14. & Aet. ser. 6. ca. 9. ibi, In summa melancholia multiformia deliria sunt ob particulares corruptas imaginationes, nō pauci mortem timent, &c. De signis melācholiæ in cerebro lege Gal. 3. de loc. aff. ca. 7. ibi, Quū autem propria melācholiæ accidentia auctiora videntur, circa ventriculū verò nulla, aut pauca admodum sunt, haud ab re existimaueris primitiuam in cerebro affectionem cōsistere, ob atram bilem in ipso congestam, &c. Aet. ser. 6. cap. 9. Cognitio an totum corpus melancholicum sanguinem habeat, an iuxta solum cerebrum talis sit, nigriores & hirsuti, & qui venas amplas habent, aptissimi sunt ad atræ bilis generationem: interdū homines rubicundi.

cundi in melācholicam temperiem
 eunt, similiter & flauī, præsertim vbi
 liis, laboribus pluribus & curis, & ten
 etu, aut melancholicis eduliis vsu
 rint, &c. Vide etiā quæcunq; supra e
 no de causis primitiuis verba fecimus
 adferit Auic. loc. cit. ibi, Signa eius cer
 cerebro est, sunt propriè superfluitat
 gitationis, & assiduatio solitudinis
 lancholicæ, &c. De signis per cōsensu
 tius corporis loquitur Paul. lib. 3. ca
 ibi, Peculiares melācholiæ notæ sunt
 cilis corporis habitus, niger, hirsut
 ex toto melancholicus vel natura,
 quisiitione per solitudines, vigili
 Auic. loc. cit. Eius quæ facta est cōmune
 totius corporis est nigredo corporis
 arefactio, et retentio eius quod euacuat
 ex splene et stomacho, et quod euacuat
 cū periodis, ex ano, et menstribus, &c.
 Gale. 3. de loc. aff. cap. 7. Facit etiā
 tionē de signis melācholiæ hypocho
 cæ, 3. de loc. affect. cap. 7 ibi, Quūq; quæ
 ca ventriculum prima inceperint
 tia, ipsi quæ autis melancholica se
 affectio, deinde alui deiectione, & vom
 & proba concoctione, ructibusque long
 is qui laborat, hypochondriacum
 sūmq; morbum ipsum nominabimur

Act

hic. loc. cit. Signa myrachiæ sunt, graui-
tas in mirach, & attractio ad superiora, &
tusea inseparabilis, & malitia animæ, &
eruptio digestionis, & eructuatio aceto-
si & sputum humidum, & rugitus, & exi-
tus ventositatis, &c. Lege eum fusius. lege
etiam Paulum lib. 3. cap. 14. ibi, Qui hypo-
condriaca laborant, habent cruditates,
adus, ructus, ardorem, & ipsorum graui-
tatem, præcordia sursum conuelluntur, &c.
Izses 9. alman. Quod si cum melancholia
erit dolor ventris, & inflatio, & malus
dolor, & digestionis corruptio, & vomitus
acetosus, &c. De signis humorum loquitur
etiam Auicenna. loc. cit. ibi, Et cholera nigra
adiciens melancholiam, quando est cum san-
guine, est cum gaudio & risu, & non comi-
tatur ipsam tristitiam vehemens, & si est
cum cholera, tunc est cum agitatione & le-
sione & dæmonio, & est similis mania: & si
erit cholera nigra, pura, tunc aderit co-
ructio plurima: & audaciæ minus, nisi
moueatur & rixetur, & habeat odiū cuius
non obliuiscitur, &c. Lege etiam Paul. lib. 3.
cap. 14. ibi, Si quando flauæ bilis supra mo-
dum exustæ in nigram fiat mutatio, &c.

*De cura Melancholiasine
materia.*

Quum dictū sit supra, cerebrum vel pri-

x

mario affectu vel per consensum labora,
 & quòd primarius affectus vel ab intena-
 rie nuda, sine humorum cõplexu, vel cu
 humoribus complexa perficiatur, idcir-
 primùm de cura eius qui sine materia
 agamus. Hæc igitur mala temperies
 plici scopo remouenda erit, primùm al-
 ratione, cum iis, præsertim, quæ cerebrum
 & cor roborant: secundò, cū euacuatione
 diuersione: nam si quispiam humor fuerit
 in fluxu, euacuari debet ac diuerti: tertio
 cum sympt. remotione. Alteratio fiet cu
 humectantibus calidis vel frigidis, præ-
 in discrasia expediet, roborantibus tam
 spiritus, cor & cerebrũ. Spiritus simpli-
 ter roborant oua, vinũ, aqua carnis: spiritus
 & sanguinem purificant margaritæ, cap-
 lus veneris, fumus terræ, &c. lapsum tẽ-
 ramenti cordis emendat, si sit frigidus in-
 schus, ambra, melissophyllon, borago: si
 lidus, camphora, rosæ, sandali, acetosa, vi-
 la nimphæa, coriandrũ, coralli. Euacuati-
 fiet per simplicia vel per cõposita: simp-
 cia sunt helleborus niger, aloës, agarici,
 colocynthis, epithymum, sena, myroba-
 ni, chebuli, lapis lazuli, lapis armenius,
 rum lactis, &c. Composita sunt, diasenæ, c-
 fectio hamech, hiera Hermetis, hiera I-
 sti, pilulæ de lapide lazuli, pilulæ inde, d-
 coctu

Atque senæ epithimi, &c. Remotio sympr.
ratur circa vigiliarum remotionem, cum
inniferis tam intrinsecus quam extrin-
tus adhibitis. Caueant sibi ab imminen-
tus periculis, ne alta petentes interdum se
precipitent, vel ne arrepto ferro, alios per-
tiant, vel semetipsos interimant, &c.

De cura Melancholia cum materia.

Cura malæ complexionis cum materia
cerebro per scopos quinque absoluitur:
primò, per sex rerum non naturalium in-
stitutionem: secundò, per materiæ præpa-
rationem: tertio, per euacuationem: quar-
to, per reuulsionem ac deriuationem, tum
cerebro, tum à corde, ad alia membra mi-
nus principalia: quinto, per resolutionem
solidi cerebri, ac cordis roborationem.
Actus ratio in melancholia sit calida &
humida, magis tamen humectans quam
defaciens, sitque probi succi, concoctu
facilis: vitentur quæcunque atrem bilem
generant, de quibus supra in causis primi-
uis satis copiose à Galeno dictum est.
Commendantur volucres montanæ non
ingues, oua gallinarum mollia, pisces pe-
rosi, carnes hœdinæ, & lactentium anima-
rum: vitentur animalia in stagnis de-
sentia. Potus sit vinum tenue, album, non
etius: abstineant à copia potus, ne cibi

ex ventre fluitent, acetum à cibo comme-
datur: somnus non prohibeatur, imò cu-
remediis sæpe arcessendus est, vicem m-
tus leues frictions suppleant, coitus vit-
tur, & sudor copiosus: in accidentibus an-
mo caueant mœrorem & tristitiam, sed f-
noribus cantilenis ac modulationibus li-
tificentur, vitentque cogitationes, &c. Pra-
paratio materiæ fiet per syrupos & per d-
cocta. Syrupi sint de pomis, de epithim-
de fumo terræ, de lupulis, de violis, de su-
co boraginis, de cortice citri, &c. Deco-
sunt ex epithimo, fena, polypodio lupul-
rū, thymo, fumo terræ, boraginis, menth-
calamo aromatico, mellissophyllo, maci-
rosmarino, xyloaloe, &c. Euacuatio, si m-
teria in capite contineatur, nō fiat per v-
næ sectionē, nisi vel copia sanguinis adfi-
vel præseruationis gratia id fiat, sed poti-
per atram bilem subducentia eam moli-
mur, prout suprā dictū est. Reuulsio & d-
riuatio fient per enæmata, frictions, ci-
cūrbitulas, de quibus aliās satis copio-
verba fecimus. Resolutio residui per in-
trinseca & extrinseca perficietur. Extri-
seca erunt balnea, sacculi & epithemat-
balnea vel naturalia, sponte scaturienti-
vel artificialia, cū herbis prædictis parat-
Sacculi quoq; parantur ex floribus buglo

fa

boraginis, mellisophylli, rosarū, & cum
len albo & rubro, sandalis, garyophyllis,
&c. Similiter epithemata cū debitis aquis
pulueribus cordi dicatis componantur.
Intrinsicæ sunt saccharū buglossatum, bo-
raginaceum, rosaceum, violaceum, adden-
diis aliquid diamusci dulcis & electua-
re de gemmis, &c.

*De cura Melancholiæ per
consensum.*

Cura melancholiæ per consensum binis
infectionibus præseruatiuis potius, quā cu-
ratiuis perficitur, quarum altera cauet, ne
hic humor abundet: altera cerebrum ro-
tando, efficit ne quid in se recipiat: & si
quid receperit, id expurgando à se expel-
lit. Humor nō abundabit, si per sectionem
venæ, (præsertim atra bile vniuersum cor-
pus occupante) vel per purgantia pharma-
ca superius habita patiens euacuetur, præ-
terea rotando tamē interim ac alterando, prout
in dyscrasia expedit: rursumque repurgan-
do, deinde reuellendo ac diuertendo cum
scaberrimis, lotionibus, aut menstruorum
vel hæmorrhoidarum euocatione, & in fi-
ne resoluendo siquid supersit, &c. Robora-
re cerebrum cum humectantibus calidis
vel frigidis, prout morbus requireret, tam
intrinsecus, quàm extrinsecus applicitis,

sicuti fieret epithema cum rosis, nenupharibus, foliis salicis, violarum, boraginis, melissophylli, stechadis, & hœdino capite, &

Loci consentientes de cura Melancholiae sine materia.

Auic. prima tertij, tra. 4. cap. de cur. r. Si melancholia fuerit ex malitia complexionis singularis, frigide aut sicce, sufficit ut administres calefactionem cordis calidioribus, è medicinis de musco & triaca, & metridato, & similibus, & curantur cum eis quæ dicta sunt in cap. de st. ditate, & c. Gal. etiam 3. de loc. aff. cap. 7. cura melancholiae sine materia loquitur ibi, Interim monendi sunt amici, qui curantem viderunt, frequentibus balneis victuque humido, bonique succi, nullò adhibito præsidio huiusmodi morbum curasse, ubi nondum ob longum temporis tractum nocuus humor euacuatus resisteret, & c. Arcul. in 9. alman. nouē modos roborandi ac alterandi spiritus & docet, quem tu fusius videre poteris. cura in cerebro cum materia loquitur Auic. prima tertij, tra. 4. Si est ex materia melancholica in cerebro confirmata, thesaurus curæ est tres res: prima euacuat

cuat

evacuatione humectationem assiduā cum
 ebrocis & oleis calidis : tertia , vt admi-
 tres confortationem cordis in comple-
 one frigida cū calidis lætificantibus, &c.
 I victus ratione lege Aet. ser. 6. ca. 10. ibi,
 Ist balnea cibos damus concoctu faciles,
 fus exortes : plerunque conueniunt pa-
 is in clibano cocti probè parati, volucres
 pingues, nō virosæ, montanæ, oua gal-
 larū mollia, pisces petrosi, & molles car-
 vitentur in stagnis degentia & in palu-
 ous. Ex carnibus conueniunt hœdinæ &
 stentium animalium, & magis extremæ
 rtes probè concoctæ. Vinum sit tenue &
 oum, & non valde vetus. Nec acervati-
 tur inter cibum, nec magna copia exhi-
 latur, ne cibi in ventre fluitent, &c. Paul.
 3. ca. 14. etiā de victu facit mentionem,
 i, Victus omnibus melancholicis cōfert
 obi succi & mediocriter humidus : vitā-
 i sunt, caro bubula, & quæcunque atram
 lem generant, &c. Itidē Auic. ibi, Sumat
 bos laudabilis chymi humectatiuos val-
 e, & fiat augmentū in hoc, vt corpus eius
 enerescat cum cibis conuenientibus, &c.
 lege eum fusius. Razes in Diuis. Potet vi-
 um album, subtile, clarum cū aqua pluri-
 na. Aqua sit boraginea, inquit, Guai. De
 ræparatione materiæ habes Aet. ser. 6.

cap. 10. ibi, Optimum est pulegij decoctum
 sæpe bibere, & ante purgatoria, & p.
 Mesu. cap. de Melanch. Fac ut cadat dig-
 estio æqualiter in materiam, quoniã est
 ra vera, &c. Hippo. in lib. de atra bile, P-
 mum quidẽ bona digestio curæ sit, dein
 purgatio. Et Auicen. loc. cit. Incipe à dig-
 estione. Et paulò infrà laudat syrupum,
 quo semina flatus discutiẽtia decoquãt.
 De euacuatione melãcholiæ loquitur Ga-
 3. de loc. aff. cap. 7. ibi, Nam ubi vniuersu
 corpus sanguinem melancholicum cont-
 net, curationem à sectione venæ incipe-
 oportet: ubi verò solum cerebrũ sanguin-
 detractiõne æger non indiget, quanuis o-
 aliã fortè causam mitti possit, &c. Itiden-
 adserit Aet. adiungens. Ni præseruation-
 gratia detractiõnem faciamus. Auic. pr-
 ma tertij, cap. de cur. mel. Amplius euacu-
 in principio rei, cū medicinis lenibus, i-
 quibus recipiuntur epithimum, pulpa co-
 locynthidos, & scamoneæ parum. deind-
 cum decoctione, in qua sit epithimũ & ag-
 ricum: & postea si non confert, administra-
 hieras magnas, deinde helleborũ, sed cum
 timore & cautela: quæ si nõ conferunt, rur-
 sus reitera, & in omni hebdomada euacua-
 vice vna, &c. B. Nota melãcholicos ob gra-
 uitatẽ humoris per inferiora purgari de-
 bere,

tre, vnde Hipp. Aph. 1. Aph. 2. Melācholi-
 o plenius inferiores eadē ratione cōtra-
 rāpponentes, vnde dixit ἀδρῶς pro σφο-
 δῶς, id est, plenius, pro fortius, quā humor
 sui natura ad exitū sit ineptus. Paul. lib.
 2. 14. Purgentur per initia epithimo vel
 ὀξέ. Aet. ser. 6. cap. 10. In quibus vitati hu-
 mores magis redūdant, ægrū purgabis per
 lērā Ruffi aut Archigenis aut Iusti. Con-
 cit etiā sero lactis aluū subducere, quod
 lacte per cocturā separatur. B. Modus se-
 gegādi lac à sero habetur non solum hīc
 Aet. sed etiam à Diosco. ca. de lacte, vbi
 quā modum bibendi demōstrat. De reuul-
 sione & resolutione loquitur Auicē. ibi,
 quūq; purgaueris, attende ad cor, cū his
 multotiēs diximus, & administra ma-
 nicationes, gargarismata, & odora-
 menta, muscum, & ambram, & alfeniati, &
 cloaloen, &c. B. Alfeniati sunt species aro-
 maticæ, vt gariophyllum, & similia. Mesu.
 cundū regimen est faciēs resolutionem
 mediocritate. vide Arcul. & ceteros pra-
 icantes de resolutione, &c. De cura per
 sensum lege primū illud Paul. Morbū
 ex totius corporis cōsortio trahit ori-
 nem viribus valētibus, à sanguinis mis-
 one curare incipies, & interposito tēpore
 ribus relectis inferius purgare cōue-

nit, & si hamorrhoidibus aut mēsisbus si
 pressis morbus proueniat, horū purgan-
 nem molimur. Itidem ait Aet. ser. 6. c.
 9. ibi, Quum igitur totū corpus melanc-
 licum sanguinē habuerit, &c. Itidem Au-
 loc. cit. ibi, Nam si vides venas plenas, q-
 litercunque sit cholera, nigra est sang-
 nea: phlebotometur igitur ex nigra, &
 Lege etiam Gal 3. de loc. aff. cap. 7. De al-
 intentionibus habes plura iuxta mod-
 nos authores, pro resolutione vtitur t-
 pheræ 3 iij. epithimi 3 j. hieræ 3 v. Aet. t-
 riaca presertim hyeme & vere. De robo-
 ratione cerebri lege Auic. ibi, Succurres i-
 cum eis quæ caput infrigidant, & hum-
 etant ipsum ac confortant, vt non recipi-
 quod peruenit ad ipsum ab aliis, &c.

Observationes in cura.

Auic. prima tertij, tract. citat. Oportet
 cura eius fieri incipiat, antequam conf-
 metur, quoniam facilis est in principio,
 praua & difficilis cū est confirmata: si-
 que studium tuum in humectando, mag-
 que in calefaciendo. Itidem ait Aet. ser.
 cap. 10. ibi, Incipientem affectionem cur-
 re oportet, &c.

Observationes de cibo.

Auic. loc. cit. Et prohibe ne comedat
 post cibum illum aliū, & ab intermissione
 cil

oi super cibum iam corruptum, & alie-
rat è se fabas, carnes solitas, lentes & cau-
li, & vinum crassum & nouum, & omne
& omne falsum, & acre, & acutum, &
quod est vehementis acetositatis: sedumat
anguine, & dulce, & cibos generatiuos san-
guinis laudabilis, &c.

Observationes de euacuatione.

Mesu. cap. de melancho. Tria in euacua-
tione annotanda proponit. Primum, vt non
mel laboriosam & subitanam euacua-
tionem faciamus, sed pro temporis intersti-
tio: nam subitanea ac violenta euacuatio
à natura regulatur. Secundum, quòd so-
litum sit commensuratum, nō excedens
mediocritatem. Tertium, non spoliatur à
rebus lenientibus & humectantibus. Hoc
lem sentit Auicenna. ibi, Euacuato in rei
principio cum medicinis lenibus, &c. B. Ad-
de tu quòd pharmacū in se habeat aliquid
ex medicinis membra principalia & spiri-
tus roborantibus, &c.

Observationes de sectione vene.

Gal. 3. de loc. aff. ca. 7. Quum speraueris
in vniuersi corporis venis, melancholicum
sanguinem contineri, quo certiorē habeas
notitiam, mediam cubiti venam seca, quæ
communis est: quòd si fluens sanguis non
videatur melancholicus, statim supprima-
tur.

tur: si verò talis appareat, euacua, quantum
pro laborantis corporis habitu satis
conieceris, &c. Itidē Aet. ca. 9. adserit. A
loc. cit. Amplius si phlebotomas, & inueni
sanguinem subtilem, non retineas sang
nem propter hoc, quoniam multotiens
ipsa præcedit subtilis. Et similiter oportet
vt amplifies phlebotomiam, vt nō effluat
quod subtile est, & retineatur crassum. M
Si sanguis exuberat in toto, & venæ ple
sunt, euacua ex vena nigra, & post ipsam
basilica, & hoc in melancholia: in mania
verò fac econtra: incipe à basilica, deinde
ex vena nigra, & post has phlebotomas
saphenis, &c.

Observationes de alteratione.

Arcul. & Marc. Catin. Fac quòd alteratio
non virtute solùm, sed etiam numero eu
acuationi correspondeat, ita vt non fiat si
tim, sed successiuè, vt dictum est.

Observationes de resolutione.

Auic. loc. cit. Non administrentur pur
resolutiua, vt non incrassetur humor pro
pter resolutionem purā, &c. Et paulò post
Quùmque administras embrocas, non e
via ad ministrandum in frigidantia pur
super caput, &c. Intellige in mania, &c. M
chaël Sauo. Diuretica in hoc casu sunt su
specta, ex eo quod tenue educūt, & crassum
aptum

zum in melancholiam conuerti relin-
qunt, &c.

Melancholiam incitantia.

Inducunt melancholiam & maniam car-
vacchinæ, nimius anacardi vsus, allium,
bosciamus, lentes, solatrum fluuiiale, vi-
alba, & quæcunque sanguinem crassum
eiciunt.

Melancholiam curantia.

Curant melancholiam, absinthium, epi-
mum, fumus terræ, borago, buglossa,
puli, anacardi, aurum, margaritæ, cala-
ris aromaticus, senna, helleborus niger,
patorium, mellissophyllon, matricaria,
silla, stechas, thymus, myrobalani chebu
& nigri, ozimum fluuiatile, diasenæ, con-
fectio hamec, confectio esdra Nic. ius galli
crepiti, serū lactis, pliris, arcoticon Nic.
cata magna Nic. dianacardinū, serapio.
antido mitridatum, lapis armenius lapis
lulus, pilulæ indæ, pilulæ de lap. lazuli,
indum, saccharum buglosaceum, bora-
naceum, rosaceum, muscus, lætificans al-
ans, electuarium de gemmis, & mille a-
qua quæ arte parari possunt. Vide de hac re
arignanam capit. 8. tra. 2. plura composita
ferentem vide etiam Montag. consi. 47.
de ægritudinibus cap. Vide insuper Arcul.
lichaël. Sauo. & Gord.

De

De prognosticis melancholice.

Hippocr. libr. de atra bile, Morbus quum nondum ferè incœpit, curari debet, nam inueteratus, difficulter curatur ac statatur. Cognosces esse confirmatum ex signis suprà positis. Et aphor. 6. aphor. 53. sapientia quæ cum risu fiunt, securiores: verò cum studio, periculosiores.

Obiectio.

Quomodo esse potest risus in melancholia, quum dictum sit, mœrorem & tristitia esse eius accidentia?

Responsio.

Duplex est risus, fictus & verus, sed hoc lege Gentilem & Arcul. qui de hac re fusius sermocinantur, intelligè que securiores, p minus periculosas. Et aphor. 6. aphor. 21. In insanientibus si varices vel hæmorrhoides superuenerint, insanix solutio. Fit solutio, natura ad ignobiliiores partem humorem melancholicum transmittens. Auic. cap. de Malan. Si accidat casus appetitus, tunc ægritudo est mala: & si accidat in corporibus eorum vlcera, tunc mors propinqua. Si verò cholera nigra appareat in egestione, vomitu, vrina, in coloris tuis lentiginibus & panno & vlceribus, scabie, varicibus, elephantia & cursu, quod ano profluit, est signum bonitatis: quod

h.

he signa omnimodā à sanguine discretio-
 nem ostendunt, &c. Et Aphor. 6. Aphor. 56.
 In morbis melancholicis ad hæc periculo-
 recubitus stuporem corporis vel conuul-
 sionem vel furorem vel cæcitatem signifi-
 c. Et aphor. 6. apho. 2. Atra bile vexatis &
 num passionibus hæmorrhoides superue-
 nientes bonum. Auicenn. prima tertij, tra. 5.
 Reparati ad hoc sunt trauli, & syllabam
 multoties repetentes, antequam dictio-
 nem proferant, &c. & hæc egritudo plus ac-
 cidit viris, sed in mulieribus est deterior,
 & multiplicatur in iuuenibus & senibus.
 plurimum melēcholiā habens est sple-
 neticus, & egritudines, quibus succedit me-
 lancholia, sunt sicut febres temporales &
 mixtæ, & melancholia accidens successio-
 nem alterius egritudinis calidæ, facilis est cu-
 ri, ita ut embrocationib⁹ remoueatur, &c.
 Trauli dicuntur qui proferre nō possunt
 res, ob humiditatem linguā mollifican-
 tem. Dixit accidere plus viris quā mulie-
 ribus, quia calidiores sunt viri fœminis.
 e successione huius morbi per alias ægri-
 tudines lege 3. prognosti. tex. 29. in com-
 ment. Galen. &c. Hippocra. de morb. vulg.
 melancholici magna ex parte morbo co-
 nitiali laborant, & econtra. B. Quia ha-
 bent communem causam, idcirco facile al-
 ter

ter in alterum mutatur, &c.

Authores dissentientes circa Melancholia

- 1 Adserere, in hoc morbo idem esse affectum & causam.
- 2 Adserere, in omni specie melancholice sectionem venæ congruere.
- 3 Adserere, pituitam adeò assari posse melancholia efficiatur.
- 4 Adserere, Melancholiam confirmatam sine controuersia posse sanari.
- 5 Adserere, humorem melancholicum qui est fex sanguinis, non differre à melancholia.

Ad primum: Gal. lib. 2. artis cur. Melancholiæ nomen à causa ipsum faciente peruenit, & humor, qui ipsius est causa, melancholia ab omnib⁹ dicitur. Igitur sicuti differt causa ab effectu, ita hic affectus à causa, & sic idem non erunt.

Ad secundum: Gal. 3. de loc. affect. cap. 7. melan. Vbi vniuersum corpus sanguine melancholicum continet, curationem à sectione incipere oportet: vbi verò scilicet cerebrum, infirmus sanguinis detractio non indiget, in omni igitur specie sectionis venæ non congruit.

Ad tertium: Gale. 3. de loc. affect. cap. 7. Igitur ea quam atra bilis constituit, melancholiam transit: quæ verò à pituita

parta est, in aliam affectionem permu-
ta, melancholiam haudquaquam effi-
cens.

Ad quartum: Alex. cap. de melāch. Si con-
tinetur hic morbus, cerebrum ad sui na-
turam mutat, & eger ad assumptionem me-
dicinarum fit inobediens, &c. Hippoc. lib.
de atra bile. Non curatur confirmatus, quia
in insaniam sepe conuerti solet. Idem etiam
A. & Auicē. adserunt.

Ad quintum: Gal. lib. de atra bile de ple-
nitudine circa finem. Porro dū ea veluti fæx san-
guinis permanet, neque adhuc acida facta
est, satius forsā sit humorem melancholi-
cum illam appellare, nondum melanco-
licum: sed melācholicum potius humorem
dicemus appellare, quando propē accessit,
et in melancholiam vertatur. Melancholia
autem dicitur, quæ iam atra bilis est, & sic
hæc verba inter se differunt.

De Ophthalmia.

Lippitudo, Græcè ὀφθαλμία dicta, est an-
te tunicæ inflammatio rubore calorēq;
primo, ac punctiōibus eueniens. In hoc
genere continetur etiam perturbatio siue
tremor, à Græcis τάρaxis dicta, quæ nihil
aliud est, quàm oculi humiditas cum calo-
re & rubore naturæ alieno, ob extrinsecam
causam forinsecus adueniente. Sequitur

y

etiam tertia species ophthalmiæ, à Græcis dicta χίμωσις, Arabicè alguardenegi, & quotiescunque ab inflammatione vehemēti utræque palpebræ ita inuertuntur, ut oculus ab ipsis contegatur.

Loci consentientes de ophthalmia.

Gale. 1. de diff. mor. cap. 13. Lippitudo membrana, quæ ceratoidi tunica adhæret, phlegmone. Itidem de part. art. med. ca. 3. ait, & in lib. finit. medic. Est, inquit, phlegmone circa oculos cum rubore & plurimo calore, & motu difficili, ac punctibus nata. Auic. tertia tertij tract. 1. Ophthalmia alia est vera, & alia ei similis, quæ minatur cōturbatio & vacillatio. Ophthalmia vera est apostema in coniunctiua alia quidem est, quæ est apostema simplex non pertransiens terminum: & alia est cataracta, magis est pertransiēs terminū in magna visidine, in qua superabundat albugo superpillam, & tegit eam, & prohibet clausio, & nominatur chimosis, & apud nos alguardenegi, & c. B. Ex his intellige tres esse ophthalmiæ species: prima est τάρaxis, quæ levis est: nam remota eius causa, remouetur: secunda ophthalmia, quæ est apostema simplex, non pertransiens terminum, & impletur est venarum exuberatio, fluxus & dolor: tertia χίμωσις, quæ est ophthalmia magna, p-

tra

transiens terminum in magnitudine, in
 ea superabundat albugo super pupillam,
 & Amplius scito omnes oculorum mor-
 bi esse in triplici differentia, scilicet ex
 phlegmone, fluxu, & ulcerationibus.

Quid sit phlegmone iam declaratum est.
 Fixus verò est tenuium delatio humorū
 contra voluntatem quæ cohiberi non potest.
 Ulceratio verò est ceratoidisruptio ab ictu
 vel à valida inflammatione oriens. de his
 de Galen. libr. finit. medic. Habet etiam
 in aquaque oculi tunica morbos à quibus
 dicitur, quæ separatim à Paulo & in vno
 capite ab Aetio declarantur. De his vide
 etiam Manardum epist. 2. libr. 7. Loquitur
 super Galen. de his primo de diff. mor.
 capit. 13. & 4. de symptom. caus. circa prin-
 cipium. Paul. lib. 3. cap. 22. *τάραξις* est ocu-
 li humiditas cum calore & rubore naturæ
 alieno, non ex corpore, sed à foris adue-
 niente causa. Galen. lib. fin. med. Chemo-
 sis est ambientis oculum membranæ, quod
 album quoque appellatur, extuberatio, al-
 bæ carnis per similis, &c. Vide etiam Paul.
 loc. cit. ibi, Chemosis vocant, &c.

De causis ophthalmiæ.

Causæ initiatrices sunt pulvis, fumus, sol,
 aer, vel quæcunq; ex sex rebus non natura-

libus, & sibi annexis oriuntur. Causæ cedentes sunt sex, sanguis, bilis, pituita atra bilis, materia aquosa & flatuosa. Quæ se coniunctæ sunt, hi humores ophthalmia ad actum producentes, aut inflammationem aut alius quispian tumor. Causæ generationis ophthalmiæ binæ sunt, prima fit in materia ex superfluitate alimenti annexæ tunica paulatim congeritur, aut ipsum alimentum non probè concoctum in ea manet, & apostema efficit. Secundam cum materia per modum fluxus à capite per venas & arterias, musculos ac nervos opticos siue intrinsecè siue extrinsecè annexam oculi tunicam se confert, aut ab aliis corporis partibus materia transmittitur ad oculum iam debilem ob eius tenuitatem, vel à generatione existente. Causæ doloris oculorum in inflammatione fiunt aut ex acrimie humorum influxu aut à distentione tunicarum repleatarum, aut à crassis humoribus & à flatuosis humoribus, &c.

Loci consentientes de causis ophthalmiæ

Gal. in lib. de oculo. ca. 83. Ophthalmia visum turbat triplex est, cuius causa est exterior, ut sol, fumus, pulvis: vel interior, sicut humores ad coniunctivam fluentes. Paul. lib. 3. cap. 22. Perturbatio oculi fit à

radueniente causa, vt à sole, fumo, pulue-
roleo, &c. Auic. tertia tertij, tra. i. itidem
ibi, Fit à causis extrinsecis facientibus
ipso botor, & rubificantibus oculum,
ut à soda adustiua, à sole, puluere & fu-
go & frigore, & propter constrictionem
musculi, &c. De causis antecedentibus loqui-
tur etiam Auic. loc. cit. ibi, Quum ophthal-
mia sit apostema, & omne apostema fiat à
sanguine, vel à phlegmate, vel à melancho-
licis, aut à cholera, aut à ventositate, tunc si-
militer ophthalmiæ causa non euacuatur
vna istarum causarum, &c. Alexā. lib. i.
cap. 23. idem ait, ibi, Considerandum cuius-
modi nodi sit $\pi\epsilon\rho\iota\tau\omega\mu\alpha$, id est superfluum, v-
trum ex humore atrabiliari, sanguineo, bi-
lioso, pituitosoque ortum sit, &c. Lege etiam
Auen. ibi, Et quandoque humor apostemans
generatur in ipso, & quandoque est adue-
niens ei à cerebro, secundum semitam ca-
rrihi, per viam velaminis intrinseci, &c.
lege hunc locum vberius, & plura ad rem

facientia inuenies. Lege etiam Alex. li. cap. 23. ibi, Diligenter prospiciendū est de nam quod redundat in oculos, ex solo capite, an ex vniuerso corpore manet: nam per arteriasne an per venas, siue per vtraque in eum sese locum recipiat, &c. De causa doloris ophthalmiæ loquitur Auicen. Violentia doloris ophthalmiæ aut est propter humorem mordicantem & corrodam tunicas, aut propter humorem plurimum extensiuū, aut propter vaporem grossum, &c. Gal. 12. meth. doloris causas inuenire longo sermone inuestigat, quæ breuiter ita se habent: Omnis dolor aut ob violentiā & aceruatim irruentē alterationem fit, aut ob continuitatis solutionem. Continuitas soluitur ruptione, cōtusione ac corrosione. Hæc verò vel ob distentionem, grauitatem. aut mordacē qualitātē proueniunt. Si igitur nihil extrinsecus sit, quod distendat, grauet & corrodat, tūc distentio ab interno humore multo, aut à flatu concluso, aut à plurima siccitate oritur: grauitas à dura aliqua magna aut graui materia corpori extra illapsa cōtingit, aut ab interno aliquo magno ac graui tumore, mordacis qualitas ex humoribus acerbis ac mordacibus prouenit: alteratio autē per violentiam fit caliditatem aut frigiditatem.

fi

De spirituum siue humorū, siue partium
sedarum: quę omnia in omni dolore con-
granda sunt, vide illum tu vberius.

De signis ophthalmiæ.

Signa communia ophthalmiæ sunt, tu-
mor, grauitas, dolor & rubor. Signa veræ
ophthalmiæ sunt, quum album oculorū in
morem mutatur cū fluxu lachrymarum,
pippitudine in angulis oculorum lachry-
milibus collecta. Signa temporū ophthal-
miæ sunt, si materia ab humore oculi pro-
ueniens, aquea & tenuis fuerit, tūc est mor-
bi principiū: si verò crassescat, & ad album
aduat, erit morbi incrementum: si palpe-
ris, quas Græci βλεφάραι dicunt, adgluti-
æ, erit morbi consistentia, præsertim si la-
chrymarum copia præcesserit: si verò hæc
omnia minuantur, erit morbi finis. Signa
umorum sunt, & primò sanguinis, oculi
rubor & tumor, & venarū plenitudo, tem-
porum pulsatio, dolor potiùs extendens
quam pungens, gramæ & glutinationes
ad somnum fiunt. In biliosa adest pun-
tura vehemens dolorq; adurens & vehe-
ns, rubor oculi paucus, lachrymę tenues
acutæ, quandoq; exulcerantes, & per so-
num non agglutinātur, tumorq; paruus
fitur. In pituitosa adsunt tumor, parua ca-
ditas, rubor ad albedinem decliuus, cum

pauco dolore & multa grauitate, glutinationes iuxta somnum fiunt, & color faciei est albus. In melancholica, dolor debilis grauitas cum offuscatione, exiccatio & perseverantia, paucitas glutinationis minutæ sunt gramæ & paucae lachrymæ. Signa flatuosæ ophthalmiæ sunt, extensio ne grauitate, ruboris paucitas sine lachrymarum fluxu. Signa perturbationis furoris, uitas curæ, & causæ præcedentes, & quantitas apostematis primitiui. Signa, quæ opus fit non per cōsensum, sed per essentiam in capite sunt, dolor capitis præcedens, & uitas, &c. Si à consensu ventriculi præcedat fit vomitus, nausea, &c. Signa fluxus humidorum per partes exteriores sunt, frons extensa, venæ exteriores plenæ, &c. Si per internas, tunc præcedit frequens sternutatio, dolorque ab intima parte oculi, antequam ophthalmia appareat. &c.

Loci consentientes de signis ophthalmiæ.

Signa communia tetigit Gale. 2. de libris affect. cap. 7. ibi, Inflammatis partibus addit ut rubescant, tendantur, renitentur, tumescant, & doleant. vide de his Arculus 9. Alman. De signis veræ ophthalmiæ meminit Razes 9. Alm. ibi, Cum ea, quæ oculis alba sunt, & in rubedinem mutata fuerint, fluxerintque lachrymæ, & in

gus

gis oculorum lachrymalibus lippitudo
 electa fuerit, dicimus tunc ægrum pati
 ophthalmiam: & quanto plus symptoma-
 ta vehementia aut ipsorum adfuerit mi-
 natio, tanto magis erit ophthalmiæ for-
 tudo vel debilitas. Signa tēporū ophthal-
 miæ habentur ex Auic. tertia tertij, cap. de
 ophth. ibi, Cūque palpebræ congluti-
 ri incipiunt, tunc iam maturationis ad-
 propinquitas: dum verò perseuerat flu-
 xus aquosus, est initium adhuc, &c. Vide in
 c. latius Arcul. & Sauo. De signis humo-
 rum loquitur Alex. libro 1. cap. 23. ibi, San-
 guineis cognoscitur, quum sanguineo colore
 facies tincta sint, vultusq; cum rubore suf-
 funditur, receptacula sanguinis plena vi-
 dentur, grauitas sentitur, functiones solitæ
 signiùs perficiuntur, lachrymæ nec mor-
 daces nec acres erunt, &c. Notæ bilis sunt
 liosa complexio, lachrymæ mordaces,
 non solum hirquos, qui à Græci *καυτοὶ* di-
 cuntur, exurentes sedant genas, & quascūq;
 partes attingunt, &c. Auic. loco citato, San-
 guineam ophthalmiam significant color
 oculi, exuberatio venarū, & pulsatio tem-
 porum, &c. Vide fusiùs etiam de aliis hu-
 moribus: & nota quòd Arabes per lippitu-
 ines superfluitatem quartæ concoctionis
 a oculo intelligunt, & quandoque accipi-

tur pro illa humoris parte, quę oculum
 festat vt Razes, & quas vocat Aetius gla-
 nationes & granas. Arabes dicunt lippā,
 De signis perturbationis meminit Auicenna
 ibi, Post dicamus, quod conturbatio
 gnoscutur leuitate sui, & causa sui, & qu-
 titate apostematis, &c. Similiter de
 gnis per consensum & per essentiam,
 Ophthalmiam in capite significat
 la grauitas capitis, & si est cum commu-
 tate stomachi, associatur ei nausea & con-
 turbatio, &c. Signa fluxionum per partes
 exteriores habet Paul. ibi, Fluxiones ex
 caluariam notant vasa in fronte & tem-
 ribus distenta, & caput veluti reuinctu-
 tum quod ex agglutinamentis sicca pra-
 dio sunt. Si haec desint, & fluoris impe-
 prorogetur, & sternutamenta nonnunquam
 molestè eliduntur, humorem sub cal-
 contineri censendum est. Itidem ait A-
 cennas, Si via fluxus à cerebro ad oculum
 non est nisi per velamen extrinsecum, tu-
 frons est extensa, & venæ exteriores sunt
 plenæ, &c.

De cura perturbationis.

Perturbatio per eius causæ ablationem
 curatur, & si quid doloris remanet, per
 terationem in contrarium reicitur. Na-
 impressio calidi per frigida, frigidi per
 ca

cida facillè remouetur, &c.

De cura veræ ophthalmiæ.

Quinque in cura occurrunt scopi, videlicet victus ratio, reuulsio & deriuatio, humorum præparatio, euacuatio, & symptomatum ablatio. Victus sit in principio parus, boni succi, facillè concoctilis, vitentur acetosa, salsa, coitus, motus, potus vini, præsertim in principio: laudantur somnus, aër obscurus, alui excretio assidua. Reuulsio & deriuatio fient per sectionem venæ saphe-
re cõmunis & cephalicæ ab eodem latere, præsertim si plethorica fuerit dispositio. Et etiã per frictions à supernis partibus ad infimas descēdentes, vel per cucurbitulas vel per clysteria & pilulas soluentes, vt scilicet azes. Præparatio humorum fiet in calido humore cum frigidis tenuem humorē intrassantibus, vt cū syrup. de papauere rosa-
leo iuiubino, de granatis, &c. In frigido, in calidis vt rhodomelle, oxymellite simplicis, &c. Euacuatio perficitur rursus vel per sectionem cephalicæ eiusdē lateris, vel per soluentia pharmaca: soluunt humorem calidum pilulæ aureæ aggregatiuæ, electuarium de succo ros. Decoctum myrobalanorum, citrinorum, cassia, manna, rheubarb. Soluunt frigidū pilulæ chochię, diaturbit, diaphinicon, electuarium indum, cõfectio
ham

hamech,&c. Ablatio symptomatū comp-
tur doloris causam auferendo,& cum ai-
dinis mitigando, & ad leuia stupefaci-
tia vsque perueniendo,&c.

De cura locali ophthalmiæ.

Cura localis triplex est: prima repe-
lendas materias ad oculum fluentes cum frigide
stypticis, vt oculus nō recipiat in principio
morbi. Secunda est repulsio admixta resolu-
tioni conueniens augmēto & statui. Ter-
tia est pura resolutio conueniens postremo
status parti & declinationi. Exempli gra-
tia, primò ophthalmiæ calidē apponatur
buben ouī cū aqua rosacea: in secūda par-
te principij sief, album sine sarcacolla: in ter-
cio augmento sief, album cum sarcacolla: & ta-
dem addatur aliquid aque fœniculi vel co-
ctionis fœnugræci, melliloti ꝯ citoni-
rum,&c. Commendantur etiam in resolu-
tione balneum & merum, &c.

Loci consentientes de perturbatione

& vera ophthalmia.

Aet. ser. 7. cap. 3. Perturbationes oculo
facillimè curantur, si æger à causa læden-
discedat, vt à sole, fumo, & alio simili,&
Auicē. in cura conturbationis & ophtha-
miæ leuis, quæ cursu eius procedit. Suf-
cit quandoque causæ abscissio, vt si fuerit
repletionē sanguinis, aut alterius humor
cu

en euacuatione, &c. Lege hūc locum fu-
 is. Pau. loc. cit. Facillimè discutitur, si ob-
 fuentur omnia, quæ foris accidentia lu-
 n perturbare possunt, item parciore ci-
 b& aluo de facili respondente, &c. De vi-
 Es ratione in vera ophthalmia loquitur
 A. ser. 7. cap. 8. ibi, Alimenta danda sunt
 lia, concoctu facilia, & ad digerendum
 vtri commoda, vrinam ciētia, nihil acre
 & alsum habentia, aut crassi humoris, &c.
 Item ait Auic. tertia tertij, Causa est cō-
 mnis in regimine ophthalmiæ, materia-
 est minoratio cibi, & ipsius exiccatio,
 electio eius quod generat humorē lau-
 bilē, & alienatio rei quæ est malæ dige-
 tionis, & alienatio coitus, & motus, & po-
 vini, & comestionis acetosi & falsi, &c.
 Similiter & Paul. lib. 3. cap. 22. adserit. ibi,
 In initia conuenit nihil assumere, &c. De
 mulsione & deriuatione locum habes in
 Aicenna ibi, tertia tertij, cap. 10. Quod si
 materia fuerit sanguinea, adhibebis ven-
 tas post phlebotomiam, & assiduabis fri-
 ctionem extremitatum, &c. Et cap. 9. In-
 rdum administrentur caputpurgia, &
 æ per nares materie partē extrahūt, &c.
 uulus lib. 3. vbi πρὸς ἐπιφορὰν ῥαίματα agit,
 ost generales, inquit, corporis euacuatio-
 es, medicamentorum vsus est, quæ per na-
 res

res atque os pituitam eliciunt: caput etiam
 attōdetur, & incisa cute exasperabitur. h
 etiam spectant quas in capite *χρησγίας* &
 ministramus *ἀγγολογίαν φημι καὶ ἀρτηρι*
μίαν ὑποπλάσσειν τε καὶ περισυφισμὸν, καὶ κ
σιν καὶ ἄλ καὶ κορυφῆς ἕως ὀπίωρ, καὶ σικύα κα
τὰ τὸ ἰνὶ μετὰ ἐκχαράξας. reuellere scili
 possunt impetum floris, &c. De hum
 rum præparatione loquitur Mes. capite
 ophthal. ibi, Quinta res est alteratio &
 gestio eius quod est transmissum, & int
 ligitur tam de extrinseca, quàm de intr
 seca alteratione. vide in hoc casu Arc
 Cati. Gord. &c. De euacuatione, quam e
 dicatiuam vocant, meminit Aet. ser. 7. c.
 8. ibi, Vbi oculorum distēsiō fuerit, & m
 tus rubor, & ad contactum resultus, &
 dor, & lachryma multa & calida, tūc sed
 venæ adhibenda erit, humeralis appel
 ta, ita vt animi deliquium succedat, q
 dolor eximatur, & feruor inflammation
 extingatur, &c. Aet. cap. 9. Si verò vniue
 sum corpus humoribus vitiatis fuerit
 fertum, tunc iuxta redundantem & af
 gentem humorem euacundum. Nam si
 tuita magis aquosa redundauerit, exhi
 pharmacū ex euphorbio, & sic de reliqu
 Auic. tertia tertij, cap. 9. Et oportet, si fue
 ophthalmia vehemēs, vt fiat phlebotom.

ut nequo timeatur lipothymia. Et paulò
post, Si egritudo sit chronica, tunc faciēda
est phlebotomia ex lachrymalibus, & phle-
botomandæ sunt ambæ arteriæ, quæ sunt
in aures, &c. Et si materia fuerit choleri-
ca uacuibis post phlebotomiam cū eo quod
deicit choleram, &c. Et cap. 2. In ophthal-
mia frigida oportet ut euacuetur humor
crassus, & quandoq; necessarium est rei-
ficare, &c. De ablatione symptomatum ha-
bet Paul. cap. 22. Interdum semen papauē-
tis ad leniendum dolorem miscetur, si ma-
gis necessitas doloris est, etiam pauxil-
lus adhibetur. Auic. loco citato, Et quan-
tumque doloris vehementia facit necessa-
rium in stupefacientium adhibitionem, sicut
in succi pomorum, mandragoræ, lactucæ,
maueris, & aquæ sumach &c. Similiter &
Galen. c. de ophthalmia inquit, ibi, Sextam
etiam complent administrationes medici-
næ dolores sedatiuarum, &c. Hippocr.
apud. 6. aphor. 31. Dolores oculorum meri-
to aut balneum, aut venę sectio, aut me-
dicamentum epotum soluit. B. Intellige
quod ad remouendum dolorem oculorum
a pharmaco soluente indigēt, alij sectio-
ne venæ, alij fomento, alij potu vini, prout
eum exigit dispositio: non enim omnia
hæc auxilia eidem homini adhiberi iu-
bet.

bet. Competit vini potus, quum vt cras
humores attenuet, & interdum transmutet
& euacuet, tum quia facit vt somnus c
cilietur, & sic per accidens dolores sec
Balneum competit, etiam si dolor tume
molli & laxo, vel à fluxu calido minus
ret: balneum enim partim dolorem ren
uet, partim signū est rei demonstratiuū
Quòd verò sectio venæ dolorem sedet
purgatorium pharmacum, iam mani
stum: nam remouendo causam, dolor i
etiam remouetur, idcirco in ophthalmia
vnicus tantum erit medendi scopus, vt s
licet inflāmatio remoueatur, quæ nec an
ueri poterit, nisi causa, à qua dependet,
ipsa auferatur: hoc autem fiet per vent
solutionem ac venæ sectionem, &c. De cu
locali loquitur non solum Mes. sed & G.
& Paul. Mes. cap. de ophthal. In princip
morbi repercussiuus vtēdum, in quibus
facilitas: deinde resolutiuus, ita vt perueni
tur gradatim, & cum successione paulatim
ab eo quod est repercussiuum vsque ad r
solutiuum. Gal. 4. de compos. med. per lo
cap. 2. Adhibenda sunt pharmaca repul
ria non exasperantia, id est, non veheme
tē sortita adstrictionem, sed quæ tum pr
pria sua substantia sunt moderatiora, tu
lenitiui liquoris, &c. Auicennas tertia te

cap. 10. Quúmque repuleris materiã per
 acuationem & attractionem & apocru-
 sca, tũc gradatim tendas ad maturatiua,
 sint in primis mixta apocrusticis. Est
 ergo cõueniens in primis eorũ commissio
 in aqua rosacea, & aqua fœnigraci est
 bona maturationi, sedatiua doloris, & est
 maturatiuo dignior, & non est in ipsa at-
 tractio. Postea trãsi ab his ad decoctionem
 melliloti, in qua sit dissoluta sarcacolla
 cocta, nutrita in lacte mulieris & asinæ:
 quúmque descẽdere inceperis, adde in ad-
 ministratione resoluẽtiũ, quod sit fortius,
 sicuti sarcacolla in aqua fœniculi vel fœni-
 graci, & administra balneum, si sciueris
 cerebrum esse mundum, & da in potu post
 cibum per aliquas horas aliquid vini anti-
 ci puri in parua quantitate &c.

Observationes in ophthalmia.

Gal. 4. de compos. med. per loc. cap. 2.
 manifestum est omnia pharmaca huiusce-
 modi affectionẽ curantia sub communem
 omniũ inflãmatorum curationem cadere,
 sumerẽque necessariò quidpiam pro par-
 te ipsius natura, quæ excellẽtem mollitiẽ,
 ad hoc vt lædatur aptitudinem, super
 omnem totius corporis cutem nacta est,
 propter sensus subtilitatem & substantiæ
 raritatẽ, &c. Auic. loc. cit. cap. 9. Et peni-

z.

tus oportet, vt non sit in medicina admi-
strata in oculo & propriè in ophthal-
miasperitas, nec qualitas saporis acetosi
acuti. Et paulò infra, Et oportet vt patiens
ophthalmiã vel rheumatismos ad oculum
deuinet inunctionem capitis & destilla-
nem alicuius olei in aurem, &c.

*Observationes de percussione
in ophthalmia.*

Aet. ser. 7. cap. 4. Quicumq; oculi sec-
undum naturam venas amplas habent &
guine plenas, itẽ qui glauci sunt, omnes
non ferunt collyriorum adstrictionem,
quoniã repellentia oportet vt sint frigida
& styptica. Vnde fac percussiva, ne
oculũ in frigidatione in frigident, quia oculi
congelascunt, & visum auferunt. Secundo
fac vt oculum roborent. Auic. loc. cit. t. 1.
oportet in quantum possibile est, vt re-
detur collyriorum administratio vsque
ad tres dies, & sufficiat regimen prædictum
ex euacuationibus & attractionibus me-
dicamentorum ad extrema, &c. Et paulò inf.
Oportet vt in principio non administre-
tur inspissatiua fortia, & quæ sunt vehemen-
ter styptica, quoniam inspissant tunicas
prohibent resolutionem, & magnificam
dolorẽ, & propriè cum dolor fuerit fortia
&c. Hoc idem confirmat Aet. ser. 7. cap.

ib

si, Repulsoria collyria quum sint ferè
 ribus frigidiora, obstructionē & corpo-
 rum cōdensationē faciunt: & dum humo-
 rum materias concludūt, maximas inflam-
 mationes & graues dolores inducunt, &c.
 Intellige obstructionem fieri, si materia
 in oculo contenta fuerit frigida: nam in
 lida & tenui corrodeute maior audacia
 fit in administratione stypticorū, inquit
 Auic. Imò non est malum apud me, inquit,
 si opio: ipsum enim sanat celeriter. vel
 intellige repulsoria esse mala, quotiens-
 inque materia ex velaminibus intrinse-
 cis ad oculum fluxerit, vnde Auic. Quum
 initium est ex velaminibus intrinsecis, cu-
 ra est difficilis. lege Paul. & Mes. de hac re
 lura loquentes, &c.

*Observationes de lacte adhibendo in
 dolore ophthalmico.*

Aet. ser. 7. cap. 10. Qui lac pro oculo infun-
 unt volentes dolorē obtundere, decipiun-
 tur. Nam lac à caliditate in dolore præter
 naturam facile alteratur, & acrius eua-
 nit, vnde per paruo solatio diurnam
 affectionem propinant, &c. Auic. loc.
 cit. Non est conueniens, vt dimittatur
 destillatio lactis in oculo tempore lon-
 go, imò oportet vt remoueat & renoue-
 tur omni hora, &c.

Observatio de resolutiuis.

Auic. Resolutiua in principio ophthalmiæ vehementer deuota, & oportet vt intendas ante omnia ad mundificationē lipitudinis cum facilitate, & nō noceas oculo, &c.

*Ophthalmiæ nocentia & visum
debilitantia.*

Nocent oculis acetum, amyllum, fumus argenti viui, semē canabis, folia castaneorum, caules, coriandrum, crocus, lac, lactuca, oliuæ, opium, oximum, pisces, portulaca, & quæcunque his versibus ioci grati annotauimus.

*Hæc oculis multum, sol, puluis, fumus & aestus
Ventus cum fletu, vina, venúsque nocent.*

Acrida ne mandes, nec quæ sint plena vaporum,

Nec cepa, lentes, allia, porra, fabas.

Zoar. primo, thesir tract. 8. cap. 21. inquit capita gallinarum à proprietate causant excitatem. Item damnat carnes siccas, salsas, pinguedinem crassam & viscosam, & propriè porcina, superfluumque animum & corporis laborem, &c.

*Ophthalmiæ curantia & visum
roborantia.*

Valent ad ophthalmiam, absinthium
aloë.

oēs, flomos, verbena, camphora, album
 ci, psyllium, opium, rosa, sarcocolla, mel-
 litum, fœnugræcū, semperuiua sumach,
 ptulaca, Sief album Mes. puluis albus
 hly. 21. anti. emplastrum ex pomis co-
 cīs, zucharo, & aqua rosacea, addendo ali-
 cid camphoræ. vide Montagn. cōsi. lxiiij.
 de etiam Varig. tract. 3. cap. 8. Itē Gord.
 uon. & Arcul. & c.

De prognosticis ophthalmiæ.

Hip. aphor. 6. aphor. 17. Lippientem alui
 posfluio corripit bonum. B. Quia humo-
 rum abundantia euacuatur simul, & ad in-
 feriora retrahitur, dans nobis exemplum,
 in lippitudinibus aluum nos quoq; sub-
 iacamus. Auic. Et ophthalmia est velocio-
 ris status, in qua lachrymæ magis currūt,
 quæ acutiorem habet mordicationem,
 tardioris, quæ est magis sicca. B. Cogno-
 scitur an longo vel breui tempore sit lip-
 pitud duratura, aut à multitudine mate-
 riæ ad oculū fluente, aut ab oculi imbecilli-
 tate, aut à viarum latitudine, quasi longo
 trauerit tempore, vlcerationem vel ocu-
 linteritum pronunciat. Hipp. aphor. 3.
 aphor. 12. Si hyems australis & pluuiosa
 fuerit, & c. Et in fine, Lippitudines siccæ
 sunt, & c. Lege insuper aphor. 13. & 16. &
 eiusdem lib. 3. Auic. loc. cit. Si initium

ophthalmiæ erit ex velaminibus intrinsecis, cura est difficilis, & omnis ægritudo quæ sit per communitatem velaminum exteriorum est magis salua, &c.

Authores dissentientes circa morbos oculorum.

1. Adferere, visionem fieri extra mittendæ & non intus suspiciendo cum Platone
2. Adferere, sectionem venæ non conuenire in omnibus ophthalmiæ speciebus
3. Adferere, in doloribus oculorum stupor facientia esse valde utilia.
4. Adferere, balneum in ophthalmia minime prodesse.
5. Adferere, oculos esse cõplexionis ignem quum maximè luceant.

Confutatio dissentientium circa morbos oculorum.

Ad primum respondet Aristot. in lib. 1. sens. & sensa. quòd impossibile sit, fieri extra mittendo probat. Præterea Auer. 3. cõlig. Si visio, inquit, fieret extra mittendæ sequeretur quòd in obscuro videretur, cut in luce, neq; lux vt mediũ, neq; reth nec tunica opus essent in videndo, neq; destructo aliquo istorũ visus destrueretur. In his vide Arist. loc. cit. interrogantem Empedoclem, quòmodo visus extenderetur usque ad astra, si quid corporeum foret
que

quod ab oculis emittitur. lege de his fu-
 Conciliatorem different. 64. & c.

Ad secundum: Auic. tertia tertij, cap. 9.
 Ephlebotomia ex cephalica est conue-
 niens omnibus speciebus eius. Item Ra-
 9. alman. cap. de oph. In principio cu-
 rationis minuenda est semper cephalica:
 quanto fortior fuerit ophthalmia, tan-
 plus est minuendum de sanguine. Ita-
 en ait Mes. Et sic in omni specie conue-
 rt, si nō ratione euacuationis, saltem ra-
 tione diuersionis, & c.

Ad tertium: Gale. aphor. 6. commen. 31.
 Stalia sint debilia, tunc fluxiones non re-
 munt vehementes: si verò sint valde stu-
 pefactia, vt ex eis maximam oculi in-
 flammationem non sentiant, tunc neces-
 sarium est, simul vim visoriam offendi, ad-
 quod cessante inflammatione vel debi-
 ler vel nihil omnino videant: simul au-
 tem & quādam præduram dispositionem,
 æ difficulter sanari possit, in oculorum
 micis derelinqui, & sic per Galenum nul-
 modo sunt vtilia.

Ad quartum: Gale. eodem comment. Se-
 trissimum est fomentum, & omnino ali-
 quam afferens vtilitatem, vel tanquam si-
 num ad cognitionem, vel tanquam causa
 unitatis. Nam si nihil influit omnino in

oculos fomentū, cōtentā in ipsis superfluatē dissoluens, sanitatem restituit: si vō adhuc influit, suo calore affert aliquod uamen, & paulò pōst dolorem auget, & fit signum dignoscitium, & sic vtroque modo summopere confert, vt Gal.

Ad quintum respondet Arist. de sensu. & quinto de generatione animalū dicēs, Quòd oculus est cōplexionis aqua, quia aqua est impressiōum susceptibilis, nec potest esse ignea, quum ignis nimis agitetur, & de facili resoluatur, nihil per retinens. Igitur non complexionis igne verūm oculus, quoad eius spiritus naturae ignis obtinet, sed in ipso simpliciter donatur aqua. Nam cōstat, quòd tactus & gustus terrae attribuuntur, oculus aquae, auditus aëri, olfactus igni: ex fumali enim vaporatione perficitur, quae ignea esse perbetur, &c. Lege tamen de hac re Concil.

De oculorum suffusione.

Affectus, qui à Latinis Suffusio, à Græcis *καύχυμα*, ab Auic. aqua, à vulgo cataracta citur, est inter crystalloidem & cornea circa pupillam humoris aquei concretio quae vbi perfecta fuerit, visum impedit. Hanc aliqui cum glaucomate idem putarunt sese decipientes: nam hypochyma sicuti est aquosi humoris concretio, i
glau

quoma est naturalium humorum in ceterum colorem mutatio. Præterea in glaucinate nil prorsus, in suffusione aliquantum cernitur.

Loci de suffusionis descriptione.

Gal. lib. finit. med. Suffusio est humoris viscosi inter crystalloidem & corneam concretio. Aet. ser. 7. cap. 51. Suffusio est præterfusio humorum circa pupillam congelatorum, ut ubi perfecta fuerit, visum impedit, &c. Paul. lib. 3. Hypochymata humorum dicimus effusionem, qui inter tunica ceratoidem & crystalloidem concreta impediunt. Auic. tertia tertij, ca. 18. Effusio aquæ est ægritudo oppilativa, & humiditas extranea, stans in foramine inter humorē albugineū, & syphac, & corneam. Quare prohibet penetrare foras ad visum. B. Aduerte quod una & eadem infirmitas est cataracta, suffusio, aqua, gutta, & imaginatio apud Arabes. In hoc nomen differunt, quia imaginatio est tanquam suffusionis principium, in quo id videtur imaginamur, quod verè non est: Aqua verò & gutta est, quum in modum aquæ vel guttæ suffusio videatur. Nam dum currit, & in cōpressionē digiti dispergitur, aqua dicitur: dum verò firmari incipit, gutta: at quum iam dudum firmata est, vocatur cataracta.

taracta. Aet. loc. cit. Glaucedo est crystal-
 ni humoris in caesium colorem mutati.
 Iridem ait Paul. loco nuper cit.

*De causis suffusionis & eius
 speciebus.*

Cause vel fiunt primario affectu in oculi
 ex nutrimento huius partis non bene con-
 so, aut superfluitate nutrimenti non resolu-
 ta: vel fiunt per consensum capitis humi-
 ratem hanc ad oculum transmittentis, vel
 vaporibus oris ventriculi ad oculos ele-
 tis: deinde à frigiditate oculorum in humi-
 ditatem conuersis. Species suffusionum varia-
 tur in quantitate & qualitate & loco. In
 quantitate, quia interdum tantæ molis est
 ut integram in oculo obstructionem pariat
 interdum tam parua, ut non totum lumen oc-
 cupet, sed per partem res videantur: inter-
 dum etiam ita crassa est, ut nihil in lumine
 comprehendatur, interdum adeo subtilis &
 tenuis, ut res quidem, sed veluti sub nub-
 cernantur. Ambae hæ curam non admittunt
 cum acu, sed tantum quæ inter has species
 media quodammodo fuerit. Species in qua-
 litate sunt multiformes ratione coloris.
 Nam quædam aëri, quædam vitro sunt similes.
 Aliæ sunt albæ, aliæ virides, aliæ flauæ siue
 citrinæ, &c. Differunt loco, quia aliæ fiunt
 in tunicis, aliæ in humoribus. In tunicis
 quum

cum aliquod vestigium siue occultum siue manifestum ab ophthalmia vel ab alio morbo relinquitur, vel quum adeo crassescunt, ut non impediatur. In humoribus, quum vel eum substantia fiat humiditas aquosa, vel eum complexio colorem inalteret, & nutrimentum transmutet, &c.

Loci consentientes de causis &

speciebus suffusionis.

Gal. 4. de loc. aff. cap. 2. Sunt & alij oculorum affectus, quibus ei per consensum inueniunt, unde subdit; Igitur accidētia suffusorū visis similia videntur, oculis nulla propria affectione molestatis, sed aut oris ventriculi, aut cerebri cognatione id accipere solet, &c. Et 1. de loc. affe. cap. 2. Accidit nonnunquam, ut efficiens causa pertransiens non firmum in particulam faciat effectum, eluti quum suffusioni similia quadam oculi imaginantur, collecto in ore ventriculi reui excremento, unde vapores quidam subleuati, deinde circūuenti à visifica facultate similes imagines mouent, quales per suffusiones apparere consueuerunt: idque maxime solet euenire iis, quibus oculorum humor exquisitè purus est, aut visifica facultas quam facillimè sentit. Et 3. de loc. aff. cap. 1. Itaque affecto stomacho oculi similibus infestantur casibus, quales in suffusion

fusionibus apparere solent: dicendum illos pati, elato ad cerebrū ab humoribus in ventriculo cōtentis, fumoso quopiā pore, &c. De his lege etiam in fine cap. eiusdem lib. & quomodo cōsensu fiat, telliges. Gal. 4. de sympt. cau. cap. 2. Fac-
tas visifica offenditur, vel nervo ad oculū descendēte affecto vel cerebro, &c. lege-
sius totum hoc caput. De speciebus fus-
sionum loquitur Gal. 4. de sympt. cau. c.
2. ibi, Haud aliter accipienda sunt ea, q.
de aquosi humoris quātitate, substantia
colore diximus, &c. Auicen. tertia tert.
cap. 18. Et ipsa quidē diuersificatur in quā-
ritate & in qualitate. In quantitate qua-
doque est plurima, & oppilat totum for-
men, & nō videt oculus aliquid: & qua-
doq; est pauca, quia oppilat partem eius,
dimittit partem detectā, &c. Gal. in lib.
ocul. cap. 12. Huius color aquæ est diue-
sus: quædam enim acri aëri, quæ vitro al-
milatur, alia est quasi alba, &c. Itidem a
Aet. ser. 7. cap. 51. Auicen. loc. cit. Diuersi-
in qualitate quandoq; est in essentia, quon-
niā alia est subtilis & clara, & alia est cra-
sa valde: & quandoq; est in colore, quoni-
alia est aërei coloris: alia alba, & est mai-
garitalis, &c. Gale. 4. de sympt. cau. cap. 2.
quod alia per locum affectū, fiat diuisio, de
monst

monstrat, dicēs. Vnus affectus ad tunicam
 ipam rhagoiden spectat, alter ad humorē
 tuē effusum, qui inter crystalloiden &
 rhagoiden medius existit. Quod etiā intel-
 lendum est de ceratoide: vnde paulò in-
 fradferit, quòd si ceratoidis tunica cras-
 sius densiorq; fuerit, hebetem efficit acie:
 si rō humidior ac densior, non hebetem
 sed obtusumq; reddit visum, verum etiā
 eicit, vt qui sic affectus est: putet se per te-
 nebras, aut nebulā, aut per fumū res ipsas
 inueniri, &c. Itidem ait Auic. ibi, cap. 9. Nā
 a existit in tunicis, aut in humoribus.
 Quæ existit in tunicis, est, vt sit super tuni-
 cam corneā vestigiū occultum valde, quod
 transit à variolis aut ophthalmia, &c.

De signis suffusionis.

Signa præcedentia sunt, vt qui sic affe-
 ctus est, veluti quædam caliginosa, vel par-
 uis culices, vel fumosa, & nebulosa videre
 deatur, aut circa lucernas circulos vel du-
 plex lumen se intueri arbitretur: quæ ima-
 ginationes variantur in quantitate, quia
 parua vel magnæ: in essentia, vt crassæ, te-
 nues, occultæ: in situ, vt raræ, densæ, nebulo-
 sæ: in figuris, vt sunt granosæ muscosæ &
 pillares, &c. Signa absolutæ suffusionis
 agnoscuntur ab artis perito, & per longitu-
 dinem temporis: rarò enim pertransit sex
 mens

mens, similiter signa colorum per se manifesta inspicienti apparent. Signa ipsius obstructionis cognoscuntur in computatione oculi: nam si statim aperto oculo deatur diuidi, ac in partes separari, tunc suffusio subtilis valde: si verò nullo modo moueatur, sed in se remaneat, erit crassa densa, nec per acum ambæ admitti poterunt: si verò dilatari, sed non in partes diuidi videatur, ea est quæ per acum curam incipit. Signa loci obstructionis cognoscuntur, si clauso altero oculo pupilla alterius aperti dilatetur vel constringatur, indicat non esse obstructionem in viis spiritibus, per quas ab vno in alterum fit transitus, & hoc præsertim, quum maxima ac crassissima non fuerit suffusio. Cognoscitur etiam esse inter pupillam & ceratoidem, si pupillæ visio impediatur. Signa quæ fit per consensum sunt, quia si à toto, sunt febres, ad quarum augmentum suffusiones augentur, & ad earum recessum declinant: si à stomacho, aucta stomachi nulla dispositione crescunt, & remota remouentur: vel si in utroque æqualiter occurrat apparetio fuerit, tunc cataracta erit ex consensu stomachi: si verò fuerit in vno tantum oculo, vel in utroque, sed diuersimodum, erit ex cerebro &c.

*Loci consentientes de signis**suffusionis.*

Aet. ser. 7. cap. 5. 1. Præcedentia signa sunt
luti culices parui, caliginosa quædã ocu-
li sæpe obuersari videntur, quidam pili-
taria vident, alij vt lanarum flamēta, aut
anearum texturas, aut circa lucernas cir-
culos: dū verò augetur affectio, augētur &
illa accidētia, &c. Auicē. tertia tertij, ca. 19.
Signa portendentia aquam sunt imagina-
tiones prædictæ, & quod accidit cum eis cō-
tributio sensibilis, & quod imaginantur
res luminosæ, sicut candelæ duplices. Et ca-
pit. 9. Imaginationes diuersificātur in quā-
litate, & sunt parvæ vel magnæ: vel in sua
essentia, & sunt grossæ, subtiles, &c. De si-
gnis obstructionis an sit curabilis, loquitur
Alexā. ca. de aqua, ibi, Quando passio
erit confirmata, & fuerit curabilis, signū
est, quod dum aspicitur oculus, vel pupil-
la videtur clara, & cedit dilatationi, cū pre-
mitur digito aut instrumento, deinde re-
vertitur ad ipsum & non frangitur, &c. Auicē.
tertia tertij, cap. 18. Et illa quæ magis susce-
ptibilis curæ ex parte essentis est, subtilis:
nam cū eam conspexeris, & super ipsam
digiti tui compressionem feceris, sepa-
rabitur velociter, deinde redibit & aggre-
gabitur. Pau. lib. de occu. ca. 2. Quando ca-
taract

taracta sit curabilis, sic dignoscitur: Si
 oculo clauso pupilla alterius dilater
 possibile est sanari: sin autē, minimē. C.
 sa, quia nervus concauus, quo visibilis s
 ritus ad pupillam ducitur, oppilatus est
 sic signa habes loci obstructionis. Hoc
 habes ex Auic. loc. cit. ibi. Inter aquā &
 pilationem intrinsecam distat, &c.
 signis per consensum loquitur Gal. 4.
 loc. aff. cap. 2. ibi, Distinguendum vtrum
 cerebro, an à ventriculo hæc affectio p
 ueniat primū ex eo, quod alter ocul
 vel vterque similiter visis occupetur: n
 si vtriq; oculo hoc accidat, affectus erit
 ventriculo. Distinguendum etiam est
 tempore: nam si per plures dies vel mens
 suffusionis accidentia apparuerint, & n
 tenebrosū in pupilla videatur, tunc
 ore ventriculi affectus procedit: sed si
 petuō hæc apparitio perseverauerit,
 aliqua suspicio sit ex ventriculo, tunc
 essentiam morbum intelliges, maximē
 vna pupilla altera sit turbidior, idque n
 gis, vbi sumpto ex aloe medicamēto nū
 variauerint, &c.

De cura suffusionum.

In cura suffusionis diuersæ sunt inte
 riones, quarum prima est, quod si à vent
 culi imbecillitate proueniat, roboratice

ing

stringemus, si multitudine pituitæ in eo cõ-
 tita, præparatione & euacuatione, deinde
 oculi roboratione, vt ne quid suscipiat, &
 seceptũ resoluatur ac exiccetur. Ac si suf-
 fusio à cerebro vel vitio oculi prouenerit,
 confirmata non nisi per manualementem opera-
 tionem curam admittit, non confirmata
 autem pullulans quinq; mediis auferetur,
 scilicet regimine sex rerum non natura-
 rum, humoris præparatione, euacuatione,
 reuulsione ac deriuatione, exiccatione &
 resolutione. Viçtus ratio erit, donec mor-
 bus transierit, attenuatoria, nam pisces &
 crassi nutrimenti, & quæcunq; flatuo-
 sos vapores pariunt, & humectant ac re-
 solunt, fugienda sunt, vinum pariter, & coi-
 uentus, & balneũ, & aer humidus vitetur. Pro-
 prium hydromel cõuenit. Humoris præpa-
 ratio quoniam plerunque ortum habet à
 pituita, idcirco cū orymellite simplici & cõ-
 cito, cum syrupo de stechade, rhodomel-
 le & cum decoctis fœniculi, rutæ, euphra-
 se, betonicę, stechados, rosmarini, & simi-
 lium perficietur. Euacuatio primũ per se-
 cõnem venæ si corpus fuerit plethoricũ,
 si minus, cū phlegmagogis, vt pilulis cho-
 cis, sine quibus lucis Asatãreth. 7. de aga-
 ro, cum electuariis & simplicibus, vt plu-
 res repetitũ est. Reuulsio & deriuatio fient

A

cum-clysteribus nascalibus, masticatorum,
 narifusoriis, cū cauteriis, cucurbitulis,
 tremarū partium frictionibus, aut balneis
 extremis partibus adhibitis, &c. Resol-
 tio suffusionis & vaporum tam per intra-
 seca, quā per extrinseca paratur. Intra-
 seca erunt electuaria, inter quæ lau-
 confectio humani à Mes. Item triph-
 myrobalani conditi, & alia multa, quæ
 cœna comeduntur. Extrinseca multa sūt
 adsterforia, quæ suffusioni quadrant, quæ
 lis est aqua mellis stillata more chymii,
 aqua freniculi, ruta, euphrasie, serapini
 in vino granatorum dissolutum, pulvis
 ruidinum, urina infantis, & collvrium
 fellibus Razis, & alia multa quæ infra
 notabuntur.

*Loci consentientes de cura
 suffusionum.*

De cura per consensum ventriculi le-
 Arcul, Marc. Catin. Gord. & cæteros præ-
 cantes. Habes insuper Galeni authoritatem
 de dolore capitis per consensum quæ
 hunc locum reduci potest. De operatione
 manuali, quoniam quid agendū foret non
 expressimus, nunc autoritas Avic. ter-
 tertij, ca. 20. satisfaciet, quæ talis est. Quæ
 voluntas adest ut fiat cura cum instru-
 to, permittitur habēti aquam, ut nutrian-

p

cibis recētibus & cibis humectatiuis, &
 aminiſtre ex eis aliquid, quod reſiſtat no-
 nento aquæ, & præcipiatur infirmo aſpi-
 re ad lachrymale domeſticum, & ad na-
 ſum, & conſeruetur iuxta illam figurā: nec
 iuxta fenestram vel in loco vehementis
 luminis, & perforet artifex cum acu. & va-
 det inter duas tunicas, vſquequo ſit coram
 ſtamine, & deponat cataractam, nec depo-
 ſitum ceſſet, vſquequo oculus clarificetur.
 ſimque curam cum inſtrumēto operatus
 erit, pone ſuper oculum vitellum oui cō-
 caſſatum cum oleo violaceo, & dormiat
 per collū tribus diebus in tenebris, &c.
 vide eum tu ſuſius. Et nota quòd triplex
 cura iuxta chirurgos: prima ſit cū acuta
 rrea vel plumbea incuruata: ſc cūda cum
 u acuminata incuruata, quæ dum ſuffu-
 ſioni ſuperponitur, eam in vacuum extra-
 hit: tertia cū cauteriis circa frontem ſuper
 culū læſum, ita quòd abſeindatur fluxus
 exiccetur ſuffuſio. De his vberius legere
 poteris Placentinum Arnaldum & Guido
 nem, lege etiam Paul. lib. 6. cap. 21. vbi de
 hac manuali operatione pertractat vberri-
 mē. vide etiam alios practicanes, &c. De
 iſtus ratione loquitur Auicen. tertia ter-
 tii, cap. 11. Et oportet vt viter piſces & ci-
 ſos ingroſſantes & vaporatiuos & potum

plurimum aquæ & vini, & frequentia pe-
botomix & ventosarum, &c. Et cap. 19.
caueat habens eam repletionem vinum
coitum, & sit cōtentus comedere semel
meridie, & fugiat pisces, & fructus, & ca-
nes grossas, &c. Aet. ser. 7. capit. 5. 1. Dia-
omnis sit attenuatoria, à vino abstinēdu
est per totam curationem, & ab omni
replentibus caput, &c. Razes 9. alman. i.
dē habet, ibi, Non comedat pisces, nec o-
nia quæ humectare possunt, sed æger ex-
lesactivis & exciccatiuis nutriēdus est,
dromel propterea in potu exhibendu
est, &c. De humorū præparatione loca n-
adducam, quum iuxta Arcul. Gord. Sau-
na. & Marcū Catin. valde pateant. De eu-
cuatione, Aet. ser. 7. cap. 5. 1. inquit. Curā
sunt qui suffusione tentantur in princip
sanguinis detractioe ex cubito, &c. Pau-
lib. 3. cap. de glan. Suffusione tentatis si-
curremus sanguinis ex cubito detractio-
& purgatione, euacuationibus acriorib
Auicē loc. cit. Oportet vt incipias & m-
difices corpus, & propriè stomachum: d-
inde deuenias ad mundificandum caput,
scias quòd hiera picra est mirabilis iuu-
menti in eis, & similiter pilulæ aureæ,
medicamenta, in quibus ponuntur centa-
rea, & cucumer amarus, &c. Razes simil
te

ait 9. alman. tribuem pilulas cho-
 las, &c. Mesu. cap. de aqua. Quando est
 in principio, & non est confirmata, suc-
 curitur ei cum medicinis, & cum mundi-
 ficatione sæpius reiterata, & propriè cum
 cichis, hiera picra, & hiera colocynthi-
 da, &c. De reuulsione & deriuatione plu-
 ribus ex Act. ser. 7. cap. 51. ibi, Et si ni-
 hil impedit, etiam clysteribus acrioribus
 purgatione utemur: deinde cucurbi-
 na occipitis affigenda est cum scarifica-
 tione, & pituitam per os trahentibus na-
 ratorijs, &c. Auic. tertia tertij. cap. 2.
 Inde mundificandum est caput cum gar-
 gismis, & caputpurgiis, & masticationi-
 bus, & dicitur quòd appositio sanguisu-
 grum super tempora confert in initio
 morbi, & phlebotomia arteriarum post au-
 tem, &c. De resolutione loquitur Mesu.
 cit. ibi, Et succurritur cum admini-
 stratione medicinarum resoluentium, si-
 cut est aqua rutæ cum serapino, aut aliquo
 mellibus animalium, cum melle & suc-
 co fœniculi, &c. Auic. itidem adserit, ibi,
 quæ sunt ex siccitate, conferunt quando-
 de humectatiua nota, sed si sunt ab humi-
 ditate, conferunt eis omnia aleophol, id
 est, collyria quæ absterunt. Vide Arcul-
 ordo, & Marcum Catinarium & cæteros

practicantes, &c.

Observationes in manuali cura.

Auic. tertia tertij, cap. 20. In regime-
n-
eura, quæ fit cum instrumento, oportet
ante ipsam præcedat mundificatio corporis
& capitis propriè, & fiat phlebotomia
necessaria fuerit, & obseruetur, ne ille
cum instrumento curandus est, habeat
oculo rupturam, & timeatur vt accidat
tunicis apostema, aut sit assuetus pati
sim, aut sit vehementis rixæ, velocis i-
nam hæc mouent ad profundum vel re-
tum. Arcul. Ne primū te ad curandum
tromittas, ni prius magistrum pluries ex-
rari videris.

Observationes de euacuatione.

Paul. lib. 3. cap. de glau. Si veluti culis
oculis obuersari videantur ex quadam
morum prauitate, vel biliosioribus vap-
ribus sursum distributis, medicamentum
dialoes amarū exhibeatur. B. id est, qui
sciuerit esse morbum ex bile, vt re pic-
si mirus, aliis compositis: nam picra ston-
cham & caput vnā simul vice expurgat
euacuat, &c. Auic. loc. cit. Vomitus qu-
tunruis conferat ex parte mundificati-
nis, tamen est nocitius in proprietate
aquæ.

Obf

Observationes de resolutione.

Aet. ser. 7. cap. 51. Medicamentis vren-
m est primum simplicibus, velut melle,
reo fœniculi, deinde cōpositis, liquidis,
his collyriis, quæ paulo post describen-
tur. Auic. tertiā tertij, cap. 2. Et oportet vt
cipias primo à medicinis lenitiuis, sicut
iniculū cū melle: deinde gradatim per-
niatur ad medicinas compositas ex sera
no, &c. Et hæc non nisi post mundifica-
nem corporis, &c.

*Suffusiones curantia ac
perseuerantia.*

Curant suffusiones adeps piscis & vipe-
recens, oleum antiquum cum melle, fel
guilæ cum melle, asa, aspaltum, berbena,
claminis succus cum melle, euphorbiū,
reacolla, segapinū, myrrha, lac ficus, gu-
i oliuæ, oleum benedictum Nic. mirabi-
sief de fellibus Haly, sief rubeum Sera-
onis, fel canis, capræ, auium rapacium,
orpionis marini, gallinæ, tauri, testitudi-
is, hyenæ, vulturis, aquilæ, succus fœnicu-
semen raphani, ozimum, rosmarinus, &
l. Prohibent suffusiones fieri pilulæ, sine
quibus pilulæ optomeræ Auic. hiera Ar-
igenis, hiera magna, hiera andromachi
les. in cur. sod. frig. caput purgiū Alex. co-
em in loco. lege in super Varignanā ca. 12.

tra. 3. vbi tractat de descensu aquæ ad oculum. Vide etiam Razem cap. de cataracta. Item Placentinum, qui puluerem describit, multum ab ipso commendatum, & Vide fusius Montagnanam conf. 66. cap. de remediis conuenientibus diminutioni & corruptioni visus, &c.

De prognosticis suffusionum.

Paul. loc. cit. verum omnia glaucomata curationem non recipiunt, hypochyma verò curantur, sed non omnia. B. Intelle glaucomata non curari, quæ ex prægressa suffusione fiunt, humore iuxta pupillam vehementissimè congelato ac resiccato. Vnde Auic. de obstructione visus, inquit. Ex siccitate fit, vt oculus in seipsum colligatur & corrugetur, & nominatur hæc ægritudo glaucoma: fit enim oculus propterea variis multorum generum, non est ei medicamen. & Aet. Quæ glaucescunt, incurabiles sunt, &c. Auic. tertij, cap. 18. Et illa quæ est magis susceptibilis curatione, ex parte coloris est aërea & alba margaritalis, & quæ ad viriditatem parum per declinat. Genus autem gypseum, & viride, & nigrum, & plumbeum vehementer nigredinis, & citrinum non recipiunt curationem, quæ fit cum acu, &c. Galen. 14. methodi cap. vlt. Hypochyma iam incipiens digere

tu

ubi diu constitit, non potest.

Arcul. 9. almans. Cataractæ quæ totum o-
culum occupant, sunt incurabiles. Item
nium crassæ, quæ non per compressio-
nem mouentur, neque acu, neque medica-
mentis curantur. Item cataractæ ex inte-
gra obstructione nerui optici factæ cura-
mentum non admittunt, & quæcunque siue
per percussione, aut post ægritudinem cere-
bri fiant, difficulter sanantur.

*Authores dissentientes circa
suffusiones.*

Adserere, locum affectum in suffusione
esse ambiguum.

Adserere, suffusiones ferè omnes per chi-
rurgiam posse curari.

Adserere, parorasm, id est, hallucinatio-
nem esse suffusionis speciem.

*Confutatio dissentientium
circa suffusiones.*

Ad primum: Haly Abb. 9. theoricæ cap.
tenet, quòd locus suffusionis sit inter
ystalloidem & corneam: pro quo habes
iam rationes in descriptione superius ex
uersis authoribus recitatas.

Ad secundum: Paul. lib. 3. cap. de glau. &
uic. ut suprà dictum est in prognosticis,
multa suffusionum genera, quibus non est
are remediũ, proculdubio recitauerunt.

A 5

Ex quibus concludi potest, non omnia
rè, sed valde pauca posse curari, sicuti
nobis experientia demonstrat, &c.

Ad tertium respondetur, quòd si pa-
ralis esset species suffusionis, sequeretur
quòd hyposphagmatici & isterici suffu-
nes pati dicerentur, quod à ratione alienum
nam isti parorali laborant, ut testatur Gal.
4. de sympt. cau. ibi. Si verò humores
multitudine, sed colore peccauerint sen-
dum eiusdem coloris naturam paroris,
id est, hallucinatio suborietur: nam
istero laborant, omnia quæ vident, palpe
arbitrantur. Qui verò pyposphagme,
omnia quæ aspiciunt, rubra putant, &c.
hoc falsum igitur, &c.

*De aurium doloris de-
scriptione.*

Dolor aurium, Græcè *ὠταλγία* dictus
tristis ac molesta auris sensatio à con-
tra re de repente ac violenter simul & ve-
ementer imprimente facta. Cuius spec-
es enumerantur quinque, ut dolor punctorii,
stimulantis, tensius, grauis, & pulsatilis, &c.

*Loci consentientes de doloris au-
rium descriptione.*

Plato in Timæo, Pathos præter natu-
violentè ac affatim incidens dolorem e-
citatur. Gal. 4. de sympt. cau. cap. 6. Hoc P-

to

volebat, quum diceret moleſtam ſenſio-
 nem in corporibus ſenſu prædictis fieri, ſi
 impoſitum ipſi pathema ex violēto ſimul
 cōſerto acciderit, &c. De ſpeciebus dolo-
 ris in lege Galen. 2. de loc. aff. & 3. cap. 7. ubi
 mentionē facit de torpido, ulceroſo, ſtrin-
 gente, lacerante, &c de quibus, cum de do-
 ribus agemus, in genere loquemur: lege-
 ram Auic. & Arcul. 9. almans.

De cauſis doloris aurium.

Omnis dolor aut per conſenſum, aut
 primario affectu fieri ſolet, cuius cauſa eſt,
 ut mala intemperies, aut ſoluta continui-
 tas. Mala intemperies aut fit à frigidityte,
 ut à caliditate, aut ab utraque, & hæc cum
 materia vel ſine materia eſſe poteſt. Soluta
 verò continuitas fit aut à flatu extēdente,
 ut ab humore corrodinge, ſive putrefa-
 ente, aut ab aliquo tumore, abſceſſu vel
 inflammatione. Quæ verò per conſenſum
 ſunt, aut à toto, aut à parte oriuntur. A to-
 to, ſicuti per criſim, per febres. A parte, ut
 ſtomacho, à matrice. Qui verò per ſe ve-
 niunt, id eſt, à parte læſa, vel erunt in auris
 cartilagine, aut in meatu, aut in auditorio
 nervo, &c.

*Loci conſentientes de cauſis
 dolorum auris.*

Gal. 12. meth. cap. 7. Doloris cauſa aut eſt
 diuina

diuifio vel alteratio, &c. De omnium do-
rum causa in genere loquens, &c. vt sup-
dictum est. Gale. lib. 3. de compo. med. p.
loc. cap. 1. Dolores aurium aliqui ex frig-
ditate à ventis inducta fiunt, aliqui ex ba-
neis frigidis medicatisve, aliqui ex infla-
matione: interdum circa meatum cutis:
terdum in profundū progressa, vbi audit-
rius neruus ad inflammata affectione
peruenit: aliqui ex flatu ventoso transitu
nō habēte, aliqui ex humoribus saniosis
mordacibus dolorem excitātibus oriūtu
Auic. quarta tertij, cap. 6. Dolor auris a-
fit à malitia complexionis, aut fit cau-
apostematis aut bothor, aut causa solutio-
nis cōtinuitatis, &c. vberius hunc locum
gito, & plura ad rem facientia inuenies:
ge in super Alexan. lib. 1. ca. 24. vbi diffusi-
rē pertractat: vide et Arcul. Sauo. et Gor-

De signis dolorum auris.

Indicia omnino communia ab ætate
temperie, anni tempore, arte & victu pra-
cedente sumuntur, item ex laborantis rel-
tione. Signa si fiāt à mala intemperie, siue
calida, siue frigida, cognoscūtur per ea, qu-
in contrarium adhibentur. Signa particu-
laria sunt: nam si à flatu fiant, tunc dolo-
erit tensius, non grauans, & sonus clarus
auditur, non confusus: si à caliditate
pr.

preſſerunt calefacientia, & à frigidis iu-
ſſur: ſi à frigiditate, grauitas & tumor
nientientur, & auditus impediatur, ſi à
ſola continuitate, ex eo cognoscitur,
quod aliquid ſanguinis vel puris effluit: ſi
in inflammatione, tunc dolor erit conti-
nua, grauitas cum tumore & febre con-
ſtanti aderit: quòd ſi intēſiora hæc ſympto-
ma fuerint, quàm quòd liceat, cum alie-
natione & frigiditate extremorum, tunc
inflammatio in intrinſeca auris parte.
Cognoscitur apoſtoma eſſe ſanguineū vel
muſum, quum intenſius ſe habeat dolor
ſimilis & ſanguine, mitius in pituita & me-
lancholia, &c.

*Loci conſentientes de ſignis
dolorum auris.*

lul. lib. 3. cap. 23. Aurium dolor qui à
frigiditate fit, ex anni tempore, ex victu
precedente, & ex laborantis temperie co-
gnoscitur: atqui ex calida intemperie pro-
uenit, ob id cognoscitur, quòd feruoris cu-
ſum ſine grauitate ſeu tenſione ſenſus
adit: qui verò ex glutinoſis craſſiſque
humoribus fit, ex capitis audituſque grauita-
te victus precedentis ratione deprehen-
ditur, &c. Auicen. quarta tertij, cap. de ta-
n. Si fuerit apoſtoma calidum in ipſo
ore, ſignificat febres cum quibus eſt hor-
ripila

ripilatio, & tremor, & cōcomitatur ipsum permixtio, intellectus alienatio, &c. Si vero non sit in neruo, tunc aderunt extensio, dolor, grauitas, & pulsus: si causa erit ventositas, significant ipsam sonitus & tinnitus, nec aderit grauitas: si vlcus & bothor, significat pruritus cum dolore & sanie: si ab humore frigido lēditur, à frigidis, & fit fortior in frigidioribus partibus diei: si est à calido, est à contrario, &c. Vide de his Arcul. longè aliis melius rem pertrantem: vide etiam Auicen. quarta tertij, tract. i. cap. 25. de signis apostematum in radice auris.

De cura doloris aurium.

Omnis curatio per eius causæ ablationem perficitur, & si quid malæ complexio nis impressum fuerit ac derelictum, cum suis contrariis tan intrinsecis quàm extrinsecis remouebitur: verùm si humorum fluxus ad aurem timeatur, cum reuellentibus & euacuantibus auferendus erit, accidentia remouenda, & victus ratio instituenda erit, &c.

Dolor verò ex inflammatione vel erit creticus, vel non creticus. Creticus duabus intentionibus curabitur: prima crisin adiuvando, secunda symptomata remouendo, & victum ordinando. Crisis quadrifa-

riam

etiam adiuuantur: Primo, multitudinem humorum euacuando, ut virtus in reliquum potentius exonerata agere conetur. Secundo, virtutem roborando cum his quæ sanguinem & spiritum cumulant, & hoc fiat ante crislum, ne in crisi natura impediatur. Tertio, meatus præparando, & superfluitates auris abstergendo ante crislum. Quarto, virtutem stimulando, si natura ad crislum tardauerit, vel si moram natura in crisi contraxerit in expellendo. Remotio symptomatum fit, quotiens dolor, modum excedens non frigidis & repellentibus, sed rebus molliētibus & anodinis demulceatur: nam frigidis & repellētibus interdū crisis impeditur. Dolor ex inflammatione nō creticus septem exigit intentiones quæ sunt euacuatio, reuulsio, percussio per se, & resolutioni mixta, resolutio pura, ablatio symptomatum, & sex rerum non naturalium institutio. Euacuatio fiet per sectionē venæ: si sanguis peccauerit, vel per cholagogā, si bilis, ut cum rheubarbaro cassia, manna, electuario de succo rosarum, diapruni solu. cum pilulis aureis, &c. Vel per pblegmagogā, si pituita, vel cū pilulis chochiis, turbit, agarico, &c. vel cum pilulis indis, de lapide lazuli, confectione Hamlech, si fuerit atrabilis. Reuulsio fiet cucurbitulis

bitulis, frictionibus, &c. Repercussio materia calida perficitur cum oleo rosæ quarta parte aceti per decoctionem rescati, vel in materia frigida cum oleo amygdalarum amararum vel camomillino, &c. Repercussio resolutioni mixta fiet, si subscptis addatur mucilago, semen citoniorum, semen lini, scœnugræci, &c. Resolutio fit per resoluentia & mollientia, quale est dachylon minus, vel emplastrum ex farina hordei cocta cum oleo camomillino. Resoluit etiam ac maturat apostemata aut emplastrum ex farina fabarum, cum oililiorum alborum, & est expertum. Victustio sit tenuis in frigidans in causa calida, vel e contrario in frigida. Vinum carnis & oua vitentur, quanquã vinum in causa frigida absente apostemate cõueniat. Aër calidus potius quã frigidus, nam frigidus inimicum neruosis partibus est. Symptomata remouetur, si fuerint vigilie, per ea quæ somnũ cõciliat, si syncopis vel surditas, per ea quæ de syncopi ac surditate dicetur, dolor interim cū anodinis vel narcoticis, quibus plura ex Auic. & Aet. & iuxta methodicos practicautes habentur.

*Loci consentientes de cura
doloris aurium.*

Quod omnis cura per eius causæ ablationem

na

iem fiat, habetur, non solum ex Paulo, sed
 ex Gal. 3. de cōp. med. per loc. cap. j. ibi, Do-
 lores à frigiditate oborti, calefacientibus
 quàm celerrimè curantur, & dolor ab aqua
 medicata circa meatum auditorium con-
 tenta, oleo assidue infuso curatur, &c. Paul.
 ib. 3. ca. 23. Dolor aurium à frigiditate ca-
 lefacientibus curabitur præsidiis, ut oleo
 rutaceo, laurino: at ex calida conceptū in-
 temperie: contraria discutiunt, ut oui al-
 bumen in aurem demissum, lac muliebri,
 oleum rosaceū, oleum lumbricorū & asel-
 lorum, quos Græci *ὀνὸς καὶ ἰχθυῖος* vocant.
 Quod si à crassis ac glutinosis succis fiat,
 vel à flatu exitum non habente, cū medica-
 mentis curabitur, quæ aperiunt, incidunt,
 ut aphonitrum cū aceto & melle, vel fel
 ouillum cū oleo amygdalino, &c. Aet. ser.
 6. à cap. 73. vsque ad caput 76. inclusivè de
 his vberimè pertractat, ubi habes, quod
 omnia amara citra mordacitatem ac mole-
 stiam meatus auris purgant & extergent,
 ac crassos humores impactos secant, &c.
 Auic. quarta tertij, cap. 8. Si autē est causa,
 caliditas superflua, oportet ut infrigides
 cerebrum cū extinguentibus cognitis, &
 destilles in aurē oleum rosaceū, tepidum,
 aut albumen oui: & si est dolor vehemens,
 permisce cū eo camphoram, &c. Lege eum

fufius, lege in super Mes. ibi, summa sext. cap. de cur: aurium, Si dolor fiat à complexione siue materia, solùm alteratione indiget, vt si calida, iuuatur ex infusione aluminis oui recētis, aut mucillagine psyllij: si fiat à complexione frigida, conferunt infusiones calidę, &c. De dolore ex inflammatione cretico & non cretico loquitur Nicolaus, ibi, Accidunt hæc apostemata vi symptomatis stimulata natura, & quandoque accidunt vincente natura, & fit sæpe secundum semitam crisis, & maximè in febribus & apostematibus cerebri. Vide Razen 3. comment. autoritate Gal. de hac re loquentem. Vide etiam in hoc Arcul. 9. almans, qui & si quinq; modos in adiuuanda crisi declaret, nihilominus ad quatuor reducuntur, vt dictum est. Lege etiã Aphor. 20. primi lib. ibi, Quæ iudicantur, & iudicata sunt integrè, neque mouere, &c. amplius Gale. in comment. dicentem, Vbi deficit natura, adiuuandum, ne recidiuas materia relicta faciat, &c.

De dolore ex inflammatione nō cretico verba faciunt omnes moderni, ex quibus primùm elicere poteris omnes à me dictas curandi intentiones, quas etiam breuiter habet Auicen. quarta tertij, cap. 8. ibi, Et si causa fuerit apostema calidū, profundum,

quod est timorofum propter propinquitatem sui ad cerebrū, vsquequo ad collectionem perueniat & suppurationem, tūc post phlebotomiam & euacuationem oportet vt administres lenitiua in primis & infri-
gidantia, & propriè lac mulieris vice post vicem vsque ad diem tertium, & similiter oleum rosaceum, decoctum cum aceto, deinde mucilaginem fœnugræci semine lini in aqua lactis, &c. Paulus loco citato, Si ex inflammatione auris laborauerit, statim sanguis mittendus est, deinde focus ex oleo dulci & calente per specillum in lana inuolutū adhibeatur, extrinsecus etiam quæ dolorem leniunt, materiāque impactam concoquunt superaccommodare, &c. Lege Galenum 3. de compositione medicamentorum per loca, cap. 1. ibi, Dolor verò ab inflammatione ortus, &c. Pro resolutione abscessus, Galenus 12. meth. ca. 8. ad dolorem aurium ex humore frigido vel flatu, medicamento vtitur, quod ex castoreo & papaueris succo conficitur, &c. Mesu. Expertum est diachylon in oleo anethino dissolutum, & ex eis quæ sunt vltimi iuuamenti est atypi cerotum. Docet etiam cataplasma confici ad hoc idoneum ex farina fabarum, camomilla, violis, &c. De victus ratione & de sex

rebus non naturalibus legantur Arcul. Matthæus de Grado fufius. Auic. loc. cit. I habens dolorem frigidū, potet vinum prurum, forte & dormiat: & cū excitatur, non habet leſionem aliquam, & c. Quòd aër frigidus fit neruis inimicus, habes Aphor. tertij lib. ibi, Frigidū inimicum ofſibus dentibus, neruis. De ſymptomatum ablatione legatur Auic. ibi, Et quandoque neceſſarium eſt in curationibus dolorum vehementium in aure adminiſtrare narcotica, ſicut aliquid ex philonio cum lacte, vopium & caſtoreum, & crocum cum lacte mulieris, & c. Aet. ſer. 6. ca. 80. Vbi verò magnus eſt dolor, neceſſe eſt ſtupefacientibus ſenſum vti, ita vt ad lac muliebre & opacandidum modicum opij admiſceamus. Admiſcendum eſt & caſtoreū ad vehementiores dolores pari menſura, ad leuiora dupla proportione, & c.

Obſervatio de diuerſione.

Hic ad memoriam reuocandum quod quarta primi dixerat Auic. Quòd ſi ad controuerſum trahere volueris materiā, primū dolorem mitigabis ac demulcebis, quod dato, ad curam te conferas, & c.

Obſervationes de repercuſſione.

Arcul. 9. almanſ. Antequam fiat repercuſſio, obſeruentur hæc: nō ſit materia critica

tice expulsa, non sit venenosa, non sit furiosa, non plurima, non immediate à cerebro expulsa, non valde tenax & crassa, non paulatim congesta, non fluxam ad partem extrinsecam auris.

Observationes de topicis.

Tusignanus septem condiciones observandas esse inquit in his quæ in aurē proiciuntur: prima, quod iniicitur, non sit calidum nec frigidū, sed tepidum, & hoc etiā innuit Auic. cap. 8. Secūda, quod sit in parva quantitate, & hoc habetur ex Auenzoar primo lib. Theisir. tra. 41. ca. 1. Tertia, quod stet in aure pauco tempore. Quarta, quod antequam aliud proiciatur, primū sit expulsum. Quinta, quod cū aliquid iniicitur in aurem, patiens iaceat super latere sano. Sexta, quod locus sit cum auriscalpio mundificatus propter tortuositatem auris. Septima, quod non administrentur repercussiva in apostematibus auris, &c. Galen. 5. meth. ca. 10. contra Thessali sectatores dixit, aurem esse particulam siccissimam, idcirco quæ valentissimè exiccent opus esse, ut castoreum. Verū hīc in dolore anodinis, illic in vlcere siccantibus fortius uti persuadet: vide tu illum fusiū.

Observationes in narcoticis.

Auic. quarta tertij, ca. 8. Oportet ut post-

ponantur narcotica, vsque quo timeat
syncopis, & propriè cum fuerint humores
frigidi: nocent enim eis valde, & post e-
rum vsum administra castoreum.

Auditui nocentia.

Fumus argenti viui, semen arundinis
lanugo & flos Typhæ, folia castaneæ, pul-
uis platani, & puluis inuentus super eiu-
s foliis.

*Dolorem ac pulsationem au-
rium curantia.*

Dolorem ac pulsationem aurium iuuat
vapor decoctionis absinthij, aqua decocti-
onis acetosæ, succus acori cum rosa, oleum
in radice aphodilli coctum, allium cum
adipe anseris, succus cucumeris asinini, su-
cus cucurbitæ cum oleo rosaceo, in calid
dolore, crocus cū oleo rosaceo, succus dr-
cunculi, hederæ, cānabis, gallia cū oleo d-
been vel de cheiri, galbanum cū oleo lilii
rum, grana granatorū cum melle, succu
hyosciami, lactuce asini, laudanum cū ole
ros. succus maioranæ, melliloti, mentæ, pa-
ritoria, peucedani, polygoni, foliorum po-
puli, porri, plantaginis, prafij, rosarum, ru-
bi, rutæ, salicis, serpentariæ, solatri, adep-
anseris, leonis, vulpis, fel arietis, apri, bub-
li, tauri, suis, oleum liliorum, amygdalar-
amararum, scorpionū, de vitellis ouorum

d

de semine cannabis, oleum benedictū Nic.
de cherua, sisaminum, de nucleis persico-
rum laurinum, de semine raphani, de ane-
tho, de chrysomyliis, de been, yrinum, nar-
dinū, vrina apri, bubali, tauri, caprę, oleum
de cinnamomo, petroleum in frigido &
antiquo, pilule sine quibus, hieralogodion,
esdra, confectio Nicol. opium cum myr-
ra, croco, & oleo ros.

De prognosticis dolorum aurium.

Hippoc. prognost. 3. text. 15. Aurium do-
lor acutus cū febre continua ac vehementi
difficilis est, periculum enim delirij abo-
litionisque imminet. Quia igitur fallax
hic locus est, citò etiam auertere omnia
alia indicia à primo die necesse est, &c.
Auic. quarta tertij, cap. 6. Et peruersior do-
lor auris est ille, qui est ex apostemate ca-
lido, profundo, & propriè cū perducit ad
commixtionem intellectus: vbi verò dolor
est in cartilaginibus extrinsecis, non est
illic vehemens dolor, nec vehemēs timor,
sed primus interdum subito interficit, ve-
luti apoplexia: interficit tamen magis ado-
lescentes quàm senes, sed ratio est, quia in
senibus ignauior sensus, nec humores sunt
ad alienationem prompti, sicuti in iuue-
nibus.

Authores dissentientes circa dolores aurium.

- 1 Adserere, in omni dolore auris esse primis reperiendum.
- 2 Adserere, dolorem auris non esse periculosum.
- 3 Adserere, in dolore auris non esse secundam venam.

Confutatio dissentientium circa dolores aurium.

Ad primum Auic. quarta tertij, cap. 2.
Si apostema fiat per viam crisis, oportet non intendas ad curam quatenus exigitur ad curam apostematum, adhibendo stypticam & apocrustica, id est, reperiensiuam principio. Itē reperiensio fit ad membrum principale, igitur in omni dolore non est perpetranda.

Ad secundum: Gal. 3. prognost. comm. 1.
Quòd si dolor fuerit in cartilaginibus auri in summa auris parte, non est periculum mortis. At si in profundo ex auditorio meatu doloris sensus affligat, ut etiam nervus auditorius afficiatur, periculum imminet, ne in consensum perducto cerebro mors repente sequatur.

Ad tertium respondent Auic. & Men.
quòd in omni dolore à sanguine fieri debet sectio venæ. In aliis doloribus reuulsum suam

suam imperant neoterici.

Descriptio vlcis aurium.

Vlcus, Græcis ἔλκος dictum, nihil aliud est quàm continuitatis solutio cum sanie, quod interdū extrinsece, interdum intrinsece accidit. Si intrinsece, vel erit in meatu, vel in neruo auditorio, aut circa os, petrosus vocatum. Præterea vel erit vlcus mundum, sordidum, virulentum vel corrodens cum dolore, cum mala intemperie & cum inflammatione vel alio tumore, &c.

*Loci consentientes de descriptione
vlcis aurium.*

Gal. 2. meth. cap. 1. Vnitatis nanque solutio in osse fractura dicitur, in carnosa parte vlcus. Auic. quarta tertij, ca. 12. Amplius non possunt esse vlcera, quin sint apparentia sensui, aut sint profunda, & non profunda propinqui temporis vel chronica, &c. Lege Arcul. & plures vlcis differentias intelliges. Gal. 3. meth. cap. 4. memorat vlcus cauum & æquabile, recens & inueteratum, sordidum, purum, liberum phlegmone, & phlegmone impeditum. Similiter de intemperie intelligendū. Lege de hac re Placentinum. De veris vlcis differentiis lege Gal. 2. meth. cap. 1.

De causis vlcerum auris.

Causæ vlcerum sunt vel humores corro-
dentes, vel aliquis abscessus, vel casu
percussio, & res quæ putrefacere vel corro-
dere possunt.

*Loci consentientes de causis
vlcerum auris.*

Arcul. 9. almanf. Causæ vlcerū sunt apo-
stemata vel bothor cū rumpuntur, necnō
humores acuti, item cerumen auris & ver-
mes, aut res ibidē natæ corroderentes ac pu-
trefacientes, similiter casus & percussio
Gal. 4. met. cap. 1. Est enim horum duplex
ortus aliās ab excisione, sæpe ab erosione.
Quo pacto fiat excisio, patet: erosio verò si
intrinsecus ab ipso animali prouenit, vi-
tiosi succi soboles est: si extrinsecus, aut à
valentibus medicamentis, aut ab igne.

De signis vlcerum auris.

Signa vlcerum auris manifesta sunt, si
pus ex aure defluat, nulla in cerebro præte-
rita lēione. Si fiat ab apostemate, statim ex
vomica multa puris copia exiet, deinde
paulatim & in pauca quantitate. E contra
verò, si ab humoribus corroderentibus pau-
latim in primis egredietur, deinde magis
abundabit. Signa vlcerum mundorum ab
optima & concocta sanie cognoscuntur.
Sordidorum ex crassitie ac multitudine
excu

exeuntis saniei. Virulenta vlcera ex fœtore & putrida sanie subtili exeunte nobis in notescunt. Corrodentia si post saniem sanguis effluerit. Fistulosa, si longo tempore contracta, si virulenta sanie, si ex callosa ac indurata carne consistant, &c.

Loci consentientes de signis vlcera auris.

Razes 9. almans. hoc tantum signum posuit, scilicet quum pus ab aure egreditur. De his signis fusius pertractat Arcul. & Aui-
cen. Similiter cæteri practi-
cantes.

De cura vlcera aurium.

In omni vlcera cura quinque opus sunt medicamina, abstergentia scilicet, corrodentia, carnem generantia, consolidantia, ac ad cicatricem inducentia. Abstergentia idcirco opus sunt, vt sanies crassa glutinosaque membro adhærens amoveatur, qualia sunt tenuia ac calida circa secundum gradum, sicut mel, &c. Corrodentia, vt supercrescentia carnis minuantur, & sunt calida & sicca in quarto, vt flos æris, alumen, &c. Carmen generantia, vt sanguis vlcera superueniens in carnem transformetur: quod fieri nequit, nisi complexio temperetur, & sanguis coaguletur, & sunt sicca in primo, & temperata in acti-
uis, stypticis & absterfionis pauca, vt
thus.

thus. Nec opus esset medicamentis in g
gnenda carne, quum ad naturam tantum
pertineat, ni in generatione carnis excre
mentum tenuius ac crassius interdum effice
retur, ad quod id tandem opus est, quod re
dundantiam absumat, & sanguinem coagu
let, quale est medicamen siccans & abster
gens. Consolidantia, ut humilitas inte
vtrasque vlceris superficies propinquas con
tenta ita conglutinetur, ut altera superfi
cierum vlceris alteri adhæreat, & sunt sicca
in secundo, cum proportionem actiuorum ac
membrum ut aloës, sanguis draconis, &c.
Cicatricem inducentia sunt, quæ absque
mordacitate tantum superficiem exiccant
ut cortex pini, &c. Sed de his vberius dice
mus in libro de chirurgia. Cura simplicis
vlceris in corpore purgato indiget tantum
absterfione & consolidatione. Si verò vlcus
fuerit compositum, puta cum inflamma
tione, vel mala temperie, aut dolore vehe
menti, tunc primum erit inflammationi
ac reliquis vacandum, non neglecto interim
ipso vlcere, &c. Cura vlcerum auris mali
gnorum præsertim corrodentium quinque
mediis perficitur, præcedat tamen eua
cuatio ac reuulsio ad hæc quæ dicenda
sunt. Primò, si quid est putridum, vel cor
rosum, vel induratum, auferatur. Secun
dò, quod

lò, quod remanet, optimè mundificetur. Tertiò, substantia iam deperdita regeneretur. Quartò, regenerata substantia ad cicatricem inducatur. Quintò, accidentia corrigantur, & ratio victus instituat, &c. Primò putridum auferemus cum vnguento Aegyptiaco, cum modico aceti vel vini dissoluto, vel si pars veluti sensus expers sit, accipiantur viridis æris, saluminis, & mellis partes æquales, & cum modico aceti fiat collyrium. Secundò, mundificatio fiet cum hydromelle vel rhodomelle, aut ænomelle, aut oxymelle simplici, vel scillitico, si materia egrediens fuerit valde tenax. Tertiò, substantia regeneratur cum his quæ mediocrem cum pauca mordacitate exiccationē, qualis est aloës, myrrha, sarcocolla, sandaraca cum melle & vino dissoluta. Quartò, ad cicatricem perducunt, olibanum, siefmemite, sarcocolla, &c. Quintò, accidentia corriguntur, vt si sit dolor, cum prædictis in capite præcedenti, si surditas, cum his quæ de surditate dicentur. Ciborum quantitas sit modica in principio, donec ad substantiam regenerandam deuenierimus, tunc sit locupletior, sed boni succi & facilis concoctionis, &c.

Loca

Loci consentientes de cura vlcera auriu
 Galen. 3. meth. cap. 8. Fieri non potest, v
 in vlcere, vel carnis productio, vel sinus ir
 pletio, vel agglutinatio, vel cicatricis indi
 ctio rectè vnquam cedat, nisi subiecta car
 pro naturali modo se habeat: verùm purg
 ri sordida, minuîq; supercrescentia etia
 carne statum non seruante possunt, &c.
 Ex quibus verbis quinque dicta à me me
 dicamenta ad vlcus sanandum opus esse co
 gnoscas. De abstergētibus quę Gręcis *ἐπι
 νὰ* appellantur, loquit Gale. 5. de fac. simpl
 ca. 2. vbi inquit omnia nitrosa & amara ad
 expurgandos meatus intro valere, at cuti
 & vlcera sordes non hæc tantum, sed & vi
 ribus minora auferre possunt, qualia sunt
 dulcia, quę tenuium sunt partium, v
 mel, & ex cerealibus eruum, faba, lupini
 hordeum, &c. Et ca. 14. de causticis seu vrei
 tibus loquens, vehementer esse calida &
 carnis colliquantia, vt arsenicum, auri pi
 gmentum, sandaraca, & crysocola, &c.
 Et capi. 15. eiusdem lib. loquens de his qua
 vim *ἐπαισθητικὴν* habent, id est, cicatricem
 inducendi, esse desiccantia absque morda
 citate dixit, &c. De generantibus carnem
 lege Galen. 3. meth. cap. 3. vbi ad vnguem
 quę à me dicta sunt recitantur, & plura
 ad hoc munus idonea etiam enumerantur.

De

In glutinatoriis etiam verba facit capi. 5. aldem, & quo pacto ab iis, quæ cicatricem inducunt, differant, apertè declarat: de illum fufius. De cura simplicis vlceris lege Galen. 3. meth. capi. 4. De vlcere composito lege etiam fimiliter Galen. 4. meth. cap. 5. ibi, Verum vlceris quod cum quo affectu coniunctum est, &c. lege tu in locum vberius, & inuenies quod fieri non possit vlcus, nisi locus in quo constitit prius sit sanatus, &c.

Breuis Galeni vlcerum curatio quæ 5.

meth. cap. 1. continetur.

Omne vlcus siccantia medicamina requirit, vlcus finum habens, non solum modicè siccantia, sed absterforia expostulat: quod verò cõiungi labra petit, veluti cruentum magis siccantia, tum quæ sine absterforiis leuiter adstringunt, desiderat: quod verò ad cicatricem perducì debet, non solum magis adhuc siccantibus, sed strenuè adstringentibus remediis indiget. At si cãpræter naturæ modum intimuerit, acriter demollietia quæ calida & sicca sunt, adhibeantur: si verò vlceri aliquod symptomata adiunctum sit, primò id remoueatur, deinde vlcus sanetur: si sordes innascantur illendæ sunt iis, quæ maiorem adstringendi vim habeant, quàm quæ carne implent:

plent: si copiosa humiditas adsit, siccantibus medicamentis, quæ propriam speciem non egrediantur, curandum. Agglutinatoria sint igitur medicamenta siccantia & adstringentia, carnem generantia & abstergentia, & sic de reliquis. Si verò subiecta caro intemperata sit, primum eius intemperantiæ succurendum utique quæ siccior iusto est, humectantibus: quæ humidior, siccantibus: quæ calidior, refrigerantibus: quæ frigidior, calefacientibus: quæ geminata qualitate intemperata per geminam qualitatem contrariam curetur. Considera insuper intemperantiæ causas, num à toto vel à parte per consensum membrum ulceratum infestent. Primum enim causæ, quæ adhuc intemperantiam fouet medendum, per hanc ipsi quæ facta est intemperantiæ Sumitur etiam indicatio à particula læ, quæ si siccior fuerit, ea magis siccari et postulat: quæ minus talis est, ea minus siccanda. Simile etiam erit de calefaciendo refrigerandoque præceptum. Sumitur etiam à præcellentia membri aut à contrario statu. Itemque ex sensu acri heretice, quum hæc diuersum medendi modum petant, & reliqua.

*De mundificantibus ac abstergentibus
ulcera aurium.*

Mundificant ac abstergunt ulcera aurium succus absinthij cum melle aphodilli, etiam cum melle & thure, succus omphacij cum melle, ærugo ferri cum aceto decocta, fel tauri cum lacte capræ, licium antiquis ulceribus, mel cum sale gemeo tepidum, myrthi decoctum, myrrha cum melle, castoreo & opio, succus foliorum nymphaeae, & succus oliuæ agrestis, virgæ pastoris, vrina pueri cum cortice granatorum, leum amygdalarum amararum, rhodomelum matrisylua & betonica oleum myrthium, terebinthina, &c.

De sonitu aurium.

Sonitus aurium nil aliud est, si describatur, quàm auditus corruptio, in qua videtur homini audire id quod certè non audit, quod Græci vocant ἥχης ἢ οὐζισμοῖς.

Loci consentientes de sonitu aurium.

Auicena. quarta tertij, tra. i. Hæc dispositio est vox, quam homo incessanter audit exterius. Et eius comparatio ad auditum, est imaginationum & tenebrarum, quas non videt homo, comparatio, &c. B. Id est, vocem quandam homo audit, ac si exterius audiret: & talem habet comparisonem sonitus ad aures, qualem imaginatio ad

C

oculos, &c. Vide etiam hanc eandem sententiam in Auicen. capit. de nocument auditus.

De causis sonitus ac tinnitus aurium.

Omnis causa sonitus & tinnitus vel e occulta vel manifesta. Oculta aut fiet à sensus audiendi imbecillitate, aut ab eius subtilitate: imbecillitas fiet à mala quapiam cōplexione. Manifesta nouem modis fiet. Primò ex aëre extrinseco intrinsecum n uente. Secundò, ex sanie sonitum in a re efficiente. Tertiò, ex motu ebullitio: humorum excicato, vt in febris. Quarta, repletionem superflua. Quintò, humorum agitatione & vapore. Sextò, casu v. percussione. Septimò, ex humorum magna inundatione. Octauò, ex fame humores commouente & aërem. Nonò, ex medicinis soluentibus quæ mouent & n educunt, &c.

Loci consentientes de causis sonitus ac tinnitus aurium.

Galen. 3. de compos. medic. per loc. cap. Sonitus quidam ex flatuoso spiritu generantur, quidam ob exquisitam sensus audiendi subtilitatem, quorum neutrius actionis certa cognitio in principio haberi potest. Auicen. quarta tertij, cap. 9. Et inundatio aëris quæ est causa vocis, aut est ocul

culta, aut est maior illa. Oculta, quum interdum sonitus auditur, interdum verò minimè, & tunc, id est, aut propter acuitatem sensus, aut propter debilitatem, &c. Lege vsque ad illum locum inclusiuè. Et quandoque accidit sonitus post medicinas, quarum proprietas est vt retineant humores & ventositates in partibus cerebri, &c.

De signis sonitus ac tinnitus aurium.

Dabis operam vt in primis cognoscas qui fiant per se & qui per consensum. Per se enim fiunt quicunque sunt continui & asidui: per consensum verò, qui sunt intermittentes, qui dispositione crescēte augentur & desinente minuuntur. Signa ab acuitate sensus sunt, quia à mediocribus sonis læditur, nec excellentes tolerare potest, nullusque adest flatusosus spiritus, nec vapor crassus, nec repletio. Signa ab humore cum flatu, grauitas in aure percipitur, imbecillusque adest auditus: si verò ex flatu tantum, sonitus est clarior, nec vlla adest in aure grauitas: si ab humoribus crassis fiant, paulatim crescunt: si à siccitate, fiunt post euacuationes & febres. Signa apostematis suppurati sunt, quia dolor præcessit, sonitusque confusus & sanies apparet. Signa debilitatis sunt superfluitates,

si à complexione calida fit statim cum inflatione: si à frigida, econuerso. Cognoscuntur etiam ex prægressa diæta, à vomitu & à progressu pharmaco, &c.

*Loci consentientes de signis sonitus
& tinnitus aurium.*

Auicenna. quarta tertij, capi. 10. In illo quod est continuus & assiduus, causa est aliqui stans in ipso cerebro: si autem quiescit, deinde excitatur post euacuationem aut vacuitatem, aut quum calor fit vel frigus fit fortis, tunc est per communitatem. Illud quod est per acuitatem sensus significat defectus causarum ventositatis & repletionis, & mundificationis auditus, & excitatio eius apud ieiunium & vacuitatem. Paul. lib. 3. cap. 23. Sonitus qui fiunt à crassis glutinosisque humoribus cognoscuntur, quod non vniuersim, sed paulatim incrementum ac nascuntur. Galen. 3. de compositione medi. per loc. cap. 1. In cognitionem peruenimus non tantum ex procatactis causis, sed ex temperie, ex diæta prægressa, ut à longo vini potu, à violento & multo vomitu, aut à prægressa plaga, aut ex auricularium pharmacorum usu, & similibus. Quinetiam si sonitus aut per interualla redit, aut perpetuò permanet, aut ex eo quod paulatim, aut aceruatim fit sonitus. verum exacta

exacta & certa cognitio habetur, vt si quis ex flatuoso spiritu exitum non habente sonitum fieri putet, & siccantia vel attenuantia adhibuerit, admotisq; apophlegmatismis nihil profecerit, tunc certò cognosces ex auditu subtilitate sonitum fieri, præsertim si acuto audiendi sensu ægrè præditus appareat. Auicen. loc. cita. Factus à siccitate est post euacuationes & febres, & factum à debilitate scies per superfluitates: & quandoque est à complexione calida, fit subito & cum inflatione, & frigida est e contrario, &c. Vide de his latius Arcul. & reliquos practitantes, & inuenies quæcunque à me dicta sunt.

De cura sonitus & tinnitus aurium.

Quum curatio fiat per causæ efficientis morbum ablationem, tunc si à percussione, vento, ebrietate, & à cæteris procatarteticis causis fiat. Causæ primitiua per sua contraria remoueantur, & roboretur auris & cerebrum. Si morbus hic generetur ex quadam crisi vel febre, primùm discutienda erit febris, & crisis non prohibeatur, præsertim si ex se natura præualeat: si minus, iuuetur: si verò ab aliquo particulari membro per cōsensum oriretur, primùm id quod transmittit membrum euacuabitur, & ad aliam regionem materia

diuertetur, & eius membri lapsa temperies per contraria permutabitur: deinde membrum recipiens roborabitur, ut puta cerebrum cum oleo myrtheo, & auris cum oleo amygdalino amaro, &c. In cura verò per se ex repletionem capitis ab humoribus crassis quatuor curandi erunt intentiones, scilicet euacuatio, reuulsio ac deriuatio, humorum præparatio, ac eorum extirpatio, cerebri & auris roboratio, & regiminis institutio. Euacuatio fiet per ea quæ humorem superfluum euacuant qualis est hiera colocynthidos, pilulæ foetidæ chochiæ, &c. Reuulsio similiter fiet cum clysteriis, frictionibus, & hæmorrhoidarum ac menstruum euocatione. Deriuatio post omnimodam euacuationem cum caputpurgis, masticatoriis, gargarismatibus, &c. Præparatio humorum præsertim pituitosorum fiet cum syrupo de stechade de calamento, oxymelle simp. & composito, & cum reliquis quæ supra memorata sunt, & cum decoctis saluæ rosmarini violarum, betonicæ, maioranæ, rutæ, origani, &c. Humorū extirpatio perficitur cum pharmacis in euacuatione nuper relatis, &c.

Roboratio cerebri & auris fiet remouendo eorum discrasiam, cum sacculis ex melle, lino, sale, & furfure, asperso potenti vino

torre

irrefactis, aut cum fomentis ex camomila, melliloto, calamēto, origano, stechade, bsinthio, aut cum pulueribus capiti adhiitis, vtputa cum speciebus pleris arcoticon Nic. & diamusci dul. aut cum his quae aurem infunduntur, quale est oleū amygdalarum amararum cum musco & nucenoscata, aut oleum de vitellis ouorum, aut astoreum in oleo rosaceo dissolutum. Virtus ratio sit calida & sicca, pluuiæ, venti, brietates & satietas nauseatiua, & vomitus vitanda sunt. Item mora sub radiis Lunæ & Solis, &c.

Loci consentientes de cura sonitus & tinnitus aurium.

Auic. quarta tertij, cap. 2. Sonitus cretus non oportet vt moueatur, quoniam renouetur cum remotione febris. In eo vero qui fit ob communitatem, oportet vt intentio sit membri facientis ipsum, & propriè stomachi, quare mundificetur & intentatur cerebro, & confortentur auris & cerebrum cū oleo myrthino, auris verò cum oleo amygdalino, &c. Itidem ait Mes. cap. de sonitu. Paul. 3. cap. περί ήχων, Si in febribus aut harum crisi- bus sonitus auriū euerint, nullum eis negotiū facessere oportet, quippe magna ex parte statim finiuntur: si autem post morbum perseueraue-

rint, absinthij decocto foueri aures debent
& acetum rosaceum infundi, &c. De cura
per se ex repletionem, quod tot sint intentiones,
quot diximus, lege Arcul. & alios habere
de re loquentes. Auicennas loco citato, Item
similiter factum à repletionem, oportet
mundificetur corpus & caput cum eo quod
scis, & subtilietur regimen, &c. Mesu. cap.
de sonitu, Quando fit per abundantiam
repletionem in capite, cura eius est solutio
& euacuatio cum hiera diacoloquinthido
& chochiis, & similibus, cum reiteratione
& reiteratione, &c. B. Intelligitur de ma-
terie minoratione ac eradicatione per hoc
verbum reiteratione duplicatum. De pra-
paratione humorum & aliis intentionibus
loquitur ibi Aetius ser. 6. Si adhuc remanet
ampliori tempore, omnibus amaris
acribus, & attenuatoriis ac discussoriis ut
re, quae paulò antea descripta sunt, &c. lege
eum fusius. lege insuper Arcul. Sauon.
Gordonium, & Mesu. ibi, Quando fit à ver-
tositate grossa, conferunt caput purgia, ste-
nutationes post mundificationem, &c. in-
telligens de deriuatione & de aliis, prout
in ipso reperies, &c.

Observationes in cura.

Auicenn. quarta tertij, cap. 11. Oportet
omnes isti vitent balneum, solem, & vo-
mitur

itum & clamorem & repletionem, & vt
niant naturas, id est, ventres.

*Curantia sonitum & tinni-
tum aurium.*

Curant sonitum & tinnitum aurium, va-
por aceti, absinthium cum felle bouino, fel
præ cum succo porri tepido, colocynthi-
is decocto in aceto, succus foliorum ebu-
lis, fel tauri cum succo porri, acetum deco-
ctionis hellebori, decoctio caricarum cum
napi, succus rutæ in cortice granati tepe-
factus, vapor decoctionis hyssopi cum fi-
bus, oleum de been, cum adipe anatis,
oleum liliorum alborum, oleum violaceum,
mygdalarum amararum, decoctum lauri
um vino antiquo & oleo rosaceo, &c.

De prognosticis sonitus.

Galenus 3. de composit. medic. per loc.
ap. 1. Si in febribus sonitus fiant, minimè
curandi sunt, vt plurimùm enim statim se-
santur. Hippocrat. aphorif. 4. aphorif. 60.
Quibus in febribus aures obsurduerunt,
anguis ex naribus fluens, aut alius turba-
a soluit morbum. B. Intellige de fluxu cre-
tico, qui facilè adueniens sonitum soluit.
Hercul. Antiqui sonitus difficulter sanan-
tur: qui verò ex natiuitate contrahuntur,
nequaquam sanari possunt, &c.

De graui auditu & surditate.

Differunt inter se grauis auditus & surditas, quum hic tantum diminutum, auditum, illa verò omnimodam auditus ablationem significet. Hunc Græci κώφωσις, iam verò δυσκοίαν appellant.

Loci consentientes de graui auditu & surditate.

Auicē. quarta tertij, cap. 2. Omne auditus nocumentum, vel est vt destruatür eius operatio, aut auditus minuatur, ita vt qui audiat quod non audit, &c. Lege Arcul. & Almanf.

De causis surditatis.

Omnis causa vel essentialis est, vel per compatiendi rationem. Si essentialis, aut auris pars aliqua læsa est, aut cerebrum. Si pars vel similis est, vel instrumentalis. Si similis, tunc vel ab intemperie, vel à soluta continuitate afficietur. Si instrumentalis, tunc ab obstructione aliqua, aut à tumore aliquo præter naturam innato aut ab aliquo aduentitio, vtputa callo, carne, tuberculo, aut à sorde in auribus genita, aut ab humoribus crassis, vel à flatuoso spiritu occupante oborietur. Si causa sit per compatiendi rationem, tunc vel à toto, sicut in febribus ex quibus vapores ad aures deferuntur: vel à crisi iam facta, vel à memb

rembro particulari propinquo & remoti
sicut à cerebro & à stomacho. Item fiunt
surditates ex paucitate & crassitie spiri-
um, vel à consumptione corporis, &c.

*Loci de causis surditatis & gra-
uis auditus.*

Galenus 4. de sympt. caus. cap. 3. Grauis
ditus & surditas animanti euenire so-
lit, aut ob auris partem aliquam, aut ob
nervum à cerebro descendentem, aut ob ce-
brum ipsum, si eadem in parte, unde
nervus oritur, læsum fuerit. Proinde harū
partium morbi ab illis huc transferendi
sunt, ut ij, qui ad similes pertinent ex in-
imperie & continui solutione æstimen-
tur: qui verò ad instrumenta ex obstructio-
bus, siue ipsarum partium tumor aliquis
preter naturam meatum obstruxerit, ut pu-
ta abscessus, phlegmone, œdema & scir-
rhus, siue aduentitius, isque omnino præter
naturam tumor in meatu ipso oriatur, ut
tum callosum vel carnosum innascitur
tuberculum. Atque huc pertinent sordes,
quæ creberrimè in auribus gigni consue-
verunt. Avicen. quarta tertij, cap. 2. Nocu-
menta auditus aut sunt complexionalia,
aut instrumentalia, aut resolutiva. Singu-
laritatis nocumētum in nervo auditus in-
terdum accidit per omnes causas ægritu-
dinum

dinum similium partium & instrumentum & solutionis continuitatis. Aegritudines consimilium partium in ipso sunt unaquæque specierum malæ complexionis singularis & compositæ. Et quandoque fit unaquæque earum absque materia, & quandoque cum materia melancholica, cholericæ, phlegmaticæ, ex phlegmate crudo & ventoso. Instrumentales sunt sicut oppilatio, quam facit humor, aut sanies, aut apostema, &c. Lege eum fusius. Hercul. 9. Almanf. Defectus etiam spirituum seminum quum sunt crassi, est causa grauedinis auditus, & similiter paucitas spirituum, & corporis exiccatio & consumptio. Vide de his Mes. cap. de surditate. Item Gordonium & Sauona.

De signis surditatis & grauis auditus.

Et si per se surditas manifesta sit, nec aliis indigeat indiciis, nihilominus autem per essentiam vel per consensum fiat, nisi indicia cognoueris, non facile rem percipies. Cognoscuntur igitur quæ fiunt per essentiam absente totius vel partis mala dispositione: e contra verò si per consensum, ex totius & partis prægressa ægitudine, quæ aucta surditas augebatur, & remota remouebatur. Cognoscitur etiam obstructio tantum ex intuitu sub radiis solaribus. Cognoscit

oscitur fieri ex materia frigida, crassa,
 & grauitate & loci frigiditate, ex commo-
 one cū sonitu: & quia læsio cum frigidis
 getur, cognosces causam esse in neruo
 auditorio ex dolore. Cognoscitur ex crisi,
 tri per præcedentem morbum ad aures
 minantem, & eo quòd crisi finita remo-
 tur auditio grauis, &c. Reliqua signa ex
 latione infirmi manifesta erunt. Cogno-
 tur à flatu fieri ex sonitu & tinnitu.

*Loci consentientes de signis
 surditatis.*

Auicennas quarta tertij, cap. 4. Factum à
 mmunitate cerebri significat dispositio
 reliquis sensibus, sicut in virtute matri-
 cæ prætereà præcesserunt nocumenta cere-
 bri, sicut sirsen & intellectus commixtio,
 reliqua quæ dicta sunt in cap. de ægritu-
 dinibus cerebri, similiter de reliquis plu-
 ribus habet Auicen. quem fusius legere pote-
 ris. Lege insuper Arcul. nam si omnes ad
 linguam recitare voluerimus, præterquàm
 deceat, in mora essemus.

*De cura surditatis & grauis
 auditus.*

Si à nuda intemperie surditas prouene-
 t, per alterationem in contrarium sana-
 tur, aurisque roboratione ac regimine
 cont

contrario discrasiae indigebit, facta tamen
 aliquali reuulsione, si humorum fluxu
 meatur. At si fuerit frigida intemperie
 lidis remediis curabitur, utpote cum
 laurino, costino, amygdalino amaro in
 rem infuso. Roborabitur auris, si his
 qualiter styptica adhibeantur. Similiter
 calida intemperies cum oleo rosaceo, cum
 aliquatulo aceti bullito curabitur. Si
 ab intemperie cum materia morbus
 cogitandum est in primis de qualitate
 moris, deinde an principaliter in aure
 tineatur, an aliunde transmittatur. Et tunc
 in curatione scopi erunt quinque, euacuatione
 scilicet, reuellere, membrum mandans corrigere,
 deinde causam coniunctam educere,
 resolvere, denique discrasiam alterare, &
 gimen in contrarium instituere. Calida
 intemperies cum materia euacuabitur
 per χαλάρωσις pharmaca, sicut cum decoctione
 fructuum, rheubarbaro, pilulis
 reis, &c. Frigida materia per sectionem
 nae vel cum chochiis & agarico. Reuellitur
 etiam materia ac deriuatur per mastico
 ria, per errhina, caputpurgia, & per ea
 pluries à me dicta sunt, imò etiam per
 teria commissurae coronali applicita. Cor
 rigitur membrum mandans euacuato,
 corroborando, & eius intemperiem as

rato

rando. Causa coniuncta resolvitur in causa frigida per exercitium, clamores, & vociferationes in aure, vel per ea quæ in aures iniiciuntur, vel extrinsecè applicantur, veluti sunt suffumigia, emplastra, &c. vel lotiones cum aqua thermarum. Regimen in contrarium ordinetur, &c.

Loci consentientes de cura surditatis.

De cura surditatis sine materia loquitur Auicennas quarta tertij, tra. i. cap. 5. ibi, Quod si illic est caliditas tantum, tunc cum infrigidatibus curetur ex oleis & aliis, aut succo granati, ita ut bulliat in cortice suo cum aliquantulo aceti, thuris, & olei rosacei, & destilletur in ipsam aqua lactuce aut salatri. Illi verò quod factum est à frigore conferunt omnia olea calida, in quibus sit dissolutum castoreum, &c. De cura intemperiei cum materia, Alexander libro primo, capite 32. inquit, Quando biliosi humores ad caput delati surditatem inducunt, non difficulter succurritur, modò venter per χαλάρωσιν sedulò euacuetur. At si malum ex crassis & crudis humoribus oriatur, principio statim medicamento purgante euacuandum, ut puta cum oxymelle Iuliana, vel hiera, vel eo quod constat ex euphorbio. B. De hac compositione quæ
para

paratur ex euphorbio, meminit Mesu
cap. de surditate, & modum parandi doce
sed in pondere ipse decipitur, quum lo
scrupulorum quatuor vsque ad sex, ipse
vix quatuor drachmis vsq; ad septē in ou
forbili exhiberi iubet, quam quantitate
oui cortex absque vitello & albumine co
peret. Auicen. loco cit. In eo quod est cho
lericum oportet, vt euacuetur cholera
solutiuo ventris: nam vt plurimum cum
lutione ventris surditas remouetur, si ve
materia frigida, &c.

Paulus libro 3. cap. *περὶ Αυσσινίας καὶ κ
φώσεως*, At ex crudis crassisque humoribus
prognatas surditates, vel grauem auditus
venæ incisione curato, aut omnino purg
tione ex hiera.

De reuulsione habes Alexand. locum in
primo libro, cap. 32. ibi, Purgatione ven
egregiè facta, vtrendum est apophlegma
tismis, quibus per os capitis pituita pu
gatur & *ἐπὶ τοῖς καὶ πλῆγμασι*, &c. Vide de
his latius Mesuen & Arcul. De resolutione
loquitur Auicennas loco suprâ citato ibi
Et exercitium est vehementis iuuaminis
& similiter vociferatio vehemens in aure
& clamores buccinarum: & quandoque p
nitur in aure caput ambubæ, vt ad ipsan
peruenire faciat vaporem decoctionum
reso

soluentium, & confert succus rutæ cum melle & castoreo, &c. Obseruentur quæ inq; dicta sunt in capite de dolore auris.

Conferentia & acuentia auditum.

Confert & acuit auditum vapor, siue fuscus aceti, succus aristologiæ cū melle, succus foliorum capparorum, vel oleum decoctionis eius radices, castoreum, cucumeris inini succus, acetū decoctionis hellebori nigri, flos aëris qui ex eo albus est, tritus & insufflatus, delet antiquam surditatem. uic. oleū decoctionis seminis laurcolæ, mercurialis cū vino instillata serpentaria, assumigium sulphuris, radix brioniæ & itis alba, oleum laterinum, albuchafsis, oleum cucumeris syluestris, amygdalarū mararum de beē, oleum laurinum, sotira Nicolai iniecta auditum reddit, theriaca magna, pilulæ aggregatiuæ, hieralogolion, & fel, & vrina capræ cum galbano.

De prognosticis surditatis.

Hippoc. aphor. 4. aphor. 28. Quibus biliosa deiectiones superueniente surditate cessant, & quibus surditas superuenientibus deiectionibus cessat. B. Intellige cessare surditatem ex deiectionibus, præsertim si à febribus vel bile ad cerebrum mota ipsa fieret, nam in cæteris casibus locum non haberet Aphorif.

D

Paul. lib. 3. cap. cit. Quæ ab origine, ve
à prima natali die, sed longissimæ & abs-
olutæ surditates cōstituūtur, nullo remedi-
eliduntur. Quæ verò non absolutæ, sed di-
turnæ sunt: ipsæ etiam nullā curā recipiū-
aut certè difficillimam, &c. id est, quæ a
origine fiunt surditates, arte curari non
possunt; siquidē neruus auditorius meat
fortè nō habet, vnde species soni hauriat
vel si habet, locum fortè nō occupat, quem
iure possidere deberet; aut vehemēs ade-
inest obstructio ex carne oborta, vt mini-
mè curationem admittat. Vide de his Me-
suë. Hippoc. aphor. 4, aphor. 60. Quibus in
febris aures obsurduerunt, sanguis ex
naribus fluens aut alius turbata soluit.

De Parotidibus.

Parotides sunt abscessus post aures de
genere inflammationum, quæ accidunt in
carnibus glādulosis, sicuti in emunctoriis

*Loci consentientes de pa-
rotidibus.*

Paul. lib. 3. Parotis est glandularum sub
ipsis auribus passio. Galen. 3. de compos.
medic. per loc. cap. 2. Parotides ex genere
inflammationum sunt, fiuntque glandu-
lis circa aures affectis. Itidem ait Aet. ser.
6. cap. 89. Auicen. quarta tertij, cap. 24.
Hæc apostemata sunt ex genere aposte-
matum

matum accidentium in carnibus molli-
bus & propriè glandulosis, & nominantur
nascentia auris, &c.

De causis parotidum.

Parotides vel à parte vel à toto fieri
possunt. A parte, obstructis in capite hu-
moribus : à toto corpore, si qua fuerit
crisis in febribus. Hoc autem contingit
ob eam quæ est in febribus caliditatem,
relata multitudinem ad caput. Fiunt inter-
dum à materia sanguinea aut biliosa,
interdum à pituitosa, aut melancholi-
ca, aut venenosa iuxta semitam epidi-
miæ, &c.

Loci de causis parotidum.

Paul. lib. 3. cap. 23. Parotis fit à materia
morbi illic emanante, modò à capite hu-
moribus in eo obstructis, modò à reliquo
corpore in febribus crismi expertis ori-
tur, &c. Quòd in febribus ob earum calidi-
tatem fiant abscessus, lege 4. aphor. Gal. cõ-
ment. 3. ibi, Lassitudinem habentibus in
febribus, &c. Auic. loc. cit. cap. 23. Et hæc
apostemata omnino fiunt à materia san-
guinea aut cholericâ, & quandoque melan-
cholica aut phlegmatica, & quandoque ex
his mixta. Vide latius in hoc Arcul. & re-
liquos practicantes, &c.

Alexan. lib. 1. cap. 34. Parotidum igitur

aliæ originem ad copiosum sanguinẽ rel-
runt, aliæ ad tenuem calidum & biliosum
humorem, aliæ ad gelidum crassumq; suc-
cum, &c.

De indicijs parotidum.

Si fierent à sanguine, rubor loci, dolor
febris sequens, caliditas, grauitas, manife-
stè indicant. Si à bile, erysipelas, dolor pu-
ctorius, vel mordicans, febris succedẽs, co-
lor pallidus. pauca grauitas aderit. Si à p-
truita in compressione aderit inũdatio, co-
lor albus, vel rubedo ad albedinem decli-
uis, dolor nõ intensus, nec sequitur febris
nisi dum pus conficitur, adest etiam graui-
tas. Si à melancholia, durities, nullus fe-
dolor & color liuidus ostendunt.

Loci de indicijs parotidum.

Auic. loc. cit. Significant quod est san-
guineum rubedo & grauitas, & expulsi-
eius apud compressionem, & constricti-
in meatibus, & significant cholericum e-
sanguine subtili, dolor mordicatus, f-
stulosus, id est corrosiuus sine grauitate
multa, &c. Alexan. loc. cit. loquitur etiam
ipse de his indiis, ibi. Quæ feruentis hu-
moris plenitati adscribuntur, dolores in-
tentissimos pariunt: quæ verò tenui sub-
tilique humori erysipelaceas inflamma-
tiones referunt, nulláque grauitate, neque
dole

alore locum excruciant, &c. de aliis indid-
is lege latius hunc locum.

De cura parotidum.

Cura eisdemet præsiidiis, quibus alios
abscessus curare solemus, perficitur, præ-
ter quod nec styptica, neque repellentia in
morbi principio cōueniunt: verū sanguis
exuberante prius sectionem venæ mo-
uemur, quæ peracta considerandum num
parotides in tumore attollatur, an adhuc
altius delitescant: si in tumorem erūpant,
tunc lenientibus mollientibúque, ac dige-
rentibus medicamentis vtemur, qualia
sunt quæ ex farina hordeacea, ex semine
lini, scænigraci, althea, camomilla, lapa-
ro, & infusa axungia parantur. Si verò
altius delitescant, tunc natura cum attra-
ctoriis præsiidiis, veluti cum cucurbitula &
suctum crebro usu, adiuuanda erit. Si verò
abscessus ad suppurationem se conferat,
us mouentibus vtemur: deinde scissa cu-
cus pus excerni cogemus: quòd si dolores
interim agrum molestant, his dolores mi-
guabimus quæ moderatè humectant ac
alefaciunt, &c.

Loci de cura parotidum.

Auic. quarta tertij, cap. 25. Oportet ergo
ne intendas ad curam eius in quātum exi-
gitur ad curam apostematum, adhibendo

styptica & apocrustica in principio, deinde compositionem regiminis, deinde resolutionem puram. Imò oportet vt incipias & propriè quando accidit in febribus cum dolore capitis, & adiuues ad extrahendum materiam ad apostema cum omni ingenio & cum ventosis, &c. Gal. 3. de compositione med. per loc. cap. 2. Non vtimur in parotidibus, vt in aliis partibus inflammatis, in principio repellentibus, sed vice versa attractoriis, vt affligentem humorem ex profundo ad cutem attrahentes, naturæ opem feramus. &c. Vide latius Aet. ser. 6. cap. 89. Paul. lib. 3. cap. cit. Si igitur aliter adhuc delitescens parotis in tumorem non attollitur natura debet adiuuari præsidio quæ coactas sordes extrahant, vel etiam cucurbitula adglutinata, vel crebro fortuum vsu. Sin inflammatione tentata in tumorem erumpat, iis quæ leniunt & concoquant, vtemur cataplasmatibus: at si sanguis exuperare videatur, prius sectione venæ ipsum euacuabis: deinde medicamentis vtire, quæ puri mouendo sunt & vbi abscessus ad suppurationem spectarit, cute descissa pus excerneretur, vel acrimonia medicamento erumpetur, &c. Vide Alex. Tral. longè fufius de singulis his tumoribus differentem.

D

De mitigando dolore lege Auicen. ibi, si fuerit initium eius cum dolore vehementi, sis contentus vaporazione, &c.

De prognosticis parotidum.

Auicen. loc. cit. Et fortasse consequitur andoque ex vehementia doloris eius ut perficiat, & apostematum, quæ sunt sub tegmine auris, illud est magis incolume, quod est secundum semitam bonæ crisis. Illud vero quod est à crisi, cum qua non est signum mutationis, aut præcedit bona crisis, est minus, &c. B. Ratio est, quia quæcumque antea præter naturam concoctione à natura sunt crises, minus sunt: quæ verò cocta materia, bonæ naturæ satius est naturam vincere, quam vin-
de Paul. loc. cit. Si in altum recurrat collu-
res, periculum haud mediocriter subsequen-
tum est, &c. Lege etiam de his fusius Ar-
d. & Sauonarolam.

*De narium affectionibus, & primò
de polypode & ozena.*

Tres inveniuntur narium propemodum
similes affectus, Sarcoma, quod in de-
scriptione polypi ponitur, Ozena & Po-
lypus. Sarcoma, est præternaturale incremẽ
carnis in naribus. Ozena verò, est vlcera
profunda in naribus tetri odoris atq;
fæditum emittens. Polypus verò, est quod-
dam sarcoma simile polypis piscibus: nam

sicuti illi multas habent propagines, mollesq; sunt atq; augmentur, ita hic quoque perfectus. Differt tamē sarcoma à polypo magnitudine tantum & opificio, &c.

Loci consentientes de polypode

& ozena.

Gal. 3. de compos. med. per loc. cap. 1. Paul. lib. 3. cap. 24. Polypus tumor est præter naturam in naribus ortus, polypus carni similis iuxta substantiæ proprietatem. Ozena verò, vlcus est putridum ex humorum acrium illuie creatum. Gale. lib. 1. finit. med. differentiam inter polypum & sarcoma enarrat. Auic. nullum agit de polypo caput, nisi illud sit in quo de hæmorrhoidibus & alharnabeth agit, ubi carni esse in naso additas asserit, nec de ozenæ sermonem facit, nisi fortè in capite vlcum nasi contineatur. Vide latius Gal. 3. de compos. med. per loc. cap. 3. ibi, Ex generum tumorum præter naturam polypodes in naribus generantur, &c.

De causis polypodum & ozenæ.

Ozenæ cæterorumq; vlcum ac tumorum causæ esse possunt multiplices, sicuti à vultu, ab ascessu, ab humorum acrimia influxu, à vaporibus acutis paulatim rodentibus, donec vlcera pullulent. Causæ etiam esse possunt quæcunque hæc omnia irri-

ta

re possunt. Similiter polypodes fiunt ex humoribus crassis à cerebro ad nares inuentibus, vel ex ipsarum narium nutrimento, à facultate nutritoria & auctrice, in carnem mutato, &c.

Loci de causis polypodum

& ozene.

Gal. 3. de cōpos med. per loc. cap. 3. Manifestum est affectionem hanc polypodis ex crassis & viscosis humoribus generari, & ozenæ ex humorum acriū & putrescibiliū influxu generantur, ita ut si acres solum sint, ægrè curabilia vlcera producere conueuerunt, non tamen graueolentia. Auic. quarta tertij, de vlcer. in naso cap. 3. Quandoque generantur vlcera in naso ex vaporibus acutis aut malis, aut catarrhis acutis, &c. De his legito accuratius Alexan. lib. 1. cap. 35. Et Paul. ibi, Ozena est vlcus ex humorum acrium illuue creatum, &c.

De polypodis & ozene cura.

His ambobus curandi scopus idem est, ut primum corpus euacuetur, materiâque per reuulsionem ac deriuationem adhuc fluens intercipiatur, caputque firmetur ac corroboretur: quo corroborato ad narium curationem progrediendum, ita ut in ozenis affecta pars tum per repellentia, tum discutientia pharmaca resiccetur, sed in

polypo partim adstringant, partim sicc
ac extenuent, partim discutiant ac conde
sent. Si igitur totius corporis humoru
copiæ indicia adsint, euacuatio prius ac
per sanguinis missionem, aut purgatio
ne per hieram perficietur: deinde loco in
dantur remedia. Cura ozenæ erit pro
de vlceribus aurium dictum est. Polypod
verò cura fiet, si cum filo tenui ligetur, &
in radice sua incidatur: & ubi ager ma
nualem abominatur operationum, procu
randum est vt acribus medicamentis pol
pus extirpetur, sicut cum puluere corti
cum granatorum, arsenico cre vsto, nitro
cantharidibus, &c.

Loci de cura polypodis

& ozenæ.

Galen. 3. de compos. med. per loc. cap. 1
Cæterùm curatio vtrisque his communi
ozena & polypodi, vt primùm caput sicce
tur, firmetur, & corroboretur, quum pa
lâm sit, ob vitiatorum humorum redun
dantiam defluxum ex eo prouenire: quo
roborato, ad naris curationem progre
dieris, scopo in ozenis proposito, vt af
fecta pars per mixtæ facultatis pharma
ca, tum repellentia, tum discutientia, resic
cet. Repellunt austera & acerba, quæ ad
stringentia dicuntur: discutunt verò cali
da

& sicca facultate prædita. Similiter in polypode mixta materia medicamentaria us est, ut partim astringat, partim siccet attenuet, partim discutiat & condenset, &c. Paul. lib. 3. cap. 24. itidem ait, ibi, Quñtius corporis humorū copix suspicio fue, hæc prius aut sanguinis dimissione aut argatione ex hiera euacuetur, &c. Auic.

Mes. curationem polypodis manualement, per incisionem & cauterium cum ferro ignito, aut acri medicamine, quos, si beat, leges. Hercul. recitat vng. de quo, loquit, modernos se profiteri omnē polypum & carcinoma curare, & est medicina artis, cuius operatio durat tribus diebus, ad circūstantes partes cū defensiuis & sicis frigidis defendantur, cuius descriptio hæc est. R. cantharidarū p. j. arsenici sublimati p. β. vel plus & minus, prout fortius ut imbecillius operari desideras, & cum xymelle simplici aut sapone nigro fiat unguentū: caue tamen mēbra principalia: nam tota vis in arsenico reponitur, &c.

Polypum & exenæ curantia.

Faciunt ad remotionem polypi, puluis antimoniis, arsenici, aristologiæ, calcanti, ciclamini, dragontæ, æris vli, floris æris cum melle vel succo serpentariæ, succus mali granati, videlicet granorum eius
acer

acetosorum cum ossibus suis cum mel-
coctus ad spissitudinē, hermodactilus cur-
are vsto. Faciunt etiam ad vlcera narium
aloes, aristologia, auri pigmentum, cipe-
rus, ciclamen, liciū, plantago, sicla, su-
mach, bleta, &c.

De polypi & oxenæ prognosticis.

Auic. quinta tertij, cap. 2. Carnes aldit-
si sunt, molles, albæ, & non sit in eis dolor
sunt facilis curationis. Quæ verò sunt ru-
bæ aut fuscæ, vehementis doloris: cum
nie foetida, sunt difficilis curæ. B. Molles
quia pituitosa facilè curationē admittunt
sed liuidæ difficulter, quum canceri prope
modum naturam sapiant. Mesu. cap. de po-
lyp. nar. Polypus qui fit in naribus durus
niger, & non tractabilis, & mollis & putr-
dus & foetidus, fortassis nō sanatur, sed qu-
elongatur & pendet, habens radicem gra-
cilem, nō nimis profundatam, curatur per
incisionem, &c.

De dolore dentium.

Manifestum est quid dolor sit dentium,
sed locus doloris adeò latet, vt vix à medi-
co diuinari possit. Qua de re triplex erit
doloris locus, aut in substantia ipsius den-
tis, aut in nervo ad radicem dentis prostra-
to, aut in gingivarū substantia inflamma-
tionem patiente, &c.

Loci

Loci consentientes de dolore dentium.

Gal. 5. de compos. med. per loc. cap. 8. Ex dentium affectionibus aliquæ euidēter apparent, veluti quū perforati, denigrati aut attriti sunt, aut frigida nec calida ferunt, id ab vtrisque aut ab altero solo dolor eis contingit: aliquæ non manifestè apparēt, veluti quum circa corpus dentis in profundo obortus sentitur, &c. lege de his Paul. lib. 3. cap. 26. & Auic. septima tertij. cap. 4.

De causis doloris dentium.

Causa doloris dentium aut est mala intemperies, aut soluta continuitas. Si mala intemperies, vel nuda erit, vel cum materia: quæ si fuerit multa, partes extendens, dolorem excitabit: si verò pauca, tenuis & icris, tunc vlcus inde orietur, & per consequens dolor: at si erit intemperies nuda absque materia, tunc erit vel flatuosa, vel nimis calida & frigida, &c.

Loci consentientes de causis doloris dentium.

Auic. septima tertij, cap. 4. Causæ doloris dentium sunt aut malitia complexionis pura cum frigore & calore, aut est cum materia aut vëtositate: si cum materia, vel hæc est multa vel pauca, crassa vel acuta: aut materia apostemans dentem, vel erodens, vel

vel vermem nasci faciens, & tunc vel à
pite, vel à stomacho, vel à toto, vt in feb-
bus materia descendit, &c.

Galen. 5. de compos. med. per loc. cap.
Perforantur dentes ex acriū ac rodentiū
humorum influxu, velut vlcera in cute
tra externam causam: similiter dentes l-
di siue denigrati ex humorum vitiatorū
influxu fiunt, &c.

De signis doloris dentium.

Dentes esse affectos cognoscimus ex
nigredine vel corrosione: sed si in suo pe-
manferint colore, inquirendum est, num
malus color in gingiua videatur, aut si r-
mida, aut quid erosionis vel putrefactionis
in se habeat: nam tunc ex se dens non d-
let, sed ex mala affectione in gingiua: ve-
si nihil horum adfuerit, coniecturandum
est affectionem esse in neruo, praesertim
dolor in profundo sentiatur. Cognosc-
etiam haec, si gingiuam gingiuae, vel den-
tem denti comparaueris: ita etiā mala in-
temperies siue calida siue frigida, per co-
lorem cognoscitur, vt si pallida, rubea, a-
ba, item ex applicitis, iuuantibus ac noce-
tibus, &c.

*Loci consentientes de signis
doloris dentium.*

Gal. 5. de comp. medi. per loc. ca. 8. Si den-
te

tes liuidi per omnem suam substantiam facti appareant, nihil mirum est ipsos quid inflammationi simile pati, &c.

Auic. septima tertij. cap 5. omnia ferè recitat quæ à me nuper relata sunt. Vide insuper Arcul. 9. almās. & Mesu. ca. proprio.

De cura doloris dentium.

Cura duplex est, vniuersalis & particularis. Vniuersalis in se continet euacuacionem, reuulsionem, & fluxus cohibitionē. Euacuatio fit vel per sectionem venæ, aut ventris solutionem, præsertim vbi abscessus aliquis, aut sanguinis copia in causa fuerit. Secetur igitur primùm vena cephalica, deinde quæ sub lingua later. Reuulsio fiat cum cucurbitulis & extremarum partium frictionibus, &c. Fluxus cohibetur per pilulas alchaiber nominatas. Cura particularis duplex, regularis & coacta. Regularis erit in materia calida, vt primùm destillationes repellantur cum frigidis, sicut rosa, myrtho, camphora, &c. deinde repellentibus discutientia commisceantur, & in fine resoluentia & maturantia, prout ad inflammationem pluries dictū est, adhibeantur. Cura coacta consistit in auferendo sensum, quo ablato dolor sedatur. Si verò inflammatio fuerit in neruo dentis, tūc dens eradicandus erit. Si verò præ mollietie dens

erosus

erosus sit, reddere oportet eum duriora
per austerā & acerba medicamina. Si liui
& nigri, per resiccantia pharmaca.

*Loci consentientes de cura do-
loris dentium.*

Galen. 5. de compos. med. per loc. cap.
Erosione dentium, siue cauernæ, per ex-
cationem influentis humoris vitiosi sam-
tur: qui si paucus fuerit, ex localibus au-
lis exiccantibus medela sufficit: si multus
influens humor, vniuersi capitis ratione
habere conuenit: sed si caput à reliquo
pore afficiatur, totius corporis cura gen-
da est. Porro erosos dentes, qui præ mol-
tie perpeSSI sunt, reddere oportet duriora
per austerā & acerba medicamenta. Sin-
li etiam cura indigent liuidi & denigri
cum perforatis per resiccantia pharm-
ca, &c. Auic. septima tertij, cap. 6. Inquit
dum an per se vel per consensum fiat do-
lor: si per consensum, incipe ab euacuati-
one membri consentientis cum phlebot-
mia, & ventris solutione, cū hiera aut se-
monio: si verò per se, cum scarificatione
similibus: deinde si materia calida, cum
gidis: si frigida, cum calidis: si sicca cum
meccantibus & dolorem leniētibus: si fu-
rit in causa siccitas, cōfert vt fricetur de-
cum butyro & adipe anatis, &c. Mesu. I.

teno

entio in cura duplex est, vniuersalis & articularis: vniuersalis habet tres res, prima est euacuatio, &c. Vide eum fusius: vide tiam Arcu. 9. almanf. cap. proprio, & alios ractificantes, &c.

*Obseruatio in cura doloris
dentium.*

Gal. 5. de compos. med. per loc. cap. 9. In dolore dentium citra gingiuarum inflammationem, siue in proprio dentium corpore, siue in neruo dolor fiat, vehementissimis opus est medicamentis, siue quis velit epellere, siue discutere doloris causam, siue humor sit, siue ventus, & propterea omnia acerrimo aceto praparentur, &c.

Nocentia dentibus.

Nocet dentibus, brassica, dactyli, gummæ, granata dulcia, lac, nix, porrum raphanus.

Curantia dolores dentium.

Ad dolorem dentium valent acetum, vitium decoctionis acetosæ, acorus, aphodillus, alij decoctum cum pini ligno & olibano, alumen, amygdalarum folia in aceto cocta, assa been, betonica, borax. Pulsationem dentis mirabiliter tollit chameleontis nigri decoctio, cappares, lac capræ, radix chelidoniæ, cypressus, colocynthis, cornu cerui decoctum, radix cucumæ ma-

sticaca, hedera, galla, gith, gramen, lace-
malua, melissa, mezerō, morus, nasturci
peucedanū, pinus, pyrethrū, portulaca, ro-
marinus, sandaraca rosa, ruta, sumach, l-
xifragia, hyssopus, sparagus, oleū verm-
terrestrium, myrthinum, de citro, de vit-
lis ouorum, oleum benedictū Nic. & de
rifricium Democriti. Auic. tra. 4. sum. 2.
medicamen Adronici. Auic. eodem in l-
co. mitridatū Nic. Sotira Auic. prima qu-
ti, & c. Reseruant ad dolorem dentium, si-
cus ceparum, sanguis testudinis marinę f-
catus, & c.

*De doloris dentium pro-
gnosticis.*

Auic. tertia tertij, cap. 5. Si affectio fue-
rit in gingiua, nunquam remouebitur do-
lor cum dentis extirpatione: si verò in ne-
uo fuerit, nec per remotionem dentis in-
terdum remouetur, & interdum iuuat. I-
Quòd dentis eradicatio minimè utilis si-
omnibus notum est: at si in neruo fuerit
exempto dante facilè curatur, quum mate-
ria quæ prius cum dente erat retenta, exi-
tum habeat: non iuuat interdum, quū ma-
teria sit crassa & neruo nimis adhereat, & c.
Hipp. 4. aphor. aphor. 53. Quibus circa dē-
tes in febribus quidam lentores nascun-
tur, iis fortes fiunt febres. Lege etiā pro-
gnos

gnost.1.tex.2 4.ibi. Si quis studeat dētibus
non cōsuetus à pueritia ita facere malum.

*Authores erronei dissentientes circa
dolores dentium.*

- 1 Adserere, dentes per se dolorem posse
pati cum zoar primo thesir.
- 2 Adserere, dolores dentium magis affici
à calido, quàm à frigido.
- 3 Adserere, dentes ab aliis ofsibus non
differre.
- 4 Adserere, in dentibus non posse aposte-
ma spurium fieri.

*Confutatio dissentientium circa
dolores dentium.*

Ad primum, Arist.1.& 3.de anima, Pilis,
ofsibus, vnguibus nullus est sensus, quum
sint naturæ terreæ, propter quod etiā plan-
tæ nullum habent sensum: sed dentes sunt
ossa per Auic.prima primi.ca.de anoth.of-
sium, & secundo de generatione animalium
cap.6. igitur dolorem non patiuntur: nec
obstat dictū Gal.3.de sympt.cau.nec Arist.
problem.2.& 3.cap.6.problem.2 2.vbi ha-
betur, quòd dentes celeriter & dolent, &
sentiunt frigus & sic patiuntur: nam hoc
non per se, sed potius per accidens euenit.

Ad secundum, Hip.aph.5.aph.18.Frigi-
dum inimicum ofsibus, dentibus, nervis
cerebro, spinali medullæ, calidum verò

utile, vbi Gal. Quæcunque partes sunt natura frigidiore & penitus exangues, citius ac magis à frigido offenduntur, quàm à calido, &c.

Ad tertium, Arist. 2. de generatione animalium cap. 6. & 2. de anima, inquit, quod ossa non crescunt, ibi, Omnium natura constantium impositus est finis magnitudinis & augmenti, sed dentes crescunt, ut patet experientia, igitur ab aliis ossibus differunt: alioqui in contritione & contactu nisi crescerent, omnino contriti perderentur.

Ad quartum responderet Serapio, 2. de dentibus, ibi, Si dentes in suo toto corpore viriditatem accipiunt, tunc non mirandum si consequatur eos, quod simile sit apostematis. Vel dic posse apostemari per viam congestionis, id est, ex superfluitate nutrimenti, non per viam rheumatis, sicut alia apostemata. Lege Concil. dra. 96

De gingivarum affectionibus.

Accidunt gingivæ inflammationes, ulcera serpentia, parulis & epulis. Inflammatio est calidi sanguinis influxus. Parulis, est alicuius partis inflammatio, quæ nisi discussa fuerit, in suppurationem vertitur. Epulis, est carnis excrecentia, quæ ab
inflamm

inflammatione contracta ad intimos mo-
res dentes pertinet, nonnunquam cum
febre & dolore, &c.

*Loci consentientes de gingivarum
affectionibus.*

Gal. 6. de comp. med. per loc. cap. 1. Inflā-
natio est calidi sanguinis influxus, &c.
Aet. ser. 8. cap. 24. Parulis est inflammatio
licuius partis gingivarum cum tumore,
uæ ubi non dissoluitur, suppuratur. Epu-
is verò, est excrementia carnis ab inflam-
matione consequuta, iuxta interiorē den-
tem molarem, aliquando cum febre & ve-
ementi dolore internarum mandibula-
um, ut neque os ægro aperire liceat, con-
ingens, &c. Lege de his etiam Paulum.

De causis gingivarum affectuum.

Causa vel est extrinseca vel intrinseca: si
extrinseca, tunc erit vel pluviosa constitu-
tio calida & humida, vel cæteræ dispositio-
nes ad humorum putredinem paratæ. Si
intrinseca, vel à parte ortum habet, vel à
toto: à parte, sicuti à capite vel à stomacho:
à toto, sicuti in febribus, vaporibus scili-
cet ad gingivas peruenientibus, ex qui-
bus ulcera & inflammationes oriuntur,
eo quòd in hac oris partes tam tenues &
debiles facilimè imprimantur, &c.

*Loci consentientes de causis affectionum
gingivarum.*

Auic. octaua tertij, ca. 1. Gingivæ accidi
apostemata causa materiei descendentis a
ipsam secundū plurimū ex capite, & quan
doque ex communitate stomachi, & qua
doque accidunt in principio hydropisis e
malitia formæ, ob id quod ex vaporibu
corruptis ad eam eleuatur, &c.

*De signis affectionum gin
givarum.*

Cognoscitur humor putribus per colo
rem & tactum: nā cognitio nostra quæ pe
visum quādoq; decipitur, ex tactu interd
certior fit: ex tactu enim omnes qualitate
percipimus, vt durum, molle, calidū, frigi
dū: interdum inflammationes & vlcera pe
se manifesta sunt, & plerunq; cū febre sūnt

*Loci consentientes de signis affe
ctionum gingi
varum.*

Auic. loc. cit. Et significatur genus mat
rieriei per colorē & tactū, & quandoque sun
ex eis manifesta, recētia, velocia ad susci
piendam curam, &c.

De cura affectionum gingivarum.

Vbi totum corpus apparuerit aut mult
tudine humorū refertum, aut eorū maliti
vitiatum, primū antequā ad topica per
uenias,

enias, per sectionem venæ, per purgationem ac inediam curabis: quum verò ad toxica accesseris, duo scopi erunt considerandi: alter ab ipsius affectionis indicatione, alter à particulæ quæ curatur natura. In ista affectione conuenit vt in principio id quod influit, repellatur. Repellentia sunt uæ adstringendi vim habent, post principium vsque ad morbi finē pharmaco opus est repellente & discutiēte, sed primo tempore adstringens præcellat, in fine verò discutiens, intermedio tempore æquales vtriusque partes sint. Si verò quid induratum de inflammatione relinquatur, non sunt adstringentia cum discussoriis miscenda, sed ita curandum, vt concoctoria præcedant ad discussoria. In particulæ natura, consideretur superficiem oris esse cure totum corpus ambiente molliorem ac rariorem. Quia de re nō fortibus auxiliis indiget, &c. Cura parulidis fiet per discussoria, antequam suppuretur, sicuti per collutiones ex decocto seminis lini, sed epulidis inflammatio cum discussoriis ac siccis deprimentibus iuferetur, &c.

Loci consentientes de cura affectionum gingiuarum.

Gal. 6. de compos. med. per loc. cap. 1. eandem methodum enarrat, quam nuper re

tulimus, sed longè satis fusiorē. Aet. ser. 8. cap. 24. & 25. Parulis dissoluenda est antequam suppuretur per collutiones, qualesunt, succus ptisanæ, decoctum seminis lini, deinde siccis deprimenda est carnis emmentia. Similiter epulis inflammatio cum dissoluentibus & siccis deprimentibus curanda est: quod si suppurentur, incidantur & vlcus per collutiones curetur. habes remedia epulidis ex Gal. 5. de compos. med. per loc. cap. 9. & à Paul. lib. 3. cap. 26.

Auicē. octaua tertij, cap. 2. loquens de inflammatione, inquit, Si materia est superfluitas calida, tunc administra euacuationem & phlebotomiam, & cura in principio cum collutionibus oris infrigidantibus, & sit in eis stypticitas, sicut aqua myrthi, & foliorum frigidorum stypticorum, & decoctio balaustiarum glandium, & succu portulacæ, arnoglossæ, & c. Lege de his Galenum fusius in loco nuper citato, & c.

*Observationes de repellentibus
& discutientibus.*

Gal. 5. de compos. med. per loc. cap. 9. Inflammationes repellentibus citra asperitatem & discutientibus sine asperitate indigent. Hoc idem refert etiam Aet. ser. 8. cap. 20. Gale. 6. de compos. med. per loc. capit. 1. Quum gingiuarum caro sit mollis
&

et rara, idcirco fortibus auxiliis non indiget. Vitentur insuauia ob eius sensum, tem venenosa, ne ob duos meatus subiacentes aliquid in ventrem vel pulmonem influat, &c.

De linguae batracho.

Ranunculus, Græcè βάτραχος dictus, est tumor venarum quæ potissimum sub lingua continentur. Sunt inter Auicennianos qui morbum appellent glandulam. Crescit ac si noua lingua oriretur: vnde sunt qui velint carnem additam esse linguae batrachum, alij apostema pituitosum.

Loci de linguae batracho.

Paul. lib. 3. cap. 26. Batrachus, tumor est ad inflammationis similitudinem, sub lingua erumpens, maximè in pueris. Itidem adserit Aet. ser. 8. cap. 37.

De batrachi causa.

Si tumor fuerit pituitosus, omnino ab humiditate viscosa à capite descendente fiet: si verò caro addita, tunc fiet sicuti & alia caro, &c.

Loci consentientes de batrachi causis.

Auicen. sexta tertij, capit. 17. Et causa eius est humiditas viscosa, &c. vide ipsum fusius.

E s

De batrachi indicijs.

Cognoscitur, quia similis est ranæ in colore, quum superficiei & venarum lingua: tumor sit, &c.

Loci consentientes de batrachi indicijs.

Auic. loc. cit. Est similis glandulæ duræ existentis sub lingua, cuius color est similis colori compolito ex colore superficiei linguae & venarum quæ sunt in ea, & est similis ranæ, &c.

De batrachi curatione.

Considerandum in primis est, num in puerulis, an in perfectæ ætatis hominibus cura fieri debeat: nam si in puerulis, tunc collutiones tantum conueniunt: si verò in maturis hominibus, tunc primùm sectio venæ sub lingua: & si ranunculus magnus fuerit, oportet vt scindatur & extrahatur. Verum in primis experiendæ sunt medicinæ corrosivæ, incisivæ ac resolutivæ: deinde si nihil profeceris, nil erit quod ab operatione manus te excuset. Medicinæ igitur in principio parantur ex sale, ammoniaco, & gallis, & diu fricetur locus, deinde flore æris, dragacanto, & similibus vti poteris, &c.

Loci consentientes de batrachi curatione.

Aet. ser. 8. cap. 37. In cura hoc discrimi-
nis

is est, vt aliter in pueris ac imperfectæ
etatis hominibus medendum sit, siquidē
is sectio venæ sub lingua, illis verò collu-
iones tantum cōueniunt. lege de his Paul.
ib. 3. cap. cit.

Auicē. sexta tertij, cap. 18. Experiantur
in ipsa medicinæ corrosiuæ, incisiuæ, reso-
utiuæ, in quibus est superflua exiccatio, vt
al, ammoniacus, & fricatio cū flore æris,
& dragacanto, & administrentur phlebo-
omia sub lingua & medicina fortis alco-
a: si autem non valuerint, non erit excusa-
tio ab operatione manus, &c.

De aphthis, id est, oris vlceribus.

Quas Græci ἀφθᾶς dicunt, Auicenniani
alcola, nos pustulas in superficie oris ap-
pellamus, &c.

Loci consentientes de aphthis.

Gal. 6. de comp. med. per loc. cap. 4. Aph-
thæ sunt vlcerationes in superficie oris
abortæ, habentes quidpiam caliditatis
igneæ, &c.

Aet. ser. 8. cap. 39. idem refert. Auicē.
sexta tertij, cap. 23. agit de his sub nomine
alcola & vlceribus malignis, &c. Vide Hip-
po. 3. aphor. aphor. 24. ibi, In ætatibus ta-
lia contingunt paruis & nuper natis
puerulis, oris vlcera que aphthæ vocan-
tur, &c.

De

*De causis aphtharum, id est,
oris ulcerum.*

Fiunt aut à lacte nutricis vitiato, aut e humorum vitiosorum ad hos influxu, aut ab acredine eorum quæ bibuntur acceduntur, &c.

*Loci consentientes de causis
aphtharum.*

Gale. 6. de compos. med. per loc. cap. 4. Fiunt ut plurimum pueris lactentibus quum vitiosum fuerit nutricis lac, aut non probè ipsum concoxerit infans, &c. Auic. sexta tertij, cap. 23. Non accidunt eis nil propter malitiam lactis, aut malitiam digestionis eius in stomachis ipsorum, & quandoque accidit ex humore omni. Aet. loc. cit. Fiunt etiam in his qui ad perfectam ætatem peruenerunt, tum propter vitiosorum humorum ad os defluxum, tum propter acridinem eorum quæ bibuntur acceduntur, &c. lege aphorif. 3. Galen. comment. 24. ibi, Causa harum nil aliud est quàm mollities instrumentorum, quæ neque tactum, neque lactis sustinent qualitatem. Et com. 32. eiusdem, ubi, inquit, à substantiam tenuem habentibus, & à mordacibus humoribus fieri, &c.

De aphtharum indicijs.

Cognoscuntur ex tactu & visu aphthæ
ex

et tactu, dum color & tumor excitantur: visu cognoscuntur ob colorem: nam albus vituitam, flauus bilem, rubeus sanguinē, niger atram bilem significat, &c.

Loci consentientes de aphtharum indicijis.

Aet. ser. 8. cap. 39. Cognitio omnium facilis est, ut pote visui & tactui subiecta: ad tactum quia calidiores quam expediat loci sunt, tumoresque excitantur: visu verò cognoscuntur ob colorem, nam rubicundiora à sanguine, &c.

Auicē. sexta tertij, cap. 23. Cognoscitur colore suo: album enim est phlegmaticum ex phlegmate falso in pluribus, & cinereum est cholericum vehementioris inflammationis quam alia, & nigrum est melancholicum & rubeum, clarum est sanguineum, &c.

De cura aphtharum.

In primis curandū est, ut humor ex quo ulcerationes fiunt, statim euacuetur, deinde ut venæ sectio: nam in his ulceribus maxime cōducit: quibus peractis, tūc si subrubrescerint ulcerationes, uti oportet refrigerantibus, & moderatè adstringētibus à principio præsertim & in puerulis, deinde his quæ circa mordacitatē discutiunt. Si verò subflauæ fuerint, tūc similibus utendū, sed frigidioribus

ribus: si nigræ, discutiētibus, &c. In adultis
verò efficacioribus remediis vtendum, &

*Loci consentientes de cura
aphtharum.*

Auic. loc. cit. cap. 24. Oportet vt inte-
datur primò humori dominanti & facie
ri alcola, & euacuetur ex corpore toto, si e-
dominus, deinde phlebotometur ex ven-
quæ sunt sub mento. Phlebotomia eni
confert omnibus ægritudinibus oris cal-
dis, &c. Galen. 6. de compos. med. per lo-
cap. 4. Quæ in superficie tantum sunt, fac-
lè ex moderatè adstringentibus curantur
quæ verò diuturna & depascentia sunt, fo-
rioribus remediis vtendum. Aet. ser. & lo-
cit. Si subrubræ infantium vlcerationes
fuerint à principio cum his quæ mediocr-
ter adstringunt & refrigerant: deinde h-
quæ citra mordacitatem discutiunt: si sal-
flauæ, iisdem similiter vtendum, verum m-
gis frigidis, &c. Vide fusius.

Observatio in cura aphtharum.

Auic. sexta tertij, cap. 24. Et oportet
alienet omnia olea, vsque ad oleum de ol-
uïs, &c.

Aphthis nocentia.

Nocent ori & palato quædam specio-
brassicæ & capparorum, lacticinia, melon-
gia, nuces, raphanus.

Ap

Aphthas curantia.

Ad vlcera oris profunt absinthium, om-
baciū, alumen, butyrū, camomilla, cam-
hora acatia, aloes, verbena, lutum arme-
um, plantago, rosa, rubus, spodium, dra-
acantum cum amylo, & aqua rosacea dis-
olutum, granata mala, galla, oliua, malua,
tium, lac, aphodillus, &c.

De aphtharum prognosticis.

Auic. loc. cit. Cholericum est vehemen-
tis inflammationis, sed omnibus malignius
est melancholicum siue cum apostemate si-
ne singulare sit. Et omne vlcus eueniens
in superficie oris est velox ad dilatandum.
Scito vlcera in temporibus pluuiosis &
in febribus pestiferis multiplicari. Quod
erò vlcus facile dilatetur, vt ait Auicē. ex
eo fortè contingit, quòd locus in quo vlce-
ra fiunt, caliditate non deficit, & cutis mol-
lis & humida facilius vlceratur. Paul.

lib. 1. capit. 10. Quod modo cru-
stæ nigrescit, omnium per-
niciosissimum & le-
thale est,

&c.

I O A N N I S

B A C C H A N E L L I

Regiensis, De consensu Me-
dicorum in curan-
dis morbis,

Lib. III.

*De tonsillarum columellaq; in-
flammationibus.*



Tonsillæ, aliàs glandulæ, o-
quandam glandis similitu-
dinem, à tole, qui author
Festo est faucium tumor, di-
ctæ sunt, fiuntque circa co-
lumellam ex vtraque parte infra fauces, &
Græcè *παρίδμια*, & Arabicè amygdal.
vocantur. *κωρί* verò siue gurgulio, vel co-
lumella (quanquam gurgulio propriè par-
sit gutturis à naribus ad pulmonem, con-
stans ex cartilagine & carne per quam spi-
ritus meat ac remeat) accipitur tamen pro
columella caruncula, quæ dum summa ex-
stet, gurgulio dicitur: dum verò colūnx in-
stat propēdet, columna vel columella: hæc
dū superius angusta est, & inferius rotūda
ob vuis similitudinē vua & vuula dicitur
dū verò gracilescit, vel ab influxu humide

laxio.

laxior euadit, tanquam loro similis pendens, lorum dicitur.

*Loci consentientes de tonsillis
& gurgulione.*

Gale. Aphor. 3. com. 26. Tonsillæ sunt lorum ad isthmum attinentium inflammationes. B. Intellige per isthmum, partem illam quæ os & gulam interiacet dictâ per metaphoram. Aet. ser. 8. cap. 40. Gurgulionem quidem columellam appellant, vix verò nomine accipienda est quædam in eo affectio, quum vix acino simile summum gurgulionis apparet. Lorum verò aliam affectionem vocant, quum ex suffitis, nimium ignitus gracilescit, & loro similis propender, &c.

Gal. 6. de compos. med. per loc. cap. 3. Columella carnosæ quædam est particula in summo ore dependens, quæ duobus nominibus appellatur à veteribus Græcis gargareon & cion, id est, gurgulio & columella: quamquæ non cion, sed cionidem posteriores medici, id est columellam vocarint: nec licenda via est, quum sit hæc gurgulionis affectio, &c. Gal. Aphor. 3. comen. 26. Tonsillæ sunt nonnunquam solius tunicæ ventri ac gulæ & faucibus totique ori communes inflammationes, nonnunquam verò & subiectorum ipsi musculorum, &c.

F

*De causis tonsillarum &
gurgulionis.*

Omnis inflammationis causa procata
etica est, vel nimia meri potio, multaque
ciborum maximè acrium deuoratio. Ca
sa verò antecedens est humorum influxus
vel humores liquidi quibus lingua larina
que & aspera arteria humescere solent, a
malignū redacti, vel vapores ipsi à febris
calore concitati ac elati. Causæ coniunctæ
sunt humores ad actum inflammatione
reducentes, &c.

*Loci consentientes de causis
tonsillarum.*

Gal. 6. de cōpos. med. per loc. cap. 3. Fium
hæc, quemadmodum dictum est de ali
inflammationibus, ex humorum influxu
&c. Aet. ser. 8. cap. 45. Tonsillarū inflamma
tiones plerunque fiunt à nimia meri po
tione, & à multa ac auidiore ciborū deu
oratione maximè acrium & asperorum
fiuntque iis maximè, qui plurimo abun
dant sanguine, vel pueris qui texturam ha
bent teneram. Auic. nona tertij, cap. 12. Illi
quandoque accidit catarrhus apostema
eas (nam de columella loquitur) ita vt pro
hibeat anhelitum, & quandoque molli
catur vna præter apostema, & indiget eo
quod

quod adstringit, &c. B. Scias quòd Arabes quatuor vuulæ morbos enumerant, & sunt apostema, vlcus, corrosio, & casus. Apostema fieri potest à quacunque materia, vlcus tantum à materia vlcerate, corrosio à multa & acri materia, casus à sanguine vel à pituita gurgulionem remolliente.

De columellæ indicijis.

Cognoscitur facile per visum, si lingua deprimatur, vel si æger in radice linguæ aliquid insistere sentiat, difficultas præter hæc deglutiendi adest, item dolor, & interdum febris, cognoscuntur humores ex eorum coloribus, apostema verò, vlcera & corrosiones per se ex visu manifestant, &c.

Loci consentientes de columellæ indicijis.

Gal. 6. de compos. med. per loc. cap. 3. Cognoscitur hoc si quis aperto plurimum ore toto linguam deprimat, &c.

Aet. ser. 8. cap. 45. In tonsillarum inflammatione accidit difficultas transglutendi, dolor & aliquando etiam febris, &c. Vide in hoc Auicennam, qui tantam deglutiendi difficultatem interdum esse inquit, ut æger digitis suis eam comprimere cogatur, donec transglutiat, & hoc præsertim fit, quum tonsillæ & columella plus iusto humiditatis recipiunt, vel laxantur, vel

inflammationem experiuntur.

*De cura tonsillarum &
gurgulionis.*

Si ex inflammatione periculum imminet, primò euacuandū per sectionem venæ cubiti, deinde reuellendū ac deriuandū cum cucurbitulis collo ac mento affixis, & cū gargarismis, primò leuiter adstringentibus, postea ex decocto furfure, passulari paratis. Quòd si ad suppurationem vertantur tonsillæ, tunc fiant gargarismi ex decocto caricarum & aqua mulsa: si verò augeat morbus, venæ sub lingua secantur aliusque subducatur, postque pharmacia acribus multum discussoriis vtendū est. Si verò quispiam sectionē gurgulionis molitur, reuera præstantius est cauterio gurgulionem resicare, quàm ferro: siquidem nullo potiore remedio tota humiditas ac illā extremitatē defluxa exiccabitur quàm cauterio. Vstionem siue incisionē fiendam denotāt vuulæ attenuatio, & si ab extremitate eius resudet veluti pus, & liuiditas eius partis appareat, &c.

Loci consentientes de cura tonsillarum & gurgulionis.

Gal. 6. de cōpos. med. per loc. cap. 3. Communiter tum tonsillis, tum columella inflammatis aut exulceratis in principio cōue-

ni

nit quies, inedia & cōsequens diēta, gargarismi simplices leuiter adstringētes. In vigore morbi alius subducatur, gargarismi ex decocto ficuum aut ptisanę succo, in quo passulæ sint incoctę. Si verò tonsillæ ad supurationem veniunt, gargarismi fient ex decocto ficuū, aut aqua mulsa calida: si amplius augeſcat malum, & principiū suffocationis suspectū sit, alius forti clysteri vel glande subducatur, vena cubiti secetur, cucurbitulę cū scarificatione collo ac mento affigendæ, fomētis ac cataplasmatibus frequentius & gargarismis vtendum. Quòd si morbus ad nullum horum præsidiōrū cedat, sed augeatur, venæ sub lingua secetur, aut iuxta angulos oculorum vel ea quæ in fronte est, &c. De sectione gurgulionis loquitur Hippo. prognost. 3 cap. 9. tex. 13. ibi, Gurgulio cum periculo secatur, aut vritur, & scarificatur, quandiu rubidus fuerit & magnus: nā inflammatio ad hæc consequitur, & sanguinis eruptio, sed hunc oportet aliis medicamētis extenuare. Vbi verò separatū fuerit, quod sanè vuā vocant, extremūque gurgulionis maius & liuidū fuerit, superior verò pars tenuior, in hoc sanè tēpore tutum est manus admoliri: præstat autem alio prius euacuata manū adhibere, si tempus permittat, & homo non suffo-

cetur, &c. Auicen. nona tertij, cap. 15. Confy-
deretur vuæ subtiliatio & detumitio, &
propriè in inferiore parte eius, & si ingros-
satur extremitas eius, & refundat ex ea si-
cut pus, tunc est melior hora incidendi cum
ferro aut medicinis cauterizantibus, &c.
B. Quoniam vocis plectrum est columella
vt Gal. de usu partium, & in eius incisione
sequatur quâdoque sanguinis profluvium
fiâtque ex eius abscissione frigidior inspi-
ratio, vnde fit vt thorace & pulmone refri-
geratis quâdoque multi intereant. Idcirco
cautius procedendû arbitror, ne dum par-
tem sanare cupimus, maius nocumentum
inde sequatur. Habes etiam remedia pe-
omnia morbi tempora ex Aet. ser. 8. cap. 45
& à Paulo libr. 3. cap. 26. Vide & alios pra-
cticantes, &c.

De angina & strangulatione.

Angina quæ à Græcis *συνάγχη* dicitur, est
musculorum, faucium interiorum inflam-
matio, qua fauces anguntur & strangulan-
tur, anhelitum vel deglutionem impediens
sicuti *παρὰσυνάγχη* exteriorum. Hic mor-
bus ab imperito medicorum vulgo desse-
xa voce à synanchi, Squinantia dicitur. Di-
citur tonsillæ etiam, quamquam Plinius
tonsillas ab angina seiungat. Strangulatio
verè

erò est subitus ob inspirationis defectum
interitus. Angina quatuor habet differen-
tias, ut infra in Aet. videbitur.

*Loci consentientes de angina &
strangulatione.*

Gal. Aphor. 4. comment. 34. Quum mu-
culi gutturis anteriores una cum ambien-
te tunica inflammationem patientes viam
spiritus valent intercludere, medici talem
dispositionem vocant synanchen, &c. Paul.
ib. 3. cap. 27. Angina quæ ουνάγχη à Græcis
licitur, musculorum faucium interiorum
est inflammatio, sicuti parasyanche exte-
riorum. Auic. nona tertij, cap. 8. loquens de
suffocationibus describit esse apostema in
guttore anhelitum vel deglutionem vel
utrumque impediens, &c. Gal. Aph. 4. com-
ment. 34. Strangulatio nil aliud est quam
subitus interitus ob inspirationis defectum,
qui fit ex angustia alicuius instrumenti ex
iis qui seruiunt respirationi, &c. De ang-
inæ differentiis loquitur Aet. ser. 8. cap. 47.
Anginæ quatuor differentiæ existunt: pri-
ma, quum fauces inflammantur. Altera,
quum nec circa oris regionem, nec iuxta
fauces, nec forinsecus quicquam apparet,
sed iuxta asperæ arteriæ extremum suffo-
catio ægrum angit. Tertia, quum ex-
terna regio una cum interna fuerit iuxta.

mentum inflammata. Quarta, quū cervicis vertebræ à suo loco excidunt, vnde lingua à luxata vertebra ad suā radicem impulsā quandoque ex suis propriis locis excidit, & difficultas respirandi magis infestat, vnde aperto ore semper hiare, atque aërem attrahere æger cogitur, &c. B. Præter has quatuor differētiās à loco sumptas sunt aliæ quatuor species ab humoribus sumptæ, scilicet à sanguine, bile, pituita atra bile, quamvis rarò hæc vltima ob succrassitiem eveniat. Specie verò, quæ ex luxatione cervicis verticuli contingit, caninam suffocationē vocat Auic. ad similitudinem canis, qui aperto ore vehemēter ex lassitudine anhelat. Vide Gale. 2. prorrh. cōmen. 54. & Apho. 4. cōmen. 35. De aliis anginae speciebus mentionē facit Hip. & Gal. 3. prognost. tex. 16. & ibi quid sint fauces euidēter exponit. Similiter Aph. 4. cōmen. 34. inter gulam & guttur spatium fauces nominat, &c. Lege de speciebus anginae Gal. 4. de loc. aff. cap. 3. circa finem, &c.

De anginae causis.

Causæ procatarcticae sunt ciborum facultas qualis est potus frigide, ebrietas, nimia satietas, frigiditas aëris, & quæcunque ex respiratione attrahuntur mala. Causæ antecedentes sunt totius vel partis repletio,
aut

ut partium quæ circa fauces guttûrque
xistunt, vel humores fluentes, vt sanguis,
ilis, pituita, &c. Causæ cõiunctæ sunt hu-
iores anginam actu facientes, qui partim
xi sunt, partim fluunt, ex quibus binæ
pecies pullulant: altera scilicet à glutinosa
igidâque fluxione, altera vrrò à calida &
ri, &c.

*Loci consentientes de causis
anginae.*

Aet. ser. 8. cap. 47. Anginæ causæ multæ
nt, frigiditas magis quàm ardor, & pla-
æ, & ex piscibus ossa ad tonsillas impacta,
potus frigida, & ebrietas, nimia satie-
is, & quæ ex respiratione attrahuntur ma-
l. Auic. en. nona tertij, cap. 9. Et quandoque
iusa est propter quosdã cibos, &c. Et sub-
ens causam antecedentem inquit, Quòd
on est semper repletio totius corpo-
is, nec superabundat superfluitas, nisi in
membris vicinis gutturi, & facit euenire
postema, &c. Et subdit, Quandoque acci-
unt ex sanguine, vel ex cholera rubra,
ut ex phlegmate, rarò verò ex melancho-
a. De causis coniunctis loquitur Gal. 4. de
ic. rat. in mor. ac. comment. 30. Et Hippo.
odem in loco, ibi, Synanche, id est, angina,
fit quũ hyeme verèque fluxio multa &
iscola ad venas iugulares defluerit, &c.

Vnde Gale. Fluxionum quæ à capite deferruntur, quædã sunt substantia tenues, aliæ ex crassis viscosisque humoribus fiunt. Tenues penetratis latis venis in angustioribus detinentur. Crassæ verò cōtrarium obtinent, vt in latis contineantur, strictas penetrare non valentes. Quum igitur in faucium venis tales impacti fuerint humores, pars in tumorem attollitur, &c. Scias quòd quum nerui & ligamēta ad partes inflammatas extenduntur, tunc vertebræ vel intra, vel ad latus, ob eorum copulam, qua simul coniunguntur, citò vertuntur. Et de his lege Gal. Aphor. 4. comment. 35. & Aet in præallegato loco, &c. Vide etiam Galenum Aphor. 3. comment. 22. vbi anginam fieri inquit ex biliosis humoribus qui ad fauces autumno decumbunt, & à pituitosioribus, qui verè cum orthopnœa accidunt, &c.

De anginæ indicijs.

Indicia anginæ sunt, difficultas spirandi, febris, genarum rubor, deglutio impedita, dolor circa guttur, tumorque non extrinsecus apparens, interrupta vox. Fluxionum humoris indicia sumuntur à colore, à dolore, & à sapore. Cognoscuntur à colore, si rubidus, flauus, albus, liuens humor fuerit. A dolore, si grauis, tensius, pulsabilis vi

ir

n sanguine, si punctorius ac mordicans ut
n bile, si parvus & obtusus ut in pituita,
&c. A sapore, si dulcis ut à sanguine, si ama-
us à bile, si falsus vel insipidus à pituita, si
onticus ab atra bile, &c.

Loci consentientes de anginae indicijis.

Paul. lib. 3. cap. 27. Anginae notae sunt, spi-
ritus recta ceruice vix trahitur, nonnullis
febricula oboritur, faciei rubor, æger ore
conniuet, cibum potumque deglutire non
potest. Gale. 3. prædict. cōment. 16. Quia in-
flammatione vexantur muscoli in guttu-
e, meritò dolore afficiuntur, &c. Hippo. 4.
le vict. in mor. ac. tex. 30. Præterita quæ in-
uenti apparent haudquaquam tumentia
videntur, tendinésque ceruicis posteriores
tenduntur, voxque ἀπὸ πύου, id est, abrupta
est, &c. Auic. ipse inquit, quòd videtur lo-
qui cū naribus, additque exitus amborum
oculorum & egressio linguæ. Lege fusius
de signis quando extrinseci laborant mu-
sculi, quandòve intrinseci, &c. De indicijis
fluxionum humoris lege Auic. nona ter-
tij, cap. 9. ibi, Et signa eius quæ est sangui-
nea, &c. Similiter ibi, Et signa cholericae.
Et ibi, Signa phlegmatica sunt falsedo &
sapor baurach, &c. Lege etiam Arcul.

De

De cura ipsius anginae.

Curatio in remouenda antecedente causa triplicem scopum exigit: primo ut euacuetur, secundo ut fluxio prohibeatur, tertio ut reuellatur. Euacuatio fiet per sectionem venae usque ad defectum animi, exclusiue, nisi morbus inducias dederit, valida maxime existente virtute cum repletione copiosa. At ubi morbus moram fecerit, partienda erit sectio venae, ita tamen ut non desineat morbo, primum à communi, deinde à cephalica extraxeris, post hanc ad secundam sub lingua venas te conferes: verum si paucum fuerit repletio, à cephalica eiusdem lateris ad venas sub lingua incipies: deinceps si abundauerit bilis, alius solueda erit cum bileducentibus. Fluxio prohibeatur cum his quae materiam incrassant, quale est diacodion & opiata, &c. Si versio fiet, per cucurbitulas, frictiones, enemata. Confert etiam diuersio per deriuationem. Curatio in remouenda causa coniuncta, siue phlegmone discutiatur, siue in pus conuertatur, tres etiam medendi scopos expostulat. Primus erit reperiens, quae reperiens nisi facta euacuatione suspecta sunt. Secundus partim repellens, partim discutiens esse debet, maxime dum viget morbus. Tertius discutiat tantum, & hoc à medio statu usque ad

morbi inclinationem. Quod si ad suppurationem inflammatio vertatur, tunc apertis, abstergentibus ac mundificantibus opus erit. At si sapiens à dolore prematur, tunc anodinis ut gargarismis ex lacte caprino dolori ipso vacandum erit. Inrim diæta sit tenuissima: sufficit enim sumatur ptisana, vel panis in aqua decoctus, & bibatur aqua, &c.

Loci consentientes de cura anginae.

Hippocra. 4. de vic. in mor. ac. tex. 30. San-
guinem igitur ex brachiis detrahens mox
venas quæ sub lingua sunt secabis, &c. Iti-
dem adserit Paul. lib. 3. cap. 27. Auicena, no-
te tertij, capit. 10. Oportet ut euacuetur in
principio vniuscuiusque materia faciens
id cum phlebotomia & solutione ventris,
ut retrahatur materia ad partem diuer-
sam, saltem cum ventosis positis super, lo-
cum longinqua opposita ei, & ligatione extre-
mitatum dolorosa, &c. Lege in hoc Mesu.
Paul. fusius. De cura causæ coniunctæ lo-
quitur Mesu, capit. de synanch. ibi, Distin-
guamus in administratione particulariū
operationum per tempora morbi: nam
in augmento sit magis vincens medica-
men, stypticum & prohibitium agita-
tionis, & discursionis rheumatis, &c.

Lege

Lege fusius: nā prater has intentiones et remedia docet in omni tempore morbi opportuna. Auic. similiter loc cit. ait. ibi, Inpiatur cū medicinis stypticis mistis cū iis quæ parū absterfionis habēt, & gargarizatio cū aceto est ex eis quæ repellūt & prohibent attractionem humiditatis plurimā deinde fiat gradatio ad maturatiua, &c. capit. 2. Et quandoque dolor fit fortior principio rei: quare oportet vt styptici admisceatur aliquid quod sedet dolore sicut syrupus viol. &c.

Paul. lib. 3. capit. 27. loquitur de viſum quum dicit, Cibus fit triduo aqua multum inde ptisanæ cremor cum dulci quadam portione, deinde & ouorum lutea, &c.

Observationes de phlebotomia.

Mesu. cap. de synan. Sit principium ratiſtrum à phlebotomia si morbus accidit cum plenitudine sanguinis: si verò cum sanguine abundet cholera, præponimus auacuationē cholerae ad sanguinis detractionem deinde facimus sequi phlebotomiam. Paul. lib. 3. capit. 27. Non vniuersim, sed pluribus interpositis vicibus euacuetur, ne cum mulata, vniuersimque facta euacuatione anima ipsis deficiente suffocationis periculum superueniat, &c. Auicen. nona tertii capit. 2. idem adserit, & Act ser. 8. capit. 47.

Obse

Obſeruatio de gargarismatis.

Auicē. loc. cit. Gargarismata poſtponantur, ſi illic eſt repletio, & ſi fuerint gargarismata doloroſa, ſed adminiſtrentur poſt mundificationem, &c. Mirum in modum laudantur etiam vētoſa ſuper collum d ſecundam vertebram, ſi deglutio fiat difficilis, &c.

Obſeruatio de reperiſſiuis.

Meſu. loc. cit. Reperiſſiua niſi facta evacuatione ſuſpecta ſunt, vnde Gale. 3. art. paruæ, Corpus plenum exiſtens reperiſſionem non recipit, &c.

Obſeruatio de victu.

Auicē. loc. cit. Et prohibeatur nutrimentum, vt ſit corpus eius vtens ſanguinis ſui nutrimento, & conuertens ipſum à parte apoſtematis, quare minorem cibum neceſſario aut voluntariè, &c.

Nocentia gutturi.

Nocet gutturi amyllum, muſtum, planus, vrtica, nux, piretrum, andachona, &c.

Anginæ conferentia.

Anginæ conferentia ſunt acetum per ſe gargarizatum, omphacium, oximel, ægrimonium cum vino, vinum granatorum, diamoron, robnucum ſuccus rubi, ebulli, aniſum cum melle, hyſſopo & aceto, garga

gargarisma, stercus canis ossa comedenti
 viola purpurea, hyssopus, Antirum con-
 fectio Haly. 27. antid. diaolibanum Nico-
 diarundinis. Auicen. prima quinti, philo-
 nium romanum, theodoricon magnū Ha-
 ly. 7. antid. hiera Archigenis, &c.

De prognosticis anginae.

Hippoc. Aphor. 6. Aphor. 37. Ab angina
 habito si tumor fiat in collo bonum, for-
 enim morbus deducitur. Et similis sente-
 tia est 7. Aphor. Aphor. 50. Et ratio Aphor.
 est quia satius est ex intimoribus & prin-
 palioribus mēbris morbos extrudi, quā
 è diuerso. Hippocrat. prædict. 3. text. 1.
 Angina grauissima est, ac celerrimè in-
 terimit, quæcunque nec in ceruice, ne-
 in faucibus conspicuum aliquid efficit
 sed plurimum doloris infert, ac spiratio-
 nis difficultatem, orthopnoeam dictam.
 Hæc enim eodem die, & secundo & terti-
 & quarto strangulat. Quæcunque verò do-
 lorem alteri sub similem infert: attollitu-
 verò, ac robore in faucibus efficit, admo-
 dum exitiosa, sed paulò longior quā sup-
 rior est. Paul. lib. 3. cap. 27. Pueris rarò tali
 affectus accidit, nisi cum ceruicis vertebræ
 affectæ loco excidunt, verum illis ceu cur-
 nō recipientibus ac deploratis manum ad-
 moliri non oportet. B. Habes Aphor. 43. se-

cu

andæ sectionis, Strangulati ac dissoluti
 ondu[m] mortui nō referuntur, quibus spu-
 ma circa os fuerit: nam in iis exitiale si-
 num est spuma circa os. Verūm Galen. in-
 uit. Nonnulli etiam strangulorum, qui-
 is circa os spuma visa est, relati sunt: vnde
 iam Auicē. Quum tamen quandoq; acci-
 dit vt præfocatus spumet, deinde sanetur.
 Hippoc. aphor. 4. aphor. 34. Si à febre habi-
 tumore non existente in faucibus stran-
 gulatione repēte superuenerit, lethale. B. Ha-
 es hanc eandā sententiam 2. prorrhēt. tex.
 ubi inquit, Fauces dolentes, &c. Ibi quod
 bri hui⁹ author à Gal. dānatur. Et aphor.
 aphor. 35. Si à febre habito collum per-
 ertitur, & vix potest deuorare sine vllō tu-
 more, lethale est. B. Vbi nō visitur tumoris
 estigium, dictum inflammationē in gut-
 re, vel in eius musculis esse, quare exitia
 signum est maximè, quum febris adsit,
 inquam vna ex causis mortē portēdētibus:
 de Auicē. Si cum præfocationibus vehe-
 mens febris fuerit, tunc mors festinat, quo-
 iam febris facit egrū magno anhelitu in-
 igere, &c. Et aphor. 5. aphor. 10. Quicunq;
 b angina liberātur, iis ad pulmonem ver-
 itur, & in septem diebus pereunt: si verò
 as effugerint, suppurantur. B. Dictum est
 b Hipp. 2. aphor. aphor. 19. quod acutorum

G

morborum non sunt certę prænunciationi
aut salutis aut mortis, quia nonnunquam
humor noxius ex vno loco ad alterum tran-
fertur, vnde si angina ad pulmonem verti-
tur, vel interficit, vel in pus conuersa su-
puratur: si ad cor, omnino ægrum perdit.
Auicenn. 9. tertij, cap. 9. Quum autem faci-
sit viridis & denigratur situs oculorum, et
ipse moritur. Similiter quando minoratur
pulsus, & infrigidantur extrema, & gros-
tudo linguę & ipsius denigratio sunt ex-
gnis malis, &c.

Hippoc. prædict. 3. tex. 20. Securissimum
est angina, si rubor quàm maximè for-
vertatur. Et prædict. primo, Fauces doli-
res tenues cum quadam difficultate stran-
gulantes velociter exitium afferunt, &c.

*Authores erronei dissentientes
circa anginam.*

- 1 Adserere, ab inflammatione asperę a-
terię strangulationem posse effici.
- 2 Adserere, in gutture nullum posse fieri
tumorem absque dolore.
- 3 Adserere, in angina nõ conducere repe-
cussiuam, ne materia introcludatur.
- 4 Adserere, anginam pluries fieri à pitui-
ta, quàm ab aliis humoribus.
- 5 Adserere, sectionem venę in omni an-
gina non conferre.

Cont

Confutatio dissentientium circa anginam.

Ad primum, Galen. Aphor. 4. comment.

1. Asperæ quidem arteriæ inflammatio difficultatem spirandi aliquam efficere potest, strangulationem verò non potest.

Ad secundum, Gale. eodem et commentum tumorum triplicem differentiam numerasset, postea in fine commenti inquit, possibile esse multitudine humiditatis, pituitosæ præcipuè, madefaciente tunicam gutturis interiorem, aliquem fieri tumorem absque dolore.

Ad tertium respondet Auicen. 9. tertij, capit. 10. Et gargarizatio cum aceto est ex his quæ repellunt & prohibent attractionem humiditatis plurimæ: hæc tamen non concuceret, si materia esset crassa ac tenax. Vide tamen de his suprâ in observationibus, &c.

Ad quartum Gordonius & Gilbertus Anilius & Geraldus de solo super 9. almans. capit. de squinantia dicunt, quòd apostema hoc fit secundum plurimum à sanguine, & rarò à pituita. Præterea quum hæc inflammatio sit morbus peracutus, à frigidis fieri nequit, igitur non pluries fit à pituita.

Ad quintum, Auicen. 9. tertij, capit. 10. Oportet ut euacuetur in principio vniuf-

cuiusque materia faciens illum cum ph
botomia: præterea si non euacuatiua, s
tem reuulsiva in omni anginæ specie co
ueniet: habes etiam de hoc suprâ plur
authoritates, &c.

De destillatione, grauedine, & raucita

Destillatio à Græcis *νάραρρος* dicta, t
aliud est quàm superabundantis humor
ex capite in partes subiectas fluxio. Diffe
à broncho qui raucedo, & à coryza qu
grauedo à Latinis dicitur, eo quòd cata
rhus fauces & palatum obtineat, bronch
guttur ac arteriam, coryza verò nares t
tùm molestet. Has species destillationu
Gerardus quidam his duobus versibus e
plicuit.

Dum fluit ad pectus, dicetur Rheuma c
rarrhus.

Ad fauces bronchos, ad nares dico c
ryzam.

*Loci consentientes de destillatione,
grauedine, & raucitate.*

Paul. lib. 9. cap. 28. Communis est om
bus vitiis excrementitiæ humiditatis e
capite in subiectas partes descensus, si in
res defluat *νάρις*, si per palatum ad nare
νάραρρος, si in guttur & asperam arteriam
ita vt membranam internam exaspe
re

ἡ βρόγχος & ἀρτηριακὸν à Græcis dicitur, si fluxio in pectus pulmonésque decumbat, tussis siue, vt ipse inquit, βήχης αὐτὸς γίνονται κακονδοίς, &c. Gal. 6. de sympt. 1. capite 4. Destillatio est per palati foramina multorum humorū delatio, &c. Vide eam Aet. ser. 8. cap. 53. & Gale. 2. prognost. 1. c. 49. ibi, Humorem de naribus secretum, tenuem, & incoctum omnes medici grauedinem nominare solent, &c.

*De causis destillationis, grauedinis,
& raucedinis,*

Causæ procatarcticae sunt aër frigidus, ora sub radiis lunæ, septentrionales ventorum humiditates exprimunt, similiter calidus, vñ meridionales caput replent, & humiditates liquefacientes. Item nimius coitus, & omnia ad caput euaporant, & ipsum replentia, sicut ebrietates & apulae, exercitium & ira. Causæ antecedentes sunt vel per se vel per cōsensum. Per se sunt humores superflui in capite existentes, intemperies calida, frigida, & humida. Per consensum sunt à toto corpore, vt in ebriis humorem eliquantibus; aut membro particulari, vt à stomacho in digerendo debili, & à reliquis membris. Causæ coniunctae sunt humor actu fluens, qui sæ-

pe est calidus, subtilis, interdum crassus
& frigidus, &c.

Loci consentientes de causis destillationis.

De causis procatarteticis lege comme
Aphorif. 5. libr. 2. ibi, Austri caput aggr
uantes caliginosi, &c. Item Aphorif. 12.
13. eiusdem libr. ibi, in commento, In qu
busdam verò coacto in vnum & compr
so quodammodo capite, expressa mater
inutilis ad loca capite inferiora descend
&c. Aet. ser. 8. capit. 53. Destillationis
muci causa est cerebrum, quod à frigore
ad frigidam intemperiem perducitur, &
Nam in hoc loco enumerat omnes alia
procatarteticas causas à me superius desc
ptas. Galen. 6. de Sympto. cau. cap. 4. D
stillationis & grauedinis cerebrum st
tim causa est, vt pars quidem similari
vel à frigore, vel à solis ardore ad inter
periem redactum, vt instrumentum v
rò, quatenus à plenitudine infestatur. L
ge latius Mesu. de cura catarrhi, ibi, A
sterarum facit ac replet, &c. Lege sim
liter Arcul. comment, almans. capit. de
tarrho. Item Gor. Sauon. &c. De fluxu
num causis lege Galen. de disse. febr. ca
1. Nam ibi ex parte laborante binas cau
sas intelliges, alteram ex accensa calidita
te, alteram à dolore excitato, vnde minu
plúsu

lūſue attrahitur quod influit. Nam ſi ve-
 mentior fuerit calor, multū attrahit:
 minus, tunc debilius. Similiter & in do-
 ore. Ex parte verò mittente, nam ſi pars
 mittens minus ſuperfluitatibus abundet,
 arum aliquid attrahenti parti immittit:
 verò plus materiæ inutilis habeat, tan-
 tum ingerit amplius, quanto plus à naturæ
 nodo reſceſſerit, &c.

De deſtillationis indiçis.

Id ſcias velim, quòd deſtillationum in-
 dicia ex capitis intemperie ſiue calida ſiue
 frigida ſumi poſſunt, item à ſapore, odore,
 calore, & ab ipſius ſymptomatibus, vt gra-
 tia exempli: Si caput calidæ fuerit tempe-
 raturæ, facies rubefcit, vel flaua eſt: ſi verò
 frigidæ, erit alba & pallida. A ſapore, vt ſi
 quod influit acris aut ſali, aut amari vel
 ætentiſ quidpiam habuerit, calidam cen-
 ſeto: ſi inſipidi vel dulcis, frigidum. A co-
 ore, vt quod rubefcit, vel flauet, calidum:
 quod albefcit, vel liuet, frigidum. A ſym-
 tomatibus, vt ſi adſit ardor, punçtio ſiue
 mordacitas, calidum: ſi nullius ſenſus par-
 ticeps cum grauitate & nariū obſtructio-
 ne, frigidum. Relinquo ea etiā indicia, quæ
 ſumi poſſunt ab his quæ iuuant & nocent:
 ſed ad differētiā quæ eſt inter tenuem &
 craſſam deſtillationem nūc tranſeo. Tenuis

igitur cognoscetur ex eo dum expuitur, g
labilis sit & fluens: at è conuerso crassa in
globum vertitur, & in se permanens non
fluit. Si quid verò in medio crassum, & in
circuniacentibus partibus tenue fuerit
tunc iudica destillationem omnino esse te
nuem, quum hæ partes ad crassitiem non
dum deuenerint. Signa quòd destillatio si
à toto sunt, quia in febrium augmento au
getur, & in earum remissione remittitur
Similiter de particularium partium con
sensu intelligendū est. Signa per essentiam
in capite sunt, si diu perseuerauerit destil
latio, nec adsit aliarum partium morbus
de quo suspicari possit, &c.

*Loci consentientes de indicij
destillationum.*

Paulus libro 3. cap. 28. Qui ex æstu gra
uedinem vel destillationem concipiunt
iis particulæ incalescunt, acris tenuisq; hu
mor tum per nares tum per os descendit, fa
cies rubescit & nasus. Qui ex frigore, iis
frons & caput vndique distenditur, mea
tusq; athmoides dicti clauduntur, &c. Le
ge de his Auicen. & Arcul. Mes. & Razem
fufius, & inuenies plura, quæ tuo arbitrio
huc traduces, &c.

De cura destillationum.

Sex in catarrho requiruntur medendi
intem

ntentiones: prima regiminis regula, se-
unda erit catarrhi alteratio siue digestio,
ertia euacuatio, quarta diuersio, quinta ca-
tarrhi interdum fluentis retentio, sexta ac-
cidentium correctio, ac capitis roboratio.
Regimen erit in catarrho calido, si calida
omnia vitentur, & ea quæ etiam cerebrum
debilitare possunt. In frigido, somnus lon-
gus & meridianus, & supinè dormire in
frigido, malum est. Digestio siue humoris
reparatio in calido cum frigidis increas-
centibus, sicut cum syrupo viol. de Iuiubis,
le papauere myrthino cum aquis farfaræ,
indiuie, aqua ordeï, & similibus parabitur
in catarrho frigido, si crassa fuerit mate-
ria cum calidis attenuantibus, sicut cum sy-
rupo de glycyrrhiza, de hyssopo, de passio,
oxy melle simplici & composito, cum aquis
ap. vener. saluie, decocto pectorali calido.
Vacuatio in calido fiet cum fructuum de-
cocto, cassia, manna, rheubarbaro, & cum
pilulis aureis aggregatiuis de hiera sim-
plici. In frigido, cum pilulis de hiera, cum
agarico, polypodio, turbit, pilulis cho-
chiis, &c. Vitetur sectio venæ, si possibile
fuerit: si minus, fiat à vena cõmuni. Diuer-
sio siue reuulsio fiet per caputpurgia, ma-
sticatoria & cauterizantia, vel per frica-
tiones, lotiones, iuncturarum ligationes,

cucurbitulas & hyrudinum applicationes. Caputpurgia fiunt per liquores, per nare attractos, ut puta in calido cum aqua violacea vel hordei, &c. In frigido cum aqua maiorana, cum succo blitis, decocto nigellæ ireos vel cyclaminis. Cauteria fiât in commissura coronali vel in humeris. Retentio catarrhi quæ fieri non debet nisi maxima urgente necessitate, pluribus mediis perficitur: primo cum stypticis, ut cum bolo armenio, spica, olibano. Secundo cum hiis quæ à proprietate incrassant, ut cum iule violaceo, zuccharo violaceo, penidiis, diacodione, dragacanto, loch de papauere, diacodione liquido, pilulis bechichiis. Tertio cum gargarismis ex aqua rosacea, aceto, sandaraca, &c. vel cum pilulis de cynaglo. Remotio symptomatum erit, per ea quæ malam capitis intemperiem siue calidam siue frigidam remouere possunt. Roborabitur deinceps caput in causa frigida cum confectione pilularum arcoticon Nic. cum diamusco, in causa calida, cum electuariis frigidis, &c.

*Loci consentientes de cura
de stillationum.*

Mes. cap. de catar. Commune est sex res, prima ponit studium in vita patientis, secunda adæquat materiam, tertia abscindit eam, quarta diuertit, quinta abscindit fluxum

um eius, sexta corrigit accidentia, & de
his singulatim agit, vt latiùs videri potest.
Hercul. & Marcus Catinarius de his etiam
usiùs pertractant. Videant in sua praxi qui
petant rem medullius introspicere.

De reuulsione, euacuatione & deriu-
atione loquitur Gale. 4. meth. cap. 6. ibi, De-
stillationem fluere incipiètem ad contra-
ria trahendam esse dicimus, fixam verò in
aborante particula euacuandam. Simili-
ter meth. 5. cap. 2. Quæ verò in oculis, aure,
palato, fluxiones accidunt, eorum ad vici-
na deriuatio est per nares, &c. Hinc etiam
dice quot modis fiat reuulsio. Lege etiam
Aetium ser. octauo, capite 53. ibi, Expedit
fontem malorum excindere sanato videli-
cet capite, &c.

Observationes in cura.

Galenus 3. de loc. affec. cap. 5. dicit, exem-
plificans de grauedine & destillatione,
quòd qualitas & quantitas excremento-
rum atque causarum, quæ præcesserunt,
contemplatio & capitis dispositio siue ca-
lida, vt in vstione, siue frigida, vt in re-
frigeratione, primùm à te considerentur:
quæ nisi discretè cognoueris, idoneam dis-
positione curationem haudquaquam in-
uenies.

Ob

Observationes in phlebotomia.

Mesu. in cur. catar. phlebotomiam non nisi in tribus casibus fieri posse adserit: primus, si destillatio calida fuerit cum multa sanguinis copia in corpore calido: secundus, si calida descendens in aliqua principali parte figatur, ut in oculis, pulmone diaphragmate: tertius, si cum febre & maximè continua fuerit destillatio, ita ut in venis putrescere humores existimentur, in cæteris verò nequaquam.

Observationes de gargarismatis.

Mesu. Suspecta sunt gargarismata in quatuor casibus: primus est suspicio catarhi ad pectus & pulmonem fluentis, id est in paratis ad phthisim & asthma. Secundus, si sit de genere subtilium, acutorum & mordicantium, eò quòd facilè cum gargarismis concitatur. Tertius, in præfocationibus quæ fiunt citò, id est, in paratis ad suffocationes. Quartus, si sit vehementis multitudinis.

Observationes in diversionibus.

Marcus Catinarius in cur. catar. inquit, Nota quòd caputpurgia & sternutatoria non debent à principio fieri, sed factis evacuationibus, quia per ista fit motus & agitatio, &c.

Mes.

Mefu. Securius est regimen diuersium quàm abscissium, & licet regimen diuersium dilatet materiam & multiplicet, amen multiplicatam conuertit ad partem communem non timorofam, &c.

Observationes in abscissione catarrhi.

Mefu. Et sunt ex stolidis qui ante digestionem & mundificationem communem administrant abscindētia catarrhi, & sunt causa cumulationis & multiplicationis ipsius. Fiant igitur post mundificationem & sedationem agitationis vehementis: in aliquibus tamen casibus in principio fieri potest, primò si ad partes nobiles reperet, ut catarrhus esset præfocatiuus, &c.

Catarrho conferentia.

Conferunt catarrho assatæ cum pipere sumptæ, betonica, bolus armenius, cinnamomum, gramen, lac caprinum, grana lauri, manna, myrrha, vitella ouorum sorbilia, fumus sandaracæ, laudani & asphalti vapor, suffumigium vtriusque thoracis retinet catarrhum, item suffumigium vernicis, sebesten & hyssopus, acharistum Nicol. confectio de iacur Mef. Phylonium Romanum Auicen. loch de papauere, pilulæ pro catarrho Mef. 10. antidot. Pilulæ de papauere Mef. Rob de nucibus Mef.

Mes. 5. antid. Rob de papauere Haly. 19. antid. syrup. de papauere, &c.

De prognosticis destillationum.

Hippocrates aphor. 2. aphorif. 40. Raucedines & grauedines in valde senibus coctionem non admittunt. B. Quia frigiditas illa ex senili ætate acquisita. reprimi non potest, imò & in quibusdam iuuenibus difficulter concoquuntur. Hippocrates prædict. 2. tex. 49. Grauedines & sternutamenta per omnes morbos qui in pulmonibus fatigent præire & subsequi malum est, &c. B. Ratio est, quia si grauedines sint signa indicant pulmonem malis humoribus repleti: si verò sint causæ, sunt etiam malæ, eo quòd ab aliis affectionibus prauis committantur. Lege etiam pro his aphorif. 12 & 14. & 31. libri tertij aphor. & plura intelliges de prognosticis, &c.

Authores dissentientes circa destillationes.

- 1 Adferere, sternutamenta in destillatione esse salubria.
- 2 Adferere, cum Artemide medico, plumbeam laminam pro voce tremula pettori esse applicandam.
- 3 Adferere, destillationes tantùm vocari quæ ex capite per asperam arteriam ad pulmonem feruntur.

Con

*Confutatio dissentientium circa
destillationes.*

Ad primum, Galenus prædict. 2. comment. 49. Sternutamentum sequitur gradines magna ex parte, sed sanè concutit thoracem, & vitiat pulmonem: igitur in destillatione non est salubre, quia ex suo motu efficit, ut materia à capite ad subiectum pulmonem descendat, vel signum est salubre ostendens per consensum etiam fieri cerebrum, ut ibi Gal.

Ad secundum, Hippocrat. 5. aphorif. 24. aphorif. Frigida qualis est nix & glacies pectori inimica tussis mouent & destillationes, &c. Sed plumbeæ laminæ sunt huiusmodi, igitur pectori non applicandæ.

Ad tertium, Galenus aphor. 3. comment. Non quas communi vocabulo destillationes consueuimus nominare, quæ scilicet fiant ex capite ad pulmonem per arteriam, sed omnes fluxiones, quæ currunt per venas à capite ad partes inferiores, &c. scilicet vocamus destillationes, &c.

De tussis definitione.

Tussis, sive Græcè dicta est, quoddam aggregatum ex duobus motibus, scilicet dilatatione & constrictione impetuosa pulmonis & pectoris, ad expellendum nocua à virt

à virtute expulforia naturali pulmonis. Ita cum adiutorio diaphragmatis. Natussis ita pectori inest, sicuti cerebro stonutamentum, vt per eam nocumentum pulmone expellatur, & à membris, quæ pulmonis consensum patiuntur, &c.

Loci de tussis definitione.

Galenus 5. de symptomat. caus. capite. Tussis nil aliud est quàm vehementissim efflatio, qua plurimus spiritus celerrim foras erumpens impetu suo extrahit, & ploditq; excrementa meatuum ipsius cstruentia, &c. Auic. fen. 10. tra. 3. capite. Tussis est ex motibus, quibus expellitur nocumentum ex membro aliquo, hoc membrum est pulmo & membra quæ ei continuantur. Vide de his latius Galen. loco citato, capite 3. & 4. de symptomat. cau. Similiter de loco læsionis de cap. 6. eiusdem quinti libri, &c. Vide etiam Arcul.

De causis tussis.

Causæ procatarctica sunt, sicut dictum est in destillationum causis, causæ antecedentes vel per se sunt, vel per consensum. Per se, vt mala intemperies cum materia vel sine materia calida, frigida, sicca, humida: aut solutio continui, velut in vlce pulmonis, in phthisi. Per consensum, v

à

toto, ut in febribus: aut à partibus, aut à cerebro destillante, vel à pectore ut pleuride & orthopnoea, aut diaphragmate ulcero, vel in abscessum conuerso, aut à stomacho, splene, hepate, quum abscessum patiuntur: nam facta diaphragmatis compressione, siue à tumore, siue ab alio quomiam fit tussis. Materiam in pulmone quoque imbibuntur, interdum inhærent, obstruunt, & resolutis partibus subtilibus in etram condensantur. Causæ tussis siccæ sunt vel mala cōplexio, vel materia in pulmone cōtenta, quia vel nimis crassa expulsiōi inepta, vel apostemata pulmonis, vel materia in venis pulmonis contenta, sua cuitate vel multitudine stimulans, vel imbecillitas facultatis expulsiuæ, &c.

Loci consentientes de causis tussis.

Aet. ser. 8. cap. 54. Causæ tussis sunt variæ; nam humor à capite ad asperam arteriam destillans tussim efficit. Asperitas insuper intrinsecæ pelliculæ arteriæ asperæ, ibi & potus præterlabentes tussim pronouent. Lumbrici stomachum infestantes, etiam tussiculas paruas excitant, similiter & acris humor stomachum perturbans, & intemperies frigida instrumentorum respirationis tussim irritant: Vide de his fusius Auicenn. 10. 3. tract. cap. 1. ibi, Causæ

H

primitivæ tussis sunt, &c. Nam fusissimè has pertractat. Vide insuper Galen de sympt. causis, cap. 4. & ibi intelliges quomodo intemperies tussim excitet, & à mala intemperie dolor fiat contra plures, qui de mente Galen. hoc non posse fieri certò affirmant.

De signis tussis.

Signum malæ complexionis calidæ cognoscitur ex præcedentibus causis calidis, & læditur ex similibus, & iuuatur contrariis, caliditas etiã sentitur ab ægro vehementia sitis, magnitudo anhelitus & pulsus, rubor faciei cum tussi sicca. Signa complexionis frigidæ sumuntur ex causis frigidis præcedentibus, iuuantur à contrariis, &c. Signa tussis ex sanguine sunt, rubedo faciei, venarũ tensio, sapor in ore dulcis, & interdum sanguis excreatur. Signa bilis sunt, flauities vultus, sapor in ore amarus, sitis, & quod expuitur, citrinũ est & vt plurimum tussis sicca est. Signa pituitæ sunt, pallor faciei, & albedo, sapor insipidus aut salsus cū humiditate superflua pauca sitis, circa fauces viscosa pituita, commotio vomitus, &c. Signa atræ bilis sunt, fuscus color, sapor ponticus, tardus euentus, lōga duratio. Signa subrilitatis & crassitiei ex tenuitate fluxúque materiæ, & quia

quia subito accidit, & è cōuerso, materia viscosa, tarda in fluxu, &c. Signa siccitatis sunt, quia sedatur ex sorbitione amyli, multiplicaturq; quum fames & sitis adest, & apud somnum alleuiatur, similiter dum comeditur & bibitur. Signa per consensum, est antecessio lationis ventriculi vel hepatis, tussis adest sicca, est insuper minus continua & minus laboriosa, quàm quæ est per essentiam. Signa apostematis, ulceris, & similiū cognoscuntur ex relatis in pleuritide, peripneumonia, & phthisi.

Loci consentientes de signis tussis.

Aetius serm. 8. cap. 54. Tussis quæ cum distillatione partium ab utraq; palati parte contingit, palàm ostendit distillationem à capite ad asperam arteriam & ad pulmonem deferri: quòd si nihil expuatur, tenuem fluxum indicat, &c. Auicenna. 10. tract. 3. cap. 1. de his pertractat signis ibi, In tussi frigida, est additio ex frigore, &c. Lege hunc locum fusius, & habebis omnia quæ à me nuper relata sunt. Lege etiam Arcul.

De cura tussis.

Dictum est in capite distillationis, fluxum humoris esse diuertendū, & quod iam fluxum est, euacuandum. Nunc etiam dicimus in tussis cura duplicē scopū requiri,

alterum in præparanda materia, alterum in abstergendo & præparatam educendo. Tenuis igitur & acris destillatio per infri-
gidantia & incrassantia, & fluxum intercipientia curatur, sicut cum syrupo de papa-
uere violaceo, iuiubino, cum decocto hor-
dei, iuiubarum, sebestē, vel cum diacodio-
ne tempore somni, vel pilulis bechichiis.
Si verò fuerit frigida, crassa ac tenax, tunc
cum calidis extenuantibus ac dissecanti-
bus digeratur, ut cum syrupo de glycyrrh-
za, de hyssopo oxymellite. syrup. de pras-
sio, oxymellite scillitico cum decocto ca-
ricarum passularum. cap. ven. hordei, &c.
cū loch de pino, de scilla, cū iure galli de-
crepiti, &c. Euacuatur deinceps subtili
materia cū cassia, electuario de sebesten
addita pectorali decoctione, vel cū piluli-
aureis aggregatiuis, &c. Frigida cum pilu-
lis cochiis elephāginis. T. de ag. &c. Quod
verò superest in pulmone, exicetur tum b-
bendo, cum lambendo ac euaporando, de
quibus satis pertractauit Mesu.

Loci consentientes de cura tussis.

Aet. serm. 8. cap. 54. Medemur tussi à te-
nui fluxu factæ per antidotum ex papaue-
re capi. inspissantes, aut per alterius phar-
maci dolorem leuantis. Quæ autē à cras-
so aut viscoso fit humore per extenuantia

&

& discindencia, instrumentorum respirationis frigiditati per calefacientia medentur. Quæ ab asperitate, per lenientia & mordacitatem arcentia sanantur, qualia sunt ex arteriacis compositionibus simpliciora, &c. Gal. 6. de cōpos. med. per loc. cap. 1. & 3. non diuerso à nobis sermone hæc lucidius pertractat, ubi habet insuper multas ad tussim confectiones, &c. Lege etiam Auicē. 10. 3. tracta. 9. cap. de cura tussis, & Arcul. & Mesu. Vide etiam quæcunq; dicta sunt de destillatione, nam huc referenda sunt.

*Observationes in cura per
exiccantia.*

Hercul. 9. almans. cap. de cur. tussis. multas condiciones obseruari in his iubet. Primum, quod non nisi reiteratis euacuationibus exhibeantur. Secundum, quod non adsit febris notatu digna. Tertium, ut virtus constet. Quartum, ut incipiatur à minima quantitate, &c. Vide eum fusius.

Nocentia & conferentia tussi.

Nocent tussi, acetum, succus ebulli, præsertim tussi recenter factæ, nam antiquæ prodest mel non spumatum, nuges, &c. Conferunt tussi amyllum cum zucharo & oleo amygdalino, semen bobicis, bdellium, radix chamaleontæ, cinnamomum cochleæ,

adiantum, hyssopus, dragacantum, enula
 faba, fœnugræcum, cum melle, phistici, fu-
 fur triticeum cum aqua hordei decoctum
 & colatum in frig. & sic. tussi, galbanum
 gentiana, granata dulcia, iuiubæ, lac asina
 vel capræ, decoctum glycyrrhizæ in vino
 malua, māna, mastix, mulsæ, oua cū melle
 papauer, passulæ, peucedanum, grana pini
 pulmo asini, prassiū, rosmarinus, sebesten
 semen lini, serpētaria, sulphur, sea, storax
 ptisana, terebentina cum melle, violæ, ze-
 doaria, vrtica, radix ireos. Cōposita sunt
 diacodion Mesu. diapapauer Mesu. in tuf-
 si catarrhali, diasulphur Serap. diacodion
 compositum Serap. diaolibanum, diapeni-
 dion, diadragantum, diairis, diacalamen-
 tum, diatrion pipereon, diahyssopum, dia-
 zingiberis, emplastrū adip. Auic. sexto tra-
 emplastrum gabadi Haly. loch de pino, de
 papauere Mes. de alliis Auicen. & Mes. in
 quinta antid. in cur. tussis humidæ, loch de
 semine lini. Auicen. quinta quinti, oleum
 amygdalarū dul. violaceum sisami, cucur-
 bitæ. Pilulæ pro catarrho. Mes. 10. antid. bi-
 chichizæ Mes. ad tussim. Auic. syrup. viola-
 ceus, myrthinus. acetosus Mes. Iuiubinus
 de prassio, de hyssopo, de cānis, de papauere,
 alteraniabim, &c. Athanasia magna, sy-
 rup. de liquiritia, de calamēto, de theriaca
 maior

naior. trochisci de stella. Auic. 8. 5. de berberis, de papauere, de arsenico & c. Alliu cotum, & baccæ lauri, & c.

De prognosticis ipsius tussis.

Auic. decima tertij, loc. cit. Et tussis frequens plerunq; perducit ad sputum sanguinis. Arcul. 9. almans, de cur. tuss. Si diuturna sit & frequens, in pregnatibus abortum facit: expuitur sanguis fractis in pectore venis. Hippoc. aphor. 6. aphor. 46. Qui gibbi ex anhelitu aut tussi efficiuntur, ante pubertatem intereunt. Lege etiã aphor. 54. lib. 1. Quibus ut plurimũ tusses siccæ leuiter irritantes in febribus ardentibus fiunt, & c. Vide etiam Hippoc. in cap. de destillatione aphor, supra recitato.

Authores dissentientes circa tussim.

- 1 Adserere, tusses à nuda intemperie fieri non posse.
- 2 Adserere, tussim siccam à nulla alia causa fieri posse, quàm à mala intemperie sine materia.
- 3 Adserere, tussim plerunque fieri causa tantum calida & sicca, ut Gerardus.
- 4 Adserere, pilulas bechichias cõferre in omni sicca tussi.

Confutatio dissentientium circa tussim.

Ad primum, Galen. 5. de sympt. cau. cap.

4. Tussim, inquit, fieri refrigeratis tantum respirationis instrumentis, ita ut affecti nihil inter tussendum expuant. Itidem aet. ut supra de causis dictum est.

Ad secundum, Galen. 2. prædict. comment. 42. inquit, Quod si humor crassus & viscosus, vel adeo tenuis sit, ut expelli nequeat, siccam tussim efficit: unde modice crassus facile scaturit. Et aphorif. 4. comment. 54. Siccae tusses sunt, in quibus nihil expuitur: fiunt etiam aliquando ob intemperiem instrumentorum quæ seruiunt respirationi, aliquando in faucium asperitate, vel à paucis & tenui humore destillante. Igitur sicca tussis etiam à materia sua causa effici potest.

Ad tertium, Galen. aphorif. 3. comment. 23. Ob hanc igitur ipsam frigiditatem tussis hyeme maxime fiunt, &c. Similiter 9. 12 eiusdem libri, Caput prius repletum in calida & humida constitutione, frigus autem superueniens veluti manus quædam extrinseca capiens ac premens, quandam uti spongiam, cerebri illam, quæ in ipso continetur humiditatem, unde fiunt tusses & grauedines, &c. Igitur à causa frigida & humida plerumque, & magis quam à calida & sicca fieri potest.

Ad quartum dicimus pilulas bichichias
confer

onferre tantum in causa calida & sicca,
t testatur Mesu. Sed tussis sicca ab alia
ausa fieri potest, vt monstratum est, qua
e re in omni sicca tussi conferre non po-
uerunt, &c.

*De asthma dyspnœa & or-
thopnœa.*

Asthma est affectus qui respirandi diffi-
ultatem cum magna conamine præ se fert.
Hæc spirationis difficultas dum modica est,
πνῶσις Græcè dicitur: at quum vehemen-
ior sit, & spirare æger sine anhelitu &
sono non potest, tunc ἀσθμα vocatur: si
verò accadat in spirando vt non nisi re-
cta ceruice spiritus trahatur, tunc ὀρθο-
πνῶσις nominatur: quos igitur Græci vocant
ἀσθματικούς, Latini anhelosos siue suspi-
riosos dicunt.

*Locis consentientes de asthma,
dyspnœa, & orthopnœa.*

Auic. decima tertij. c. 4. Asthma est egri-
tudo pulmonis cum qua patiens non inuenit
excusationem ab anhelitu frequenti, sicuti est
anhelitus quo laborat præfocatus & festi-
natus. Gal. aph. 6. com. 46. Multæ sunt spirandi
difficultates, sed solam illam Hippo. com.
suevit asthma nominare, in qua contingit
satis crebrum anhelitum fieri. Vocant τὸ ἀσθ-
μαίνειν, id est, anhelare, id quod fit in cursu-

H 5

bus & vehementioribus exercitiis, &c. Vnde de his Gal. 7. de cōp. med. per loc. cap. 6. ibi, Qui citra febrem dense respirant, &c. B. Nota quòd asthma interdū sumitur pro difficultate spiritus sine febre & apostemate, interdum pro constrictione non facta causis materialibus, interdum pro maliti spirandi à materia crassa inhaerente facta & sic in hoc loco à Gale. accipitur, &c. Galen. 4. de vict. in mor. ac. comment. 21. Sic ca orthopnoea ea est spirandi difficultas quæ sine sputis vel tussi vsque adeò vehemens est, vt inclinari citra suffocationem qui ita afficitur, non possit.

De causis harum affectionum.

Causæ procatarticae sunt caliditas & frigiditas, aëris casus, percussio, nimius corporis motus, fumus argenti viui, odor rectum pectus constringentium, &c. Causæ antecedentes per se, vt à mala intemperie frigida coarctante vel obstruente, vel à materia vt plurimum pituitosa in pulmone, vel eius bronchiis infarctata. Per consensum fit vel à toto, vt in febribus & hydrope, aut ab aliqua parte, sicut ab occipite, neruis, vertebris colli, à pectore, diaphragmate, hepate, stomacho, splene, ab occipite inquam spiritibus ad pectoris musculos transire nō valentibus, à neruis mo-

rum

in diaphragmatis impredientibus, à col-
vertebris & pectoris, quum extra sedem
uertuntur à pectore, sicut ab eius angu-
lia, abscessu, paruitate, vlcere, & colluile,
diaphragmate, hepate, splene, ob eo-
rum abscessus & vlcera: interdum fit etiã
exiccatione pulmonis, &c. Causæ con-
nectæ sunt ipsi humores infarcti in arte-
ris & venis pulmonis morbum facientes,
similia.

Loci consentientes de causis.

Auic. decima tertij, cap. 14. Et quando-
que accidit propter multitudinẽ vaporis,
quando coarctatur in pulmone, & propter
entositatẽ coarctatam in membris anhelis,
& quãdoq; causa generationis in ipso
est frigiditas eius. Vide de his latius apud
Iesu. cap. proprio. Galen. 7. de compos. me-
dic. per loca, cap. 6. loquens de causis ante-
cedentibus, inquit: Manifestum est coar-
ctationem locorum præter naturã intrin-
secus adesse, cuius etiã sensum agri mani-
festè perceptant. Coarctatio verò fit, quum
ut crassorum & tenuium humorum mul-
tudo pulmonis brõchiis fuerit infarcta,
ut tumor abscessui similis in ipso cõstite-
rit, &c. Auic. loc. cit. Et quãdoq; fit propter
ocumentũ in ipso pulmone, & in eis quæ
ipsi cõtinuãtur, ppter inuiscationẽ humo-
rum

rum crassorū in arteriis & ramis eorū, quandoque in cana pulmonis, & eius raritate, & in locis vacuis. Et istę materię et se sunt ad ipsum ex capite. Et quandoque isti humores nocent sua qualitate, quantitate, & multitudine, & quandoque fit & rō ab exiccatione pulmonis, & quandoque fit propter cōmunitatem membrorū vicinorum comprimentium membra anhelatus, &c. Vide de his Gal. 4. de vic. in mor. ac. com. 2 1. & 3. aphor. com. 2 6. & 4. aphor. com. 5 0. ibi enim à quibus causis spirandi difficultas fiat, apertē intelliges: lege et 4. de loc. aff. cap. 7.

De indicijis asthmatis, orthopnæque.

Frequēs adest anhelatio, nec spirare possunt, nisi recta ceruice, pallescit eorum facies. Si ab intemperie absque materia fiat adest pectoris lenitas absque sensibili gravitate, rursus sine sputo: calida ex calore sensu & ex anhelitu & pulsu magno frequenti cognoscitur: frigida ex frigore in partibus spiritualibus percepto & ex anhelitu, pulsu paruo ac tardo: sicca ex asperitate, ex siti, & à causis exiccantibus humida ex causis contrariis. Vel intēperies omnes cognoscuntur ab his quę iuuant & nocent. Nam calidis frigida profunt, frigidis calida humida

humores cognoscuntur ex sapore, odore, assitie ac tenuitate. Locus læsus cognoscitur, quoniam si in pulmone est læsio, tunc est grauitas, screatus, tussis laboriosa, difficilis anhelitus: si in aspera arteria, minus adest in respirando, screatus facilis: in bronchiis, screatus fieri non potest, nisi cum multa tussi: si fiat à peripneumonia, magna suo capiti ascribentur: si fiat asthma toto per consensum sicuti in febribus, ex quo inde cognoscet, quod ad earum augmentum augetur, & in recessu minuitur: si per consensum ex partibus, facile etiam cognoscet ex earum morbis superuenientibus, &c.

Loci consentientes de indicibus asthmatis.

Auic. decima tertij, ca. de sig. asthmatis, si humores vel humiditates fuerint causa asthmatis, tunc aderit constrictio, in principio anhelitus, cum excreatione, oscitatione, & retentione humoris permanentis, & grauitas cum sputo, &c. Vide hunc locum fufius: nam de singulis signis hic pertractatur. Vide insuper Arcul. Sauro. Gordo, &c.

De cura asthmatis & orthopneæ.

Primus in curando scopus, (dum modo totius corporis repletio appareat) sit sectio venæ. Secundus sit humoris preparatio, ita ut tenuis incrassetur, tenax & viscosus attenuetur.

tenuetur cum syrupis in capite catarrhi memoratis. Tertius sit euacuatio, prout opportuna fuerit in humore peccante. Quartus sit humoris cum cucurbitulis & frictibus ad partem oppositam reuulsio. Quintus residuum exiccat. Sextus sit regimen e his quæ dilatant anhelitum. Vitetur acris acetosa, styptica, toleretur fames & potus vitetur insuper somnus meridianus ac diurnus, &c.

*Loci consentientes de cura asthmatis
& orthopnoæ.*

Paul. lib. 3. cap. 29. Hæc cura sit, ut per abstergentia extenuantiaque medicamina glutinosus humor & crassus abscindatur, quod si necessitas urgeat, etiam vena ante omnia incidatur, & quantum vires patiuntur, sanguis detrahatur, &c. Gal. 7. de compos. med. per loca, cap. 6. Cæterum curatio ambaram affectionum aliquid commune habet, & aliquid cuique proprium: commune utriusque est, ut redundantia humorum affectiones generantis, consumatur & expendatur: proprium verò, ut si à crassis viscosisque humoribus fiant, per attenuantia & extergentia consumantur, &c. Consule in his & aliis non solum Auicenn. sed Mesu. ipse enim singula declarat. Vide & Arcul. & alios practitantes.

Obfer

*Observationes in preparatio-
ne humorum.*

Pau. loc. cit. duo notat: alterum ut quum
assitiem & tenacitatem humorum seca-
us & attenuamus, humiditatem cū phar-
macis adhibeamus, quo facilius efferatur,
de largiorem potum anhelosis cōmen-
tat: alterum, ne vehementer calidis vel fri-
gidis in hac affectione utamur, quia tena-
cis & crassi humores à vehemēti calore
viscosiores reddūtur, & sic difficulter auel-
lo possunt, frigidis ne crassescant ac cogan-
tur, &c. Vide similiter Aet. ser. 8. cap. 57.

Auic. loc. cit. Vitandæ sunt medicinæ
multum incisivæ, ibi, & non sis conten-
tis, &c. Secundò, miscendæ sunt medicinæ
spaticæ, sicut eupatorium, cum pectorali
bus, præsertim si crassities hepatis asthma
adiungatur. Tertiò, quum morbus sit na-
ra longus, medicinæ sæpius permuten-
tur, non ex eodem genere in aliud, sed in
eodem consimili facultate mutata perma-
neant, ut voluit quarta primi, capit. 1. ibi,
nò in vna medicatione medicinam per-
muta, &c. Quartò in ægritudinibus chro-
nicis interpolationes fiant. Quintò, si cau-
sa coniuncta & antecedens aduersentur,
tendatur illi quæ magis infestat. De ob-
servationibus aliarum intentionum le-
ge

ge Mesuen.

*Conferentia asthmatis &
orthopnoeae.*

Conferunt asthmatis & orthopnoeae acetum scilliticum, amygdala amara, ammoniacum cum melle, assa foetida in ouo sorbili, bolus armenius, calamentum, cappares saliti, decoctum centaurij Mes. daucidiptami, enulae, caricarum, adianti, gentianae, iuniperi, granorū lauri, marrubij origani, pastinacae, oxymel scilliticū, peucedanum in ouo sorbili, pix humida cū melle, sulphur in ouo sorbili, vel fumus eius in ore per embotum, scilla, thymus, hyssopus cum ruta, ficubus & melle, allium coctum betonica, gentiana, ius galli antiqui, galbanum, foenugraecum cū melle, urtica cum melle, baccae lauri, myrrha, violae, zucharum. Composita sunt, T. de agarico, alipt. muscata Nic. praesertim in pueris, diapapuer, diaprassium, loch de pino Mes. loch de scilla Serap. loch de papauere Haly. quadrumeron conf. Nic. rosata magna Nic. fyrupus de hyssopo, de prassio, de calametro, de iuiubis, de liquiritia, theodorico magnum Haly, 6. antidota, theriaca magna Nic. hiera, logodium, hiera Archigenis, Phylonium romanum, &c.

D

De prognosticis asthmatis.

Hippoc. aphor. 4. aphor. 50. Difficultates spirandi in febre intermittente, lethargice vide etiam aphor. 46. lib. 6.

Auicena. loc. cit. Hæc ægritudo cum accipit decrepitis, non forsitan sanatur, neque curatur, quum ipsa in iuuenibus & plurimum sit difficilis, & est ægritudo longa, abens cum hoc paroxysmos acutos iuxta similitudinem paroxysmorum epilepsiæ spasmii, & multotiens mutatur ad peripneumoniam, &c.

Authores dissentientes circa difficultates spirandi.

Adserere, asthma verum non esse morbum pulmonis.

Adserere, orthopnoeam non posse fieri absque febre.

Adserere, apnoeam non dari posse in animali viuente.

Adserere, pulmonem esse proprium anhelitus instrumentum.

Adserere, anhelitum esse motum tantum naturalem & non voluntarium.

Adserere, spirandi difficultatem indicare tantummodo læsionem membrorum spiritualium.

Adserere, vinum in spirandi difficultate non esse exhibendum.

8. Adferere, pharmaca non valde soluetia in asthma conuenire.

Confutatio dissentientium circa difficultates spirationis.

Ad primum, Razes quarto cōment. cap. 1. Asthma est veraciter, quod in canalibus pulmonis habet humiditates multas viscosas, prohibentes ex ipsarum viscositate, aër trahatur quantitate opportuna. I. Auic. Asthma est ægritudo pulmonis, igitur erit verus morbus pulmonis.

Ad secundum, Gal. aphor. 6. cōment. 4. Nonnulli simpliciter asthma nominant nonnulli orthopnoeam, quando absque bre ægroti iugiter anhelitum habet difficilem: ex quibus verbis cognoscitur orthopnoeam absque febre fieri.

Ad tertiū, Gal. de loc. affe. cap. 7. in fin. Nam impossibile videtur, vt animal omni spiratione exactè priuatum in vita seruari possit, quāuis animalia quæ in cauernis tent, thoracem mouere minimè videantur quare aut exiguam fieri spirationē, vt sensum effugiat, aut huiusmodi animal tunc spiratione omnino non indigere, sed eam spirationem quæ per vniuersum corpus fit, sufficere, quippe hæc cor ipsum per arterias efficit, ex quib⁹ apparet vt apnoe dari possit viuente etiam animali.

A

Ad quartum, Conciliator differētia 99. sciendum quòd instrumentum proprium phelitus est diaphragma, pulmo verò colluatiuum se habens vt ad secantem ferat &c. Probat etiā alia potiori ratione, ex quo quod insensibilis sit pulmo, tum quia non musculos in pectore frustra natura procreasset.

Ad quintum, Auic. 10. 3. tenet, quòd anhelus cōpletur duobus motibus, inter quos sunt duæ moræ, &c. ita vt componatur ex motu voluntario & naturali. Itidē cōfirmat Gal. de vsu partium, &c.

Ad sextū, Hippoc. prædictionū 1. tex. 27. Galen. in eodē com. At verò, inquit, rara spiratio, hoc est, multo tempore interposito, si magna est, indicat delirium: si parua, extinctionem natiui caloris: igitur alia in thorace etiam læsionem indicat, &c.

Ad septimū, Razes 4. cōment. Vinum tenue & subtile facit ad asthmatis passionē, si in potu accipiatur multa quantitas. Hoc tamē intellige in resolutione materiæ, vel ubi vinum sit cibus & potus.

Ad octauum, Paul. lib. 3. cap. 29. Ex antidotis hiera & purgatio continens, ex validissimis medicamentis petita Idem Auic. vtitur belleboro & colocyntide. Præterea probatur etiam ratione, nam materiæ quæ

sunt à viis ductuum remota, educi nō possunt nisi per pharmaca vehementia: sed in asthma ita sunt, igitur non nisi per validissima pharmaca educi poterunt, & per consequens vehementi indigent pharmaco, &c.

De peripneumonia.

Peripneumonia nil aliud est, quā pulmonis inflammatio cū febre acuta & spirandi difficultate: & est duplex, vera & spuria: vera cum à sanguine: spuria, quum ab aliis humoribus oriatur: vnde non immerito Mesues alioquin oculus à Conciliator reprehenditur differentia 100. dum inquit, veram fieri ex pituita, & esse minus mortalem, &c.

Loci consentientes de peripneumonia.

Paulus libro 3. cap. 30. ἡ περιπνευμονία φλεγμονὴ τοῦ πνεύμονος ὀξεία. similiter Aet. ser. 8. cap. 66. Peripneumonia est pulmonis inflammatio cum febre acuta. Itidem Auic. decima tertij, tra. 4. cap. 10. Peripneumonia est apostema calidum in pulmone. Lege Gal. 2. meth. & in lib. de finit. med. Item in lib. de part. art. med. ca. 4. ibi, Peripneumonia tantum dicitur, quum à sola inflammatione pulmo afficitur, &c.

Mesu

Mesu. cap. de peripneu. Ex ea quædã est
 va, quædam non vera, &c. Vide eum tu-
 lius, vide etiam Conciliatorem loc. cit.
 he etiã de his Hippoc. & Gal. prædict. 1.
 c. 29. Item Arcul. & Gord. & cæteros præ-
 scantes, &c.

De causis peripneumoniæ.

Causæ antecedentes sunt angina, pleu-
 ritis, catarrhus, vel alia materia ab aliqua
 corporis parte ad pulmonem transmissa.
 Causæ coniunctæ sunt humores ibi coar-
 cti & putrefacti, sicuti est sanguis, bilis,
 cruenta: fieri enim potest ferè ab omni
 humore.

*Loci consentientes de causis
 peripneumoniæ.*

Haly abbas in sua praxi, Et hoc aposte-
 riore aliquando fit ex materia sanguinea,
 et ex cholera quæ ad pulmonem incur-
 rit, nonnunquam à catarrho à capite de-
 pendente, interdum à pleuritide, iugula-
 tione, &c. nam pulmo imbecillis ea facile
 recipit, quæ ab aliis membris repurgan-
 tur. Paul. lib. 3. cap. 30. idem sentit, ibi, In-
 flammatio fit ut plurimum à valenti-
 s in eam partem destillationibus, aut
 angina, aut suspirio, aut pleuritide, &c.
 de causis verò coniunctis loquitur Au-
 sen. decima tertij, capit. 10. ibi, Et pe-

ripneumonia fit ab omni humore, sed plurimum fit à phlegmate, quoniam in membro rarò non cõtinetur humor subtilis, &c. B. Intellige Auicen. velle peripneumoniam à sanguine, & à pituita frequenter fieri, rarò ex bile, rarissimè ex atrabili, vnde Auic. plura capita facit de hac re quem legere poteris. Gal. apho. 7. cõment. 12. causas peripneumonix etiam tetigi quem fusius videbis.

De indicijis peripneumonix.

Indicia communia omni inflammationi sunt rubor, tensio, dolor. Propria sunt febris acuta, grauitas absque dolore, ni pelliculæ ipsius thoracis sint inflammatae quoniam tunc dolor percipitur, spirare adest difficultas, rubescunt maxillæ & facies, nasus fit simus, venæ temporum eleuatur, appetitus deiectus est, lingue adest siccitas, tussis sicca præcipuè in morbi principio, respiratio calida est, sputum biliosum, spumosum, & quandoque cruentum, vigilie adsunt quæ delirium & stuporem inducunt, extremitates frigida, ungues liuidi incuruantur, & hi plerunque in 4. vel 7. pereunt: si verò ad salutem tendat morbus, sanguinis ex naribus profluuium sequitur, excrementitia per sedem excernuntur, &c.

De

*De locis consentientibus de indi-
cijs peripneumoniae.*

Gal. 4. de loc. aff. cap. 8. Quando cū spi-
radi difficultate, cui & angustia & gra-
tas cōiuncta est, acuta quoq; febris inci-
rit, is affectus inflāmatio pulmonis est:
mod si fuerit intolerabile incendiū, angus-
tiae verò & grauitatis sensus minor, erysi-
pelas ipsum vexare censendū est. Et 2. de
c. aff. cap. 7. Signa inflammationū cōmu-
na sunt, vt partes inflāmatae rubescāt, ten-
entur, remittātur, intumescant & doleāt.
Et 2. de loc. aff. cap. 9. cognoscitur pulmo-
s inflammatio, quia tanta inducitur spi-
radi difficultas, tantāq; angustia, vt suffo-
ri laborantes videantur, ac recti sedere
rogantur, calida adest respiratio. Quocir-
ca ubi plurimū perfiant, iunari videntur:
tussiendo modo hoc, modo alio colore
affectū expuitur, vt rubrū, flauum, rufum,
fumosum, nigrū & liuidū: grauitatis sen-
sus adest, dolorque ab imo ad pectus & ad
diaphragmam, & febris acuta adest, &c. Lege de
his fulius Aet. ser. 8. cap. 66. Vide similiter
Alicen. decima tertij, cap. 2. ipse enim ad-
dit, quòd dolor ascēdit ad iugulū, & pulsa-
tio est vsq; ad spatulam, & furculā, & ma-
nillas saltē apud tussim, & quādo dormit
super latus praefocatur, & lingua primò

rubescit, deinde nigrescit, & quòd ad
inflatio oculorū, grauitas palpebrarū, pul-
sus vndosus, lenis & diuersus, & ibi reddi-
rationem horum omnium. Vide insupe
Hipp. 2. prognost. tex. 60. Vide etiā Arcul-
& Razen 9. almans. ibi, Cum alicui super-
uenerit febris, & in aëris attractione tan-
tam patitur constrictionem, vt se præfo-
cari putet, &c.

De cura peripneumoniae.

Primus in medendo scopus erit reuul-
sio, vt inflammationis augmentum prohi-
beatur, quæ fieri potest cum sectione venæ
cum cucurbitulis, cum impositione ena-
matum, &c. Secundus est humoris digestio
vnde si fuerit à sanguine vel à bile, conue-
niunt syrupus violaceus, iuiubinus cum
aqua hordeacea vel zucharacea, vel syru-
pus myrthinus de papauere cum decocti-
pec. Si verò fuerit à pituita, cōueniunt sy-
rupi de glycyrrhiza, de hyssopo, oxyme-
simp. miscendo secū syrup. viol. cum deco-
ctis pectori conducentibus, &c. Tertius est
euacuatio, quæ fieri potest cum manna cal-
sia, rheubarbaro 7. de viol. de agarico cum
electuario de sebesten, &c. Quartus est
sputi prouocatio, & completur cum hi-
quæ in ore lambuntur, vt patet in cura
pleuritidis, &c. vide ibi plura.

Loco

Loci consentientes de cura
peripneumoniae.

Gal. meth. 13. cap. 4. Quum aliqua particula phlegmone vrgeri cœperit, videndū ē an propter calorem aliquem, qui in illa rater naturam ortus sit, an propter dolorem vel ipsius vel propinquæ alicuius partis hâc cōtraxerit, quò scilicet adempta causa phlegmone non amplius increseat. Post hæc considera num vicina particula sanguinem largius ad partē phlegmone obsessam transmittat, deinde si corpus succorum æqualiter auctorum redundantia laetoret. Si igitur copus fuerit plethoricum, vel malo succo redūdet, cogimur sanguinem mittere, & membrū, ne quid trāsmittat, corrigere, &c. Aet. ser. 8. cap. 66. Si nil obstiterit, vena in cubito secanda: & si vires validæ fuerint, ex utroque brachio sanguis extrahatur, &c. vide latius Auic. loc. cit. & Arcul. & Marcum Catin. & Saonarolam & Gordon.

Observatio in sectione venæ.

Herc. 9 alman. Reiteratio sanguinis fieri nō debet, nisi plethoricum sit corpus, vel membrū influens sit hepar, vel aliqua evacuatio solita, puta mēstruorū, hæmorrhoidarum repressa sit, aut si quam putaremus ad membra principalia materiā defluere,

in alijs enim periculosa & suspecta est, &c. Auic. decima tertij, cap. i. commendat plus sectionem venæ, quàm ventris solutionē, quia in ipsa, inquit, non est timor sicut in solutione, quum interdum non soluat, interdum superflua sit, prohibet etiam narcotica, quoniam sputum & maturationem prohibent, &c.

Observationes in tpicis.

Platearius, Nunquam vtendū est repercussiuīs, sed diaphoreticis & resolutiuīs. Præterea caueant aquæ calidæ infusionem super caput, quia liquefacit humiditates, & superfluitates ad pectus descendere cogit, &c. Auic. loc. cit. vnum aduertit, quod in tpicis exterius applicitis maior esse debet in penetrando vis, quàm in pleuritide: nam in penitiori loco affectio collocata est, vnde ad cataplasmata, fomenta & linimenta addatur aliquid quod sit tenuium partiū. Et nota quod debent applicari tam retro supra spondilos, quàm antè ex directo partis inflammata, &c.

Conferentia peripneumonia.

Conferūt peripneumonia, althea, amy-lū, aqua mellis, butyrum cum melle, bolus armenius, capillus Veneris, semina cucur-bitæ, citruli melonū, crocus, decoctio hyf-sopi, faba fressa in cibus, farina hordei, ca-rica

leæ cum fœnugræco decoctæ, succus gen-
ianæ, iuleb viol. iuiubinum, iuleb. Alze-
nes Mes. in cur. pleurit. Glycyrrhiza, ori-
ganum cum melle penidij, pix cum amy-
gdalis & zucharo, porrum cum melle, mu-
ilago psyllij, ruta cum anetho sicco cocta,
iola, hypericō, iris, hyssopus cum ruta fi-
ubus & melle. Composita sunt oleum de
mygdalis, oleum narcissi, de cucurbita,
violaceū, syrupus de cucurbita, violaceus,
de vino granatorum dulcium, iuiubinus,
unguentum violaceum, zucharum viola-
ceū, confectio catafici Haly. 6. antid. Dial-
thea, æsypum, diapapauer, dia dragacantū,
diaolibanum Nic. Phylodium Nic. cum
melle, loch de papauere Mes. rosata ma-
gna Nic. sotyra Nic.

De pnegnosticis peripneumonia.

Hippoc. aphor. 5. aphor. 10. Quicumque
ab angina liberantur, iis ad pulmonē verti-
tur, & in 7. diebus pereunt: si verò has effu-
gerint, suppurantur. Et aphor. 6. apho. 16.
A morbo laterali, vel pulmonia habito,
alui profluuium adueniēs, malū. Et apho-
ris. 7. aphor. 2. A morbo laterali inflamma-
tio pulmonis, malum. B. Nota peripneu-
moniam fieri à pleuritide, sed non econ-
uerso, quia si mitis fuerit inflammatio, o-
mnis humor noxijs per sputum expurga-
tur:

tur: si sit pernitiola, antequam costæ patiantur, stragulat. Et aphor. 7. aphor. 12. A pulmonis inflammatione phrenitis malum. Et secundo pronost. ca. 69. Qui purulenti ex pulmonia sunt, &c. Vide tu Galeni commentum: item secundo pronost. tex. 64. ibi, Quibus abscessus, &c. Et tex. 67. eiusdem libri, Auic. Peripneumonia quæ à cholera rubea fit, secundum plurimum sua acuitate interficit, et fit vicina cordi, & appositio cum infrigidationibus non peruenit ad locum, &c. Mes. Et dixit Gal. quod peripneumonia est difficilius curæ quam pleuretis, & promptior ad interficiendum, eo quod solutio continui in pulmone raro est susceptibilis curæ: vel quia virus cordis non tantum patitur, immo deficit ab inflammatione eius, &c. Hercul. Peripneumonia longa & diuturna perducit tandem ad nocumentum hepatis, ita ut erret eius digestiua, & tumescant pedes & crura, interdum etiam venter. Auic. decima tertij, cap. 2. Et Hippoc. dixit, quod quando accidunt exituræ apud mammillas, vel ea quæ sequitur ad eas, & aperiuntur pustulæ, euadunt, & similiter quando accidunt exituræ in crure, sunt signa laudabilia, &c.

*Authores dissentientes circa
peripneumoniam.*

1 Adserere, peripneumoniam fieri non posse

posse à pituita per viam influxus.

Adserere, peripneumoniam pituitosam esse biliosa deteriore.

Adserere, in peripneumonia ex aliis morbis facta conferre sectionem venæ.

Confutatio dissentientium circa peripneumoniam.

Gal. 2. de loc. aff. cap. 9. respondet primo, quippe iam ostendimus omnem inflammationem ex affluente fieri sanguine, quapropter si biliosus fuerit sanguis, flauum aut illudum erit sputum: si pituitosus & spumans, candidum, &c. Ex quibus inferri potest hanc etiam inflammationem pulmonis à pituitoso sanguine gigni posse, &c.

Ad secundum respondet Mes. & omnes auctores, quod deterior est biliosa, quum morbus sit acutior, sæua inducens accidentia, &c.

Ad tertiū, Pau. lib. 3. cap. 30. Vitabimus sanguinis detractionem, dum ex aliis morbis peripneumonia dependeat, & si in flauum morbus fuerit, &c.

De spūto sanguinis.

Sputum sanguinis nil aliud est, quàm quædam sanguinis reiectio per os vndeunque proueniens. Hinc consydera potius locum à quo sanguis emanat, quàm ipsam definitionem, vt monet Gal.

De

De causis sputi sanguinis.

Causæ eius primitivæ sunt percussio, sus, vociferatio, acuitas vocis, vomitus laboriosus, cibi acuti, calidi, timor & angustia sanguinem acuens, sanguisuga gutturi inhaerens, frigus constringens, caliditas dissoluens, &c. Causæ antecedentes sunt multitudo materiei & ciborum, aut retentio menstruorum, aut sanguis ex hæmorrhoidibus, aut abscissio membri, aut acuitas humoris, aut vehementia motus, aut fluctuosus spiritus, &c. Causæ coniunctæ sunt quia si proveniat à venis, erit aut incisio aut perforatio, aut apertio, aut erosio, aut valida abstergio: si verò non provenierit à venis, tunc erit vel vulnus, vel ulcus, quod à corrosione, vel putrefactione, vel ab excessu sanguineo fiet, &c.

Loci consentientes de causis sputi sanguinis.

Auic. decima tertij, cap. 4. Causa primitiva fit ex percussione aut casu super pectus aut super hepar, aut à re incisiva, aut à tussi frequēti, aut à vociferatione, aut ab acuitate vocis sine gradatione, aut à rixa, aut vomitu laborioso, & propriè in præparatis, aut assumptione solutiuorum acutorum, aut ciborum calidorum, aut à timore & angustia sanguinem acuate, &c. Galienus

len

nus 4. de locis affectis capite octauo, Vnde
 præcedentes causas, aut cū aliquis ex al
 iis, vel in ludo, vel in certamine ceciderit
 et ubi lapis vel lignum thoracem offende
 rit, aut ira cum exclamatione acuta vehe
 mentiq; voce, vt cytharædis tragædisque
 accidit, vasa diruperint: vide locum hunc
 Galienus. De causis antecedentibus & coniu
 ntis loquitur etiam Gal. 4. de loc. aff. cap. 5.
 sanguis reicitur vel rupto vel eroso vase
 liquo, vel ore alicuius venæ patefacto rū
 nitur vas, vel ob sanguinis abundantia, aut
 ob frigus à vicinis partibus contractū, aut
 ob innatam intemperiem. Quandoque ru
 tionis causa est aut vehemens motus, aut
 humorum abundantia qui vnà cum crudo
 & frigido & flatuoso spiritu venas exten
 dunt, &c. Lege hancmet sententiam cap. 8.
 eiusdem: similiter 6. de symptom. cau. cap.
 2. ad medium. Vide etiam Auic. decima
 tertij, tract. 3. cap. 4. Similiter lege omnes
 practiçantes:

De signis sputi sanguinis.

Quoniam locū cognoscere ex quo san
 guis emanat necessarium est, ne inter sto
 lidos quos redarguit Gal. compute mur, di
 ligenter aduertendum, quòd si à capite san
 guis fluat, quòd capitis vel dolor vel aliud
 nocumentum præcessit, si proueniat ab
 arte

arteriis, magno cum impetu exiet, eritque
tenuior, rubeus cum claritate, vixque col-
betur. Si à pectore, præcessit dolor: tussis
& grauitas, si à pulmone. Habes Hippo-
caphor. 13. lib. 5. ibi, Quicumque spumofus
sanguinem expuñt, iis è pulmone educti
fit cū tussi multa. extenuatio corporis, al-
ratio in genis, &c. Nota etiā quòd spumo-
sus sanguis de mēte Auic. prouenire pote-
etiā à cana pulmonis. Si sanguis proueni-
rit à rupto vase, in primis erit multus, de-
inde paucus cū aliquali dolore. Si ab erof-
vase, accidunt affatim sanguinis vacuatio-
nes, præceduntq; exigua sputa, atq; acre
ex capite in pulmonē distillationes, erit
tenuis. Sanguis ex apertione orificiorum
in principio est paucus, deinde augetur, &
est sine dolore, sanguis ab apostematibus
corrosionibus & vlceribus cognoscitur ex
præcessione eorum, & interdum expuit
sanies, &c. Sanguis proueniēs ex naribus
facile cognoscitur, tum ex rubore faciei
tum quia dum exprimitur, nasus adhu-
fluit. Vel rem breuius sic habe: Sanguis al-
ore proueniens per quatuor modos cogno-
scitur, aut expuitur tantum, & est ex par-
tibus oris: aut exit cum screatu, & est ex
colatorio, vel vuula palati & partibus eo-
rum: aut exit cum vomitu, & prouenit ve-
à meri

meri, vel à stomacho, aut ab hepate & fibus orum: aut exit cum tussi, & tunc vel à ex pectore vel pulmone, aut cana, aut laerto vocali, aut epiglotti, &c.

Loca consentientes de signis.

sputi sanguinis.

Gal. 4. de loc. aff. cap. 5. Cognoscitur sanguis qui à gula & ventriculo reiicitur ex ipso vomitu: si ex spiritualibus partibus, ex ipsa tussi: si ex faucibus & gurgulione, ex sreatu: si ex ore, ex simplici expuitione. Cognosces ex erosa vel exesa vena, si nulla præcedente causa existente, sanguis plurius inter tussiendū reiiciatur. Cognosces à pulmone educi, vbi fuerit sanguis spumofus. Cognosces à partibus pectoris emanare, si illic dolor adfuerit: nam in thorace multi adsunt nerui, quibus dolores percipi possunt. Cognoscitur à primaria thoracis affectione fieri, si neque multum, neque rubrū, sed nigricantem grumofumq; sanguinē coniecero, &c. Vide etiam cap. 8. huius lib. Itē Paul. Aeginetam cap. 31. lib. 3. Item Aet. ser. 8. cap. 59. Et Auic. 10. 3. tra. 3. cap. 4. & ibi ad vnguem omnia intelliges, Vide etiam Mes. cap. de exitu sanguinis ab ore: similiter Arcul. & alios practitantes.

De cura sputi sanguinis.

Primus scopus in medendo erit, sex res:

K

non naturales ad frigidum & siccum ordinare, ut sanguis cohibeatur & frigeat. Cibi igitur sint viscosi glutinosique, stipti & frigidi, quales sunt prifana hordeacea vel ex amylo confecta, aut pisces viscosi carnes crassæ, pingues, & animalium extremitates. Conueniunt etiam caseus recentiores portulaca, lentes, miliū, alica ac coriza. Bibatur aqua chalybeata, vitetur exercitii loquutio, &c. Secundus erit reuulsio, quæ fieri potest per phlebotomiam multoties repetitam, quæ pro singula vice sit modica. Hinc valet ligare extrema, menstrua & hemorrhoides euocare, cucurbitulas natibus affigere, &c. Tertius est malam sanguinis qualitatem temperare, reprimendo eius aquositatē, vel (ut ita dicam) biliositatem. Si enim fuerit aquositas illa pituitosa, præparetur cum rhodomelle & syrupo rosaceo, deinde euacuetur cum myrobalanicis & rheubarbaro. At si sanguis fuerit biliosus, digeratur cum syrupo rosaceo de semine acetosæ, de granatis, de omphacio, de citionis, myrthino, de portulaca, cum aqua plantaginis, portulacæ, &c. deinceps euacuetur cum myrobalanicis citrinis & rheubarbaro cum cassia. Quartus est sanguinis cohibitio, quæ primum & statim fienda erit, ne forte adeo vires ægrotantis prosternat, & diffi-

fficultas fit in reuocando. Primùm con-
 nit portulaca, lapis hæmatites, corallus,
 rnu ceruinum vstum, terra figillata, bo-
 s armenius, semen myrthi, flores & cort.
 anatorum, gumi Arab, &c. Sextus est, vt
 sanguis in pectore vel ventriculo coagu-
 tur, statim dissoluatur cum oxymelle
 mplici & composito, cum aquis hyssopi,
 abiosæ: aliqui exhibent theriacam &
 agula leporis, &c.

*Loci consentientes de cura
 sputi sanguinis.*

Auic. 10. 3. tra. 3. cap. 6. loquitur de sex re-
 us supranaturalibus dicens, Et cibi con-
 nientes eis, sunt omne conglutinatium
 oppilatiuum, & omne consolidatiuum,
 omne infrigidatiuum sanguinis, prohi-
 ens feruorem eius, & custodiantur ab o-
 nnibus causis mouentibus sanguinem, vt
 ant cibi calefacientes, saltus, clamor, rixa,
 oirus, loquutio plurima, &c. Vide de his
 atius Mesuem.

De reuulsione loquitur Paul. lib. 3. cap. 31.
 Quibus destillatio cruentum sputum con-
 itat, vena protinus debet incidi, & pro vi-
 ium modo sanguis detrahi. Auicen. loc.
 cit. Cura est vt succurratur cum phlebo-
 tomia basilicæ, in qua existimatur esse re-
 solutio singularis, &c. Et fricentur eius

extremitates & ligentur, incipiendo à superioribus ad inferiora, &c. Vide de his latius Marcum Cat. Arcul. Gord. & reliquos practi-
cantes, &c.

Item Mesuem ibi, Secundam rem complent administrationes phlebotomiæ cum iterationibus, &c. De Rectificatione sanguinis loquitur Auicenna loco citato. ibi. Et sumant in potu medicinas frigidas conglutinatiuas, &c. Vide de his vberius Mesu. & Arcul. De constrictione sanguinis loquitur Gal. 7. de comp. med. per loc. ca. 4. Curamus apertionem osculi alicuius vasis per obturationem, & rupturam per eius conglutinationem, & vasorum erosionem, per renutritionem erosorum. Obruratur osculum dilatarum per adstringentia, conglutinatur ruptum per eadem & quæcunque ipsis in compositione citra mordacitatem resiccantia, & glutinosi quid habentia miscent, vt lemnia terra. Renutriuntur corrosa per cibos boni succi, & pharmaca carnem gignentia, &c. Vide fusius Galen 5. meth. cap. 5. 6. & 7. Item Aet. ser. 8. cap. 63. Et Auicen. ibi, Et confert tribuere ei in potu trochiscos de charabe, &c. Vide de his iuxta Arcul. Mar. Cat. Sauon. Gulielmum Plac. Gordonium, & reliquos practi-
cantes, &c.

Obfer

Observationes de euacuatione.

Mesu. cap. de flu. sang. ab ore, Si fuerit acuitas & inflammatio & ebullitio in sanguine propter mixtionem cholerae acutae in ipso, oportet vt euacuetur cholera prius, deinde phlebotometur: hoc enim est secundum canonem artis, demum sequatur infrigidatio, &c.

Observationes in adstringentibus.

Gal. 2. de comp. med. per loc. cap. 4. Conueniunt adstringentia iis qui non tussunt simplicia: sed illis qui ex pulmone, aut thorace, aut arteria sanguinem reiectant, miscenda sunt adstringentibus calida, & tenuium partium existentia, vt per totum corpus distributio fiat: vbi vero circa stomachum aut aluum affectio haec contingat, huiuscemodi pharmacorum mixtura opus non est, &c. Razes 15. comment. In ruptura venae pectoris & phthisicis noli prohibere secretum perseverante adhuc catarrhi descensu ad pectus vel pulmonem, &c.

Cohibentia sputum sanguinis.

Cohibent secretum sanguinis, aloës, amyllum, balaustie, barba hircina, betonica, bolus armenius, cinis cancri, cortices castaneorum, cauda equina, centaurium maius, nux cupressi, cydonia, & eorum flores, coagulum leporis & hœdi, colla piscium, co-

rallus, corigiola, coriandrum, cornu ceru
 vstum cum dragacanto, radix dracontea
 hæmatites, gummi arabicum & amygd
 larum, cortex glandiū, flores granatorum
 hyosciamus, charabe, lachryma lentisc
 litium, lutum sigillatum, mastix, fructu
 myrthi, mumia cū mastice, ænanthe, om
 phacium, cortex rad. oliuæ, cortex oliban
 albumen oui, pix, portulaca, plantago, psy
 lium, rheubarbarum, rosa, succus rubij, si
 lix, sandaraca, sanguis draconis, symphy
 tum, synopida in ouo, cortex suberis, si
 mach, spina alba, spodium cum succo plat
 aginis, stercus apri, terra samia, tritici
 vernix, virga pastoris, hypocystis. Compe
 sita sunt, Trochisci hæmathicorum Me
 in cur. sputi sang. T. de charabe, de terra
 gillata, de papauere, de stella Auic. triph
 ra saracenica Nic. theriaca maior Auic. si
 tira confectio, confectio mirabilis Mes.
 cu. tussis hum. medicamen Andromach
 Auic. phyloniū persicum, diabolibanū Ni
 loch de papauere Haly, diapapauer Me
 diasulphur Serap. aqua aluminosa, chal
 beata, athanasia magna Auic. i. 5. & c.

De prognosticis sputi sanguinis.

Hippo. Aphor. 4. Aphor. 25. Sanguis qu
 dem suprà qualiscunque fuerit, malus, i
 frà autē bonus. B. Si immoderātia sangu

is adfit, siue infernè vel supernè exeat,
 imper malū est: immoderata enim nullo
 modo naturæ quadrant, &c. Et Aphor. 4.
 phor. 47. Excretiones in febribus non in-
 mittentibus liuidæ, cruentæ, foetidæ, o-
 nes malæ. Et Apho. 4. Aph. 27. Quibus in
 tribus sanguinis fluxerit multitudo qua
 inque ex parte, &c. Et Apho. 5. Aph. 3. Vbi
 sanguis plurimus fluxerit, singultus aut
 convulsio superueniens, malum. B. Intellige
 si à plenitudine proficiscatur, alioqui ad
 aletudinē confert. Verūm si ex euacuatio-
 ne alius morbus sequatur, necessario pro-
 nosticū erit malum. Nam Hipp. Apho. 7.
 ph. 9. A' profluuium sanguinis desipiētia &
 convulsio, malū, Et Apho. 6. Apho. 10. Caput
 dolenti & circūdolenti pus vel aqua vel
 sanguis effluens per nares, aut os, aut au-
 des morbum soluit. Et Aphor. 7. Aphor. 15.
 A' sanguinis sputo puris sputum, malum.
 B. Hoc intellige de sputo maligno quod
 ex pulmone educitur, alioqui sensus Aph.
 non esset semper verus. Et Aphor. 7. Apho.
 37. Quicumque euomunt sanguinem, si
 sine febre quidem, salutare: si verò cum
 febre, malum: curare verò acerbis & re-
 frigerantibus, &c. Galen. 7. de compos.
 med. per loc. cap. 4. In reiectione san-
 guinis, primum periculum est, ne immo-

derata euacuatio fiat, &c. Auic. 10. 3. tract. cap. 4. Et ille cui accidit sputum sanguinis: & ille qui est à pectore, non est tantum timoris, quantum in eo quod est ex pulmone. Et multoties quidem est sputum sanguinis causa sanitatis apostematis in hepate aut splene, &c. Lege & Aphor. 3. Aph. 29. ibi, Iuuenibus autem sanguinis sputiones, tabes, febres acutæ, &c.

*Authores dissentientes circa
sputum sanguinis.*

- 1 Adserere, sputum sanguinis cum tussis semper à spiritualibus membris provenire.
- 2 Adserere, spumofum sanguinem semper esse indicium affecti pulmonis.
- 3 Adserere, aperitiua in sputo sanguinis retentione menstruorum facto cōferri.
- 4 Adserere, omnem sanguinis reiectionem per superiora semper esse malum.

*Confutatio dissentientium circa
sputum sanguinis.*

Ad primum, Gal. 4. de loc. aff. cap. 5. Non verò sanguinē qui à cerebro ad gurgulis partes internas, ut ad fauces affatim descendat, tussiendo educi sæpenumero contempnimus, quippe gutturi subito irruentissimè mouere potest: ex quibus reprehendi

Medicos, qui eruptionem pelliculosissimam tanquam pulmone affecto credebant.

Ad secundum, Auic. cap. de sig. spu. sang. quandoque est spumofus sanguis ex capulmonis proueniens. Et paulò post, Et si cum dolore pectoris significat locum ægritudinis unde non semper erit à pulmone spuma, &c.

Ad tertium, Auic. 10. 3. de cur. spu. sang. aueant à cibis calidis & omnibus calefactibus, sed aperitiua sunt calida, igitur non conferunt. Præterea Hipp. Aph. 7. Aph. 7. Cura cum acerbis & refrigerantibus, non calidis & prouocantibus: sed in hoc casu fac ut monet Gal. 5. meth. ubi per sectionem venæ menstrua prouocat, & non aperitiuis. Nec styptica cum aperitiuis admittenda sunt, quum alterum ab altero facile in operatione impediatur.

Ad quartum, Galen. Aphor. 4. comment. 5. inquit, eam quæ supra fit per os solam excretionem non esse semper malam, illa quæ fit per nares omissa, quæ etiam non est mala, quoniam Hippo. Apho. 7. Aphor. 37. Quicumque euomunt sanguinē, si sine febre quidem salutare, &c. Igitur non semper erit mala, &c.

De purulentis & tabe siue phthisi.

Empyema est puris collectio in media

K 5

inter thoracem & pulmonem regione. Tabes verò quæ à Græcis φθίσις dicitur, est pulmonis vel thoracis vlceratio cum febre debili ac tussicula corpus cōsumens: nam à verbo φθίνω, quod est diminuo, dicta est: ex vlcere enim corpus consumitur, diminitur, ac colliquatur. Hęc differt ab hectica, quum omnis phthisicus sit hecticus, & non econtra: præterea hectica tam ab vlcere, quàm à non vlcerato pulmone oritur. Marasmus etiam ipse cōsumptionem corporis importat quæ à febre acuta dependet. Tabis tres sunt species: vna quum corpus non alitur, ita vt summa macies oriatur, à Græcis ἀτροφία dicta altera, vbi malus corporis habitus est, in quo ferè omnia alimenta corrumpuntur, & hanc Græci καχεξία vocant. Tertia est quæ à Græcis dicta est φθίσις, & fit quum à capite in pulmonem catarrhus descendit, & frequens tussis oritur. Interdum tamen à medicis pro vno & eodem morbo accipiuntur.

Loci consentientes de empyemate & phthisi.

Paul. lib. 3. cap. 32. ἐμπύημα καὶ τὰ κενὰ τοῦ θώρακος ἢ τοὶ καὶ τὸ ὑπὸ τὴν μεμβρανὰν, id est, si verbum verbo reddideris, Empyema in vacuis thoracis regionibus, vel in membrana costas subcingente colligitur. Gal.

Gal. lib. de tum. præter naturam, capit. 3.
ἰμπύους, hoc est purulentos dicunt, quibus pus
 in media inter thoracem & pulmonem re-
 gione fuerit collectum. Similis sensus ha-
 betur 5. meth. cap. 8. & aphor. 6. commē. 27.
 & 4. de loc. affect. capi. 5. Aet. ser. 8. capt. 67.
 Phthisis propriè est vlceratio pulmonis ad
 sanguinis spuitiones cōsequens. Gal. aphor.
 7. commē. 16. Quam propriè phthoen nomi-
 nant Græci, hanc Hipp. phthisim appellat,
 quæ pulmonis vlcera insanabilia cōsequi-
 tur, & totius corporis cum febre paruam
 extenuationem. Vide etiam hanc definitio-
 nem in lib. de fin. med. & 5. de loc. affect. ca.
 3. Vide etiā Mes. ibi, Phthisis est detrimen-
 tum desiccationis & cōsumptionis, cadens
 in corpus ex calore febrium habitudina-
 lium & vlcere pulmonis.

De causis empyematis & phthisi.

Empyema fit vel à sanguinis eruptione,
 vel ab vlcere, aut ab inflammationē abscef-
 sa & rupta, aut à catarrho à capite ad pe-
 ctus fluente. Causæ primitiue phthisis sunt
 aër, motus violenti corporei, regio borea-
 lis frigida & sicca, cibi & potus salsi & a-
 cres ac caput replentes, casus, percussio,
 autumnus pluuiosus, & temperies agri fri-
 gida & sicca, &c. Causæ antecedentes sunt
 destillatio acris mordicans, ac corrodens,
 aut

aut præcedens peripneumonia iam put-
facta & ulcerata, aut pleuritis rupta, a
putrefactio & corrosio præcedēs in subst-
tia pulmonis, aut aliqua causarum spu
sanguinis venam aperiens, &c. Causa co-
iuncta est ipsa materia producens phthisi
ad actum, &c.

*Loci consentientes de causis empye-
matis & phthisis.*

Paul. lib. 2. cap. 31. Purulenta scretio
vel propter sanguinis erupti onē, aut ab-
cere in pulmone, aut ab inflammatione a-
cessa & rupta, aut à destillatione à capi-
fluente ad pulmonem, &c. De causis prin-
tius plura habes ex Auic. 10. 3. capit. 15. ibi
Et causa extrinseca est sicut casus & perc-
sio aut multiplicatur quum æstati borea
sicca succedit autumnus pluviosus, &c. V-
de de his Arcul. fusius. De causis antecede-
ribus loquitur Mes. ca. de phthisi, ibi, Vlc-
ratio huiusmodi causam habe, aut ex pr-
cedenti catarrho acuto, ulceratiuo, insti-
lante in pulmonem, quandoque ex præce-
denti pleuritide aut peripneumonia, &c.
lege eū fusius. Lege etiam Auic. 10. 3. tra-
4. cap. 19. ibi, Cause ulcerum pulmonis sunt
catarrhus mordicatus, &c. Vide etiam
Galen. 4. de loc. affect. capit. 8. fusius de hi
causis

cis pertractantē, & alios practicātes, &c.

De signis empyematis & phthisis.

Signa ab exeuntibus sunt sputum saniei in signis suis, vrina est naturalis, verū interdum oleaginea, interdum habet furas, quæ omnia humidi consumptionem significant: in processu morbi lienteria aut diarrhœa superuenit, & sudor in fine digestionis. Signa à qualitate mutata sunt febris continua vniformis, genæ liuescunt, pedes tumescunt, carnes consumuntur, vngues curuantur, pallidi apparent. Signa ab actione læsa, malè dormiunt, pulsus minus, frequens, vniformis, diuersus in fine, ab helitus naturalis, sed in fine ob virium imbecillitatem diuersus, appetitus deiectus, & quod sursum vergit, foedi est odoris, &c.

Loci consentientes de signis.

Hippoc. prædict. 2. tex. 60. Cognoscuntur purulenti principio si febris non dimittit: sed interdum tenuior, noctu vehementior. Si copia sudoris elicitur, ac tussendi cupiditas adsit, nec quidquam tamen dignum commentatione expuunt, si oculi caui redduntur, maxillæ ruborem contrahunt, vngues manuum curuantur, digiti potissimum summi calescunt, in pedibus tumores consistunt, neque cibum appetūt, & postulae circa corpus erumpunt, &c. B. Causas

horum signorum habes in comment. Gal
 Lege de his Paul. lib. 3. cap. 32. ibi, Phthi
 cōfirmata, &c. Lege etiam Gal. 2. de mor
 cau. cap. 7. & fufius 1. de diff. feb. capi. 9. L
 ge etiam Aet. & Paul. ibi, Pus collectu
 attestantur grauitas pectoris, tussis valic
 ficcāque, &c. De signis praparatorum a
 phthifim loquitur Galen. & Hippo. apho
 5. aphor. 9. ibi, Tabes fiunt, &c. Et Auice
 10. 3. tract. 4. cap. 20. ibi, Ifti funt alati, hab
 tes pectus strictum, &c. vbi infert quod c
 lum gracile & longum præ se ferunt, & h
 meros ad modum alarum & fcapulas qua
 à pectore femotas habent, fi macilenti fi
 & carnem cum humorum acrium influx
 mollem habeāt, ad phthifim inclinati fun
 Vide de his fufius Arcul. & Galen. de dif
 feb. 1. capi. 9. Cognofce etiam ex Galen.
 Hipp. prognost. 2. tex. 62. Quatuor erupti
 nis fuppuratōis figna, quæ funt dolor, fi
 randi difficultas, tuffedo, & fcreatio: quæ
 contineantur, & vehementer infestent, ce
 lerem fignificant eruptionem: fi minus
 diuturniorem, &c.

De cura phthifis & empyematis.

In primis an phthifis curari poffit, leg
 Conciliatorem differentia 193. Si curand
 erit, vnica erit intētio, vt videlicet caufam
 tam conferuatricem, quàm productricem

am

noueamus : quæ si fuerit à sanguine, per
 stionem venæ reiteratâ: si à bile, per cho-
 loga: si à phlegmate, per ea quæ pituitam
 acunt: quanquam sciam Auicem. à Raze
 hoc differre, vt ipse solutiua ad causam
 inouendam exhibeat, quæ à Raze ratio-
 phthisis factæ interdiciuntur. Si verò fiat
 phthisis à pleuritide, cura erit in capite
 puritidis nota. Si ab empyemate, tunc pu-
 r concoctio adiuetur, deinde euacuetur:
 si suppuratio si rumpatur, vel deorsum
 indet, & expurganda erit per aluum, inte-
 rina, ac vesicam: si sursum, versus pulmo-
 nem, tunc per asperam arteriam elicitâ tuf-
 seducetur. Verùm si neutra harum via à na-
 ra têtetur, superest tantum, vt locus in quo
 nies consistit, ita aperiatur, vt extrudi pos-
 sit. Si phthisis proueniat ab vlcere, tunc cu-
 ritur in primis vlcus abstergetur cum
 hydromelle, aqua hordeacea, cum cicerum ac-
 chari, vel cum decocto hyssopi, &c. deinde
 rixus destillationum prohibeatur cum his quæ
 almonem roborant, sicut est syrupus myr-
 rinus, puluis pulmonum vulpis, &c. Ter-
 o, residuum permanens exiccetur cum mel-
 e & galbano, deinde vlcus consolidetur con-
 olo armenio. Aliqui exhibent lac quod ab-
 ergendi, & conglutinandi vires habent:
 ut qui exhibent aquam hordeaceam cum
 cancris

cancris fluuiatilibus coctam, & præcipi
confert, &c.

*Loci consentientes de cura phthisis
& empyematis.*

Meſ. cap. de phth. Primam rem comple
que abſcindūt nocumēta catarrhi, & ſi ca
ſa eius fuerit ex empyemate, peripneum
nia & pleuritide, cura eorum dicta eſt. S
cundam rem complent euacuationes ca
ſas abſcindētes, vnde ſi cognoueris ex ple
tudine ſanguinis, phlebotomamus ex ba
lica: ſi cholera abundare, euacuamus. Au
ca. de empye. Cūmq; eruperit ſanies, & e
ſtimas quod pauca ſit, vt mundificetur cu
ſputo ad quadraginta dies, tunc oportet
adminiſtrentur poſt eam abſterſiua, laua
ua, mundificatiua, dando ea in potu, qu
incipit expui, id quod erumpitur, & cu
decocto hyſſopi rad. lilij, ſyrup. de mel
&c. Paul. lib. 3. capit. 32. Puris concoctio p
mūm adiuuanda eſt fomentis, cataplaſm
tis: promouet etiam rupturam vomica
ni lateris incubitus, muſſæ ſorbitio & ſi
cus ptiſanæ cū melle. Valentiſ. decoctum
hyſſopi & thymi cū melle, &c. Vide lati
de his Galen. 5. meth. cap. 8. & Aet. ſer. 8. c.
65. & de cura vlcerum, 5. metheo. capit. 10
Auic. de cura vlcerum partium pectoris,
inuenies quæcunque à me dicta ſunt, 8.

Observationes in cura.

Galen. 5. meth. cap. 8. In ulcere pulmonis
 rimū fac, ne magno eger vtatur respira-
 tiō, sed semper agat silētium. Præterea sta-
 tim à ruptura valis facta, curam incipias,
 iōd. cruetum adhuc vulnus priusquā phle-
 monem excitet, glutines. Mesu. cap. cit.
 Quando consolidatio & conglutinatio vul-
 neris quæritur, tunc cibaria sint desiccati-
 a, non eleuata in gradu, multæ exiccatio
 is, & sint conglutinantia, vt sunt extremi-
 tes porcorum & hædorum, &c. Et paulò
 infra. Prohibeatur eis omnis lubricitas vē-
 ris & constipatio viscerum: nam lubrici-
 tas vehemens, resoluit virtutem, &c.

Conferentia tabidis.

Conferunt tabidis, ius adipis capræ bibi-
 um, amyllum, barba hirci cum aqua hor-
 dei, betonica, lutum armentum, butyrum,
 decoctio cancerum, dragacantum, scœnu-
 græcum, gumi albotim, peucedanum, pix
 humida, plantago, portulaca, confectio
 dicta mirabilis. Mesu. in cur. tuss. hu. loch-
 de pino, de papauere, Troch. de papauere
 Haly. Phthificis cōferunt radix acori cum
 ptisana, & betonica, berberaca, cancri cum
 aqua hordei, decoctio scilicet citoniorum,
 cocleæ cum vino, iecur aprī vel lupi, semen
 lini, lutum armenium, marrubiū, porrum,

L

pulmo cerui, plantago, salvia, stercus vacarum, confectio de satyrion Mefu. confectio dicta mirabilis, confectio de iacu Mefu. in curanda phthi. diadragacantur diapienidion, diarrhodon, diapiapauer Niphylonium rom. loch de spodio Auic. loc album Mefu. in cu. tuss. hu. syrup. de papuere, violaceus de hyssopo, de psyllo. M. Triasandali Nico. Troc. de camph. Mel de citoniis Serap. de arsenico & zacharurof. nouum.

De prognosticis phthisis & empyematis

Aetius sermone 8. capitu. 65. Quoniam rumpuntur suppurationes vel sursum, & deorsum. Quae vero sursum, in vacuum & in vacui & in racis locum funduntur, & periculosiores sunt. B. Nota quod suppuratio multis indisternatur, aut statim sua multitudo suffocat, aut à colluue pulmo putrefcit unde phthisis; aut sputo expurgate liberatur, aut per viam magnae venae ad vesicam cum vrina crassa extruditur, aut per viam secessus per intestina euacuatur, aut per morem in cute pectoris enatum & ruptum educitur, qui modi ferè omnes praeter primos optimi reputantur. Hippocrat. aphor. 5. Aphor. 11. Qui à tabe molestantur, si sputum quod excussunt, graue olet iniectione carbonibus, & capilli à capite defluunt lethali

thale. B. Capilli defluunt vel ob maximum alimenti defectum, vel ob humorum perniciosam corruptionem, & est pessimum signum.

Hippo. aphor. 5. aphor. 12. Quibusunque be laborantib⁹ capilli à capite defluunt, alui profluvio superueniente moriuntur. Et aphor. 5. aphor. 14. A tabe habito prouiū alui superueniens, lethale. Et aphor. aphor. 27. Quicunque suppurati, aut aquam intercutem patientes vruntur, aut sentur, si pus aut aqua vniuersim effluxerit, omnes moriuntur. B. Vide etiā aphor. 10. & 13. & 22. & 29. lib. 3. circa hanc materiam: item 8. lib. 4. Et aphor. 7. aphor. 6. A puris sputo phthisis & fluxus: quum erò sputum retinetur, moriuntur. Aet. ser. capi 67. Difficillimè curantur vlcera pulmonis, eo quòd citra tussim non repurgantur, & à tussi mutuò vlcus corrumpitur. Præterea pharmacorum vires ad vlcus peringere non valent, priusquam in ventre permutantur. Præterea pulmo per spirationes semper mouetur, & tussiendo lancinatur. Itidem si curentur, ita vt fistulosæ & callosæ cicatrices relinquātur, progressu temporis fricantur, & leui ex occasione recidiuntur. B. Vide de his fusius Gal. 5. met. cap. 8. & 7. de compos. med. per loc. Intelli-

ge tamen tu vt Gale quòd vlcera in superficie pulmonis facta curari possunt, sed antiqua & à phlegmone facta difficulter, vplanè nūquā sanari possunt. Vlceravero pectoris facilius curantur, tū quia carnosum est pectus, tum quia paruo motu indigent quia substantiam ita mollem & ad erosionem pronam non habet vt pulmo. Vide de his latius Galen. loc. cit. & 4. de loc. aff. capit. 5. ibi, Vlceravero in pulmone, &c.

Hippo. aphor. 5. aphor. 15. Quicumque morbo laterali suppuratur, si in 40. diebus purgantur à die qua fit ruptio, liberantur si minus ad tabem transeunt. Et prognost. 2. text. 5. Superfunt, quos febris eodem die dimiserit, & cibum citius appetunt, & à tibi liberati sunt, & venter exigua & constantia deiicit, & pus album leue & color est, & sine labore ac tussi valida reicitur. Qui verò contrarium habent, pereunt &c. Et 2. prognost. text. 52. Quicumque dolor circa thoracem & pulmonem non definit, adhibitis opportunis auxiliis, in suppurationem verti sciendum est. Vide textus alios sequentes ad prognosticū etiam maximè spectantes.

Galen. 5. meth. ca. 8. Si phlegmone semel inuaserit, exigua glutinandi est eius spes, i longius tamē protrahere potest tēpus, &c.

B. R.

. Ratio est, quia in pulmone nec sanies
ecpus elui potest, quod in phlegmone so-
ita prima est intentio, nec vulnus gluti-
ri, quum in perpetuo motu ob respiratio
em pulmo sit.

*Authores dissentientes circa empye-
ma & phthisim.*

Adserere, omne empyema esse per inci-
sionem vel vstionem curandum.

Adserere, cum Erasistrato, nihil ex tho-
racis spatio in pulmonem posse recipi.

Adserere, phthisim fieri posse à siccitate
per se.

Adserere, humiditatem per se posse pul-
monem vlcere.

Adserere, phthisim ex vlcere pulmonis
antiquo esse curabilem.

6 Adserere, lac nullo modo competere
phthisicis.

7 Adserere, zacharum rosaceum recens
nullo modo conferre phthisicis.

8 Adserere, abstergentia expurgantiâque
solum in phthisi conuenire.

*Confutatio dissentientium circa
empyema & phthisim.*

Ad primum, Galen. aphor. 6. comment.
27. Vstione tantum indigent qui plurimum
habent puris, adeo ut desperent per spuitio-
nes posse expurgare: sed omne empyema

tale non est, igitur nec per incisionem curandum, &c.

Ad secundum respondet Galen. 5. de loc. affect. cap. 3. ibi, Ii nanque vel ex thoraci spatio in pulmonem quippiam recipi impossibile esse sibi persuadentes, &c. & ibi docet modum & viam qua fit hic transitus. Similiter & 5. meth. cap. 8.

Ad tertium, Gale. aphor. 3. comment. 1. Morbi tabitudines nominati ad has duas sequuntur constitutiones, & ad frigidissimam, ex qua nonnulla ex vasis quæ sunt in respirationis instrumentis dirumpuntur, & ad alteram quæ coniunctam habet cum caliditate humiditatem, quarum occasione caput repletum mittit ad pulmonem fluxiones: à sicca verò constitutione omnia alia magis quam tabitudines consequuntur, sic à siccitate nullo modo phthisis oritur.

Ad quartum, Conciliator differētia 19. in eius appendice inquit, quòd humiditas per se non causat phthisim, nisi fuerit coniuncta humido catarrhali vel caliditate vel frigiditati.

Ad quintum, Gale. 5. meth. cap. 8. Ulcer pulmonis non modò ad curandum sunt difficiliora, sed quibusdam etiam impossibili eius cura videtur, & hoc ratione & experientia. Ratione, quoniā pulmo est semper
ir

in motu: sed quæ sunt sananda, quiete indigent. Experientia; quia neminem eorū ita seclorū sanatū viderim. Item 4. de lo. aff. multos ex hoc morbo defecisse, imò inquit, quapropter omnes perire necesse est.

Ad sextum, Gale. 5. meth. cap. 12. Veteres rō etiam mulierem lactantam, iis qui hoc confumerētur, adstare voluerunt, eorum sententiæ ipse quoque accedo, &c. ubi lac summopere commendat. Itidem scribit 7. meth. cap. 6. Præterea id quod est cilis assumptionis, optimæ digestionis bonæ nutritionis, item optimè humeans, consolidans & abstergens, confert nihilis: sed lac habet has condiciones, refert Auic. igitur est dādum phthisicis. Quare si ab aliis irritetur, idcirco fit, quia febre putrida non comperit, &c.

Ad septimum, Auic. decima tertij, tra. 4. capite 6. Vnum de maximè conferentibus phthisicis est, zucharum rosaceum, & ex his quæ multoties sum expertus, in corporibus & regionibus diuersis est, ut utatur ane zucharo ros. & si angustetur anhelis, detur in potu syrupus de hyssopo: & si inflammatur, dentur trochisci de camphora, &c. Mes. Ex rebus mirabilis iuuamenti ad consolidationes & sanationes vlcerum pulmonis est zucharum ros. recens & supra

quod non præterit annus, &c.

Ad octauum, Conciliator different
194. Medici plerunque errant circa phthi-
sis curationem, eò quòd volentes purgar
saniem tantùm absterfuis, eam expurgar
tibus vtuntur, vt sanguinis sputum denu-
inducant, &c. ibi quæ notat zucharum ro-
non nisi præcedentibus mundificatiuis ef-
exhibendum, &c.

De pleuritide.

Pleuritis duplex, vera & mendosa. Vera
est subcingentis costas pectoris membr-
næ cum suis musculis inflammatio, cui
dolore punctiuo & acutissima febre. Men-
dosa verò est inflammatio in pannicul-
pectoris extrinsecis. Intrinsecus enim i
pectore tres continentur membranæ, qu-
rum quædam à Græcis dicuntur *εσφοντε*
id est subcingentes Latine, Arabicè pleuri-
que verò rectè per medium thoracis ad in-
gulum feruntur, *διαφράττοντες*, id est inter-
sepientes, barbarè mediastinum dicitur
deinde diaphragma, &c.

Loci consentientes de pleuritide.

Galenus 5. de loc. affect. cap. 3. Inflamma-
tiones, quæ in subcingentes costas mem-
brana ac musculis illi continuis fiunt, mo-
bum quem lateralem vocant, efficere so-
lent

It. Hæc eadem sententia est iuxta Galen.
 part. art. med. cap. 4. & de constit. art.
 id. cap. 15. & aphorif. 6. comment. 33. ibi,
 quædam acidum ructum, &c. Mesu. Pleuresis
 quædam vera, quædam non vera. Vera est
 asthema cadens in panniculis & lacer-
 at. &c. Non vera quæ fit in lacerto & vela-
 mine extrinsecis, &c. Vide de his Auicen.
 prima tertij, cap. de pleuritide. Item Ale-
 xand. & Aet. ser. 8. cap. 68. ibi, Pleuritis ex-
 iisita & propria est inflammatio mani-
 lantæ extrinsecus latera succigentis, do-
 rem punctiuum vehementer inferens,
 in acutissima febre, &c.

De causis pleuritidis.

Causæ primitiue sunt casus, percussio
 thoris, denudareque se post laborem in
 re frigido, venti septentrionales, aquæ
 frigida potus & similia. Causæ anteceden-
 tes sunt humorum influxus, vel eorum su-
 perabundantia, vel retentio superfluita-
 tum exire consuetarum. Causæ coniu-
 ntæ sunt sæpius sanguis & bilis inflamma-
 tionem actu producentes, rarò pituita, ra-
 rissimè melancholia, quia quod est densius,
 rarò ad hæc membra penetrat, &c.

Loci consentientes de causis pleuritidis.

Galenus libro de constit. art. med. cap. 5.
 Inflammatio ex humorum influxu subori-

tur; quia hæ partes non æquè vt cutis sunt densæ & cōpactæ, sed raræ potiùs. Et aphris. 6. comment. 3. idem adferit, ibi, Quæ vnaquæque inflammatio ex alicuius humoris, &c.

Auicennas decima tertij, cap. de pleura. Et materia huius apostematis vt plurimum est cholera, aut sanguis cholericus quoniam in membris tunicosis non penetrat, nisi subtilis sanguis cholericus, & purus, &c.

Mes. cap. de pleura. Commune est intrinsecis ac extrinsecis pāniculis ab omni materia apostemari, verum à sanguine & cholera frequentius, à phlegmate & cholera nigra rariùs, &c. & hæc de causis antecedentibus & coniunctis. De causis verò primitiuis lege Arcul. Gord. Sauona. & Auic. ibi, Et quandoque facit pleuresim multitudo potus aquæ frigidæ, & frigus additum, & facit euenire caliditas vehemens & potus vini puri, &c.

De indicijis pleuritidis.

Signa pleuritidis inseparabilia sunt, febris acuta, dolor punctorius, modò ad iugulum modò ad præcordia tendens, spiratio frequens & exigua, pulsus serinus ac durus, tussis magna, interdum cum screatu, interdum absque sputis, quorum signo

rum

In si vnū deficiat, vera pleuritis esse non est. Signa materię inflammationem efficiētis sumunt ex colore sputi, vnde si rufus fuerit, sanguinolenta erit inflammatio: si flauus, biliosa: si spumofus, pituitosa: si niger, bilis assata. Signa pleuritidinē ab inflammatione hepatis interstinguentia sunt, quia loco, pulsu, dolore, colore & tussi differunt. Loco, quia infra costas in dextram tantum parte sentitur durities vel tumor. Pulsu, quia in inflammatione hepatis vnus est. Dolore, quia non acutus, sed gravis. Colore, quia facies malè colorata. Tussi, quia adest sine screatu spirationeq; majori, contrà verò in pleuritide. Signa quibus differt peripneumonia à pleuritide sunt, quia in peripneumonia pulsus est vndosus, genarum malè rubent ac si fucò deliniantur. Signa quibus differat à phrenitide sunt, quia pleuritis sine alienatione, præsertim dū incipit, prouenire solet: contrà verò phrenitis cum alienatione incipit, & cum delirio constrictione desinit, &c.

Loci consentientes de indicijis pleuritidis.

Gal. 5. de loc. aff. cap. 3. Huius signa inseparabilia sunt, febris acuta, dolor perinde ac si locus intendatur vel pungatur, spiratio frequens & exigua, pulsus paruus arteriam duram & quodammodo intēsam demonstrat

monstrans, tussis magna cum sputis coloratis, nonnunquam sine his, &c. Orib. aph. 1. comment. 16. ibi, Accessiones, &c. Sign. inquit, pleuriticorum sunt quatuor, scilicet tussis, respiratio difficilis, febris, & dolor acutus, quorum vnum si deficiat, pleuritis esse non potest. B. Habentur hæc signa ab Hippocr. 4. de vic. in mor. acu. te. 72. & lege causam horum signorum ex ip. Gal. in comment. Gale. de constit. art. me. cap. 15. ex colore sputi, quis humor peccat nobis demonstrauit, ibi, Si sputum color rubro inficitur, tunc sanguinolentum erit, si flauo, biliosum: at si spumosa excrementa pituitosum: si niger fuerit scretus, tunc iudicandum an fluxio siue biliosa siue sanguinolenta assetur, &c. Lege etiam fusi. 5. de loc. affe. cap. 3. & aphor. 6. comment. 3. ibi, Quæ à flauis ac ruffis sputis fit ex biliosis humoribus, &c. De aliis signis quibus ab aliis morbis interstinguatur pleuritis, fusiùs habes iuxta Paul. lib. 3. cap. 3. & à Gal. 5. de loc. aff. cap. 3. De signis pleuritidis mendosæ fit mētio à Galeno ibidem 5. de loc. affe. ibi, Sunt & alij laterum dolores cum febre & exigua respiratione, & sunt hæc, grauitas lateris sine tussi, nullum redditur sputū, dolor extrinsecus est tumor, deinde extrà apparet, &c. Signa co

SINGULI

CO

ctionis pleuritidis habentur ex Galeno
in commen. 12. lib. primi aphor. ibi, Acces-
siones & constitutiones morbi indicāt, &c.
Ite Galen. etiam 2. de loc. affec. cap. 9. ibi,
Quod si tussiendo nihil expuat, fieri po-
teat ut nihilominus pleuriticus sit ille, &c.

De cura ipsius plenritidis.

Cognoscas id in primis licet, an notha
vera sit pleuritis: si notha, tūc cura ten-
tativa utitur cum fotu tum humido tum
seco, quale est decoctum camomillæ, ane-
thi, melliloti, semine lini, fœnugræci, &c.
In sacculum ex sale, milio, furfure, &c. &
in his quæ potiùs ventrem leniūt, quàm
dridè soluant. Si vera fuerit pleuritis, vel
resolutionem, vel suppurationem, vel
alium morbum transmutabitur. Si ad
resolutionem, tunc in primis id quod in-
est reuellendum cum sectione venæ, cum
clysteriis, cum cucurbitulis cruri-
bus applicitis, cum fricatione partium in-
teriorum. Secunda intentio erit materiæ
præparatio, quæ si fuerit sanguinea vel bi-
liosa, præparabitur cum syrupo violaceo,
rubino, cum aquis violarum, hordei, ci-
uli, melonis indi, cucurbitæ, &c. vel cum
decocto rerum, pectus frigidantiū. Verūm
si materia biliosa requiritur id quod plus
refrigidet, & humectet, quàm abstergat, in
sang

sanguinea plus abstergat, quàm humect,
 in pituitosa plus abstergat, quàm infri-
 det, quale est decoctum hyssopi & syrupus
 de liquiritia, hydromel & oximel. Tercia
 intentio est euacuatio à loco, in quo fit
 inflammatio, & perficitur cum sectione ve-
 ex eodem latere patiēte, vel solutione ve-
 tris, vbi materia ad has partes decline-
 nam quò natura vergit, eò ducere oportet
 per loca conferentia, & hæc fiet tutius per
 cassiam, mannā, rheubarbarum. T. de ag-
 rico, de violis, &c. Quarta intētio erit spi-
 ti euocatio ac facilis eductio, & perficitur
 cum iuleb & syrupis iam dictis, vel aliquo
 eclegmate, vel inunctione ex oleo vio-
 ceo, amygdalino dulci, &c. Quinta intētio
 est residui resolutio, quæ fiet cum topicis
 modū emplastri & fomenti cum camom-
 la, &c. Si verò ad suppurationem vertatur
 prima intentio erit puris cōcoctio, quæ fiet
 cum emplastris ac vnctionibus mollienti-
 bus, sicut cum oleo amygdal. dul. butyr-
 adipe gallinæ, &c. Secunda intentio est ri-
 pturæ vomicæ promotio, quæ fiet cū vali-
 tussi, & cum his quæ dilatant pectus, qualis
 est mulsæ sorbitio, incubitus eiusdem lati-
 ris cum valido corporis motu, &c. Tercia
 intētio est, abstersio cum aqua sacchari vel
 hydromelle, cum iure cicerum. Quart

intentio erit conglutinatio, & perficitur
um bolo armeno & cum similibus, &c. At
ad alium morbum transmutetur, cura
iusdem morbi curabitur, &c.

Loci consentientes de cura pleuritidis.

Hippo. 2. de vic. in mor. ac. tex. i. Lateris
dolor siue is per exordia fuerit, siue post-
ea exortus sit, tentare calidis fomentis dis-
soluere non abs re existit, &c. & hæc de cu-
ra nothæ tentatiua, vbi laudat fomenta ex
qua calida, & quæ ex sale & milio paran-
tur. Auic. de cur. pleur. plura habet, ibi, Ve-
rum humida cū nō iuuant, non nocent, &c.
De cura veræ pleuritidis loquitur: deinde
Hippocrati. 4. de vic. in mor. acu. tex. 73. ibi,
si dolor sursum vel ad clauiculam, vel ad
mamam, vel brachium ascenderit, ve-
nam brachij internam secare oportet, qua
parte dolor afficit, sanguinemque auferre
pro corporis habitu, anni tempore, ætate,
mò si dolor acutus fuerit, vsque ad animi
defectum detrahes, postea clysterem ex-
hibebis: si verò sub thorace dolor fuerit,
pleuretico ventrem subpurgabis. Legem
etiam secundo de vic. in mor. ac. tex. 10. II.
vbi non animi vsque defectum venam se-
care iubet, sed eousque extrahere, donec
rubidior multò, aut pro rubido liuidus
fluxerit, &c. Quoniam latere secanda sit
vena,

vena, dubitauit primus Gentilis, dein omnes neoterici: quanquam meo iudicio efficaciores sint eorum rationes, qui a parte laesa dicunt extrahi, quam qui ab opposita. Pro his lege Manardum lib. 12. epistolarum ad Iacobum Pharusiū, plures rationes adducentem. Galenus secundo de vi in mor. acu. comment. 11. Tutius est per venæ sectionem euacuare, quam per purgantis medicamenti administrationem, etiam si ad hypochondriorum regionem dolfiniatur, imò per venæ sectionem nullum impendit periculum, eo discrimen maximum subeunte, quod per purgationem teratur, maxime quum morbus hic acutus cum febre vehementissima. Quod etiā diuersio ad hanc intentionem spectet, legi Auic. ibi, Oportet vt prohibeas materiam euenientem cum euacuatione & attractione, &c. De secunda intentione loquitur Meibius, Mundificationem corporis oportet præcedant præparatiua ad materie digestionem necessaria, & si materia fuerit cholerica, requiritur infrigidatio maior cum humectatione non spoliata à virtute absterfionis, &c. Si materia erit sanguinea requiritur virtus infrigidationis minor & absterfionis maior: si phlegmatica, requiritur minor infrigidatio, & maior absterfio.

absterfio. De tertia intentione loquitur
 Auicē. decima tertij, de cur. pleu. ibi, Dica-
 tus igitur, quòd cura est phlebotomia, si
 sanguis fuerit vincēs, & si est humor alius,
 iacua non cum eis quę sunt sicut myroba-
 ni, &c. Paul. lib. 3. cap. 33. Recentiores
 omnibus venam incidūt, veriti, vt opinor,
 turbationem, quam purgatio solet accer-
 re, &c.

De quarta intentione plura habes ex
 Iesue, ibi, Quintam rem complent admi-
 nistraciones medicinarum sputum facili-
 tantium, quę sunt cum humectantibus &
 emollientibus, procedendo ad res tempe-
 ratę absterfionis, &c. Auicē. loc. cit. Opor-
 tet vt sit tua magnifica intentio ad hoc vt
 tutum facile sit, & ex eis quę multiplicāt
 tutum, est dormire super latus infirmū,
 &c. De aliis intentionibus curatiuis habes
 etiam plura ex Auicē. loc. cit. ibi, Et ex eis
 quę sunt sollicitę attendenda est, vt succur-
 ras maturationi ægritudinis, & si sanies
 fiat, oportet vt succurras cum mundifica-
 tione, &c. lege de his vberius Mes. Marc.
 Bat. Arcul. Gordonium, & ceteros practi-
 cantes.

Observationes circa curam tentatiuam.

Mesu. cap. de pleu. Et canon est, debere
 in humidis & debilioribus incipere, &

M

quanto compactior & ficcior fuerit materia, tanto tardius ad fortiora prorumpere ne resoluator quod est subtile, & cadat durities in residuo. Cauendū insuper, ne vapor ex euaporatoriis ad nares ægri ascendat, dissolutionem enim & tristitiā & anhelitus constrictionem generat, &c.

Hippocra. secundo de vic. in mor. ac tex. 9. Verū si fomentis dolor non placetur, non diutius calefacito: siccat enim id pulmones, atque ad suppurationem excitat, &c.

Observationes in phlebotomia.

Auic. decima tertij. cap. de pleu. Cū in phlebotomas & euacuas, & non sedantur accidentia, tunc scias quod prohibitio collectionis, quam quæris, difficilis est: non igitur reiteres phlebotomiam, ut nō congeletur materia, quæ habitura est collectionē. Et post hæc, Dispositio debilitati virtutis nō est quæ tolerare possit phlebotomiam & solutionem, sed necessariū est tunc uti clysteriis, &c. Mesu. Oportet phlebotomiam præponi solutiuis, nisi ventris fuerit constipatio, tunc enim præcipimus lenire prius naturam, &c.

Observationes in solutio pharmaco.

Auic. decima tertij. cap. 1. In solutio el timor magnus, ipsum nanq; interdum mouet

et, & quandoque non soluit, & quandoque superfluit. Vide de his Galen. 2. de vic. morb. ac. comment. 2. deinde inquit nien. Nec solvatur venter cum pharmalaborioso, sed leniente, & vitentur stygica, sicuti myrobalani.

Conferentia pleuritidi.

Conferunt dolori lateris & pleuritidi, amygdalæ, anethum, berbena, betonica, bellium, brassica, galbanum, gentiana, illua, capillus Ven. violæ, hordeū, passul, iuiubæ, peucedanum, salvia, verbascū, rica, iris illirica, colatura fursuris cocti aqua hordeacea, althea, alchana, camomilla, carice, hyssopus, penidij, zucharum colatum, & quæcunque dicta sunt superius in capite peripneumoniæ.

De prognosticis pleuritidis.

Hippocr. aphor. 3. aphor. 23. Hyeme vermori laterales, &c. Et apho. 6. apho. 33. qui acidum eructant, non valde morbo laterali corripuntur. Et aphor. 6. aphor. 15. A morbo laterali vel pulmonia habito, si profusum adueniens, malum. B. In alige de fluxu à natura nō regulato: nam si à virtute regulante fit, etiam in principio bonum, nisi vllum aliud accidens fuerit, quod virtutem prosteruat: vnde Auic. fluxus in principio apparēs, bonum est

signum, &c. Et aphor. 5. aphor. 8. Quicum morbo laterali laborantes in 14. diebus repurgantur, ij ad suppurationem vertuntur. Et aphor. 15. eiusdem, Quicumq; ex morbo laterali suppuratur, si in 14. diebus purgantur, à die qua fit eruptio, liberantur: minus, ad tabem transeunt. Auicē. decim. tertij, cap. de pleu. Quæ est propinqua cordi & parti sinistrae est deterior, sed ad hoc ut maturetur convenientior. & quæ est remotior à parte sinistra, est salubrior, si ex parte resolutionis & maturationis magis inobediens. Et paulò post, Et apparit fluxus sanguinis narium est ex signis bonis ultimis in pleuresi. B. Adde tu, qui non tantum à naribus, sed ab hæmorrhoidibus & matrice proueniens sanguis casu laulatur. Galen. 10. metho. cap. 5. pulmonis vel membranæ quæ costis sustentitur, vel ventriculi, vel iecinoris phlegmone sit, quæ has partes occupet, ne modò his qui imbecilles sunt viribus, si etiam quibus valentiores sunt mortificasse solet. Hippocr. 3. prorrh. text. 5. Dolor lateris ex sputis biliosis, si absque ratione euenerit, in furorem aguntur. B. Et scilicet bilis ad cerebrum transit. A. cen. decima tertij, tract. 1. cap. 1. Et quando accidit pregnantibus est perniciosus.

accidens decrepitis ob debilitatem vi-
um in spuendo interficit. B. Nam solet
ominem interimere vel ex eius vehemen-
i symptomatum, vel ex præfocatione.
imo modo prægnātes moriuntur, secun-
o decrepiti nō valentes materiā extrude-
. Hippoc. lib. de aëre & aqua, Qui habēt
ntrem natura humidū, minimē morbo
terali atque aliis morborum generibus
orripiuntur. B. Hic locus citatur à Galen.
phor. 6. commēt. 33. & ratio est, quia abun-
ante bile aut pituita falsa & acri irrita-
r alius ad deiectionem, in qua plures hu-
iores excerni solent, &c.

*Authores dissentientes circa
pleuritidem.*

Adserere, pleuritidem posse fieri absque
febre, Anaxionis exemplo.

Adserere, profluuium alui in omni pleu-
ritide esse signum periculosissimum.

Adserere, pleuritidem plerunque fieri à
tenui pituita.

Adserere, repercussiua in pleuritide iā
facta conferre.

Adserere, pleuritidem dextri lateris de-
teriolem quā sinistra.

*Confutatio dissentientium cir-
ca pleuritidem.*

Impugnat primum Gal. aphor. 1. comm.

12, ibi, In morbo laterali acuta quidem f
bris vnà cum spirandi difficultate & tui
& dolore lateris pungente signa passion
significatiua nominantur. Et 5. de loc. at
cap. 3. vocat hæc signa inseparabilia, igitur
absque febre fieri non potest.

Ad secundum, Gal. aphor. 6. commen. 1.
In mediocri verò morbo laterali profluu
alui superueniens potest prodesse ratio
euacuationis, & magis quàm signa cōcoctio
nis apparuerint, inesse passionibus, neque
adeest timor sed morbus est citra pericul

Ad tertium, Gal. aphor. 6. cōmen. 33. Pu
mo in omni parte rarus ac laxus, propter
est omnes suscipere humores, membrat
autē subcingens plus bilioso. ob hæc igitur
causam, quibus pituita natura superabun
dat, rarò à morbo laterali corripiūtur, &
Vbi habes non plerunque à pituita fieri.

Ad quartū, Gale. 2. meth. cap. 17. Parci
ad pectus est adstringētibus vtendū, quar
do talia humores, qui phlegmonem exci
tant, in pulmones & cor nonnunquam re
primant. Et paulò pòst, Quippe foras tra
here potius, quàm reprimere in eo debe
mtis. Iridē ait Auic. decima tertij. in ser. c
muni de cur. doloris. Vnde non mirum
Mes. à Gord. hac de re derideatur, quū i
eo morbi principio principiante nullus
opu

us medici ab infirmo petatur.

Ad quintū respondet Conciliator diff.
no. & tenet quòd deterior sit respectu fi-
is materiae, itē ratione nobilioris partis,
em quia sauiora sunt symptomata, &c.
ege fusius vbi de peripneumonia agit.

De cardiaca passione.

Sunt cordis passiones se inuicem con-
sequentes numero tres. Prima, est cordis
imbecillitas. Secunda, est palpitatio. Ter-
tia, est cardiaca syncopa. Nam facta imbe-
cillitate cordis vehemēti agitur virtus,
unde palpitatio ex qua deinceps syncopis
oritur, nec inter se differunt, nisi secūdam
magis & minus. Palpitatio est quædam di-
latatio atque contractio præter naturæ or-
dinem facta: cardiaca verò syncopa est in-
nati roboris labefactatio & languor siue
præceps virium lapsus.

*Loci consentientes de cardiaca
passione.*

Mesu. de ægritud. cor. Aegritudines cor-
dis sunt, debilitas pulsus, tremor & synco-
pis, nō aliter inter se differentes, nisi sicut
debiles & fortes. Debilitas facta fortis, vs-
que adeò vt sit agitatiua virtutis, facit tre-
morē, tremor superueniēs generat synco-
pim, vltimitas in syncopi est extinctio &
mors. B. Nota quòd Arabes pro palpita-

tione cordis tremorem dicunt, nesciente
inter palpitationem & tremorē interstin-
guere. Sed de his fusius dicemus in fine h-
ius morbi. Galen. lib. de tre. & palp. cap. 1.
Palpitatio est quædam dilatatio atq; con-
tractio præter naturæ ordinē. Et 12. meth.
cap. 5. Syncope est præceps virium lapsus
Auic. decima tertij, cap. 6. Syncopa est de-
structio maioris partis pluriū virtutū mo-
tiuæ ex sensibilibus propter debilitatē co-
dis & aggregationē totius ad ipsam, & c.

De causis syncopæ.

Causæ syncopæ sunt vel extraneæ ve-
interaneæ. Extraneæ sunt ambientis aëri-
malitia, vel res venenatæ, vel animalium
venena, vel aliquis animi deflexus, quali-
est ingens dolor, timor, & c. vel plures mo-
tus, vigiliæ, respirationis prohibitio, & c.
Causæ interaneæ vel primario affectu fiunt
vel per consensum totius & partis. Si pri-
mario affectu, erunt vel mala intemperies
calida, frigida, sicca, humida, vel mala
compositio obstruens & spiritus præfo-
cans, vel solutio continui: quæ si fuerit
in superficie, mors usque ad diem secun-
dum prolongatur: si ad ventriculos pene-
tret, statim interficit: vel erit aliqua in-
flammatiō vel abscessus, ex quibus breui-
ter aut aliqua mora facta mors sequitur.

Si

per consensum totius corporis, tunc vel
 ut febris acuta colliquans, vel vehemens
 ritas corporis, ex qua magna sudoris co-
 a elicitur. Si per consensum partis, vel
 it ab ore ventriculi, vel à mala hepatis
 spositione, aut vteri strangulatu, aut à
 tentis menstruis, aut à vermibus, aut ab
 nmodica hæmorrhoidarum euacuatio-
 e, aut à medicamento fiet.

Loci consentientes de causis

syncope.

Gal. 12. meth. cap. 7. Occasiones quibus
 yncopæ succedunt, sunt sex, dolor vehe-
 nens, vigilia, immodica inanitio, inter-
 um motus, & principiorum intemperies.
 t cap. 5. eiusdem, Fit syncope ex ambien-
 is aëris malitia, vel ex venenatis faculta-
 ibus, vel ex animalium venenis, vel ex ali-
 quo affectu animi & pluribus moribus, ex
 vigiliis, ex immodica eius tenuitate, ex cō-
 nientium corporum raritudine, ex respi-
 ratu prohibito, & ex nutrimenti defe-
 ctu, &c. De aliis verò causis loquitur 5. de
 loc. aff. cap. 2. ibi, Affectus cordis si prima-
 rio affectu fiant, erunt aut malæ intempe-
 ries, aut venenosus humor, aut erysipelas,
 aut inflammatio, aut alius quispiam præ-
 ternaturalis tumor, &c. Lege de aliis à me
 recitatis totum hoc caput. Et 12. meth. ibi,

Si per consensum ab ore stomachi, &c. Vnde etiam de his quæ per compatiendi rationem fiunt Mes. lōgo satis sermone pertractantem. & Auic. decima terrij. cap. 6. Paul. lib. 2. cap. 38. Similiter vide Act. & reliquos practicautes: nam Auic. tres causas ponit, quarum prima est attractio, totius aut maioris partis spiritus ad cor: secunda est præfocatio spiritus in corde, spiraculum non inuenientis: tertia est paucitas spiritus in toto, ita ut non superfluat præter illum qui est in minera, &c.

De signis syncopæ.

Signa ipsius syncopæ est animi defectus, pulsus parui, extremorum frigus & fudo frigidus perumpens. Signa primarij affectus sunt, quia nulla manifesta causa in alijs membris inuenitur, nec in ore stomachi, quum non adsit nec vomitus, nec nausea. Signa malæ complexionis calidæ sunt caliditas, æstus, incendium, febbris, pulsus frequens & velox. Signa comp. frigi. sunt pulsus & anhelitus tardus, rarus, præcesseruntque longa ægrotudo, sanguinisque euacuatio, &c. adest somnolentia, color pallidus. Signa siccæ comp. sunt extenuatio corporis, nulla sentitur humiditas, pulsus durus, &c. Si sanguis vel bilis peccet, sentitur caliditas, pulsus magnus, plenus

lenus, fortis. Si melancholia, adest timor, tristitia, sollicitudo, plussus, durus, &c. Si pituita, abest sitis, cor percipitur, ac si in aqua nataret, pulsus mollis, &c. Signa oppilationis sunt diuersitas in pulsu percepta cum imbecillitate & paruitate, &c. Signa per consensum sumuntur à membris communicantibus materiam: nam si à cerebro, tunc præcessit dolor capitis, vertigines, imaginationes falsæ. Si ab hepate, cognoscitur ex debilitate, caliditate & grauitate in eo percepta cum suis aliis morbis. Si à pulmone, cognoscitur ex difficultate spirandi, ex tussi & ex catarrho. Si à stomacho, cognoscitur ex vomitu, nausea, difficultate digerendi, &c.

Loci consentientes de signis syncopæ.

Paul. lib. 3. cap. 34. Notæ ipsius sunt, resolutio animæque defectus, pulsuum paruitas, extremorum frigiditas, & in sudorem proruptio. At si cor incaluerit, magnam crebramque edit respirationem: si refrixerit, exiguam & raram.

De signis primarij affectus & per consensum lege Auic. decima tertij. cap. 7. ibi, Et quando syncopis non habet causam manifestam, & est cum tremore cordis frequente, & non est, quod est in ore stomachi causa faciens ipsam, tunc ea est cordia

cordialis confirmata: illa verò cum quæ
nausea & conturbatio, est stomachalis, &
Loci de aliis signis habentur fufius ab ip.
Auic. cap. de signis tre. cordis: fimiliter
Arcul. Sauo. & Gor. & ab aliis.

*De cura tremoris cordis
ac syncope.*

Primum regimen erit contrarium ca
fæ efficiēti tremorem fivæ palpitationem
nam fi fuerit caufa calida, regimen erit fr
gidum, cordiale: fi frigida, calidum, & c. S
cunda quæ occurrit intentio, erit digesti
præfertim fi ab aliquo humore fiat, in ca
fa calida cū frigidis, vt cum fyrupo viol.
ribes, de fuc. acetofæ, de limonibus, aceto
fa fimp. cū aquis violarum, rofarū, borag
nis, nenupharis, & c. Tertia erit euacuatio
quæ peccante fanguine (virtute roborat
fiet per fectionem venę in parua quātitati
aut peccante bile, per leuia pharmaca, qua
lis eft infufio rheubarbari in rebus cor
dial. cum myrobalanis citrinis, cum man
na accafsia. Pituita verò fuperabundant
cum diaphinicone, electuario indo, cum
myrobalanis, chebulis & agarico, additi
femper rebus cord. calidis in melancholi
peccante cum confectione hamech, piluli
indis de lapide lazuli, & c. Quarta inten
tio eft reuulfio, qua reuellimus materias
cor de

orde, & deducimus ad membra ignobilia
um fricationibus, cucurbitulis, cū sectio-
ne venæ saphenæ, cum lotionibus & clyste-
rīs, &c. Quinta est robur cordi addere, re-
nouendo intemperiem calidam cum fri-
gidis, vt puta cum rosīs, camphora, sanda-
lis, acetosa, nenuphare & similibus: in cau-
sa frigida cum calidis, vt cum buglossa, ze-
loaria, mellisophyllo, cort. citri, musco,
ambra, &c. aut cum cōpositis, vt puta cum
zucharo boraginaceo, buglossaceo, electua-
rio de gemmis, diambra, diamusco: hinc
etiam parari possunt epithemata, vnctio-
nes, sacculi, pulueres, &c. Syncopis maxi-
mè si in paroxysmo fuerit, tres in eius cu-
ra requirit intentiones: quarū prima pro-
hibet resolutionem spirituum, qui reman-
serunt, ne omnino resoluantur: & fit cum
irrotatione faciei cū aqua rosacea acetōq;
mixta, vel aqua frigida vel vino. Secunda re-
generat spiritus, & virtutem roborat, vn-
de huc spectant aromatica, & quæ citò re-
ficiunt, qualia sunt vinum, oua sorbilia,
aqua carnis, & similia. Tertia excitat vi-
res, & conuertit vapores & spiritus ad ex-
teriora confricatione extremitatum, cum
prouocatione sternutationis, facta cū acri
aceto & helleboro albo, &c.

Locū

Loci de cura syncopæ.

Auic. vndecima tertij, tract. 2. cap. 4. de cura à causa calida inquit, Et stude vt l' aër in frigidatus vltima in frigidatione vt sint rorationes & odoramenta aromatica camphorata, &c. Vbi commendat etiam res in cibo acetosas cum succis fructuum agrestibus & malis acetosis, &c. Pro secunda intentione inquit, Da ei ad sorbendum syrupū de fructibus, &c. Pro tertia intentione in materiali omni feratur auxiliū cum euacuatuius in sanguineo cum phlebotomia & extractione sanguinis vltima, &c. Lege eum fusius, & plura inuenies à me dicta. Lege insuper Arcul. Marc. Catin. Sauō & Gordia. & ceteros neotericos. De cura syncopæ loquitur Galen. 12. meth. cap. 5. Quum essentia virium, quibus regitur corpus tum in spiritu, tum in solidorum corporum temperamento consistat, hæc si integra sint, seruari debent: si corrupta, ad integrum reuocanda. Quæ igitur portio defluit, hæc apponendo refarcimus, quod altera fecit, in debitam temperiē per contrariam alterationem vindicemus, &c. B. Habes curam illius syncopæ quæ per consensum oris & tricoli fieri solet ab ipso Gal. 12. meth. cap. 3. præcipuè si à crudis crassisque humoribus fiat: si verò à flaua bile, habes
simil

similiter curā ca. 5. eiusdē li. ibi, At quibus
 clauabile, quæ os vētriculi infestet, syn-
 coa incidit, & c. Lege Paul. Aegi. ca. 36. &
 3. lib. 2. omnia ex Galeno satis bellè reci-
 tem, & c.

*Quot modis dicatur medici-
 na cordialis.*

Auic. in lib. de viribus cordis, Septē mo-
 di dicitur medicina cordialis: Primò, quia
 facit spiritus & nutrit, vt vinū: & de hoc
 eam loquitur ipse secūda primi, summa
 copulsiōis, & vndecima tertij, in cura syn-
 copis, similiter aqua carnis, oua, & similia.
 Secūdo, quia illustrat spiritus, vt margari-
 tæ & sircū. Tertiò, quia cōgregat substan-
 tiam cordis & spiritus, prohibendo resolu-
 tiōē eorum, vt charabæ, terra sigillata, bo-
 lis armenius. Quartò, quia amica est cor-
 di, quale est dulce & odoriferum. Quintò,
 quia per virtutē suam alteram & viuificat
 corroborando per qualitates manifestas, qua-
 si sunt simplicia temperata, vt borago, bu-
 bolū, aurū. Sextò, quia euacuāt depuran-
 do humorē melancholicū à corpore, aut
 iacuando quod nocet cordi, vt sunt myro-
 alani, & c. Septimò, quia sua proprietate
 occultā roborat, ac cōfortat cor, vt hiecy-
 thus,

thus, semina citri, buglossum, &c.

Observationes in cura.

Auic. undecima tertij, tract. i. cap. de c. v. ulceribus cor. Oportet vt sit velox studium in cura malarum dispositionum cordis. vt non fiat error, quia incorrigibilis est, quod non accidit aliis membris, &c.

Observationes in euacuatione.

Auic. loc. cit. Obseruamus ne superflue & cadat virtus, deinde post euacuationem viuificemus virtutem. Repletio sanguinis remouetur phlebotomia basilicæ dextræ & repletio vaporosa cū phlebotomia basilicæ sinistræ. In aliis euacuationibus nascantur medicinæ cordiales, &c. Mich. uon. de mēte Auic. inquit, Audaciores esse debemus in administrando phlebotomiam in ægritudinibus cordis quàm pharmaciam, nam phlebotomia non peruenit ad cor lūdendo sicuti pharmacia cū suis vaporibus.

Observationes in remouenda

mala complexionē.

Auic. in cura calidæ. Si inueneris virtutem debilem, & timueris extinctionē, non erit excusatio, quin permisceas frigida calidis. Mar. Car. Non debemus excessiue calidis & frigidis vtī, & quum infrigidare desideramus, medicinam calidā aromaticam miscere debemus, quia frigida clauduntur

via

as, & penetrare nō possunt, vel hæc simul
 miscemus vt naturalis calor & spiritus vnā
 conferuentur: nam Auic. confidimus, quòd
 natura fuerit fortis, discernet inter fri-
 dum & calidum, & afferet frigidum cor-
 , & calidum spiritui, &c. Vide eū fufius.
 al. 12. meth. cap. 5. Ad robur virtutis con-
 ruandum, & ad syncopalem accessione,
 io minus derepente incidat, cauendā, sin-
 ulare præsidium est temperamenti custo-
 ia, &c. Vide Mesu. de his, &c.

Noceat ac conferentia cordi.

Noceat cordi, alſcebram, colocynthis,
 phorbium, genista, mezereō, lac, scam-
 m. Conferūt debilitati, syncopæ, & tre-
 mori, aurum, caro cochlearum, margaritæ,
 menta, melissa, & xyloaloes, ambra, bora-
 o, cinnamomū, crocus. granata acetosa, la-
 s lazuli acetosa, myrobalani, aqua florū
 yrrhi, rosa, poma acetosa, sandali, sena,
 oica inda, spodium, os de corde cerui, om-
 bacium, zingiber, perdix, siricum, argen-
 um, been acetositas citri, coralli, corian-
 rum, doronici, emblici, endiuia, epithi-
 um, folium, charabe. mumia, rheubarba-
 um, persica, vinum, oua. Composita sunt
 iamargariton Nic. electuariū. de pomis
 Mes. diamusculus dulcis, aromaticū musca-
 um Mes. electuarium de gēmis Mes. pli-

N

ris arcoticon Nic. cōfectio xyloaloes Me-
 diasenæ, dianthos, diarrhodō Nic. electu-
 rium lærificans Mes. zucharū ros. borag-
 naceum, diambra, ambra cū ligno aloe
 osse, de corde cerui cū aqua rosacea in ma-
 dum pilularum, electuarium de citro, pra-
 lator regum Mes. gallia muscata, oleū m-
 linum Mes. oleum basiliconis Nic. persi-
 & pyra condita, rob de ribes, de berberi-
 de sumach, de pomis, de granatis acetosi-
 de citro, syrupus ros. de pomis, de acetol-
 theriaca magna Auicen. triphera ioanit
 Mes. theodoricon magnum, troc. de xyle-
 loes, de musco almans, potio muscata Ni-
 sotyra cōfectio, &c.

*De prognosticis syncopis &
 palpitationis.*

Hippoc. aphor. 4. aporif. 65. In febribus
 circa ventriculum & fortis æstus & cordis
 tremor vel dolor, malū. Et aphor. 2. apho-
 41. Qui frequēter ac fortiter absque causa
 manifesta exolūtur, derepente moriūtur.

Paul. lib. 3. cap. 34. Si syncope valida sit
 medicinæ locus non est, sed si vires adhu-
 tantillum cōstent, aliquando ad sanitatem
 recursus est, &c. Gal. 12. meth. cap. 6. Existi-
 mandi sunt insanabiles, qui viribus iam
 languentibus aliquod eorum viscus phle-
 gmone infestetur, quoniā nutrire eos aſsi-
 du

ne non possumus, nec seruare eos, si non
triatu: licet, &c. Auic. vndecima tertij,
lib. 2. cap. 6. Et scias quod syncopis confir-
mata curam non recipit, & proprie quado
rducit ad viriditatem faciei & conuersio-
nem colli, & ille cuius res peruenit ad hoc,
tunc quum caput eleuat, statim moritur. B.
tria requiruntur ad hoc, vt confirmata di-
tur, primum quod sit continua, secundum
sit vehemens, tertium quod nulla adsit
causa manifesta, vt dictum est in aphor.
lib. 1. 2. meth. cap. 5. Syncopia humorum cru-
orum vires premant, & propter tum mul-
titudinem tum crassitiem exiguos anima
s meatus obstruant, iam multis nomini-
bus exitialis est syncope, &c. Auic. loc. cita.
Quumque confirmatur in corde malitia con-
plexionis, non recipit curam: & quando non
est confirmatio, non facile curatur, aposte-
ma quidem calidum est interficiens statim,
frigidum ex eis est, quæ sunt difficilia,
numque cor non toleret vt apostemetur,
quomodo tolerabit vt collectio & saniosi-
tas in ipso fiat? cor longinquius est ad hoc
vt toleret solutionem singularis. Et quado
occidit, vt penetret vsque ad ventres eius,
interficit statim: & si non est penetrans, post-
ponitur eius interfectio vsque ad secundum
diem. Et quando permutatur materia ex-

pulsæ ad cor ex pleuritide, & peripneumonia sunt causæ magni timoris & moris subitæ. Et quando calor purus aut frigus purus peruenit ad cor moritur, & quandoque vidi congelatum loqui, & iam moriebatur cum sudore, &c. Lege hunc librum cum fusius.

Authores dissentientes circa cardiacas passiones.

- 1 Adserere, idem esse palpitationem & tremorem cordis.
- 2 Adserere, syncopim frequenter accidere esse signum mortale.
- 3 Adserere, sectionem venæ usque ad syncopim non esse faciendam cum Auerrho.
- 4 Adserere, vinum in defectu animi non esse exhibendum.
- 5 Adserere, in actu syncopis rescipient spiritus non præmitti debere styptici.
- 6 Adserere, syncopim & lipopsychiā nullo modo inuicem differre.

Confutatio dissentientium circa cardiacas passiones.

Impugnat primum Galen. lib. de tre. & palp. ca. 5. ibi, Tremor est partium quæ sursum vicissimque deorsum feruntur, involuntarius motus, sed sursum ferri & distrahendi, & ferri deorsum & contrahi non idem est igitur nec tremor & palpitatione idem sunt, &c.

Ac

Ad secundum, Gal. aphor. 2. com. 41. Nō ones qui exoluūtur, derepente moriuntur, sed qui sæpius, fortiter, ac sine causa manifesta exoluuntur: igitur frequens syncopis hoc non efficit, sed tantum seruatis cōis dictis conditionibus.

Ad tertium, Gal. apho. 1. com. 23. In maximis inflammationibus & in febribus aduentibus, mensura euacuationis est vsq; ad animi defectū: nā in febribus ardētissimis frigus totius corporis habitus refrigeratur, febris extinguitur, & plurimis aluus citur, sudores emanāt, &c. In maximis verdoloribus nullū maius inueni remediū, cū vsq; ad animi defectū euacuatur, &c. Hæc argumenta Auerrhois non cōcludūt, cum plerūque ea quæ natura inchoat ars, inde perficiat, & econuerso.

Ad quartū respondetur, quòd si vinū interdici deberet, maximè iis qui syncopi laborāt, ex flaua bile interdiceretur: sed Gal. meth. ca. 4. omnib⁹ quos syncope male libet, offerri iubet, eo quòd deductionē in corpus primoueat, igitur in syncopi vinum sit exhibendū: intellige tu omnibus phlegmone interiori non laborantibus, &c.

Ad quintum respondetur, quòd actu exiens syncopis refici virtus desiderat, & sic præcedent reficiētia styptica, sed si timea-

tur de futura syncopi, ob nimiam euacuationem, debent præmitti styptica, & hæc ex Gale 10 12. meth. cap. 6.

Ad sextum, Gal. 12. meth. cap. 5. loquens de succis grauantibus, ac obstruentibus,quit, Quod si nec obstruant, nec onerent, syncopem ij certè non inferunt, sed quæ lipopsychias Græci vocant: vbi lipopsychia à syncopi differre dicit. Præterea syncopæ accipitur tanquam genus, lipopsychia tanquam species, igitur aliquo modo inter differunt, &c.

*De vomitu, nausea, & vultuulosa
subuersione.*

Vomitus est motus facultatis expultricis stomachi, cum quo expellitur id quod est noxium per viam oris.

Loci consentientes de vomitu.

Galen. 6. de sympt. cau. cap. 2. accipit nauseam pro vomitu, dum inquit, Nausea est expultricis facultatis motus deprauatus quo per gulam id celerrimè euacuatur quod ventriculo est noxium. Interdum accipitur nausea pro præuia ad vomitum dispositione, sicuti primo de loc aff. capit. 4. dum inquit, Quod si humor quispiam in ipsis ventriculi tunicis contineatur, nausea quidem vexabit, sed inanis & sine vomitu, & quæ irritat duntaxat, nullum humorem

norem euacuans, &c. Et octauo de compo-
 ned per lo. ca. 2. Appellât eos stomachicos
 uibus nausea cōtingit, & maximè si ad
 omitum impellat: erunt igitur quatuor
 inuicem sequentia symptomata, primū
nausea, quæ fit quum stomachus intempe-
 rie vitiosus, aut humorum redundantia ci-
 os auersatur: hæc dum crescit, nauseâ pa-
 it, ex qua adhuc aucta, subuersio oritur,
 quæ fit dum fundus stomachi ad superiora
 erititur, vnde quum vehemens est subuer-
 io, voluulosa à Galeno octauo de compos.
 ned. per loc. cap. 3. dicitur, non minus ac si
 eheamenti contentione & violentia, velu-
 i in voluulis siue ileis, dum stercora vo-
 nuntur, subuersio fiat, à qua demum vom-
 us siue reiectatio fieri solet, &c. Auic. 13.
 ap. de vom. Vomitus & subuersio sunt
 notus stomachi ad expellendū ex eo quod
 est in eo per viam oris.

De causis vomitus & nausæ.

Causæ procatae siue sunt aër corruptus
 fædi odoris, cibis & potus in odore & sa-
 pore malus, aut nimia eius assumptio, aut
 mala eius præparatio & vinctuositas, mo-
 tus à cibo statim laboriosus, ira & cætera
 animi accidentia, imaginatio alicuius rei
 obscenæ, similiter casus, percussio, veneni
 potus & animalium venenosorū morsus.

Causæ antecedentes per essentiã sunt mala intēperies, calida, frigida, aquea, & fluuosa, materiæ stomacho inhærentes vnatantes, quæ grauando, pungendo ac extendēdo vomitū excitant, item acuitas sensus oris stomachi, mala cōpositio, sicuti accidit in oppilatione pylori, id est, ianitor vel morbus in numero, vt vermis mordendo ac pungendo, solutio cōtinui, inflammatio & abscessus pustulæ, dolor & imbecillitas ipsius stomachi, &c. Causæ per consensum vel fiunt à toto, vt in febribus, tūc vel est creticus vel symptomaticus, sicuti accidit in febrib⁹ malignis. & est pessimus: vel fit à parte, sicuti à cerebro materias transmittēte, vel ipso percusso & vulnerato, vel ab hepate, splene, intestinis, &c.

Loci consentientes de causis vomitus.

De causis primitiuis lege Arcul. & ceteros practitantes. Gal. 6. de sympt. caus. cap. 2. circa mediū, Huiusmodi excretionem fiunt interim grauato ob multitudinē vetriculo. vt quum plurimum cibi ingestum est interim ob rem mordacem, quemadmodum per cruditates cibus ingestus, vel acidum ructum vel nidorem, vel amarorē, vel acrimoniam refert: & in hoc genere continentur pituitosa ac biliosa & acetosa excremen

ementa, tum ibi nata, tum ex vniuerso
 bitu animantis in ipsum deriuata. Est &
 rtium causarum genus, quibus ventricu-
 l' ad vomendum cōcitatur, nulla vel gra-
 uel mordaci re ipsum irritante, sed ob-
 iduntaxat, quod præter naturam quip-
 um in eo cōtinetur. Vocantur præter na-
 ram quæcunq; postquam concocta sunt,
 ere non possunt, quare non tam acida pi-
 ita & salsa, verum dulcis, & sanguis quā-
 oque in ventriculo consistentes ipsum ad
 omitum impellūt, &c. Lege etiam Gal. 1.
 loc. aff. ca. 4. Itē aphor. 6. com. 1. &c. Ha-
 is etiā de his causis sensum Auic. 13. tra. 5.
 p. 8. ibi, Et id quod commouet os stoma-
 i ad vomitum, aut est qualitas operatiua
 peratione materiæ, ex qua læditur mem-
 ri communicantis vt cerebri, aut aduen-
 is percussione, aut materia grossa imbi-
 ita, aut infusa in ipso corrumpens cibum,
 &c. Lege eum fusius. de his Arcul. vberius
 git, &c.

De signis vomitus, &c.

Signa ad vomitū præcedentia sunt, nau-
 sea, subuersio, tremor, labiorum & hypo-
 hondriorum tensio. Signa vomitus qui fit
 per consensum sunt: quod si à toto, vel à
 parte fiat, in eorum augmento vomitus &
 nausea augetur, & in eorum morbi decre-

mento minuitur. Indicia per essentialia sunt primò, si à nuda & mala intemperie sine materia fiat, quòd tristis quidam aderit sensus in ore ventriculi, nec vlla aderit in ventriculo grauitas, nec ructus exierit alicuius extranei saporis, sed frequen & inanis aderit nausea absque vomitu. Signa à mala intemperie cum materia sumuntur à grauitate percepta, à ructus sapor siue amaro, dulci, acido & foetido, à siti humor sit calidus, à putrefactione & ab eo quod vomitur. Indicia obstructionis pyloroni sunt tarda concoctio & cibi descensus nisi moræ in causa sint aliæ causæ. Signa vermium erunt commotio quædam, siue titillatio circa ventriculum. Signa soluta continuitatis sumuntur à dolore, ab exitu sanguinis, & à similibus, &c.

Loci consentientes de signis vomitus.

Auicenn. de cimate tertij, tract. 5. Signa vomitû antecedentia sunt nausea, subuersio: tremit labium, accidit tensio hypochondriorum. Signa humoris calidi putridi sunt sitis, & sapor malus in ore, & putrefactio apparens, &c. Vide de alijs signis eû fusius. Galen. lib. de plen. circa finem libri, de his etiam signis mentionem fecit, ibi, Patet stomachum hoc loco appellari os ipsius

sius ventriculi, vbi si pituita colligatur, appetitiones excitat: si verò bilis flaua fuerit, sitim & cibi fastidium pariet, præterea erit illis amarulentum. At si atra bilis, torosi & tristes & sine siti, saliuâque plurimum illis scatet: nec tamen omnes cibum fastidiunt, imò eorum in quibus atra bilis cida fuerit, nonnulli satis famelici sunt, &c. Lege etiam primo de loc. affect. cap. 4. ubi, Rursus distinguendo inuestigabimus, num ab intemperie ipsius ventriculi hoc eueniat, an à flaua bile in ipso contenta, an à ecinore malè suo officio fungente, an is ex vniuerso defluat corpore, an etiam in ipso gignatur ventriculo, &c. B. Ex hoc loco postremo elice, quòd ex frigido ciborum cupiditas excitatur, &c. lege de sig. omnibus Arcul. & Sauon. & Gord. fusiſsimè loquentes. Vide etiam Platearium, &c.

De cura vomitus.

In cura vomitus primùm cōsidera an cibalis sit, an humoralis, item an creticus an symptomaticus: si cibalis, vel per essentiã, vel consensum. Si per essentiã, tunc quatuor erunt curandi intentiones: prima est causæ vomitus remotio: secunda est ventriculi roboratio: tertia est diuersio & accidentium correctio: quarta est victus ratio. Prima igitur & secunda intentio vno & eod

eodem tempore cum contrarijs moderat
stypticis alterantibus malam complexio
nem remouebit. Tertia perficietur cum r
uulsiōe, cum cucurbitulis suppositori
clysteriis, frictionibus: quod si acciderit
syncopis eisdemet auxiliis, vt supra dictū
est, curabitur. Quarta intentio sit mode
rantia in cibo & potu, participant aliqu
stypticitate remedia & cibaria, sintque fa
cilis concoctionis, saporis non ingrati, vi
num laudabile, & quod patienti placeat
&c. Si verò fuerit vomitus per consensum
tunc moderanda erit siue totius siue parti
consentientis dispositio, similiterque robor
andus erit stomachus cum his quæ exte
rius & interius applicari possunt: deind
cum diuersionibus prohibere fluxum hu
morum ad stomachum. Quod si vomitu
sit creticus, tūc vel integrè iudicatur, & sic
naturæ relinquendus: vel in aliquo deficit
& tunc in eo quod deficit, supplere oportet:
si verò superfluat, compescendus est. Vom
itus verò symptomaticus vel ex stoma
cho prouenit, vel ab aliis membris aliunde
deriuatur. Si primò, tunc intentiones me
dendi erunt tres, prima euacuatio humo
ris in ventriculo contenti: secunda est sto
machi intemperies corrigenda, simulque
stomachus roborandus: tertia est diuersio,

e fluant ab alijs membris humores, & accidentium correctio, quæ omnia etiam supra relata sunt. Si ab alijs membris proueniat vomitus, similiter in primis euacuandum, deinde diuertendum, & membra tam abundantia, quàm suscipientia roboranda, alterũ ne mittat, & alterum ne suscipiat prohibeamus, &c. Vomitus igitur si non fuerit qualis esse oporteat, tunc si sanguis cum alijs humoribus peccauerit, secunda sit vena communis, maximè etiam si ex oppressione mēstruorum & hæmorrhoidarum proueniat. Si verò à sanguine peccent alij humores, tunc facta aliquali præparatione, sicuti in bile peccante, cū oxyphara, syrup. de agresta, de granatis, de citro, de limonibus, de endiuia, de citoniis, & papauere, cū aquis endiuia, plātaginis, ipulorum, &c. In pituita cū rhodomelle, syrup. de absinthio, de menta, de bifantiis, & fumo terræ, de epithimo cū aquis mēte, absinthij, &c. Fiat euacuatio in bile cū rheubarbo, myrobalanis, cit. pilulis aloëhāginis: in pituita cum rheubarb. & myrobalanis cheb. agarico, &c. Reuulsio fiat ut dictum est cum cucurbitulis natibus ac toxois affixis, cum ligaturis iuncturarum, cum lotionibus pedum, cum proritatione urinæ & sudoris. Fluxus etiā intercipitur
vias

vias obstruendo, humores incrassando, ventriculum roborando, cum diacitoni & troc. de olibano Razes, &c.

Loci consentientes de cura vomitus.

Auic. de cimateertia tertij, tra. 5. cap. 1. Sermo vniuersalis in cura vomitus est huiusmodi, vt qui generatur à corruptione administrationis cibi, rectificetur, & adiuuetur ex quibusdā confortatibus stomachi boni odoris, calidis & frigidis, secundū quod cōuenit, & ille cuius causa est materia mala, aut plurima, euacuetur illa materia clysteribus, & minor etiā cibis & subtilietur, &c. Gal. 1. de loc. affe. cap. 4. Igitur si ipsum quod molestat nil aliud quam intemperies fuerit, calidā refrigerando, & frigidam calefaciendo, illico hominē iuuari, maximē si videris refrigerantibus tum medicamentis, tum victus ratione hominē sanari & calorificis lædi, &c. Lege fusius Galen. 8. de cōpos. med: per loc. cap. 1. ad finē & cap. 3. ibi, Vomitus ob imbecillitatem grauari stomachi aborti curantur, &c. Vide de his Arculeum & Gordonium, &c.

Observationes in cura vomitus.

Hip. aphor. 4. aphor. 6. & 7. Graciles & facile vomētes purgare superius, cauente hyemē: vomētes verò difficulter. & medici
criter

iter carnosos, per inferiora, cauētes aestam. B. Quomodo & quibus conueniat vomitus habetur ab Hippo. in lib. de salubritate tex. 17. vbi inquit, Vomitus hoc morbo irritare oportet homines obesos, ieiunantes currendo, aut celeriter eundo, graciores & imbecilliores à cibo vomitum proeuent. Lege etiā tex. 20. & 22. eiusdem. & de in comment. latius Galenum. Gal. lib. 1. sect. ven. ad finem, Caue ne noxam stomacho inferas: nam stomacho læso multæ læ corporis particulæ læduntur, &c.

Observationes ante vomitum.

Ioan. Arcul. cap. de vom. & eliciuntur ex Nicen. quarta primi, cap. de vomitu, Insue prius ad vomitum assuescāt leuibus vomitiuis, ne ad insueta tam citò fiat trāsitus. Secundo, ante vomitum præcedat ventris initio, & cibetur cibus diuersarum virtutum mixtis ex incisuiis, abstergentibus, viscosis, dulcibus, vinctuosis, acetosis, &c. Tertiò ante vomitum fac, quòd extrema & stomachus sint calida, & quòd tempus sit aliudum in meridie, &c.

Observationes post vomitum.

Ioan. Arcul. Finito vomitu lauet sibi faciem cum aqua rosacea, cui parum aceti sit admixtum, lauetque os ex vino. Tardet cibum per duas horas, & quū cibatur, tribuan-

tur

tur res boni odoris & suavis saporis, pa-
cæ quantitatis, facilis digestionis, veloci
penetrationis, paucæ superfluitatis, do-
miat & non bibat, &c.

Gal. 8. de cōpos. med. per loc. cap. 3. Et
ob id curationis scopus, vt simul ad af-
ctas partes odoratas qualitates impor-
mus, quales aromatum sunt: nam que-
admodum graucolentia omnia stom-
achum subuertere solent, sic odorata cor-
borare, &c.

Conferentia vomitui.

Conferunt vomitui, absinthiū, acetū si-
liticum, acetosa, omphaciū, allium, alo-
anethum, anisum, aurata piscis, betonia,
calamentū, castanea, cape, citonium, citi-
coriandrum torrefactum, grisomila, enc-
uia, fœniculum, phistici, cariophyllum, n-
la granata. acetosa, lupinus dulcoratus, n-
stix, mellissa, myrthus, mespila, nux m-
scata, olibanum, origanum, pyra, piper, p-
ma, pulegium, pruna, rosa, rosmarinus, si-
mach, spica, scenoanthos, tamarindi, vu-
non recentes, acatia, &c. Cōposita sunt, al-
pta, moscata Nic. antidotum hæmagogu-
Nic. aquæ thermarū, alumniosa, rosacea
aromaticum ros. Mes. Confectio alchar-
zi Mes. diacitomiten, diaolibanum Ni-
electuarium de myrtho Auicen. phyl-
niur

um Nic. cum posca, menta cum aceto,
usc. almanf. hiera picra, Gal. pilule arom.
aly. rob de ribes, de acetosa, de agresta
etositatis citri, de berberis, de citoniis
ornuum, fructuū, granatorum, pyrorum,
omorum, sy. de agresta, de menta, de ace-
sa, de succis, acetosus de citoniis Mes. de
uctibus. Auic. de citoniis, de granatis, de
osis, troc. de rosis, de olibano almanf. soti-
a Nic. rosata nouella Nic.

De prognosticis vomitus.

Hippo. Aphor. 1. Apho. 2. In perturbatio-
ibus ventris & vomitibus spontaneis si
alia purgentur, qualia purgari oportet,
onfert & leuiter ferunt: si minus, contra.
t Aphor. 4. Aphor. 22. Morbis quibuscumque
ncipientibus si arrabilis vel supra vel in-
ra exierit, lethale &c. Et Aphor. 7. eiusdē,
omentes verò difficulter & mediocriter
ene carnosos per inferiora, timētes aesta-
em. Et Aphor. 6. Aphor. 15. A' longo alui
rofluuio habito spontaneus vomitus fu-
erueniens morbum soluit. B. Hic nota na-
uram esse medicorum magistrā: nam
retractionem edocet, quam imitari debet
medicus. Et Aphor. 7. Aphor. 3. A' vomitu
singultus & oculorum rubor, malum. B.
Quotiescunque ventriculus ab humori-
bus infestatur, vel per vomitiones vel in-

○

ferne eos abiicit, & statim à singultu libratur: quum verò singultus nō desinit, durum alterū significat, vel cerebrū, vel ventriculum non mediocrem pati inflammationem, &c. Et AHor. 7. Aphor. 10. Ab illo vomitus, singultus, desipientia vel convulsio, malum. B. Quia nil ad inferiora descendere significat. Et Aph. 37. Eidem quicumque euomunt sanguinem, si sine febre quidem, salutare: si verò cū febre, malum: curare verò acerbis & refrigerantibus. Intellige de vomitu qui à ventriculo tantum prouenit, non à pulmone. Est enim luctaris vomitus, quū nullius inflammationis suspicionē afferat, præsertim si sine febre fuerit. Vide Gal. in comment. Hippoc. prognost. 2. cap. 7. Vomitus utilissima est pituita ac bile mixta quàm maxima est non multa, nō crassa est: syncerior enim deterius est. Et tex. 39. Si vomitus fuerit præseus, aut humida, aut nigra, quodcunque coloris fuerit, malum. Et tex. 40. Si idem homines vomit colores, exitiale admodum est. Et text. 41. Vomitus liuida si graue oleocysissimam indicat abolitionem. Et tex. 42. Omnis sub putris ac foetidus odor in omni vomitione malus, &c. B. Habes rationes ex Galen. quare syncerum deterius sit permixto, & de aliis quæ tibi in legendo

lo apertissima erunt, &c. Auic. tertiadeci-
ma tertij, tra. 5. cap. 8. Et ex nausea est, quæ
est signum crisis, & quandoque est signum
malum, sicut in febribus pestilentialibus.
Et quum multiplicatur in conualescenti-
bus, indicat conuersionem: & in admini-
stratione vomitus cum æqualitate, est iu-
uamentum maximum, & assiduatio eius
maximè debilitat virtutem stomachi, &
facit eum lacunar superfluitatum. Et vo-
mitus quidem creticus euadere facit spas-
mum: nam accidit febricitanti spasmus aut
epilepsia, & subito euomit humorē vt flos
eris: & euadit. Et multotiens vomitus sa-
tiat ex singultu clamoso. Et ex administra-
tione vomitus cum æqualitate conseruan-
tur renes, & curantur nocumenta eorum, &
nocumentum pedum, & eruptio venarum,
&c. Et deterior vomitus est ille vomitus
anguinis nisi secundum necessitatem sit.
Et amatur quidē vt administretur in men-
se bis, & melior horarum vomitus est, quæ
est post balneum & cibum, &c.

*Authores dissentientes circa
vomitum.*

- 1 Adserere, vomitum quolibet tempore &
in omni homine posse tutò prouocari.
- 2 Adserere, vomitum non nisi à re grauan-
te vel mordaci irritari.

3 Adferere, in syncopi ex consensu ventriculi facta non conferre vomitum.

Confutatio dissentientium circa vomitum.

Ad primum, Gale. Aphor. 4. comment. Cui imperandus est vomitus, oportet ut sit gracilis & facilis ad vomendum, & quod non sit hyems: & sic non quolibet tempore prouocandus, nec in omni homine. Nam mediocriter carnosos & difficulter vomites per inferiora, non per superiora purgandos admonet, &c.

Ad secundum, Gale. 6. de sympt. cau. cap. Est & aliud causarum genus, quibus ventriculus ad vomendi impetum concitatur nulla vel graui, vel mordaci re ipsum irritante, sed ob id duntaxat quod præternaturam quidpiam in eo continetur.

Ad tertium dicitur, quod est opinio Galeni, art. cur. ad Glau. cap. 14. quod prouocetur irritando stomachum. Itidem Auic. 2. 3. de cura syncopis. Itē Haly abbas 6. pract. cap. de syncopi: & in hoc later Auerrhois quatuorlibet, verum si syncopis cum sudore fieret, tunc nequaquam fieri iubet Auicenna loco citato, &c.

De corruptione concoctionis & eius imbecillitate.

Concoctio est secundum qualitatem, quam

nam

imirum ventriculus facit, dum cibos sibi
miles reddit, alteratio, quæ trifariam læ-
itur, vel omnino abolita est, & talis per-
manet cibus, qualis ingestus est vel imbe-
cilla fit, & cibus tardè concoquitur, vnde
αδυνψία, id est, tarda concoctio à Græ-
cis dicitur: vel deprauata est, & tunc cibus
in alienam qualitatem permutatur, vnde
ψία, id est, cruditas appellatur. Cibus
erò interdum & ipse ita corrumpitur, vt
nullam concoctionem admittere possit, &
nullum proprium nomen habet, &c.

*Loci consentientes de corruptio-
ne concoctionis.*

Gal. 6. de sympt. cau. cap. 1. Concoctio est
secundum qualitatem, quam nimirū ven-
tricus facit, dum sibi similes cibos red-
dit, alteratio, &c. Lege eum fusius.

Et tertio de sympt. cau. cap. 4. Alteratrix
militer vel omnino abolita est, quū cibus
secundum omnes qualitates talis perma-
net, qualis assumptus est: imbecilla, quum
tardè concoquit: deprauata, quum in alie-
nam qualitatem cibi permutantur, &c. Le-
ge eum fusius. Lege etiam 6. de symp. cau.
cap. 1. ibi, At bifariam vitium fieri potest:
aut enim tardè alterantur cibi, vt vix pro-
priam transmutationē suscipiant: aut cor-
rumpuntur omnino vt nullam concoctio-

nem admittant: illud $\beta\rho\alpha\delta\upsilon\omega\psi\iota\alpha$, hoc verum nullum proprium nomē habet. Vide Auic 13.3.tra.3.cap.1. ibi, Et cibus aut conuertitur ad id quod facit digestionē integram aut conuertitur ad id quod digeritur digestionē aliqua non integra, &c. lege eum fusius.

*De causis corruptionis, concoctionis,
ac eius imbecillitatis.*

Causæ primitiue imbecillitatis concoctionis sunt aër corruptus, foetidus, vaporibus malis admixtus, similiter ventriculi vel alicuius membri sibi compatientis caliditas nimium dissoluens, aut frigiditas calorem natium extinguens. Cibus quæ sua qualitate mala, aut sua quantitate confici non potest, aut quia intempestiue, aut non recto ordine, aut quum diuersimode ingeritur. Potus similiter quum bibitur plus quam ad cibum spectet. Coitus in cibo, & accidentia animi immoderate spiritus commouentia, &c. Causæ antecedentes & coniunctæ per se sunt mala ventriculi compositio, mala figura, vt si fuerit maior vel minor quàm deceat, vel figuræ rotundæ, quum naturaliter oblonga sit. Causa similiter erilapsus ad frigidam & siccam intemperiem & humores cuiuscunque generis in ventriculo superfluentes. Per consensum à toto
fi

etiam imbecillis concoctio, sicut in febribus, hydrope, crisi, &c. A parte, ut læso rebro, splene, hepate, &c. Causæ corruptionis vel erunt in ventriculo, vel in cibis, vel in rebus superuenientibus. Si in ventriculo, vel fiet per proprios vetriculi morbos, ex quibus corruptio ciborum sequitur, aut ex solutione continui, ex eius inflammatione, &c. Si in cibis, vel corruptio fiet per suam malam qualitatem, vel vaporum, vel acidam, aut foetidam, aut putridam, &c. Vel per suam quantitatem, ut dictum est, &c. In rebus superuenientibus sicuti ab errore externo accidente, vel à vitiosis humoribus in ipso cumulatis.

Loci consentientes de causis.

Gal. 6. de sympt. cau. cap. 1. Causa communis est alteratricis potentiae à scopo aberratio. Fit autem bifariam, vel à potentia ipsa affecta, vel ab externo errore. Potentia rursus bifariam læditur, vel per suam ipsius essentiam, aut per aliquem instrumentorum morbum. Error triplex est, vel à ventriculi excrementis, aut à cibis, aut dormiendi tempore. Per suam essentiam ex intemperie quadam agentium qualitatum. Per instrumentorum morbos, ut per erysipelata, œdemata, phlegmones, scirrhus, abscessus, & propter alios morbos simplices &

compositos in ventriculo existētes, quib
malē ventriculus concoquit læsa existen
eius potentia. Interdum etiam animal n
concoquit, aut ob immodicam ciborū p
tūūque quantitatem, aut prauam qual
tatem, aut quia intempestiue, aut non re
ordine ingerantur, &c. Lege Gal. 1. de lo
aff. cap. 3. ibi, Corruptionis ciborum tr
sunt differentiæ, &c. Auic. 13. 3. cap. de co
rupt. dig. Et ad summum causa in hoc a
est in cibo, aut in receptore cibi, aut in r
bus accidētibus superuenientibus eis, &
Vide eum fusius: nam ibi omnes causæ r
citantur, quæ nuper à me dictæ sunt, &c. V
de etiam Gale. 3. de loc. aff. cap. 6. ibi, Qu
cōcoctionis opus, &c. ibiq; intelliges quē
digestio fit in fundo vētriculi, sicuti in ei
ore ipse appetitus, &c. Lege etiam Arcul.

*De signis corrupt. concoctionis ac
eius imbecillitatis.*

Indicia debilis cōcoctionis cognoscun
tur ex grauitate, extensione, & ex mala ci
bi tolerantia. Cognoscuntur etiam ex visi
& patientis relatu, ex ventositate, ex rugi
tu, ex mora cibi in stomacho, ex paucā cor
poris refectione, facieique pallore, & e
multo sputo. Signa diminutæ concoctioni
sunt, si post decimā horam ructus odorem
malum redoleat. Signa corruptæ sunt, si
nidor

dorofum, foetidumque, aut alia non con-
statam qualitatem sapiat. Signa malæ tem-
peraturæ & malæ compositionis solutique
ntinui ex dolore, & ex his quæ de vom-
dicta sunt, iam patent. Intemperiem ve-
frigidam & humidam attestantur, fitis
modica, sapor insipidus, acidus ructus, co-
r linguæ albus, pallor vultus cum albe-
ine. Calidam verò & ficcā demonstrant
tis assidua, sapor oris amarus & ructus
etens nidorosus, color linguæ flauus, pal-
or cum flauitie. Attestantur esse in stoma-
cho flatum rugitus & extēſio. Signa corru-
ptæ concoctionis & materiæ corruptę sunt
etor, sapor inconsuetus & horribilis, nau-
sea, vomitus, singultus & syncopis. Vbi ve-
rò mora fuerit pluriū dierum, & non con-
tinuò hæc adsint, aliunde materiam proue-
nire indicium certum est, &c.

*Loci consentientes de signis
corruptionis.*

Gal. 6. de sympt. cau. cap. 1. Corruptiones
nidorosæ sunt à calidioribus & biliosiori-
bus, acidæ à frigidioribus & magis pitui-
osis. Acidæ quidem creant quæ pituitosa
sunt & frigida, fumosæque calida & bilio-
sa. Et paulò post, Tardæ etiam cōcoctiones
cibi difficulter corruptibiles faciunt, si vl-
tra quàm vires tolerant sumantur, simili-

liter & vigilia, &c. Lege locū fufius Au.
13.3.tra. 3.cap.4. Illam quæ leuis eft, fig-
ficant grauitas & extenfio & remanen-
cibi in ftomacholongior, &c. Vide Au-
fufius hîc, & in cap.de corrup.digef-
fion. fimiliter Arcul. Cord. & cæteros præ-
cantes. & habebis quęcunque à me reci-
ta funt, &c.

*De cura corruptæ concoctionis &
eius imbecillitatis.*

Considerandū an per fe vel per cōfen-
fu ab aliis partibus afficiatur ftomachus.
per fe, tunc fi à modica repletionē fiat, p-
fomnum longum fanabitur: fi verò à m-
ta repletionē, tunc educto per vomitu
cibo iam corrupto cum aliis humorib
admixtis, primū ftomachi difcrasia
per fui contrarium curato, & caufas quę a-
teratricem facultatem debilitant aufert
ventriculūque roborato. Vnde in cau-
frigida roboratur ventriculus, fimulqu
materia præparatur cū fyrup. de abfinthio
de menta cum mina citoniorū aromatici-
cum rhodomelle, cū aquis abfinthij mei-
tæ. Roborant etiam ventriculum plurim
cōfectiones, ficut aromaticum rofa. diaga-
langa, diaciminum, diatrion pipereon, &c.
In caufa calida primū facta euacuatio-
ne vel per vomitum vel per feceffum, ma-
teri-

tiæ præparatio fiet cum syrup. rosaceo, & his quæ suprâ in capit. vom. memorata sunt. At si per consensum morbus fiat, tunc quod transmittit membrum, corrige per evacuationem & reuulsionem, & stomachus ne humores aliunde fluêtes recipiat, turbetur, & sui demum intemperies pervertatur, resque non naturales in contrarium ordinentur, &c.

Loci consentientes de cura corruptæ concoctionis, &c.

Aet. ser. 9. ca. 24. Si à ciborum corruptio fiat cruditas, statim per vomitum tollenda est corruptio. Quod si quis natura difficulter euomat, enæmate succurratur. Si defectu ventriculi, cum his quæ concoctionem adiuuant, curato, &c. Auic. tract. 3. capi. 5. Cùm fuerit debilitas digestionis à causa leui, aut à repletione antecedente non plurima tunc sufficit in ea longitudo somni, &c. lege eû fusius. Lege etiam capit. 7. ibi, Primum est vt educatur corruptum in stomacho cum vomitu aut solutione ventris, & rectificetur regimen, &c. lege eû vltcrius, & inuenies quodcûq; dictum est: lege Arcul. & Mar. Catinarium, &c.

Observationes in cura cibandi.

Aet. ser. 9. cap. 24. Ad cauendam cruditatem præuidere debemus, vt neq; in multitudine

dine, neque in qualitate eorum quæ in
bo accipiuntur, neque in acceptionis
oportunitate, neque in ordine delinquant,
quæcunque concoquere valeat, ea tantum
ingerat, &c.

Auicē. 13. 3. tra. 3. cap. 7. Caue à frigidis
subtilibus (quoniam subtilia corrumpuntur
in eorum stomachis) non vomat ac
cibum, ne stomachus debilis fiat, sumatque
res stomachum roborantes, &c.

Observationes in topicis.

Gal. 8. meth. cap. 5. Quæcunque applica-
tur stomacho, sint valde calida: nam tepida
firmitudinem ventriculi dissolunt, & tri-
stia in duplici vase calefacienda sunt, ne e-
orum facultas vitietur, &c. Nota etiam quæ-
cunque dicta sunt de vomitu circa stom-
achum supra, &c.

Conferentia concoctioni

& stomacho.

Conferunt stomacho, & cōcoctioni pro-
ficiunt hæc simplicia calida, vt sunt absin-
thiū, agaricus, aloës, calamentum, calamo-
aron, cardamomū, cinnamomū, ciperi, nu-
ces cupressi, citrū conditum, phistica, ga-
langa, gallia, gariophyllū, grana pini cum
zucharo, macis, mastix, laudanum, menta-
oliuæ, olibanus, oua, passulæ, rheub. scoria
ferri, vinum, xyloaloës & zucharum. Com-
posita

ita calida sunt, aromaticum ros. garyo-
 pillatum, diaciminum, confectio Ale-
 xadrina, confectio de xyloaloës, de ga-
 lga, de citoniis, de scoria ferri, cero-
 n Alexandrinum Mes. emplastrum dia-
 pnicon, oleum masticinum, de absinthio,
 menta, pilulæ stomachicæ, aloephangi-
 , syrup. de absin. de menta, de fumo ter-
 de cort. citri, theriaca magna, triphera
 minor, troc. de ros. de absinthio, hiera Gal.
 simplicia frigida sunt, acetosa, acetum, a-
 esta, aqua chalybeata, belirici, berberis,
 conia, corallus, coriadrum, emblici, endi-
 a, cicorium, vinum & aqua extinctionis
 rri, granata, lzarabe, chebuli, lactuca, my-
 balani, myrthus, mespila, persica, poma,
 una damascena, ribes, rosa, sorba, sumach
 narogdus, perdix, pellicula interior sto-
 machi gallinarum, capillus veneris, coriã-
 rum, &c. Composita frigida sunt, diacito-
 iten, diarrhodon, electuarium de sorbis,
 ob de ribes, de berberis, de sumach, de ci-
 oniis, de pyris, de pomis, de granatis,
 e citro, syrup. de myrtho, ros. zucharum
 os. oleum citoniorum, ros. &c.

*De prognosticis corruptæ conco-
 ctionis & eius imbecillitatis.*

Auicen 13. tract. ca. 3. Quandoque perdu-
 cunt debilitas digestionis & cōuersio cibi
 ad

ad phlegma, ad tremorem & frigus ex-
 mitatum, & commotionem paroxysme-
 bris, verum pulsus non est pulsus ut in
 febris. Et dicitur in libro mortis velos.
 Qui habes nauseatiuam satietatem &
 ditatem digestionis, bothor apparēs n-
 super oculos eius similis ciceri, & r-
 parse eius, & viridis fit pars alia, tūc ipse
 ritur in 17. Gal. 6. de sympt. cau. ca. 2. Qu-
 coctionis gradus quatuor enumerētur,
 mus fit in ventriculo, secundus in venis,
 tius in qualibet parte, quartus qui altera-
 nis species est assimilatio dicit. Porro co-
 ctio vel omnino deficit, vel deprauata est
 deficit, corpus assumpto cibo non pascit,
 & fit atrophia. Si deprauata est, fiunt vini-
 gines, leucas & elephas: vide eum fusi.
 Auicen. 3. 3. tract. 3. cap. 1. Sanguis qui n-
 est digestus digestionē conuenienti na-
 ræ non recipitur à membris, sed putrefit
 foetet, nec fit ex eo nutrimentum, nec b-
 na assimilatio: vnde non mirum si sequi-
 tur lyenteria, hydrops, scabies, &c. In
 corrupta digestio in conualescentibus se-
 per recidiuam pronuntiat. &c.

Authores dissentientes circa concoctionem,

- 1 Adserere, hominem posse viuere natur-
 liter pluribus diebus sine cibo.
- 2 Adserere, à siccitate & humiditate abs-
 alii

aliis qualitatibus actiuis coctionē lædi.
Adferere, posse assignari tempus moræ
ciborum in stomacho.

*Confutatio dissentientium circa
concoctionem.*

impugnat primum Gentilis & experien-
tiam, nam quum recitasset ex Alberto, vetu-
stis in Lombardia vixisse per 40. dies sine
cibo, ipse inquit. Hæc difficilia sunt in ho-
mine apud me: nam tales humores debe-
ant potius putrescere & carere regimine
vitæ, quàm nutrire, &c. Vnde naturali-
ter loquendo, non solum impossibile est,
sed etiam non credendum, &c.

Ad secundum, Auicenna de noc. digest. Ve-
rum sicca & humida non perueniunt ad hoc
fundum plurimum, vt appareat ex eis so-
lum cum æqualitate ambarum aliarum qua-
libet datum nocumentum in digestionem: igitur
non lædunt absque aliis qualitatibus.

Ad tertium, Quum diuersimodè loquuti
sint authores de hac re, idcirco tale tem-
pus assignari impossibile existimo: nam
Aetius dixit, quod tempus moræ est
12. horarum: Gentilis, 10. horarum. Aui-
cenna de cur. febr. phlegmatici, inquit, Hora
ubi sit post paroxysmum teporem & eradi-
cationem eius, & ante paroxysmum ad mi-
nus quatuor horis. Vbi cōcludi posset quod
sto

stomachus in spatio quatuor horarum
cibo vacuus: nam superius dixerat, C
ne occurrat paroxysmus, nisi ventrem
beat vacuum, &c.

De appetitu canino.

Quum appetitus ad naturalē actionem
pertineat, non ad animalem, ut ipse
ait, ad appetitum necesse est ut præcedat
inanitio, deinde inanitarum partium
naturalis appetitus, hunc mox sequitur
tricoli per venas suctio, deinde suctionis
sensus qui est fames, demum animalis
petitus omnium ultimus: hic erit duplex
alter ad cibum, & est appetitus calidi &
ci: alter ad potum, & est appetitus frigidi
& humidi. Quorum uterq; trifariam
leri potest, si vel suctionis sensus pereat
suctio non fiat, vel corpus non inaniam
vnde dicimus quòd appetentia, vel est
lita, vel imbecillis, vel deprauata. Abi
ta, quum nihil quis appetit: imbecilis
quum in appetendo deficiat: deprauata
quum immoderatam cibi potionisque
hibitionem appetat, aut ad alienæ qua
tatis desiderium vertitur Appetitus igitur
caninus erit plurium, quàm possit dig
intensior appetentia, à cuius assumptione
animal non satiatur: alienam qualitate

petere est, ac si ea quæ secundum naturam non sunt, quis appetat, qui morbus Galeno cita. i. pica siue malacia, eo quod erogantes mulierculas infestet, vocar, ita vt carbones extinctos & testas & niles absurdos cibos appetant, &c.

Loci consentientes de appetitu canino.

Galen. 4. de sympt. cau. cap. 7. de his longiori sermone pertractat, quem fusius videre poteris. Facit etiam mentionem de appetitu canino. 6. de loc. affect. cap. 2. ibi canina appetentia vexantur, &c. Et 5. de loc. affect. capit. 6. locus affectus demonstratur, Quæ aut canum moræ, &c. Et est os ventriculi deuoratorum pondus sustinere non valens, &c. Similis etiam sensus habetur in compos. Aphor. 20. libr. 2. Vide etiam etiam Auicenn. tertiadecima tertij, text. 8. capit. 10. de corruptione appetitus: & Aet. 1. 9. ca. 20. & 23. de vitioso appetitu: vide etiam Arcul. & alios, &c.

De causis appetitus canini.

Causæ quæ caninum appetitum excitant sunt plures: quandoque excitatur hic appetitus post diuturnas euacuationes ac febres prolixas, interdum à ventre retentrice corporis, quandoque à vermibus cibum as-

sumptum deuorantibus, interdum à catho ad ventriculum stillante. Sed ad summum tres erunt præcipuè causæ, frigiditas scilicet cogens ac exprimens, calliditas resoluens, & inanitio consumens, frigiditas erit vel ab acida pituita, vel à melancholia, &c.

Loci consentientes de causis appetitus canini

Auicē. 13. tract. 2. cap. 12. Multotiens citatur hic appetitus caninus post euacuationes & febres prolixas resoluentes, quandoque accidit ex debilitate virtutis retentiuæ in corpore, & quandoque propter caliditatem superfluam in ore stomachi resoluentem, &c. lege locum hunc fusius: Galen, 4. de symp. cau. capi. 7. Caninæ appetitiuæ binæ sunt causæ, quarum vna est acidorum humorum vitium, altera est plurimè per totum corpus inanitio, siue ipsa caloris vim sequatur, siue retentricis facultatis imbecillitatem, &c. Habes etiam in 2 aphor. comment. 21. quòd canini appetitus vel propter solam intemperaturam frigidiorē, vel propter humores acidos, quos exorbuīt os ventriculi, fiant. Similis sensus habetur à Paulo lib. 2. cap. 51. & ab Aet. ser. 9. cap. 1. & 22. sed latius consule Gale. loco citato: nam præter alia, plura exempla affert de siti immodica, sicuti de mesore

re qui vinum, in quo vipera extincta fuerit, bibit & mortuus est: Item de eo qui ex veteri vino inebriatus, & de his qui in aui aquam marinam bibere ausi sunt, & de quodam febre ardenti laborante, &c. quorum causa erat salsus vel biliosus humor ventriculum mordicans. Quòd verò ermes sint causa appetitus canini, legere poteris non solum Auicē. sed & neotericos omnes, &c.

De signis appetitus canini.

Signa humorum acidorum in ventriculo sunt, multa deiectio eorum quæ deuorata sunt. Signa inanitionis ipsius habitus exacta inanitio, nec cibis per totum corpus distribuitur. Signa frigiditatis sunt eo quòd nulla vel parua adest sitis, copiosa adest deiectio, adest etiam fames assidua, & cibi assumpti grauitas, flatus multiplicatio, praua concoctio cum singultus copia. Signa caliditatis sunt sitis vehemens, corpus non impinguatur, nec quicquam per vomitum vel per secessum excernitur, &c.

Loci consentientes de signis appetitus canini.

Galen. 4. de sympt. cau. capit. 7. Canina appetentia si ab acidis humoribus fiat cognosces: quia eorum quæ fuerunt ingesta, multa fiet deiectio: si ab inanitione, quia per habitus exactam inanitionem cibis

per corpus non digeratur, &c. Razes 9. al
manf. Si cibus nec eum grauat, nec ipſum
euomit, nec per ſeceſſum expellit, ſignum
eſt à vi caloris morbum fieri: ſi verò aſſidue
famem patitur, & cibus poſt aſſumptionem
grauat, ita vt vel vomere, vel per ſecef-
ſum reiicere neceſſe ſit, ſignū eſt morbum
à frigore oriri, &c. Lege etiam Aet. ſer. 9.
cap. cit. Auicen. 13. tra. 2. ca. 13. Signum eius
qui ſit poſt euacuationes & ægritudines eſt
anteceſſio earum, &c. Signa eius qui ſit ex
frigore ſunt paruitas ſitis, multitudo fæ-
cis, inflatio, &c. Signa ex caliditate ſunt
fortitudo ſitis, & non eſt vomitus acetofus,
& natura eſt vt plurimum conſtricta, &c.
Signa eius qui ſit ex debilitate virtutis re-
tentiue eſt multitudo egeſtionis crudæ, &c.
Signa ex humore acetofò aut melancholi-
co ſunt paucitas appetitus, & aceſitas eru-
ctationis, &c. Vide Arcul. etiam & alios
practicantes, &c.

De cura appetitus canini.

Omneſe operā dabis in remouenda cau-
ſa: nam ſi fiat poſt euacuationes & febres
prolixas, tunc reſicientibus vinctuoſis quæ
os ſtomachi mūdificāt opus eſt, ſicuti ecle-
gma eſt ex oleo amygdalino dulci cum
zucharo paratum. Si fiat à retentricis ſacul-
tatis imbecillitate, tunc per contrariū eius
com

cōplexionis curato, vt si humida cum sic-
cis, si calida cum frigidis, &c. Si fiat à catar-
rho, tunc cura erit: prout dictum est in capi-
e destillationum. Si verò fiat ab acida pi-
uita, quemadmodū sæpius fieri solet, tunc
his potissimum vtendum est quæ incidunt
ac repurgent, vt sunt dulcia, salsa, & alio-
qui abstergētia calida, qualis est hiera Ga-
le, deinde vinum dulce. Profunt etiam cali-
da pingua, sicut butyrum cum brodiis pin-
guibus, cinnamomo, garyophyllis & cro-
co paratum. Si verò fiat à vermibus, confe-
runt ea quæ vermes interficiūt, deinde vte-
tur stypticis. Si fiat à calore plurimo resol-
uente, remoue cum frigidis tam intrinse-
cè quàm extrinsecè applicitis poros carnis
obstruentibus, vt cum oleo myrthino ros.
&c. abluanturque aqua frigida & aceto, ni-
si quod prohibeat: cibi verò sint frigidi,
crassi, viscosi, quales acidi, acetosi & con-
gelati, vnde confert etiam in hoc casu pa-
nis azymus & similes cibi, &c.

*Loci consentientes de cura
appetitus canini.*

Auic. decimatercia, tra. 2. cap. 14. Verum
illos quibus accidit hoc post febres fortes
& euacuationes, oportet cibari ex vnctuo-
sis quæ mūdificant os stomachi, quæ nō sint
malæ substantiæ, quale est oleum amygdæ-

larum dulcium cum zucharo, &c. Illisve
qui patiuntur ex debilitate virtutis re-
tinae, licet secundum plurimum debilit-
tur propter frigus, tamen debilitatur
omnis virtus propter omnem malitiam con-
plexionis, idcirco oportet ut cognoscas co-
plexionem, & opponas cum contrarietate
curae, &c. Hippo. aphor. 2. aphor. 21. Fame
ἀσπρῆς, id est, vini potio soluit. Gal. in cor-
men. inquit pro fame intelligi debere non
naturalem quae ex longa inedia aut ab ali-
euacuatione facta sit, sed tantum appeten-
tiam caninam, quae vini portione & cibi
pinguibus & oleaginis curatur, quia hoc
symptoma plerumque fieri solet à frigida
intemperie, siue nuda, siue humoribus im-
buta, unde vinum calefaciendo excludit hu-
mores & stomachi intemperiem emendat

Obiectio.

Videtur hoc in loco Auicen. discordare
à Galen. i. in ordine assumendi: nam Ga-
len. vino praemittit pingua, Auicen. pin-
guibus vinum, dum inquit, Ipsum sanat
sumptum in potu calefactum in ieiuno. Pre-
terea Auicen. non semper laudat vinum, ut
Galen. maxime, si adsit ventris solutio, quod di-
cat, Oportet ut omne vinum tunc deuitent, &c.

Responsio.

Dicimus vinum tantum conferre post
pingua

nguia, vomitus ratione, sed ad resoluen-
 in humorem viscidum, ieiuno stoma-
 cho vt Auic. In reliquis verò sunt concor-
 dis, si bene considerentur. Paul. lib. 2. ca. 15.
 quoniam igitur à pituita potissimùm a-
 cida constituitur affectus, iis vtendum est,
 quæ hanc incidant repurgentq; vt sunt dul-
 cia, salsa, & alioqui abstergentia calida, &c.
 et. ser. 9. cap. 22. Nullo alio tutiori medi-
 camento expurganda est acida materia,
 quam picro appellato pharmacho, quod
 non tantùm calefacit, sed diffecat, repur-
 gat, extrahitque ex profundo oris vetricu-
 lis, quin & ventri robur addit, ne facilè hu-
 morem nociuum suscipiat: appetitus verò
 qui à fortitudine caloris prouenit, nō hoc
 medicamento, sed iis tantùm indiget, quæ
 eum condensare ac spissiore reddere
 possunt, vt est oleum ex immaturis oliuis
 expressum: abstineant à potu vini & ab o-
 mnibus quæ tam intrinsecus, quàm extrin-
 secus calefacere possunt, &c. Lege Auicen.
 libi, Et similiter cura eius est, quæ accidit
 propter resolutionem plurimam, &c.

Conferentia appetitui canino.

Conferunt canino appetitui omnia pin-
 guia, vinum, diaciminum, diatrion, pipe-
 reon, emplastrum aggregationis. Auic. 3. 5.
 emplastrum purgamenti ferri Haly. 14. antid.

theriaca. Serap. hieralogonion Haly. 7.
tid. hiera picra Gal. &c.

De prognosticis appetitus canini.

Auic. 1. Tra. 2. c. 12. Et scias quod appetitus caninus multoties perducit ad bulimiam & subet & mortem, &c. Gal. 4. de symp. c. 7. Non mirum si affecto ore ventriculi, appetentia consistit, quandoque dolores animi defectio sequatur: nam tum ob extam sentiendi vim, tum ob situs vicinitatem hoc contingere potest, &c. imò ex nervorum aut arteriarum consensu cardialgia, morbi comitialis, gravis sopor & deliria consensiente cerebro eueniunt, &c. Hip. aph. 5. ap. 27. Qui noctu bibere appetunt, iis ad morientibus si superdormierint, bonum, &c. Quia conquieti per somnum subdesce dit id quod sitim efficiebat. Et nota quod qui ex humidi defectu valde sitiunt, iis dandus est potus: nam succurrere defectui, et inquit Gal. medicinale Theo. Vide tamen de siti in lib. de febribus infra, &c.

De bulimo.

Bulimos, est intensus membrorum appetitus cum deiectione appetentiae stomachi, unde venae fiunt vacuae, sed stomachu respuit ac abhorret cibum, &c.

Loci consentientes de bulimo.

Auic. decimatertia, tra. 2. cap. 15. Bulim

us vocatur fames vaccina, & est membrum fames cum satietate stomachi, & venter idem sunt vacuæ, & stomachus cibum spuit, &c. Gal. aph. 2. comment. 21. Passio bulimos appellata est casus potentiae appetitricis à frigiditate exteriori, qui à fame idem inchoavit, sed non habet amplius vim adiunctam, &c.

De causis bulimi.

Causæ primitivæ sunt motus per loca humida & frigida, vel mala ventriculi imperies, vel eius imbecillitas, vel frigiditas virtutem attractoriam & sensibilem mortificans, similiter & inanitio, &c.

Loci consentientes de causis bulimi.

Galenus 4. de symptomat. caus. capite 7. accedit ad hoc bulimos, id est, vehemens fames, quæ fit quum simul penuria, imbecillitate & refrigeratione ventriculus afficitur, &c. Avicennas 13. tra. 2. capite 15. Et multoties accidit iter agentibus in frigore & congelatis, quorum stomachi ex frigore vehementi inspissantur, & causa eius est malitia complexionis, mortificans virtutem sensibilem & attractivam, & fit ex humoribus, &c.

De signis bulimi.

Signa bulimi recitata sunt suprâ capite de appetitu canino, nam communia prope-

modū sunt. De his vide Gal. lib. de fin. med. ibi, Bulimos est ingēs fames, & dispositio, in qua fit cibi inquisitio ex paruis interval-
dis: qui hac detinentur, resoluuntur & con-
cidunt, decolorēsque fiunt, perfrigescunt
iis extrema corporis, & torquetur stoma-
chus, vixque pulsus percipitur, &c.

De cura bulimi.

Quum morbus fiat à frigore exteriori,
curetur cum calidis aromaticis, in quibus
ad sit stypticitas, deglutiantq; panem infu-
sum in vino odorifero cretico, deinde fiat
aliqualis diuersio, ligando extrema ma-
num & pedum. Somnus interdicator, pun-
gantur ac suscitentur, cum vrtica & virgis
paruis suauiter flagellentur, fiantque em-
plastra circa regionem ventriculi ex odo-
riferis ac cordi congruentibus, & si adue-
nerit syncopis, tūc spargatur eorum facies
ex aqua frigida, stringanturque manus ac
pedes, euellanturq; capilli: quum verò syn-
copis desinit, statim cibentur, &c. In causa
calida vrantur frigidis, velut rosa, nym-
phea, viola, coriandro præparato, sandalis,
camphora, fiantque epithemata frigida ex
aqua ros. nenupharis cum sandalis, &c. Ci-
baria sint boni nutrimenti cum omphacio
conditi. Potus sit vinum granatorum cum
iuleb ros. vngatur etiam stomachus cum
oleo

oleo ros. myrthino, &c.

Loci consentientes de cura bulimi.

Auicennas decimatertia tertij, tra. 2. ca.

17. Est cura casus appetitus, & oportet ut odorentur cibi promouentes appetitum, habentes species & fructus odoriferos & aromatica odorabilia, in quibus est stypticitas, ut congregetur virtus, & deglutiant panem infusum in vino odorifero, &c. Vide hunc locum fusiùs, & omnem curam intelliges. Lege etiam Aet. serm. 9. cap. 20. de cura perditionis appetitus, nam ambo hi morbi simul coincidunt, &c. Vide etiam Arcul. & Marc. Cat. &c.

De prognosticis bulimi.

Aet. ser. 9. cap. 6. Afsidui bulimi & exolunt, & in animi deliquia incidunt, quibus agrè auxilium reperitur. B. Nota quòd syncopis ex bulimo, tum ob corporis inanitionem, tum ob oris vètriculi nocumentum, cui cor compatitur, accidere solet: quæ si longo durauerit tempore, plerunque egros ad interitum perducit, &c. Intellige etiam de bulimo quæcunque dicta sunt de prognosticis appetitus canini.

Authores dissentientes circa bulimum.

1 Adferere, idem esse bulimum & appetitum caninum.

2 Adferere, vinum in quolibet appetitu can

canino conferre.

- 3 Adserere, cibaria crassa tantum in bulimo & appetitu canino competere.

Confutatio dissentientium circa bulimum.

Ad primum respondetur, quod definitiones utriusque datæ sunt, quæ manifestantur idem esse. Præterea Gal. aphor. 2. com. 2. sine eos reprehendit dicēs, quod pro generali & vniuersali faciunt specialem & particularem. Præterea bulimos tantum à rigiditate exteriori fieri potest, & non appetitus caninus. Demum bulimos incipit cum fame, sed perseverat sine fame, quod non facit appetitus caninus, &c.

Ad secundum, Gal. eodem in comme. Talem famem vini potio sanat, non autem eam quæ ex longa inedia, vel alui profusio, aut fluxu sanguinis, aut alia aliqua ista euacuatione, &c.

Ad tertium respondetur, quod & si cibaria crassa, eò quod magis sedet appetitum videantur congrua, nihilominus tenuenda sunt, tum quia virtus imbecilla est, tum quia facilius per membra distribuuntur, &c.

De dolore stomachi & eius flatu.

Dolor stomachi est eius quidam tristis sensus à mala intemperie nuda vel material

aut à soluta continuitate proueniens,
 s causæ primitiuae sunt percussio, ca-
 offensio stomachi vel membri consen-
 tis, vt cerebri, nerui intestinorum, vel
 men cibi inordinatum, vel aliarum
 im non naturalium. Causæ anteceden-
 unt nuda intemperies, vel cum mate-
 cri & mordicante, vel à sanguine, pi-
 aut potus aquæ frigidæ, aut flatus ex-
 iens, aut soluta continuitas sicut ab vl-
 bus, vel ab aliquo abscessu. Causæ con-
 unt sunt ipsi humores, vel reliqua dolo-
 stomachi actu efficientia, &c.

*Loci consentientes de causis do-
 loris stomachi.*

uicen. decimatertia tertij, tra. 2. cap. 1.
 Dor stomachi accidit aut propter mali-
 n complexionis absque materia, aut
 materia, & propriè acuta mordicati-
 aut propter solutionem cōtinuitatis ex-
 a ventosa extensiuā, aut mordicatiua
 esta, aut aggregatiua ambarum rerum
 ul, sicuti est in apostematibus calidis,
 Lege eum vlteriùs, & inuenies etiam
 sas, quor dolor accidat ante comestio-
 n, & sedatur quum comeditur, &c. Con-
 in hoc etiam Arcul. 9. Alman. Galen. 6.
 diymptom. caus. cap. 2. Spiritus in ventri-
 spatiis oriri solet, quum humores pi-
 tuitosi

tuitosi ibi contenti, vel cibi ab imbecillo calore in vapores resolvuntur. Nam vobis solutum frigus vaporem non excitat, calor magna ex parte quæ comprehendit vincens plusquam pro vaporis generatione cibum extenuat, nisi fortè suapte natura in flatum transeat. Quare relinquitur quòd à calore imbecilli cibos non omnino conficiente, sed quodammodo dissoluebat, flatus siue spiritus exoriatur, &c. Lege fusiùs Galen. de caus. flatus. 14. meth. cap. 1. ibi, Porro halituosum spiritum in animalis corpore ex succis, &c.

De signis doloris stomachi.

Signa bilis sunt mordicatio, dolor, pruritus, sitis, oris siccitas atque amaritudo. Signa pituitæ sunt, oris falsedo, præsertim si falsa fuerit pituita, inflatio, grauitas, sibilis, aliquando frigiditas: interdum sitis ratione doloris & clamoris, item est vomitus pituitosus, pallor faciei, &c. Signa flatus sunt eructatio, rugitus: rugitus sunt vel strepitus, extensio in hypochondrio, iuuatur per emissionem strepitus, dolor permutatur frequenter. Signa asthenie sunt appetitus destructio, emissa in parte exteriori, præsertim si fuerit cibus os ventriculi: si verò fuerit in fundo, coctio destruitur, nec apparet eius eructio.

ncia, adest febris, &c. Cognoscuntur vlti-
ma ex sanie & reliquis exeuntibus, &c.

*Loci consentientes de signis do-
loris stomachi.*

uic. decimatertia, trac. 2. cap. 2. Et mor-
ditio cum inflatione est significatio ma-
gisi calidæ propter qualitatem acutam,
calidam: si mordicatio non est stabilis,
non renouatur, significat effusionem cho-
leæ ex hepate, &c. Et signa ex ventositate
sunt eructuatio & rugitus & extensio in hy-
pochondriis, &c. De his consule Arcul. fu-
si, Gal. 6. de symp. cau. cap. 2. Cognoscitur
num esse in ventriculo, quoniam si per os
eructitur, facit ructum: si per inferiores par-
tes flatum reddit vel strepentem vel sine stre-
pitu: quod si per neutram partem deferatur,
signum ventriculi efficit ob imbecilli-
tatem non potest spiritum redundantem &
mucosum expellere, &c. lege hoc totum ca-
pitulum: nam ex flatu acuto ac tenui sono, & si-
militer ex bombosis diuinare te docebit,
quod ex parte flatus procedat, & alia ad rem
sufficiant: lege etiam neotericos, &c.

De cura doloris stomachi.

Diuersimodè curabitur dolor, prout cau-
sa efficiens fuerit: nam si nuda ac sola intem-
peries mala sit in causa, tunc sola alteratio-
per contrarium curabitur: si verò materia-
lis

lis intemperies in causa fuerit, tunc cum
 di intentio quinque intentionibus perficitur.
 Prima erit circa regimen sex rebus
 non naturalium, ita ut in contrarium ca
 omnia adhibeantur, ut in calidis frigida
 econuerso. Secunda est doloris mitigatio
 quæ statim in opus dirigenda est, quæ
 machus sit membrum sensitivum, ex cuius
 sione facile totum corpus compatitur. Hæc
 duobus modis perficitur. Primo abscin
 do abforis causam, & hæc fit cum solutiui
 sectione venæ: quod si materia nimis sto
 cho adhæreat, ac fixa & compacta persis
 ita ut aliqua præparatione indigeat, præ
 randa tunc erit prout in altera intentione
 dicetur. Interim alter sedandi modus est
 cum rebus anodinis quæ parari possunt
 fatus, cataplasmata, cerata, olea, &c. For
 fiunt cum floribus camomillæ anethi, me
 loti, & semine lini, fœnugræci, althææ, &c.
 Deinde in casu necessitatis ad opiata co
 currendum: unde in causa frigida dantur
 phyloni rom. 3℥. vsq; ad 3j. cum modico
 no, & in calida tantundem requiei Nic. &c.
 Tertia intentio est humoris peccantis præ
 paratio, unde in causa calida procedimus
 cum syrupo acetoso simpl. vel ozysacch
 ra, syrupo de endiuia, viol. de agresta cum
 aquis endiuia, lupulorum, violarum, &c.

Qu

quæ bilis si aliud fluere, præparanda esset
 in his quæ aliqualem in se stypticitatem
 continent, ut cum syrupo ros. de semine ace-
 ræ, de granatis, de citoniis, cum aquis en-
 diuæ acerosæ, plantaginis & cichorij, &c.
 in causa frigida cū rhodomelle, ozymelle
 simpl. & compos. scilliticôq; syrupo de ab-
 thio, de menta, si fuerit pituita salsa, cū
 r. viol. & ozymelle simplici; cū aquis ca-
 momillæ, endiuæ: si melancholia cū syr.
 fumo terræ, de epithymo aceroso sim-
 pli. syr. viol. & cum aquis fumi terræ, lu-
 borū, boraginis, &c. si sanguis extraha-
 tur per venæ sectionē. Quarta intentio est
 euacuatio, quæ in materia biliosa ita para-
 tur. R. mānæ electæ mast. ʒ xij. electua-
 ri de semine ros. ʒ ij. semē syr. viol. ʒ j. cū
 decocto fructuū & florum cord fiat potus.
 In materia crassa cū cassia diaphinico-
 ne. In melācholia cū cassia & confectione
 nemech: laudatur insuper hiera Gal. simpl.
 lula aleophāginæ, &c. Si in causa fuerit
 stoptas, curato post euacuationē factā cū
 alefacientibus & exiccantibus, præsertim
 materiam fouentē habuerit, unde in hoc
 commendatur cucurbitula cū maxima flam-
 ma applicita. Item fiant foci ex decocto
 mentæ, absinthij, camomillæ, calamenti,
 pullegij, rutæ, cinnamomi, galægæ, calami

Q

arom. & c. vel cū oleo in quo ruta, apiū, cuminum, maratrum bullierint, & c. Quinta intentio est malæ cōplexionis derelictæ remotio, quæ si fuerit calida, frigidis remouebitur: si frigida, cū calidis, quæ parantur per cerata cataplasmata, linimenta, & c.

Loci consentientes de cura doloris stomachi.

Auic. 13. tra. 2. cap. 3. Cura eius qui est ex malitia cōplexionis calide sine materia est in potu sumere lac acetosum, & aquā frigidā, & in cibo pullos, perdices, cucumeres, cucurbitā, portulacam, & c. & sic intelliges de frigida cōplexione, quod per contraria curetur. Quod doloris mitigatio tribus dictis modis fieri possit, lege etiā Auic. 2. primi, doct. 2. sum. 2. ca. de cau. sedādi dolorē. Itē quarta primi, cap. de sedatione doloris. Lege etiā neotericos practicanes Arcul. & Mar. Cat. Mich. Sauona. Razem & Baucium fol. 66. & c. Auic. 13. trac. 2. cap. 3. loquens de præparatione simul & euacuatione humoris dolorem efficientis, inquit, Et quando dolor fuerit ex humore cholerico calido, euacuabis, & administrabis syrupū acetosum cum aceto in quo fuit infusum absinthium, & c. Galen. 14. meth. cap. 7. In curatione omne principium est totū corpus euacuare ea euacuatione quam ferre potest

potest: purgatio sit vel missio sanguinis, vel purgatio tum per ea quæ subter expellunt medicamenta, tum per quæ supra, vt vomitoria, deinde per ea, vt vno verbo me expediam, quæ calefaciunt & exiccant, &c. Galen. 12. metho. cap. 8. De cura flatus ventriculi commendat cucurbitulam maximam cum flamma admotâ, & ita hoc præsidium valere, inquit, vt incantamenti cuiuspiam simile videatur. Et 8. meth. cap. 5. Flatus sanandi sunt, oleum in quo ruta & semina quæ flatus discutiunt fuere introcta, vt sunt apij cumini, marathri, atque alia id genus. Et 14. meth. cap. 7. Est illud, inquit, commune præceptum omnium ferè quos vitiosus succus creat morborum, quod in fine calefacientibus & exiccantibus sit vtendum, &c. Vide Aet. ser. 9. cap. 27. ex Archigene curam, & Auicen. 13. tract. 2. cap. 3. ibi, Et dolore quidem stomachi frigidos & ventosos sedat, &c.

Observatio circa curam doloris stomachi.

Marc. Cat. de mente Auicen. Debemus in primis cum diligentiâ & bona cura procedere, & causam cognoscere, ne si error contingeret, ob id quod stomachus thylum generat, talis error toti corpori communicaretur. &c.

Noceat ac conferentia do-
lori stomachi.

Dolorem & mordicationem induc
blata, bulbus, fructus cedri, dactyli, gu
pini, iuniperus, lac, rapa cruda, scamo
Conferunt dolori & mordicationi, ab
thium, aloës, acetosa, acetum scilliticū,
tonica, calamus aromaticus, corallus,
riandrū fūrfur, galanga, gariophyllū, gal
tiana gariophyllata, granata, acetosa
ctuca, maiorana, menta, mellilotū, nep
nux moschata, ostraca, oua semicocta, a
ganū. puritaria, passulæ, peucedanū, pon
laca, pulegiū, rheubarbarum, rosa, ruta
bus, lac sicomori, siliqua, sisamus, spica,
na alba, scenoanthos. Cōposita sunt alpi
didicō. Auic. tertia quinti, Apozima de
sinthio quarta quinti Auic. Athanasia r
ior Haly. 6. antido. Ceratum hyssopi, fil
grios hyssopi Pauli, stomaticon Mes se
da antid. electuariū de carui. Auic. de a
bra Serap. electuariū indū de baccis lau
gallia muschata, infusio hieræ Mes. oleū
de absinthio, de mēta, de costo, nardinū,
rosaceū, massicinū, myrthinū. de citoni
pilulæ aleophanginæ, massicinæ de hier
cū agarico hieræ simpl. Quadrumeron co
fectio Nic. Rob granatorum de citoni
theodericon magnū Auic. theriaca maie

th

riaca diateffaron triphera magna Nic.
 triphera saracenica Mes. troc. de diarrho-
 ra, de absinthio, de rosis; vnguentū cardu-
 ni Auic. secunda antid. zucharum ros.

De prognosticis doloris stomachi.

Auic. 13. tract. 2. cap. 1. Et quandoque
 moritur subito propter aduentum doloris
 in cor. Secundo, & quandoq; descendit do-
 lor, & facit prouenire colicam. Tertiò por-
 tendit in pręgnantibus pręfocationē ma-
 tris. Quarto, timetur in illo in quo pro-
 longatur dolor stomachi, quòd attrahat
 costema stomachi. Quintò, Hippo. in lib.
 mortis festinæ, Quando apparet cum do-
 re stomachi super pedem dextrū quod-
 dam simile vesicæ. tunc patiens moritur in
 vicesimum septimum diem. Et si habet do-
 rem ventris, & apparet in supercilio eius
 stigium & bothor, similis fabæ, dein-
 fit vlcus, tunc ipse morietur, & huic ac-
 cidit subet, &c.

*Authores dissentientes circa
 dolores stomachi.*

Adferere, succum absinthij magis con-
 ferre stomacho. quàm ipsius herbam.

Adferere, in omnibus maximis dolori-
 bus sectionem venæ semper conuenire.

Ad primum, Auic. 13. tertij, Quoniā suc-
 cus eius est separatus à stypticitate reten-

ta in herba, idcirco non ita conducit stomacho ut ipsa herba, quæ ob partem te ream in se manentem sit magis stypti & confortatiua, &c.

Ad secundum, Auic. quarta primi, Til quoque cauere debes à minutione in hostis doloris, itē cauendū à phlebotomia in corporibus habētibus subtilitatem nimiam oris stomachi, quoniā ex ea in syncope cadūt. Præterea in frigido, crasso ac viscoso humore nō competit, igitur nō semper competit, sicuti etiam in dolore viro prosterne non competit, &c.

De imbecillitate hepatis.

Hepatis imbecillitas est alteratricis facultatis in propriis actionibus impotentia absque alicuiusvisceris malo manifesto, &c.

Loci consentientes de imbecillitate hepatis.

Gal. 8. de compos. med. per loc. cap. 6. a finem, Imbecillitas hepatis est citra manifestum aliquod in viscere malum in propriis actionibus impotentia alteratricis facultatis. B. Intelligendus est hic Galen. de alteratrice facultate, & si ad vnguem eam non expresserit: nam huic attractoria & retentrix & expulsoia tanquam principali seruiunt.

Auic. 14. trac. 2. c. 1. Hepaticus est ille cui

iu

est debilitas absq; re manifesta in operationibus hepatis, &c. Inuenio iuxta Gal. in b. fin. med. iocinorosos appellari, quos feris dolor cū tumore & duritie & corporis colore malo comitatur, & his febris acies superuenit, & lingua arefcit, quæ orino euenire solēt, quū alteratrix facultas suo nō p̄bē fungitur officio: ad ipsam pertinet sanguinem generare, vnde al. 5. de loc. aff. cap. 7. sanguifica specialiter alteratrix dicitur, & ab Auicē. digesta. lege Gal. 6. de sympt. cau. cap. 2.

De causis imbecillitatis hepatis.

Causæ primitiue sunt casus & percussio super hepate, & quæcunq; à rebus non naturalibus prouenire possunt, malè dispositis. Causæ antecedentes sunt vel per se vel per consensum: per se fiunt vel à mala temperie sine materia, vel vt placet Auicē. cum materia abscessum, vel erysipelā, vel œdema generante: per consensum vel à toto, vt in febribus, vel ab aliqua parte quæcunq; sit debilitante fieri solent. Causæ coniunctæ sunt vel ipsa intēperies, vel quid aliud facultatem alteratricē actu imbecillitans, &c.

Loci consentientes de causis imbecillitatis hepatis.

Auic. 14. tract. 2. cap. 1. Et id est aut pro-

pter malitiam cōplexionis singularis sē
 materia, aut cum materia, cuius principi
 est ab hepate, aut à membris aliis, sicut
 fel quando non trahit choleram, aut spl
 quando non trahit melancholiam, aut r
 nes, aut vesica, aut matrix propter vehem
 tiam fluxus sanguinis, & propter vehem
 tiam retentionis menstruorū, &c. Et qu
 doq; nō est propter malitiam complexi
 nis solam, imò propter apostema sangu
 neum, erisypelam vndimiam, aut propt
 vlcus, &c. B. Nota an hoc loco decipiat
 Auic. Nam dictum est à Gal. non solūm i
 descriptione iam dicta, sed etiā 8. de con
 pos. med. per loc cap. 6. quòd hepatica pec
 liariter appellata citra tumorē prater na
 turam contingat, &c. Gal. 6. de sympt. cau.
 cap. 2. Intemperies quæ alteratricis facul
 tatis imbecillitatē parit, si calidior, quā
 oporteat, fuerit, interdū biliosum, inter
 dum melancholicū excrementum efficit:
 frigidior, pituitosum & aquosum excre
 mentum similiter parit. Lege insuper Ga
 le. 5. de loc. aff. cap. vlti. ibi, Omnium facul
 tatum essentia, &c. Item 2. de sympt. cau. &
 Aet. ser. 10. cap. 1. Et Paul. lib. 3. cap. 46. &
 Arcul. 9. almans, &c.

De indicis imbecillitatis hepatis.

Indicia sumuntur à colore corporis, ab
 egest

uestione, à dolore leui, ab intēperie cali-
 frig. sic. & hum. à facultatibus ipsius he-
 patis. Si verò per consensum morbus effi-
 citur, ex mēbri læsione, à quo fit consen-
 sus. A colore cognoscitur, quia si à flaua si-
 pallida bile, aut à pituita fiat, tota cutis
 fit alba siue pallida, siue flaua: ab egestio-
 ne, quia quæ egeruntur, similia carnis lotu
 apparēt. A dolore leui, quia sicut ex ci-
 vō vētriculus premitur, ita ex chylo iecur,
 unde dolor leuis accidit: à cōplexione co-
 gnoscitur ex eo, quòd à suis cōtrariis iuuat
 ur: à facultatibus hepatis, nā si ab altera-
 trice, sanguis diminutè erit cōcoctus, qua-
 lis est sanguis pituitosus, aut superfluè erit
 cōcoctus, qualis est biliosus & adustus. Si
 ab attractoria facultate morbus fieret, tūc
 ex prima cōcoctiōe celebrata, chylus egre-
 ditur, quum ad iecur attrahi nō possit: si à
 retētoria, tūc id egreditur quale intrauit:
 si ab expulsoia, tūc id nō expellitur quod
 est superfluū, sed admixtum sanguini cer-
 nitur: aut cognoscitur ex eo, quòd multæ
 ad ventericulum fluunt humiditates. Sunt
 & harum facultatum alia indicia: nā si san-
 guis corruptus sit, vel ad putredinē decli-
 nis, vel colore varius vel pituitosus, tūc al-
 teratricem cognoscimus esse diminutā: si
 totius corporis adsit macies & imbecilli-

Q 5

tas, tunc attractoriam vim esse imbecillitatis cōiectamur, & sic de reliquis. At si morbus per cōsensum fiat, cognoscitur ex alterius membri læsione: nam si per cōsensum felis fieret, tunc ex colore icterico cognoscitur: si ex consensu stomachi, ex concoctionis malitia, & sic de reliquis, &c.

Loci consentientes de indicij imbecillitatis hepatis.

Auicē. 14. trac. 2. cap. 2. Color est ex rebus quæ significāt secundum plurimū dispositionem hepatis, &c. Et egestio & urinae similes aquæ carnis significāt debilitatem hepatis in generādo sanguinē, &c. Cōplexiones autē significātur ex radicibus prædictis, &c. Lege fusius hunc locū, & indicia à me dicta inuenies. Gale. 5. de loc. aff. cap. 7. Igitur alui quū sedimina aquæ, in qua macerata caro abluta est, similia esse videris, tunc efficacissimū esse affecti iecoris signū nō dubites. Et paulò post facit mentionem de complexionū signis, ibi, Calida intēperies hepatis, &c. Habes tamen rem magis expeditā 8. de compos. med. per loc. cap. 6. ibi, Calida igitur intēperie circa hepar existente, colliquationes fiunt primū humorū, deinde carnis ipsius hepatis, &c. Similiter habes signa facultatū hepatis 5. de loc. aff. cap. 7. ibi, Si attractrix facultas afficitur,

tunc cibus in ventriculo in sacculum transfertur, &c. Vide 8. de consensu. med. per loc. cap. 6. fusius de hac re. Itē Jul. & Act. & Arcul. &c.

De cura imbecillitatis hepatis.

Perficitur hæc cura quatuor mediis. Primo, remouendo causam imbecillitatis. Secundo, roborando hepar. Tertio, remouendo quæ aduenerint symptomata. Quarto, gulando ægrum in sex rebus non naturalibus. Causa si fuerit primitiua, ut potus quæ frigida, remoue eam cum calidis, ut pice cum potu vini, & abstineat se ab aqua, &c. de reliquis causis primitiuis. Si causa antecedens in hepate fuerit intemperies calida, remoueatur frigidis stypticis hepaticis conducantibus, frigida calidis aromaticis perientibus, humida siccis, &c. Si verò fuerit apostema, vlcus, vel aliqua alia soluta continuitas, curabis per ea quæ ad apostemata, vlcera, & solutã continuitatẽ faciunt, ut aliàs dictum est. Si causa sit per consensum ab alio membro, tunc illius membri mala dispositio remouenda est cum euacuatione, reuulsione, ac membri roboratione, ne quid amplius ad hepar, transmittatur, demum hepatis nocumentum iam impressum remoueatur, &c. 2. Robur hepatis fit decem mediis, ut ex Auic. & neotericis elicetur

tur 1. Cum leuiter calefacientibus, vt naturalis eius temperies seruetur, & hoc intelligi potest de his quæ ad penetrandum exhibentur. 2. Cum leui apertione, quæ semper de obstructione hepatis timor sit, & tunc vtimur phyticis & absinthio. 3. Cum maturatione & lenificatione, quæ cum passulis & vino granato conficitur. 4. Cum abstergentibus quæ parantur cum aqua hordeacea & hydromelle. 5. Cum incidentibus, vt cum vino granatorum, quod ad acetum vergit. 6. Cum his quæ moderatam in se stypticitatem habent, vt scenoantho, rosis, absinthio. 7. Cum prohibentibus putredinem, vt cinnamomo, cassia lignea. 8. Cum exiccantibus, vt cum spodio. 9. Cum mundificantibus, vt cum melle & vino subtili. 10. Cum his quæ à proprietate valent, vt spica, lupi hepar, limatiis rheub. passulis. Verum in his memoria interim mandandum, quænam facultas principaliter laesa sit, vt eius robori magis intendas: nam attractoria vis calidis & siccis, sed magis calidis: retentoria frigidis & siccis, sed magis siccis roboratur: alteratrix calidis & humidis, licet magis calidis: expultrix calidis & humidis, licet magis gaudeat humidis. &c. In causa igitur frigida conueniunt absinthium, rheubarbarum, troc. de rheub. diacurcuma, sy. de absin

sinthio, de eupatorio. Item. electuarium.
al. in tex. Auic. descriptum, ibi, ℞. ligni
oes, rosarū, spicæ, nardi, cinnamomi an.
ij. & c. In calida cōueniunt cichoriū, aqua
matiarū, diarrhodon Abbatis, triasanda-
T. de rosis, syr. de endiuia, de cichorea cū
neub. 4. Cibaria nullam crassiem, vel vi-
ositatem participant, carnes sint boni nu-
imenti, vnde conueniunt vitelli ouorum
orbiliū cum cinnamomo & pipere aro-
matizati. Itē passulæ limatiæ, & c. Potus sit
qua hordeacea cū aliquantulo mellis, & c.

*Loc. consentientes de cura imbe-
cillitatis hepatis.*

Auic. 14. T. 2, cap. 3. vt plurimum debili-
as hepatis est propter frigus aliquod, aut
humiditatem aut siccitatem, aut propter
materias malas retētas in ipso, & propter
hoc plurimū curæ eius est cum calefactio-
ne subtili, cū apertione & maturatione &
lenificatione permixta cum stypticitate cō-
fortante & prohibente putrefactionem, &
sit cū medicinis aromaticis, in quibus est
apertio & maturatio, vt crocus. Et quādo-
que indigemus propter retentionē mate-
riæ in ipso phlebotomia & solutione vene-
ris, & c. Gal. 8. de compos. med. per loc. cap.
6. Scopus curatiōis in eiusmodi affectiōi-
bus sit communis quidem iuxta intempe-
rici

riei contrarietatem: peculiarem verò
cuiusque cōtrarium. Verum in his siue
terius applicitis, siue intra adhibitis, se-
per aliquid ex adstringētibz miscere o-
tervt iecoris robur seuetur, &c. Et 2. me.
cap. 16. Si quidem in ventriculo & ioci-
re robur resolui est perniciosissimum,
De cura facultatū hepatis laboratiū hab-
plenē iuxta Auic. loc. cit. ibi, Si debilitas
digestiua prouenit, conforta cum styptis
aromaticis: si à retentiua, adde in confor-
tione de stypticitate & minus de cale-
factione, &c. Lege fusius, & inuenies cata-
à me iam pridem exarata: lege etiā Arc.
in hoc, & Marcum Car. De cibis lege et
ibi Auic. Et conuenientiores cibi sunt,
quibus nō sunt crassitudo & viscolitas, &
lege eum fusius & Arcul. &c.

Observationes in curatione.

Auicē. Medicinæ hepaticæ sint apert-
iue cum leui caliditate, quarum virtus sit
nituiua & absterſiua, nec stypticitate careā-
quum hepar sit membrum latum, &c.

Nocentia & conferentia imbe-

cillitati hepatis.

Nocent hepati aloës, alſa, colocynthi-
da styli, helleborus, euphorbiū, esula, sicu-
lac, mezereon, ozymū, serpētaria, serapini-
scamonium, scebram, triphera ferrugine

Nic

Nic. Conferunt imbecillitati, & eam roborant absinthiū, acorus, aloes boni, amygdalæ amaræ, ammonium, asarum, berberis, camphorus aromaticus, cinnamomum, cortex citri, costum, cuscute, crocus, cichorium, endiuia, eupatorium, phystici, fumus terræ, granata acetosa, lactuca, laudanū, lignum aloes, liquiritia, hepar lupi, macis, mastix, myrobalani, cit. nux musc. origanū, passula, rheubarbarū, rosa, rosmarinus, rubea, spica, spinachia, scenoanthos. Composita sunt citonia condita, conditum de citro, de succo citoniorum, de muscho, diarrhodō, dialacca, diacurcuma, diareos, lætificans Mes. el. de myrtho Mes. de cāphora Auic. empl. diaphinico, diaspermato, gallia sebelien Mes. oleum masticinum, amygdalarum amararum, irinum, costinum, pilulæ aggregatiuæ, de rheub. stomaticæ Auic. de agarico Serap. syr. de endiuia, de cichorea cum rheub. de acetositate, diarrhodon, de fumo terræ, de absinthio, tro. de ligno aloes, de rosis, de aniso, de absinthio, de lacca Haly, de eupatorio, hiera Damasce-ni, tudiarum rosa, &c.

*De prognosticis imbecillita-
ti hepatis.*

Auic. 1. 4. tract. 2. cap. 2. Et multoties perducit ad hydropem & colicam phlegmaticam,

cam; &c. Arcul. Debilitas hepatis notabilis quā inueterata fuerit, aut difficillime, aut fere nunquam emendatur: lege etiam Gal. 8. de compos. med. per loc. &c.

De inflammatione iocinoris.

Inflammatio est calidi sanguinis influxus quæ in hepatis substantia, vel in eius gibbosa vel concaua parte, aut in maseis vel tunicis colligentibus, vel in venis accidere solet: nec inquirendum vtrum in venis mesenterij hoc accidat, quoniā in concaua iecoris parte fuerit inflammatio, etiam in venis mesenterij necessario ei

Loci consentientes de inflammatione hepatis.

Auic. 14. T. 3. cap. 1. Apostematū in partibus hepatis accidentium quædam fiunt in ipso hepate, quædam in lacertis positis super ipsum, & alia sunt quæ accidunt in meseraicis: & eorum quæ fiunt in ipso, quædam accidunt in partibus eius superioribus & ad latus gibbosum, & alia in partibus inferioribus, & ad latus cōcauum, & alia in velaminibus & panniculo & in venis ipsius, &c. Lege Gal 5. de loc. aff. cap. 2. & 13. meth. cap. 14. vbi etiam inquit: Quia cauo iocinoris phlegmone obfesso, pronus etiam venas quæ in mesenterio sunt, vna phlegmone laborare necessē sit. Vi-

etiam

em Gal. in lib. de tum. præter naturam
c. 2. ibi, Inflammatio est calidi, &c.

*De causis inflammatio-
nis hepatis.*

Causæ primitivæ est nimius calor ex im-
modico motu aut ex sole igneque acquisi-
tus, aut acre medicamentum, aut nimius
pus, vel cibus calefaciens, percussio aut
fractio, &c. Causæ antecedentes vel per se
fit in hepate vel per cōsensum fiunt. Per
sunt intemperies calida, malos humores
attrahens, aut intemperies frigida quæ al-
teratricem & expultricem debilitat, unde
tumores fieri possunt: similiter obstructio
per qua humores retinentur, aut dolor ma-
triam ad iecur attrahens, aut iecoris im-
mobilitas. Causæ coniunctæ phlegmonis
sanguis copiosior, quàm pars postulet,
in ipso hepate contentus, &c.

*Loci consentientes de causis inflam-
mationis hepatis.*

Galen. 1. 3. meth. cap. 6. Istius caloris cau-
sa aut est immodicus motus, aut ex sole &
igne tepor, aut acre medicamentum, &c.
Alic. 14. tra. 3. cap. 1. etiam de aliis primiti-
vis causis loquitur, ibi, Et cibi quidem ca-
lefacientes & crassi, & qui non digeruntur
valde adiuvant ad faciendum apostemata
in hepate, & quandoq; accidit propter per-

R

cussionem & torsionē, &c. De causis etiā
 antecedentibus hic, verba facit ibi, Cau-
 illius sunt complexio frigida prohibēs
 gessionē & expulsionem, aut debilitas st-
 machi, aut oppilatio congregans hum-
 res, &c. lege eum fusius. Gal. 13. meth. ca.
 Communis omnium phlegmonum gen-
 ratio ex sanguinis influxu est copiosiori
 quā pars postulet. Causa verò quur influ-
 sanguis, tum à partibus mittentibus, tum
 ab his quę ad se attrahūt, peruenire pote-
 mittunt enim partes. quum nimium cop-
 superuacua est, aut quū à sua qualitate re-
 lestantur: quę verò attrahunt, ea ob morb-
 sum calorem attrahunt, vel ob sui, vel vi-
 næ partis dolorem, aut ob partis recipiē-
 imbecillitatem, vt testatur Gal. 23. meth.
 cap. 5. Lege etiā de his Gal. 13. meth. cap.
 6. ibi, Dolor prouenit, vel ob intemperie
 & vultus confusionem, & distorsionem
 tensionem, vel obstructionem quandā, &c.
 Lege etiā 14. meth. cap. 1. ibi, Inflamma-
 tio fieri solet, quum sanguis copiosus in
 aliquam particulam procubuit, &c. Leg-
 de his vberius Arcul. 9 almans, &c.

*De indicis inflammationis
 hepatis.*

Indicia hepatis inflammati sunt dolo-
 inseparabilis in dextro hypochondrio, gra-
 uitas

as in eo maior quàm in oppilatione, for
 corporis mutatur: apparet enim in fa-
 & in aliis membris tumor siue infla-
 color tendit ad citrinum vel pallidum,
 illa adest pulsatio, vt in cæteris inflam-
 mationibus, costæ nothæ vt plurimum do-
 nt, exigua & sicca tussicula adest, singul-
 s quoque sequuntur, dormire non valēt
 per latus dextrū, & super sinistrum dor-
 ire graue est, febris adest acuta. Signa
 iando adest, in gibba parte sunt grauitas
 maior, quàm in concaua, singultus minor,
 nsio apud suspensoria manifestior fit ta-
 ui, præcipuè indebili, tussis sicca, difficul-
 is anhelitus maior, ob cōsensum diaphra-
 matis, vrina pauca cū mordicatione, lin-
 ua est citrina, ad nigredinem decliuis. Si-
 na quando fuerit in concaua, singultus
 maior, grauitas minor, eò quòd à stoma-
 cho sustentatur, tussis parua, & anhelitus
 aruus, dolor vehementior, nausea, appeti-
 us destructio, sitis vehemens, vomitus bi-
 iosus, frigus extremitatū, & nigredo lin-
 guæ & syncopis, &c.

*Loci consentientes de signis inflam-
 mationis hepatis.*

Gale. 5. de loc. aff. cap. 7. Iecur affici de-
 clarant in dextra præcordiorum parte gra-
 uitas, dolor tota præcordia contrahens, &

R 2

ipsius vsque ad iugulum extensio, exig
 tussis, linguæ color in primus ruber,
 inde niger, ingens ciborum fastidium, si
 inexhausta, vomitus tū synceræ bilis, tū
 quæ ouorum vitellis similatur, quæ post
 æruginis colorem refert. aluus adstringi
 tur, si inflammatio cum eius visceris in
 cillitate excitetur, spiritus adest diffici
 tas, febris acuta, &c. Et paulò post, Infla
 mationes in simis iecoris partibus fati
 dium, nauseam, vomitū biliosum, sitim i
 gentē, tussim atq; dolorē vsque ad dexte
 partis iugulum excitant, nōnunquā vtri
 parti dolor adest, nothæ costæ cōsentiūt.
 gibba verò parte inflāmatione existent
 præter dicta, tumoris cumulus cōprehēsi
 conspicuus in superficie tactui, maximè
 abdomen gracilescat, cōprehenditur, dolo
 res circa respirationē, & tussiculæ mag
 intendūtur cū dolore ad iugulū extenso,
 detrahi videatur magis quàm intima par
 te. Si verò in rectis musculis inflāmatio a
 cidat, tumor erit præter naturā oblongus
 atq; per totū ventrē extēsus, vmbilicū con
 prehēdē, &c. Lege de his Auic. 14. tract. 3
 cap. 2. ibi, Signa cōmunia sunt, quòd inue
 nit æger grauitatem sub hypochondrii
 inseparabilem, & inuenit illic dolorem ve
 hementem, &c. Lege similiter Arcul. 9. al
 mans.

ans. Item Gal. 2. de lo. aff. cap. 9. ibi, Si in-
gnita nobis fuerit inflammatio, iubendū
tagro, vt magnā edat respirationē, &c.
ide etiam de hac re Paul. lib. 3. cap. 46. &
et. ser. 10. ca. 3. & Gal. 2. de loc. aff. ca. 8.

De cura inflammationis hepatis.

In curatione hac tota adhibenda est di-
gentia, ne hepatis læsio per totum cor-
is dispergatur. Erunt igitur intentiones
irationis sex, prima erit reuulsio. 2. reper-
ulsio. 3. humoris præparatio. 4. euacua-
o. 5. resolutio. 6. malæ complexionis de-
elictæ remotio, cum regimine sex rerum
on naturalium. Reuulsio fiet cum sectio-
e venæ basilicæ, aut cephalicæ, quæ an fiē-
a sit ex opposito, an ex eodem latere, du-
itat Conciliator differentia 198. quæ fu-
us videbis. Diuertimus etiam cū frictio-
ibus, ligaturis, cucurbitulis circa partes
xtremas positis, & similibus. Repercus-
io fiet tum per exteriora, tum per inte-
iora. Conueniunt extrinsecus epithema-
a & inunctiones ex oleo ros. de citoniis,
vel ex aquis rosarum, solatri cum syndone
madefacta & hepati applicita, quibus ad-
di possunt pulueres ex sandalis rub. & al.
& cit. ex rosis, cortibus & floribus gra-
natorum, & aliquid camphoræ: sed in

R 3

materia frigida accipimus aliquid ab
thij masticis cum oleo ros. masticino, &
Intrinscus valent syr. ros. de succo acet.
se. plantaginis, cichorij, cap. sine aquis,
causa frigida: rhodomel, syr. de duab
rad. oxymel cum syr. ros. Et hæc faciu
etiam pro tertia intentione, vno tam
animaduerso, quòd styptica tantū in pri
cipio, sed cū materia iam fluxa est, al
non stypticis vti possumus, vt syr. acet.
simp. viol. de endiuia, de fumo terræ, &
Euacuatio fiat rursus peccante sanguin
cum sectione venæ hepaticæ, aut peccan
cholera cum rheubarbari infusione, a
cum aliis pharmacis, prout millies dictu
est. Resolutio fit cum his quæ resoluunt
addendo aliquid quod nonnihil styptici
tis secum afferat: & huc spectant inuncti
nes, cataplasmata, & epithemata cū aneth
melliloto, althæa, camomilla, rosis, al
finchio: similiter cū oleo anethino, came
millino, ros. & c. Si verò ad suppurationem
verteretur, tunc suppurantibus vtendum
qualis est decoctio passullarū, caricarum
althææ, maluarum semen lini, fœnugra
ci, cum oleo amygdalarū dul. cum pingue
dine gallinæ, anatis, butyro, ex quibus pa
ramus cataplasmata, & c. Maturata in
flammatione tūc vomica, vomitu, tussis &
steru

Innutamentis, & similibus prouocanda
 deinde abstergenda, si in gibba fuerit
 te, cum urinam prouocantibus & ab-
 gentibus, qualis est aqua hordei, cice-
 m rub. hydromel, hydrosaccharum, &c.
 In concaua, cum his quæ per secessum
 eunt, qualis est cassia, serum caprinum,
 marindi, &c. deinde consolidandum
 ut, siue conglutinandum cum bolo ar-
 enio & terra sigillata, &c. Quod si ab-
 cessus ad duritiem permutetur, quanuis
 rō curationem admittat, nihilominus
 in emolliētibus procedemus, sicuti cum
 thæa, maluis, &c.

*Loci consentientes de cura inflam-
 mationis hepatis.*

Gal. 13. meth. ca. 6. Communis omnium
 ilegmonum curationis indicatio est e-
 uacuatio: quæ verò adhuc in generatione
 in in iis prior euacuatione est influentis
 in affectum locum sanguinis inhibito,
 &c. Et cap. 11. eiusdem lib. Quum iecur in-
 ammationem patitur, tum reuellendus,
 tum educendus, qui ad iecur fluit, sanguis
 est, interna in dextro cubito infecta vena,
 propterea quod è directo & ampla via cum
 ena, quæ caua dicitur, societatem habet,
 qua non apparente media secanda est:
 quod si ea nec se ostenderit, reliqua ac ter-

ria incidenda est, &c. Ex quibus notare
bes, quòd stante virtutis robore mor
xar' 3620, id est, è directo extrahatur sa
guis: & si alia atque alia vena secetur, n
multum referre, quum singulæ venæ si
in euacuatione respondeant. Auic. 14. tra
3. cap. 12. Phlebotoma igitur in primis,
non hæutes in hoc, quum nō est prohib
tio fortis, & extrahe sanguinem abunda
tem Et scias quòd indiges in initio ei
eo quod est si nile in casu de percussio
& infrigidatione, &c. Gal. 13. meth. cap. 1
In iecinoris phlegmone, etiam si nihil a
fluat, reprimētibus vtendum: & reddit b
nam rationem: primò quia in principio
rum est quod affluit, tum magna ex par
non crassum, tum recipientis partis virtu
valentior: secundò, quia nondum in affl
cta parte violenter impactum est. Quu
verò phlegmone in suo vigore consistit, c
trario modo omnia se habent: adest eni
multitudo sanguinis crassi ac impacti, ti
virtus partis debilior, vt à se superuacuo
emolliri non possit. De digestionem legi
Auic. ibi, Medicinæ conuenientes aposte
m tribus hepatis in initio rei, quū illic est
caliditas superflua, sunt, aqua endiuia &
aqua solatri cum syr. acetoso, zucharino, &
aqua hordei, arnoglossæ, cuscutæ, cucume
ris,

cucurbitę, &c. De euacuatione loquitur
 l. 13. meth. cap. 15. ibi, Considerandū an
 gibba vel in caua parte fiat inflamma-
 tiō: si caua parte, purgare per aluum cōue-
 niens: si in gibba, per vrinas. Lege etiam 14.
 aut huius, ibi, Expelli ē iecinore oportet
 quicquid in totū atræ bilis, tum saniei ex
 phlegmone prouenientis iam collectū est,
 &c. De regimine resolutionis loquitur
 ā Auicē. ibi, Quapropter indiges ut in-
 tēas ā regimine resolutionis materiei in
 te egritudine: plusquā sit tua inceptio in
 aliquis apostematibus, timero lapideitatē
 duritiem, &c. De cibo & potu habes plu-
 ex Gal. 13. meth. ca. 14. ibi, Poscit ergo tū
 tur ipsum, tum os meatus, qui bilē trans-
 mittit, cibos & pharmaca quæ obstructa
 cludant, qualia sunt nō lenta, sed quæ te-
 ni consistētia sine qualitate mordente
 nam ā mordentibus phlegmones irritā-
 (r) non dulcia, quia ā dulcibus tum iecur
 am lien intumescunt. Talia igitur erunt,
 in cibis prāsana, & in pharmacis oxymel
 um aqua mixtum, punica mala, & quæ-
 unque astringunt, interdiciuntur, quum
 ilis reatus os arctēt, & bilem ipsam ex-
 erni prohibeant, & phlegmonas ipsas quæ
 in cauo sunt visceris irritent, magis quā
 in gibbo: nam quum ad gibbū perueniūt,

R 5

iam quæ assumuntur, mutata sunt, ut
nec adstringant vel mordeant, &c. Auic.
sine ca. Cibus autē melior est chisch. h.
dei, in frigidat enim & abstergit, & nō
cit acquirere oppilationes, & festinat
penetratio: panis non ex frumento, sed
simila, & ex oleribus, lactuca & attri-
ces, ex fructibus granata dulcia, &c.

Obiectio.

Miror mirum in modum, mala puni
dulcia hic ab Auic. cōcedi, tū quia adstri-
gunt, tum quia ex dulcibus hepar intum-
scit, & aquā hordeaceam hic concedi, &
altero sequēti textu renui, ibi, Et aqua h.
dei quanuis abstergat sine mordicatione
tamen est dulcis, & dulce facit incur-
re oppilationes, &c. tamen à Raze, Serapi-
ne & Haliabbate commendatur, &c.

Responsio.

Gentilis putat Auic. tex. corruptum,
loco aquæ hordei, legi debere aquæ me-
lis. Vide tu commentatores Auic. & inte-
liges causam alterius obiectionis.

*Observationes in cura inflam-
mationis hepatis.*

Marcus Cat. de mēte Auic. Statim, inq.
succurrendū est huic ægritudini, nō tantū
in iecore, sed in quocunq; membro princ-
pali, alioqui cura esset vana, &c. Galen. 13
meth

h. cap. 8. Prohibendū ne tumor augeatur nec suppuretur, cauendo etiā ne ad scirrhum cōuertatur: nam facilè tumor in duritiē euadit, &c. Auic. 14. tra. 3. cap. 12. Nulli mediis succurrendum, ni prius facta sectio venæ, aut antequam pharmacū cōueniente sectione sit exhibitū. Nā, si phlebotomas, & dimittis materiam in hepate, & administras styptica & crustica, procul dubio induratur apoplectica. Caue tamen in exhibendo pharmacū nimium soluētibus vtaris, nā hepar tra quod imbecille reddunt humores, eadem commouent, vt interdum maiori copia ad locū læsum refluant, &c. Vitandum super ne urinā prouoces morbo in cōcapite existente, aut soluas ventrem, si in ipsa parte tumor fuerit, &c. Ga. 3. meth. 12. Quæcunq; iecinori intrinsecus vel extrinsecus applicantur, non sint actu frigida: nam ultra q̃ ad locum difficulter penetrarēt, meatus etiā cutis occluderēt, &c.

Obseruationes de repellentibus

& resoluentibus.

Auic. loc. cit. Repellentia sint in stypticitate remissa, & nisi tumoris augeatur calitas, cum aperientibus & incidentibus misceantur: resoluentia citius in iecoris inflammationibus sunt applicanda, quā

in

in ceterorum membrorum tumoribus,

Conferuntia inflammationi hepatis.

Conferunt inflammationi hepatis a
sta attriplex, berberis, camphora, capis
Ven. acetositas citri, cucurbita, endiuia,
choreū, hepatica, lupuli, mercurialis, ny-
phea, portulaca, rheubarbarū, rosa, sanda-
semperuiua, solatrum, spodium, sumacha
marindi, violæ. Composita sunt, confectio
de acetosis Mes. electuariū de psyllo M.
ceratum de sandalis, emplastrum de fi-
mento Mes. de semperuiua Haly, oleu-
irinum rosaceum, syr. acetosus de pon-
de portulaca, triasandali Nic. triphora p-
fica, troc. de sandalis Mes. de spodio, de
phora, vnguen. ros. viol. hiera, siraco
Mes. papauer. cum oleo rosaceo, &c.

*De prognosticis inflamma-
tionis hepatis.*

Auic. 14. tra. 3. cap. 1. Et apostema quod
est in gibbositate est deterius eo quod
in concauitate. Et apostema hepatis siue
lidū siue frigidum oppilationem facit,
non relinquit corpori nisi sanguinē aquo-
sum, & cum hoc debilitat hepar in separa-
do aquositatem. quæ si in meseraicis co-
tinetur, est causa hydropisis carnosæ
ascitis. Item quando permutatur calidum
ex hepate ad splenem, est bonum: si ver-

e

plene ad hepar, malum. Et cap. 2. Inter-
 du omnis species apostematum hepatis
 elucit ad hydropem: & scias quòd quū
 apostemati hepatis associatur ventris solu-
 tiest mortale. Et cap. 16. Non euadit ali-
 qu ex apostemate duro quiescente & con-
 nato. Hippoc. aph. 7. aph. 46. Quorum
 har suppuratur, aduritur, si pus purum
 album fluxerit, euadunt: nam in tunica
 ipus continetur: si verò qualis amurca
 sit, pereunt. B. Quia si pus album & pu-
 rum fluat, signum est, quòd ad carnem he-
 patis vsque corruptio non pertingit, sed
 tantum in eius tunica fuisse: si verò ut fæx
 fluat, tunc declarat substantiam hepa-
 tis esse corruptam, idcirco non ab re mo-
 dentur, &c. Hippoc. aphor. 7. aphor. 17. In
 hepatis inflammationibus singultus ma-
 gis. B. Quia ex magnitudine inflamma-
 tionis stomachus cōpatitur, vnde fit singul-
 tus. Hippoc. apor. 6. apor. 18. Vesica discissa
 in cerebro aut corde, aut septo transuer-
 so aut aliquo ex tenuioribus intestinis, aut
 in ore lethale est, &c.

*Authores dissentientes circa
 morbos hepatis.*

- 1 Adserere, aquam hordeaceam non con-
 venire in inflammationibus hepatis.
- 2 Adserere, profluuium ventris in aposte-
 mate

mathe hepatis ex abundanti mater
non esse mortale.

3 Adserere, nutrimentum viscosum ne
nocere hepati.

4 Adserere, hepati supercalefacto ceru
sam tanquã frigidam esse applicandan

5 Adserere, stypticiora magis conueni
in hepatis apostematibus quã stomach

6 Adserere, in apostemate hepatis phl
botomiam potius in pede, quã in br
chio fiendam.

*Confutatio dissentientium circa
morbos hepatis.*

Ad primũ, aqua hordei nõ solũ ab Au
cen. sed à serapio 4. tra. ca. 2. & à Rhaze i
lib. diuis. & à Gal. 13. meth. vt suprã. Max
mè igitur dum commendatur conuenit.

Ad secundum, Auic. Quum hepatis apc
stemati sociatur fluxus ventris, est morta
le: & intellexit propter materiæ exuber
tionem. Similiter factus ab imbecillitat
hepatis est mortalis, vt volunt Auic. com
mentatores.

Ad tertium, Serapio, Indiget hepar cibi
& potibus, & medicinis apertiuis, non vi
scosis, sed subtilibus, non mordicatiuis ne
que dulcibus, neque stypticis & ponticis
cò quòd oppilant, &c. igitur, &c.

Ad quartum respondet Conciliator dif
feret

tentia 197. quòd per se cerusa nocet hep-
ti, quanuis cum aliis quæ suam virtutem
troferant, possit interdū iuuare, sed me-
is esse cum aliis aromaticis operari, &c.
Ad quintum respondetur per ea quæ di-
a sunt in cura. Nam Auic. 13. tra. 4. cap. 1.
uoniã ex magis stypticis grande nocu-
entum resultat, eò quòd hepar velocius
iã stomachus correspondet duritie, quã
ducunt styptica, &c. & sic non conferunt
magis hepatis quàm stomacho, &c.

Ad sextum, Auic. alleg. cap. inquit, Phle-
botoma, si tibi possibile est, ex basilica: & si
non, ex nigra: & si non, ex cephalica: eò
quòd directius hepar respiciunt. Et hoc
iam habes ex Galeno in cura: igitur ma-
gis in brachio, quàm in pede.

De morbo regio.

Icteria dicta est ab ictero auz, quã nos
galbulam siue ficedulam dicimus, de qua
cit mentionem Marcialis, dicens:

Galbula decipitur calamis, & retibus ales

Turget adhuc viridi cum rudis vva mero.

Dicta est etiã Aurigo à colore auri vel ar-
iatus morbus, à cœlestis arcus colore, aut
morbus regius, eò quòd morbo affectos appa-
itu regio & ludis lasciuus uti perutile est.
Ioratus.

ut mala quem scabies aut morbus regius
urget.

vrget. Est autem morbus regius per totum corpus bilis suffusio, quæ interdum nigræ interdum flaua est, ex qua color citrinus vel niger apparet, &c.

Loci consentientes de morbo regio.

Plin. Ictericis auis à colore vocatur, quæ si spectetur ab icterico, sanari id malum tradunt, & auem mori. De deductione locorum nominum lege fufius Cornel. Cel. Aet. ser. 10. ca. 17. & neotericos omnes. Galen. lib. finit. med. Aurigo seu morbus regius arcuatusque est bilis refusio in cutem quo fit ut superficies tingatur, lutea quoque fiat, & vitietur cutis, &c. Auicenna. decima quinta tertij cap. 3. Ictericitia est coloris corporis fixa alteratio ad citrinitatem vel nigredinem tendens, ob cursum humoris citrini & nigri ad cutem sine putrefactione, &c. B. Similis definitio legitur etiam penes Concil. diff. 78. adiungit tamen Auicenna. sine putrefactione: quia re verum dum bilis putresceret, non icteritiam tantum, sed febrem tertianam producere. Vide Aet. ser. 10. cap. 17. & Paul. lib. cap. 50.

De causis morbi regij.

Causæ si extrinsecæ fuerint, tres erunt, scilicet, virus alicuius animalis, assumptio ciborum icteritiâ efficientiû, vel bilis generatio
&c

obstruentium, & nimius labor in sole
cidero. Intrinsece vel fiunt ab hepate vel ab
aliis membris. Si ab hepate, vel erit mala
temperies calida vel frigida cū abscessu
sine abscessu, aut obstructio, aut facul-
tatis attractoriae vel secernentis imbecil-
las. Si à splene, tunc in causa est apostema,
vel obstructio, vel mala cōplexio, vel eius
cultatis imbecillitas, & sic de aliis mem-
bris intelligito. Interdum fit per morbo-
rum iudicationes, &c.

*Loci consentientes de causis
morbi regij.*

Galen. 5. de loc. affec. cap. vlt. Morbus re-
nus nonnunquam fieri solet iecinore ne-
quaquam affecto per morbi iudicationem.
Interdum citra morbi iudicationem, dum
linguis extranea quadam corruptione in-
ilem vertitur, qualis ferarum morsu fieri
solet, aut assumpto veneno. Interdum fit ab
obstructione, aut ab inflammatione, aut à
cirrho iecinoris, aut citra hæc ab ipsa tan-
tā iecinoris intemperie præter naturam
mutata, aut à iecinore suo munere nō fun-
gente, aut ob splenis vitia. Interdum ab
attractricis folliculi fel continentis im-
becillitate, aut quia folliculus est obstru-
ctus, aut quia eius facultas secretoria est
imbecillior. Interdum fit etiam ob obstru-

S

Etis aut infirmis vasis, quæ ac ipso exora sua in hepar extendunt, &c. Auicen. cap. 3. ibi, Icteria citrina aut fit multitudine generationis cholere citrine, aut propter euacuationis eius prohibitionem, multitudo eius generatur ab hepate propter causas calefacientes, aut propter apstemata in hepate, & in meatu cholera, aut propter oppilationem retinentem cholera in felle, aut propter caliditatem complexionis cholera, &c. Lege fusius, & tam intrinsecas, quam extrinsecas causas icteritiae intelliges. Vide & Gordoniũ & Arcul. in proprio cap. Gale. 4. Aphor. com. 62. Tres sunt affectus, quibus morbus regius solet adnasci, tumor durus, inflammatio & obstructio. B. Nam dum sanguis expurgatur, bilis à venis ad meatus bilem recipientem transfertur, si trium alterum adfuerit, necesse est sanguinem non expurgari, sed cum ipso bilem per totum corpus diffunditur, unde morbus regius oritur. Vide Paul. li. 3. cap. 50. & Auic. de oppilationibus hepatis, ibi, Materia quæ generat oppilationem aut est humor oppilans propter suam crassitiam, &c. Lege eum fusius, &c.

De signis morbi regij.

Signa cõmunia sunt, pigrities & tumor ad motum grauans, dulcis cibos aduersantur

itur, variis imaginibus vexatur, pruritus
ius corporis adest, difficulter exudant,
oculorum, & faciei tempora, & malæ
lorē demonstrant, &c. Signa malæ hepa-
tēperaturæ per ea quæ de imbecillitate
patis diximus satis nota erunt. similiter
abscessus signa per ea quæ retulimus de
flammatione hepatis, &c. Signa oppila-
onis sunt grauitas, dolorque sub dextra
arte nullo tumore vel vrgente, febre per-
pta: item si egestio flaua non egrediatur,
d alba. Signa imbecillitatis expulsoriæ
cultatis sunt, si vrina nullo colore infecta
cernatur, etiā si nulla grauitas percipia-
r. Cognoscitur etiam ex attractoria fa-
ltate fieri, si nausea, vomitus, amaritudo
ris, nullo apparente in iecore grauitatis
nsu adfuerit, & flauus color paulatim &
subitus fiat. Signa veneni erunt, si nulla
rius existente humorū malitia, sed ex ho-
ine sano statim icterus euadat: nā absque
nora virus per totum corpus diffunditur.
igna sumpta à crisi sunt, si febres præcef-
erunt acutæ, & alia quæ crisin indicare so-
ent. Signa quòd per consensum totius cor-
oris fiat erunt ex febribus, quæ tenues san-
guinis partes in bilem commutant. Signa
quòd fiat à cisti fellis sunt quòd accidit su-
bitò, & egestio est alba, adest amaritudo

oris & sitis, & si porus, qui vadit ad stom-
chum, est oppilatus, tunc vrina est color-
ta, spissa, crocea, egestio tineta crocea, &c.

Signa quòd ex splene fiat, sunt duriti
splenis, grauitas, & icteritia potius nig-
quàm flaua, &c.

*Loci consentientes de signis
morbi regij.*

Aet. ser. 10. ca. 17. Communiter omnib;
ictericis adest pigrities & tumor ad m-
tum grauans, &c. Gal. 5. de loc. aff. c. ult.
per morbi indicium icterus fiat, indicium
erit, quòd excrementa & vrinae secundu-
naturam se habebunt. Si sanguis externi
corruptione in bilem vertatur, indicium
totius corporis prasinus siue porraceus co-
lor. Si ab obstructione folliculi fellis fiat
signum erit quòd citra febrem morbus re-
gius accidit, vrgétque in dextra præcordi-
um parte grauitatis quidam sensus. Si v-
rò ab inflammatione vel alio abscessu, tunc fe-
bris aderit cum biliosis deiectionibus,
in dextra præcordiorum parte dolor. Si a
intemperie hepatis humorum corruptio
contingat, tunc totum corpus herbis cande-
ti pallore infectis assimilatur, interdum
plumbeum aut magis fuscum colorem referet.
Si ob splenis vitium, tunc colores veniunt
multò nigriores quàm ab hepate, &c. Leg.
de h

de compos. med. per loc. cap. 1. B.
 Na tamen quòd velle ex colore tantum
 stum sedem diuinare, est malum, vt Gal.
 tert 5. de loc. aff. ca. cit. de Stefano exem-
 plum afferens, &c. Lege etiam Auic. 15. tra.
 p. de signis icteritiæ citrinæ, Natura o-
 mnia illa nuper à me recitata habet, quæ
 citius videre poteris: si enim omnia in
 unum congererem, longè à negotio res li-
 ber excederet. Vide de his Arcul. & Gord.
 Fil. & cæteros practiçantes. Similiter de
 icteritia nigra lege Gal. 6. de loc. affect. ca.
 de affect. lienis, & Aet. serm. 10. cap. 17. Vide
 etiam Auic. de signis oppilationis hepatis,
 i. Signa oppilationis sunt, &c.

De cura morbi regij.

Morbus regius indicatoriè ex febribus
 pfectè solutis eueniens, visibilis ad cu-
 tum translata, si multum crassa, balneis vel
 ous discussoriis faciliè curabitur, quale
 e balneum ex aqua dulci, vel ablutio ocu-
 lû & totius corporis cum aceto albo ca-
 llo, & succo citri, in quo bullierint flores
 momillæ, &c. Verum si crassa fuerit, in
 nimis extenuantibus vti oportet, deinde
 scussoriis. Si à causis primitiuis fiat auri-
 o, tunc singulæ remoueantur, vt si morsus
 i perarum sit in causa, curetur ad externas
 artes virus deducendo, & membra prin-

cipalia tuendo. Si causæ sint per consensu
à toto, vt in febribus, remoueatur febris
euacuatione, sectione venæ & soluentib:
pharmacis, deinde in frigidantibus, ne si
caliditate sanguis in bilem conuertatur.
verò fuerit caliditas hepatis vel alteri
membri, remoue per in frigidantia, e
uendo obstructionem, & membra demu
roborando.

Cura arcuati ex multitudine bilis qu
tuor habet intentiones: Prima est euacu
tio, ne dum superfluit bilis, ipsa suæ mul
plicationis sit causa, quæ fieri interdū d
bet cum sectione venæ, interdum cū pha
maco, vt cassia, manna, rheubarbaro, el
ectuuario, de suc. ros. ros. Mes. diaprunis fa
&c. Secunda est humoris præparatio, &
cum acetoso simp. syr. de endiuia, viol.
cichorea, de suc. acetosæ, de agresta, de l
monibus, de acetos. citri cū aquis & deco
ctis similibus. Tertia intentio est discrasia
membri derelictæ remotio: vnde in cau
calida conuenit tale epithema: R. aque e
diuiæ lib. i. ros. ℥ ij. sandalorū spodij an
℥ j. aceti ℥ j. spicæ ℥ j. Misce, & cum synde
ne applicetur hepati, vel fiat ceratum san
dalinū. Electuaria sunt triasandali, dia
rhodon, troc. de camphora. Quarta inter
tio erit sex rerum non naturalium ad fr
gidu:

dum & humidum declinantium, de qui-
 bus satis aliàs diximus, &c. Cura iſteritiæ:
 obſtructione quatuor etiã intentiones
 requirit: prima humoris obſtruentis inci-
 piens, extenuatio atque reſeratio, & fit cū ſy-
 rupo biſantino, cum aceto de duabus rad.
 rodomelle, oxymelle, ſyrupo de eupato-
 rio, de cichorea, &c. Cum aquis fœniculi,
 anij, cuſcutæ, & eupatorii. Conſulerem ta-
 men in hoc, vt prius ſtomachus cum caſſia
 & pilulis aleophanginis purgaretur, an-
 quam iſta exhibeantur. Secūda erit eua-
 cuatio, quæ perficitur cum iis quæ bilem
 craſſam & pituitæ admixtam purgant, vt
 ſcilla cum rheubarbaro, agarico, diaphini-
 ſione, diaturbis, & cœnæmate acri, quod ad
 inteſtina ſuperiora pertingeret. Tertia in-
 tentio eſt palliditatis vel fœdi coloris abla-
 tio, & occluſarum viarū apertio, & fit cum
 rebus aperientiſſimis & vrinam prolicienti-
 bus, vt cū decocto anij, fœniculi, aſparagi,
 ruſci, petroſelini, aqua raphani, vel deco-
 cto marrubij, praſij, cicerum, rub abſin-
 thij, centaurij minoris, cuſcutæ, vel cum in-
 fuſione cartami in lacte in ore Auic. vel
 cum dialacca, diacurcuma, diacalamento,
 troc. de rheubarbaro, de eupatorio, &c.
 Quarta intentio ſit circa regimen, quod
 calidum & aperiens & extenuans inſti-

tuatur. Curatur Aurigo, si à facultatu
siue iecoris, siue folliculi fel continen
imbecillitate fiat, prout de hepatis imb
cillitate iam dictum est, &c.

*Loci consentientes de cura
morbi regij.*

Gal. 9. de compos. med. per loc. cap. 1. Ict
rici qui ratione indicationis febrium su
curantur balneis aquarum potabilium,
olei discussorij affricu, omniũque rar
facientium cutē, quale anethinũ oleũ & c
momillum. Qui verò regium morbum e
obturatione incurrūt, per omnia quæcun
que strenuè extergēt, etiam si medicame
tariam substantiam habeant, & calidæ su
facultatis, curantur. Conueniunt icterici
ex inflammatione hepatis quæcunque in
flammationes sanant. Si verò inflammati
& obturatio simul coincidant, laxantibus
simulque extergentibus opus erit: fugiēd
amen quæcunque medicamentarię substan
tiæ & calidæ facultatis existunt, &c. Auic
15. tra. 1. cap. 6. Scias quòd intentio in cura
tione icteritiæ ad duas res tendit, quarum
vna est, vt remoueatur icteritia cū eo quod
resoluit ipsam à cute & ab oculo cum me
dicinis lauatiuis & solutiuis educentibus
materiã facientē icteritiam. Secūda verti
tur ad causam & abscindit eam, & est aut
rectifi

etificatio cōplexionis, aut cōfortatio virtutis, aut regimen apostematis, aut apertio postematis, aut apertio oppilationis, aut iacuatio per phlebotomiam basilicæ, &c, et. serm. 10. cap. 18. Secatur vena quibus copia sanguinis vnâ cū bile in toto corpore abundat, aut quibus dolor vel distensio circa præcordia fuerit. Et de purgatione loquens dixit, Quare in principio purgare nō oportet, priusquā per deoppilantiā bilis attenuetur. Nanq; mali causam purgationes in principio datæ præbuerūt, &c. Gal. 5. de loc. aff. cap. vlt. Quibus morbus regius intra febrē accidit, urgente in dextra præordiorū parte grauitatis cuiusdam sensu, his omnibus obstructions aperiens & cibus & potibus & medicamentis extenuantibus, deinde medicamentum quod bilem lucere possit exhibens, eorū plurimos vna die sanitati restituiimus, &c. Lege de his omnibus intentionibus Arcul. Gordonium, Marcū Catin. & cæteros practicātes. De cibo & potu & de aliis sex rebus nō naturalibus lege Auic. 15. cap. 6. ibi: Et cibus quidem ictericorum. Et cap. 7. ibi, Cibi in omnibus illis sint cibi leues. Vide eū fusius. Vide & alios suprā scriptos authores.

Observationes in cura.

Auic. 15. cap. 6. Omnes qui habent icteri-

§ §

tiam ex causa calida, de uient iram, & m-
tum primum & balneum, &c.

Conferentia morbo regio.

Conferunt iſteritiæ abſinthium cū ap-
vel adiantho, acetofa, acorus, aphodillu
agaricum, aloës, alcacangi, aſſarum, attri-
plex, berbena, betonica, ciclamē, calame-
tum, chamædryſ, chamepityſ, camomill
caſſia, filiqua, centauium, cartamum, cu-
cuma, cuſcutæ, helleborus, endiuia, eup-
toriū, epatica, fœniculū, lactuca aſini, lun-
brici, lupulus, marrhubium, menta, mult-
pedum aſeliuæ, nepita, origanum, pœoni-
perdix, peucedanum, aqua raphani, rheu-
barbarum, roſmarinus, rubea tinctorum
aqua ſaliciſ, ſulphur cum ouo, ſcariola, ſce-
lopendria ſiue citrach, ſtercus aſini, pull-
bibitum, tamarindi, tamarifcus, vrina, vr-
tica, hyſſopus. Compoſita ſunt, confeſtio de
rauedſeni, de eupatorio Meſ. decoctū ſum-
terræ & coltulæ, diarrhodō Nic. electuariū
de pſyllo roſatū Meſ. diaphinicon, oleū de
cartamo, de abſinthio, ſyrupus biſantinus
de fumo terræ, de abſinthio, de cichorea cū
rheubarbaro, oxymel ſcilliticū, ſotira Ni-
colai, theriaca, triaſandali, triphera perſica
Meſ. triphera ſaraceni Nic. tro. de rheub.
de roſis, de eupatorio, de camphora, vinum
ſcilliticum, pilulæ Indæ, de fumo terre, &c.

De

De prognosticis morbi regij.

Hipp. Aphor. 4. Apho. 62. Quibus in febribus morbus regius ante diem septimū acciderit, malum. Et Aph. 64. eiusdem lib. Quibus in febribus morbus regius septimo vel nono, vel vndecimo, vel quartodecimo superuenerit, bonum, nisi dextrū hypochondriū obduruerit: si verò nō, bonum. Morbum regiū in febribus accidere ante septimū, malum ex eo est, quia vel ab inflammatione, vel à duro hepatis tumore, vel ipsa obstructione oriri indicat: post septimū verò, bonum, nisi ex dictis quispiam effectus hepatis acciderit. Vide tamen proph. isto Hipp. 4. de vic. in morbo ac. com. 1. Hipp. Aph. 6. Aph. 42. Morbo regio laborantibus, si fiat hepar durum, malum est. Et Aphor. 5. Qui morbo regio laborant, nō dmodū ventosi sunt. B. Quum nec ventris imbecillitate, nec pituitoso humore, à quo fieri solet ipse flatus, icterici laborāt, de circo flatuosi nō esse possunt. Auic. 15. ca. 1. In omni oppilatione in meatu hepatis ad fel, aut in meatu fellis ad intestina, quæ est ex incarnatione, aut porro, nō speratur sanitas. Et in eo qui habet icteritiam frigidā, qui nō curatur, nec resoluitur eius materia, est timor, & pluribus eorū associatur mors subita. Et quando multiplicatur

rema

remanentia vrinae albae cum icteritia, parum tincta, est deterius, & magis timendum ne cadat habens eam in hydropem ad summam, dum non remouetur apertima, & rectificatur dispositio, non habet spem in curatione ipsius icteritiae, &c.

*Auithores dissentientes circa
morbum regium.*

- 1 Adserere, icteritiam ante septimum parentem, semper esse malum indicium
- 2 Adserere, icteritiam post septimum parentem absque tumore hepatis, esse bonum signum simpliciter.

*Confutatio dissentientium circa
morbum regium.*

Ad primum respondetur, esse verum, nisi icteritia cum alia euacuatione coniungatur, ut puta cum sudore vel ventris fluxu nam tunc est bona. & hoc voluit Galen. in fine commen. 62. 4. aphor.

Ad secundum respondetur, quod icteritia proueniens in 7. 9. & 11. non est iudicanda bona, nisi materiae concoctio praecesserit: & hoc voluit Auicen. ubi de signis icteritiae determinat. Vnde, inquit, si icteritia accadat in 7. aut 9. cum signis laudabilibus, sine hepatis laesione, tunc erit bona: si minus, neutiquam. Igitur non simpliciter bona, &c.

De

De splenis affectibus.

Scias quòd omnia morborum genera hic membro accidere possunt, sicuti imperies calida, frigida, humida, sicca, et nuda, siue cum aliquali materia, quæ est imbecillitas splenis aut mala compositio, aut obstructio, quæ nihil aliud est quàm morbus in viis lienis, prohibens naturalium aut superfluarum humiditatum transitum, quæ per ipsum transire naturaliter consueuerunt: aut solutio continui, quæ est dolor, qui est splenis quædam tristis sensatio, non per carnem ipsam splenis, sed potius per panniculum eam contegentē facta. Hinc etiā abscessus plures enumerantur species, vt dura, mollis, biliosa, sanguinea.

Loci consentientes de splenis affectibus.

Auic. 15. tract. 1. cap. 1. Spleni accidunt omnes species ægritudinum, quæ sunt mala complexio, compositio, sicuti oppilationes, & solutio continuitatis, & similia, & apostemata cum speciebus suis, &c. Galen. 6. de loc. affect. ca. Quum itaq; splen multa habeat accidentia cum hepate communia, illa nulla re differre videntur, nisi quòd quædam magis, quædam verò minus alterutri euenire solet, &c. Lege de aliis Arcul.

De

De causis affectuum lienis.

Causa imbecillitatis splenis est ipsa intemperies calida, frigid. humid. sicca, &c. Causæ obstructionis sunt vel cibi crassi atrabilarij. aut aliquod apostema vel flatu crassi obstruentes. Causa doloris est soluta continuitas siue à mala intemperie, siue à apostemate, siue à flatu crasso facta. Causæ apostematû splenis procatarticae sunt ac crassus, vinum crassum, & cibi atrabilarij. Causæ antecedentes & coniunctæ nonnullæ per se existunt, aliæ per consensum. Per se sunt, vel expultricis imbecillitas, vel attractoriae fortitudo, aut alteratricis debilitas, aut obstructio illius venæ per quam atrabilis ad os stomachi defertur. Materiam verò efficiens apostema vel est sanguis niger, vel alij humores, quanuis raro pituita. Per consensum sunt totius vt in febribus, vel partis vt in hepatis intemperie, aut in vteri menstrua retinentis, &c.

Loci consentientes de causis affectuum lienis.

Quòd intemperies sit causa imbecillitatis, lege Galen. 5. de loc. affect. capit. vlt. ibi, Omnium facultatum essentia, &c. Et. 6. de sympto. cau. capit. 2. Auicenn. 15. tract. 2. capit. 9. Oppilatio quandoque fit ex ventositate, quandoque ex apostemate & ab humoribus

is, secundum quod sciuisti, &c. Gale. 5. de
 compos. med. per loc. capi. 2. Splen à natura
 terrimè indurari solet, sanguine nimi-
 um in venis obturato, & ob crassitiem ne
 excerni, neque discuti facilè potente.
 Auicen. 15. capi. 13. Dolor splenis aut fit pro-
 pter ventositatem & inflationem, aut pro-
 pter apostema magnum, aut propter solu-
 tionem continuitatis, aut propter malitiã
 complexionis, &c. De causis apostematum
 lege fusius Arcul. 9. almanf. Alex. lib. 3. cap.
 6. Oboriuntur in liene nō rarò, vt dictum
 est, inflammationes, quarum vniuscuius-
 que singuli humores possunt existere cau-
 sę vt sanguis, bilis, &c. Similiter Auicen.
 c. cita. vbi inquit: Sed phlegmaticum ac-
 cidit rarò. Lege neotericos omnes præser-
 tim Arcul. & Gord.

De signis affectuum lienis.

Signa temperaturę calidę sunt sitis, in-
 flatio lienis, corruptio attractorię faculta-
 tis. Signa frigidę sunt, casus appetitus, fasti-
 osa satietas, rugitus ac ructus copia, im-
 becillitasque attractorię facultatis. Signa
 calidę sunt durities corporis, imbecillitas,
 crassities sanguinis, & color nigerrimus.
 Signa humidę sunt, corporis mollities, ni-
 gredo ad albedinem decliuis, &c. Signa ob-
 structionis sunt grauitas lateris sinistri, di-
 stentio

stentio & dolor, nec adsunt signa alicuius abscessus. Signa attractoriæ facultatis sunt totius corporis ex sanguine purpureo & grities & obstructio. Signa retentricisfectæ sunt, vomitus sine febre vel alia occasione. Signa inflammationum lienis cognoscimus ex dolore, feruore, distentione, febre, & ex eo quod ad tumidam duritiem quæ scirrhus dicitur, paulò post desinit: & etiam os foetet, gingivæ exeduntur, vlceres in cruribus cicatricem non recipiunt, & inde affecto iecore hydropici fiunt, &c.

Loci consentientes de signis affectuum lienis

Auic. 15. trac. 2. cap. 2. Calidam significant complexionem sitis & inflatio in sinistro, & corruptio virtutis attractivæ. Frigidam significant debilitas attractionis & confusus appetitus, & iteratio fastidiosæ satietatis, &c. lege eum ulterius. De signis obstructionis lege Paul. lib. 3. cap. 49. ibi. At si lienem grauitas & distentio, & etiam dolor exerceat, meatus obstructio ostenditur, &c. De signis facultatum lienis loquitur Galen. 6. de loc. affect. cap. 1. ibi, Si alteratrix facultas imbecillis sit, sanguis ex iecore in uniuersum corpus impurus transmittitur, quod circa color nigrior euadit. Si vomitione vero sanguis melancholicus excernatur, quod per inferiora interdum decedere videtur
inc

ilicium est, quod retentrix facultas im-
 illis sit. At si euacuatione suppressa mœ-
 dia melācholica superueniat, & cibi au-
 isimè concupiscantur, acida maximè exi-
 ente, quæ ad ventriculum transfertur me-
 lcholia, expultricem laborare indicium

De signis apostematum lienis loquitur
 lul. loc. cit. ibi, Inflammationis notæ sunt,
 tuor, dolor, distentio. Et paulò post, In-
 ritiem occallescit, hoc pressis vitio os-
 tet, gingiux exeduntur, &c. B. Quir
 ingiux corrodantur ratio est, quia vapo-
 corruptio ad partes gingiuarum ascen-
 ens eas exedit. Lege de his Auicen. de si-
 nis apostematum splenis, ibi, Communi-
 ant apostemata splenis in grauedine, ma-
 pitudine, &c. Lege etiam Alexā. Tra! lib.
 cap. 25. Item Arcul. & Gord.

De cura affectuum splenis.

Cura complexionis simplicis est altera-
 & regimen contrarium, ita vt causa re-
 moueatur. Si verò fuerit mala intemperies
 lida cum humoribus, tunc tres opus e-
 unt intentiones: prima alteratio siue hu-
 oris digestio, quæ fit cum syrup. acetoso
 mpl. syrup. viol. de endiuia, de fumo ter-
 e, de lupulis cum aquis endiuix, fumi
 rræ, lupulorum, cichorij, &c. Secunda

T

erit euacuatio, quæ fit cum Rheubarbo, manna, cassia, pilulis aureis aggregatis, electuario de suc. ros. &c. Tertia est solutio debilis cum roboratione mentis, ita ut mala intemperies remoueat: sic cum zucchero ros. viol. tria sandalis, diaro done, vel per ea quæ extrinsecus adhibentur, inungendo cum oleo rosaceo, violaceo, &c. Temperies verò frigida curatur cum his quæ humorem pituitosum præstant, quale est oxymel simp. & compos. lithicumque, rhodomel, syrup. de dualis rad. bisantinus, euacuatio cum agarico, leu. Gal. diaphinicone, &c. Remouetur malitia intemperies derelicta cum electuario de musc. dul. de baccis lauri, unguendo extrinsecus cum oleo de spica, de ruta, de caparibus, &c. Cura materiæ ventosæ similiter digeritur, euacuatur ac resoluitur, pro resolutione conueniunt diaciminus diatrion pipereon, theriaca. Extrinsecus soluent, fofus ex anetho, ruta, pulegio, camento, semine aniforum, cimini, foenicul. similiter oleum rutaceum, de caparibus, &c. Cura inflammationum, quatenus ad causam antecedentem attinet, euacuatione & reuulsione indiget: quatenus verò ad causam coniunctam, tunc sicuti in aliis abscessibus in primis repellendum, in morbi incremento re-

lletibus cum aliquali resolutione vten-
 am, in statu & declinatione resoluendum
 si abscessus in suppurationem vertatur,
 tunc suppurationis opus sunt. Euacuatio
 fit in causa antecedente, si humoris co-
 ra cum sanguine abundet, tum à vena com-
 uni, tum ab ea quæ inter annularem & mi-
 mum digitum collocatur, sectio fieri de-
 bet, vel retentis menstruis, vel hæmorrhoi-
 bus à vena in talo pedis. Euacuantur alij
 humores, præparata prius cum coctione eo-
 rum materia, per ea quæ millies dicta sunt.
 Euulsio fiet cum enæmate splen reficien-
 te, aut hæmorrhoidarum & menstruorum
 euocatione, &c. Cura apostematis duri-
 bus similiter requirit intentiones, prima
 præparatio humorum cū syr. de epithymo,
 decocto terræ oxymelle, &c. Secunda, euacua-
 tio, quæ fit cum confectione hamech, cassia,
 crobalanis indis, epithymo, &c. pilulis
 indis, de fumo terræ, de lapide lazuli, &c.
 Tertia est mollificatio & resolutio, quæ per-
 fitur cum vnguentis ceratis, cataplasma-
 tibus, &c. de quibus plura habes iuxta Ar-
 cel. & Gord. Cura facultatum affectarum
 hismet remediis perficitur, si modo quid-
 iam austerum adiungatur, &c. Cura dolo-
 ris est, ut eius causa remoueatur: quæ si fue-
 rit mala intemperies, calid. frigid. per con-

traria remouebis: si flatuosa materia
ram habuisti: si ex inflammatione, cura-
rum cura, & vt ere anodinis, prout ali-
aliis doloribus dictum est Cura obstru-
nis splenis sit perinde ac de icteritia
ctum est, &c.

Loci consentientes de cura affectuum splis.

Galen. 13. meth. capit. 2. Vbi lien pe-
gmone inuadit, in sinistra manu secala
est vena, si quidem quod euacuandum
communis est indicatio. Et 9. de comp.
medic. per loc. capit. 2. Deinde attenuat-
bus opus est pharmacis, citra manifestu
caliditatem, vt ne vehementer incrasset
succus crassus in ipso obturatus. Quò vò
actiones ipsæ conseruentur, ex austeris:
quid his admiscetur, quale etiam adstr-
gentium genus. Ea gratia igitur ama-
valde medicamenta ipsi offerimus, & qu-
dam ex austeris ipsis admiscemus. Et
meth. capit. 16. Quotiens obstructio quæ
in eum incidit, aut phlegmone potissi-
mum ad scirrhum perueniunt, tum ea quæ
obstructiones eximant, tum quæ dissecer-
valentiora exigit. Nam quale medicame-
tum iecori est absinthium, tale est liei
capparidis cortex: & quale est iecori eupat-
rium, tale est spleni scolopendrium, &
Alexand. lib. 3. capit. 23. Calidiori & sic-
lieni

his intemperaturæ contrariis medicamentorum auxiliis, frigorificis & humectantibus subueniendum est: frigidæ verò humidæ calorificis & arefacientibus præiis succurrere expedit, &c. lege eum fusnam ibi plura ad curam faciētia intelles, & demū omne genus eduliorum in orbis splenis congruentium etiam percies. Lege insuper Arcul. Marc. Catin. & Jul. lib. 3. cap. 49. & Auicen. 15. tra. 2. cap. cura splen. Item Aet. & Gord. & omnia ne recitata intelliges.

Observationes in cura splenis.

Galen. 13. meth. cap. 16. Valentiora tantò magis lieni congruunt, quantò crassiori fitur alimentò, &c.

Auicennas 15. tract. 2. cap. 3. Est proxima rationibus hepatis, & indiget vt sint medicinæ fortiores & penetrabiliore: penetrare verò faciunt ea, quæ obseruant virtutem super eos, quousque perficiunt operationes suas, &c.

Observationes de phlebotomia.

Auicennas loco citato, cap. 5. Et phlebotomia plurima apostemat splenem, euacuando subtile, & remanendo crassum: idcirco Razes dixit non multum referre de vena secanda, dummodo vulnus illatum ongè pateat.

Observationes circa localia in cura spleni.

Aui.loc.cit.cap.6. Applicanda in cura ne seruent latus stypticitatis, sed cum cuncta calefactionis vehementis, ne materia ad crassitiam & duritiem festinet: nam ambo viscera ad duritiem opportuna sunt, sed misceantur cum eis medicinae, in quibus sit incisio aliqua cum caliditate aequali. Et capi.7. Et scias quod res calidae valde non sunt multum conuenientes spleni, propterea quod indurant & exiccant, & prohibent a resolutione, &c. Itidem fatetur Paulus & Galen.

Observatio circa medicamenta.

Galen.13.meth.ca.17. Sanè duplex ratio est eius medicamentorum usus, quum patientes superiores positae laborant, per ea quae eduntur & bibuntur, inferiores per id quod fit per clysterem infusum, &c. Paul.lib. cap.49. Cibus competit tenuis, acris, siccus, potio paucissima.

Auicem.15. tract. 2. capitu. 7. Omne lac praeter lac camelarum, est malum spleni. Et in administratione ciborum melius est ut administretur ante eos balneationes longae, deinde assumat incisiva, subtiliatiua, & facientia sitim, & sumat in potu vinum mixtum cum aqua marina & subtili, & regimen per tres dies. Lege Galen.13.meth. cap.

p.17. ibi, Scirrho laborantibus cōuenien-
 a medicamenta, & c. lege etiam Alexand.
 al. lib. 3. cap. 23. nam fusissimè de omni-
 is cibis ibi pertractat, & c.

Nocentia spleni.

Nocent spleni lagana, bouinæ carnes,
 styli, ficus, lac, lentes, vinum dulce, cras-
 m, nouum, aqua cruda, frigida, omnia
 ctuosa, legumina, olera, caseus antiquus
 litus, aues aquaticæ, omnes fructus aquo-
 omne splen, & omnis aër crassus, paludo-
 s, autumnalis, & c.

Conferentia spleni.

Conferunt splenis affectibus frigidis,
 osinthium, acorus, agaricus, apium, am-
 oniacum, agrimonium, assa, aristologia,
 tonica, chamædrys, capparis, caules, cy-
 umen, cyperus, costus, ebulus, hederæ, hel-
 borus, epithimū, lapatium, lapis lazuli,
 pis armenus, lentiscus, liliū, mel, menta,
 ercurialis, nasturtium, nux mosch. oua,
 iganum, passula, pastinaca, peonia, poli-
 ichum, pulegium, prasiū, pulmo vulpis,
 phanus, ruta, radix capparorū, radix ge-
 estæ, saluia, sandaraca, sena, serpillum, ste-
 nas, scolopendrium, spica, squilla, tamari-
 us, vrina hominis, vrtica, hyssopus, iris,
 num extinctionis auri, & c. Composita
 alida sunt diacurcuma, diatriō pipereon,

fyrup. de calamento, de stechade, de althio, de fumo terræ, troc. de absinthio, capparibus, hiera, &c. Frigida sunt si acerum scilliticū, aqua chalybeata, blacorus, cornu cerui vstum, lactuca alba, morus, myrobalani omnes, vitis, viola, &c.

De prognosticis affectuum splenis.

Auicen. 15. tra. 2. cap. 4. Si spleneticus uenit dolorem interiorē, est magis salus, quia in ipso adhuc speratur sensus. 2. Quando accidit fluxus ventris cum sanguine melius, quia speratur cū ipso resolutio materie splenis: si autem perseuerauerit, uenit ei lubricitas hydropica, & morietur. 3. Qui catarrhū habet, nō ei accidit splen. B. Quia humiditatis copia humidā interiem arguit, ex qua rarō atra bilis cingere solet. 4. Qui habet dolorē in splene suo, & currit ex eo sanguis rubeus, & parent in corpore eius vlcera alba non lētia, morietur in die secūdo: & si nō, cadit appetitus. 5. Quandoq; terminātur apostemata splenis fluxu sanguinis nariū, & propriē ex latere sinistro, & apostematibus apud aures difficilis suppurationis & apertionis propter crassitiē materie. 6. Et laudabilior vrina eorum est crassa, sanguinea & vrina in qua est fæx viscosa: quandoque significat sanitatem splenis & destructio

nen

in eius. Vltimò, inquit, apostemata splene
conuerti ad iecur, malum; ecòtrà verò,
bonum. Hippocr. aphor. 6. aphor. 43. Qui-
usq; lienosi difficultate intestinorum ca-
pantur, iis superueniente longa difficul-
tate intestinorum aqua intercutis aut leui-
tate intestinorum aduenit, & moriuntur. Ec-
ce aphor. 6. aphor. 48. Lienosis difficultas in-
testinorum superueniens, bonum. Lege-
re etiam de hac re apho. 22. tertij. lib. ibi, Au-
gustinus verò, &c. lege etiam Arcul.

*Authores dissentientes circa
morbos splenis.*

Adserere, materiam in splene posse edu-
ci conuenienter per vias vrinæ.

Adserere, omne genus lactis in splenis
duritie conferre.

*Confutatio dissentientium circa
morbos splenis.*

Ad primum, impugnat Gal. 13. met. cap.
1. ubi inquit, gibbū hepatis expurgari per
renes, sed lien per intestina: quū per renes
uacuari, nulla lieni vacuando via pateat.

Ad secundum respondetur, quòd lac ex
o, quòd obstructionē inducit, nequaquam
conceditur: verū quum lac camelarum à
proprietate lieni conferat, idcirco lauda-
tur ab Auic. & hanc ob causam non omne
genus lactis conceditur, &c.

De malo habitu.

Malus habitus, quem Græci *καχξία* dicunt, est præuia quædam ad hydropem dispositio, ex mala hepatis concoctione pueniens, &c.

Loci consentientes de malo habitu.

Paul. lib. 3. cap. 47. Principia aquarum cutem subeuntium vocare Græci *καχξία*, Latini malum corporis habitum cōsue- runt. Aet. ser. 10. cap. 19. Quum corporis bitus in aquositatem diffunditur, *καχξία* à Græcis appellatur. Auic. 14. tra. 2. cap. Quum corrumpitur digestio hepatis, communicat super ipsum debilitas, in primis accidit dispositio ad hydropem antecedens, & vocatur cachexia, &c.

De causis mali habitus.

Causæ ipsius cachexiæ sunt longitudo alicuius morbi, durities splenis vel hepatis, consuetarum excretionum prohibitio deprauiata hepatis siue stomachi alteratio quæ si omnino corrumpatur, non amplius cachexiam, sed aliquam hydropis speciem efficiet. Denique quæcunque causæ hydropis esse possunt, dum leues existant, omnino cachexiam inducunt, &c.

Loci consentientes de causis mali habitus.

Aet. ser. 10. cap. 19. Hæc affectio ut plurimum

um ex longo morbo congregatur, aut ex
scere quopiam in scirrhum indurato, ma-
nè hepate, splene, aut à consueta & cohi-
ta excretionem aliqua. Auic. 14. tra. 4. ca. 3.
t à corruptione digestionis, vel ab hepa-
imbecillitate, & quandoque accidit
propter congregationem aquæ in pulmo-
, &c. B. Hancmet sententiam habes ex
so cap. de signis peripneumonix, ibi, Et
tando prolongatur tēpus cum peripneu-
monia, facit incurrere ægrum in inflam-
mationem pedum, &c.

De signis mali habitus.

Primum corpus albicat vel flavescit ob
tius malam intemperiem, concoctiones
opediuntur ob hepatis vel vētriculi im-
cillitatem, remanet tamen ciborum ap-
tētia à frigido elicita, deinde fastidium
defectus animi accidit ob venenosam
materiam ad cor exhalantem, respiratio
ra ob consensum pulmonis vel diaphra-
matis, extrema corporis inflantur, præ-
rtim si anasarcam cachexia præcedat.
rina & sudor paucus ob aquosam humi-
tatem retentam, quæ per consueta loca
expurgari nequit, testiculi inflantur, dum-
modo asciten cachexia præcesserit, vlce-
adsunt incurabilia ob sanguinis sincerī
efectum, &c.

Loci

*Loci consentientes de signis
mali habitus.*

Act. ser. 10. cap. 19. In hac effectione v-
uerfa corporis miscella laxior fit ac em-
lescit, corpúsque totum cum virore albi
ac inualidum est: nam intereundum cru-
vacillant, concoctiones in primis, manes
etiam appetitu, impediuntur, fastidium
cidit, respiratio fit rara ac debilis, quæ n-
tibus ac actionibus cōdensatur. Lege Au-
lo citato, cap. 3. ibi, In primis permu-
tur color corporis & faciei ad albedine
& citrinitatem, & apparet inflatio in p-
pebris, & facie, & extremitatibus manu-
ac pedum, &c. Lege fusiùs, & intelliges c-
tera à me dicta, &c.

De cura mali habitus.

Cura requirit quatuor intentiones. Pr-
ma erit circa regimen, ita vt æger in cib
& potu parcus fit, non comedat ad satiet-
tem, nec nisi celebrata digestionem: sitire a
famescere in hoc casu vtile: fugienda ei
ciborum multiplicitas, aqua interdicatur
nisi alia cogeret necessitas. Cibaria igitur
in hoc casu sint calida, tenuia & exiccan-
tia, præsertim in causa frigida, in calid-
verò econuerso. Secunda est euacuatio: vn-
de si à menstruis vel hæmorrhoidibus sup-
pressis morbus proueniat, vel ab alia ex-
cre-

etione prohibita, fiat sectio venæ: si verò
vitiatis humoribus, tunc purgatio ex
era utilis est, vel ex agarico, pilulis de
eubarb. hieralogodione, electuario, in-
diaphinicone, prout materia exegerit.
ertia intentio est humorum præparatio,
ide si fuerit bilis mixta, conuenit syrup.
santinus de endiuia, cum aquis absin-
thij cichorij: & in materia non valde fri-
da valet syr. de eupatorio acetosus simpl.
in materia crassa ac viscosa oxymel scil-
ticum, syrup. de absinthio, & in materia
melancholica syrup. de epithymo, de hyss-
po, &c. Conueniunt etiam in hac inten-
tione diacurcuma, dialacca, triasandali,
rarrhodon, troc. de ros. de absinthio, &c.
Quarta intentio est diuersio, quæ fieri po-
t est per vomitum, quia extrahit ab hepate
per venas meseraicas, tum quia ex infimo
co materias eradicat, tum quia à stoma-
cho & ab adiacentibus partibus optimè a-
vertit. Clysteres etiam laudantur, eò quòd
stomachi fundo euacuant: tum quia edu-
ctio per vètreem naturalis magis est, quàm
per vomitum, &c.

*Loci consentientes de cura ma-
li habitus.*

Aet. ser. 10. c. 19. Cibi eorum sint simpli-
es, qui facilè concoqui possint, &c. Lege
eum

eum fusiús. Auic. loc. cit. c. 4. Cibus hali-
tium cachexiã sit ex eis, in quibus est a-
uitas & confortatio naturæ, sicut alcubi-
gi, id est, perdices, & sint vina eorum co-
rificata, cum eis quæ sunt garyophylli, a-
namomum, crocū, &c. & ex fructibus, g-
nata dulcia, & de citoniis parum nō noc-
& misceantur cum cibis ea quæ sunt sit
sinapis, porrum, allia, &c. Paul. lib. 3. ca.
Victus sit tenuis, siccus, &c. De euacuatie
loquitur Aet. loco cit. ibi, Si hec affectio
consuetæ excretionis cohibitione cont-
gat, excretionem irritare expedit, aut
nam incidere, si nihil præpediat: si min-
vena incidenda sit, conuenienti purga-
te pharmaco, & maximè ex hiera ope-
ret, &c. Auic. loco cita. Considera an h-
mores sin cholerici, & educantur soluti-
ne ventris cum hiera picra: nam educit si
perfluitates absque humiditatibus inn-
tis, &c. Lege eum fusiús. De humorum præ-
paratione lege Arcul. & neotericos: leg-
etiam Auic. ibi, Et ex eis quæ conferunt
eis valde sunt syrup. de absinthio in iei-
no, mitridatum & diacurcuma, & dialac-
ca, & diaspermato, &c. De vltima intèrio-
ne lege etiam Auic. ibi, Et vtatur vomitu
ante cibum: est enim regimen bonum ei:
in principio rei cū raphano infuso in syr-

etoso, & in fine cum helleboro, &c.

Observatio in regimine.

Auic. 14. tra. 4. capite 4. Oportet quòd gimen eorum sit, superfluitates prohibens, &c.

Observatio in sectione venæ.

Paul. lib. 3. cap. 47. Iis qui copia vitiosorum humorum laborant, vacuatio sanguinis per venam noxia est: purgatio autem hiera permultum utilis. Auic. loco citato, Ante venæ sectionem præcedant quæ sanguinem purificant, qualis est hiera.

Observationes de solutione ventris.

Auic. loco citato, Primum humorum qualitates considerentur & purgentur: quòd nouissimè materia aggregetur, figi eam non permittas, sed reiterata purgatione lues. Secundò, cauendum ne eorum stomachi à solutiuis lædantur, quare cum solventibus aromatica sunt admiscenda. Tercò, sex purgationum modos enumerat. Primus, per ea quæ ventrem solvunt, & obstructiones aperiunt. Secundus, per clystera attenuantia & resoluentia. Tertius, per moderatum exercitium & per paucitatem potus. Quartus, per balnea cum aquis non calidis. Quintus, per vomitum ante cibum. Sextus, per cibos exiccantes, aperientes, & attenuantes cum aromaticis, &c.

Confer

Conferentia male habitui.

Conferunt cachexiæ, spica, cinnamo-
 absinthium, eupatorium, semē vrticæ,
 mæpitys, vrina hominis, helleborus,
 fucus, maiorana, cricius, handacocha. Co-
 festio alcacangi, de rauesdeni, cōditum
 buglossa, diacurcuma, dialacca, diacostm
 Mes. empl. Alex. Mes. omorufia Auic. th.
 doricon magnum Haly, theriaca, diate-
 ron, triphera minor, pilulæ de rheubaie
 alcacangi Mes. troc. de diarrhodon, de-
 sis, de rheubarb. de eupatorio, syr. acetos
 de diarrhodon, de absinthio, de fumo t-
 ræ, de squinanto viatic. 5. & c.

De pragnosticiis mali habitus.

Act. ser. 10. cap. 19. Senes facilè hac al-
 tione capiuntur, maximè que liberante
 pueri verò facilè pereunt ob vitalis rob-
 ris imbecillitatem, aut ex succis ob cu-
 raritatem facilè transpirātibus. Qui in
 gore sunt, rarò incidunt, facilè que inde
 extricant: quum verò malum diutius d-
 rat, in aquam inter cutem transit, & c.

De hydropè.

Hydrops est morbus à materia intra p-
 ritoneum contenta, quæ ab hepatis imbe-
 cillitate provenit factus, ex quo venter in-
 tumescit, & interdum reliqua membra
 Huius tres sunt species: prima *ἀσκίτης*, i
 el

utricularis : secunda est τυμπανίτης, id
 tympania : tertia ὑπόσαρκα καὶ ἀνάσαρκα
 λουκοπλεγματία, id est, pituita alba dici-
 tur. Ascites est morbus in quo venter &
 iura intumescunt, superiores autem par-
 tes gracilescent ac marcescunt. Tympanias
 est morbus in quo plus flatuosi spi-
 ritus inuenitur, & minus humoris, ita ut si
 inter percutiatur, tympani modo crepi-
 tum elidat. Anasarca verò est morbus, quo
 totum corpus albidum redditur, atque hu-
 more circunluitur, ex quo ægris pudenda
 truertuntur, & febres accidunt, &c.

Loci consentientes de hydrepe.

Auic. 14. T. 4. cap. 5. Hydrops est ægri-
 tudo materialis, cuius causa est materia
 uberans frigida & ingrediens mem-
 bra, &c. Aet. ser. 10. cap. 20. Hydropis dif-
 ferentia tres sunt : alius enim ascites ab
 ore dicitur, alius tympanitis à tympa-
 ne, tertius sarcites iuxta carnem, à Græ-
 cis λουκοπλεγματίας nominatus, &c. hoc
 sentit Paul. lib. 3. cap. 48. & Alexand.
 3. cap. 29. ibi, Hic morbus, &c. Gal. lib.
 1. cap. 1. med. Hydrops, quæ anasarca, id est,
 per carnem dicitur, est quum totum cor-
 pus intumuit oedemate atque humore cor-
 pus circunluitur, &c. Ascites, id est, utri-
 cularius est in quo venter & serotum cru-

raque intumescunt, superiores autem
 tes extenuantur, &c. Similiter Tympanum
 est quum in ventre spiritus plus inu-
 tur, humoris minus, & si quis pulsa-
 sonus exauditur, &c. Lege etiam Gale-
 hac re aphor. 4. commen. II.

Obiectio.

Quar tres tantum species facis, quum
 Theodorus lib. 5. quatuor enumeret, sci-
 cer anasarcam, hyposarcam, tympanum
 & ascitem. Præterea Hippocr. 4. de vi
 mor. ac. tex. 3. duas tantum species esse
 clarat, vna quidem hyposarca, altera cu
 inflationibus.

Responsio.

Distinctiones interdum dantur penes
 mina rerum, interdum verò penes causam
 efficientem, interdum penes locum læsum. Er-
 igitur quatuor ratione nominis, vt The-
 dorus: erunt duæ ratione loci: nam aut in
 mibus mēbris cōtinentur, aut tantum
 concavitate ventris, & sic erunt duæ sp-
 cies vt Hippocra. erunt tamen tres, vt di-
 ximus, quia causæ tres sunt, &c.

De causis hydropis.

Causæ efficiētes & primitivæ sunt omni
 causa exterior, nocumētum in digestionem
 primens, & imbecillitatē maiorem quàm
 cachexia inducens: regimen inordinatū
 se

rebus non naturalibus, percussio, casus
 offensio super hepar, &c. Causæ antece-
 dentes sunt mala dispositio hepatis vel
 orū membrorū, quæ prouenit vel à ma-
 intemperie nuda, vel humorali, vel à so-
 la continuitate, vel ab aliquo abscessu
 gessionē impediēte. Causæ per consen-
 tum erunt vel à toto, vt in febribus quæ ca-
 lē hepatis innatū imbecillitant, & dige-
 stionē præpediunt, vel euacuationes super-
 ta calorē innatū extinguentes, sicuti eua-
 cuationes per ventrem, per vomitū, per su-
 rem, per menstrua, per sanguinis fluxū,
 &c. Vel erunt à membris particularibus,
 puta à pulmone, diaphragmate, absces-
 su vel aquam patiēte, vel à stomacho ob
 lam eius intemperiem, vel à splene ob
 is magnitudinē & duritiē, &c. Causa cō-
 iuncta est materia ipsa frigida, mēbra alte-
 ns, & in tumorem attollens cum imbe-
 cilitate hepatis & digestionis eius assi-
 de illam materiam regenerantis, &c. In
 asarca igitur erit materia pituitosa, pe-
 trans cū sanguine per membra. In ascite
 erit materia aquosa citra peritonium con-
 ta. In tympanite est materia ventosa in
 as partes diffusa, &c.

Loci consentientes de causis hydropis.

De causis primitiuis lege neotericos, præ

cipue Arcul. & Sauonarolam, Gordoniu,
 Platearium, & reliquos. De causis ante-
 cedentibus lege Auic. 14. tra. 4. cap. 4. ibi, Ca-
 sa vero antecedentes sunt omnes ægri-
 dines hepatis complexionales, instrum-
 tales, sicut paruitas & oppilationes, & as-
 temata calida, frigida, mollia & dura, &c.
 Lege eum fusius. Gal. 5. de loc. aff. cap. 7. in
 omnibus corporis partibus tum superius
 tum inferioribus, pituitosus sanguis co-
 tineri conspicitur in iis morbis, quos Ge-
 ci anasarcas & leucophlegmatias non-
 nāt: proinde cōsentaneum est, ut ob vis-
 ris refrigerationem cibus iam redditus
 sanguinē transmutari nō possit, &c. Et i-
 uenies per consensum etiam affici. ibi, L-
 borans aqua inter cutem molestari videt-
 vitio existente in liene, vel in ieiuno, v-
 pulmone, vel renibus, aut tenui intestin-
 aut mesenterio, aut vbi sanguis plurim-
 per hæmorrhoidas excernitur, aut ob mi-
 liebre profluuiū, aut quū retinentur men-
 strua, aut aliam ingentem vteri dispositio-
 nem, &c. De causis particularibus loquitur
 Aet. ser. 10. cap. 20. ibi, Ascites fit quū inte-
 pelliculam peritoneum appellatā, & inte-
 stina plurima aquosi humoris collecti
 fiat. Tympanias, quū flatus aëre repleti a
 superflui plurimā collectionem facit, &c.

Sari

scites verò ab aquosa pituita ortum habet, &c. Hoc idem sentit Auicen. 14. tra. 4. p. 4. ibi, Ascitis causa est materia aquosa cula in spatium ventris inferioris, &c. Vide Galenum de causis hydropis 2. de naturali facult. cap. 7. Item 4. aph. comm. 11. i. Quibus tormina, &c. Item 4. de pract. ex pulsibus, capite de meninge affect. Itē prognost. 1. tex. 1. ibi, Cuiusvis aque intercitis genitura est, ubi sanguificationis officiū intercidat, &c. Hippoc. aphor. 7. aphor. 71. A pituita alba aqua intercus succurrit. Vide Gal. in commē. Vide etiam lul. & Alex. lib. 3. cap. 29.

De signis hydropis.

Signa hydropis in genere octo sunt. Primum, est vitiatu color iuxta hepatis inspectionem, ut in frigida albus & liuidus, in calida flauus vel rubeus. Secundum, est inflatio oculorum & pedum, ut in anasarca excipitur tympanias, in quo nullus tumor nisi in ventre cernitur. Tertium, sitis exhausta, quia humor in his locis retentus salus est & putrefactus. Quartum, cibum fastidium, scilicet in calida hydropis: nam in frigida appetitus inualefcit. Quintū, vrinæ paucitas, rubex, praesertim in ascite & anasarca, ubi nulla fit separatio sanguinis & bilis. Sextum, febres mi-

tes ac tepidæ. Septimum, accidunt vlcera
Octauum, nihil cruētum fecerni solet, a
ximè in ascite & tympania, &c.

Signa particularia Ascitis, sunt gra-
tas sensibilis in ventre: & si percutitur, il-
lum sonum emittit, sed aqua à latere au-
tus commota cernitur. Tactus est vtri-
que pleni. Nulla adest membrorum in-
gnitudo, cutis tensio, paucitas vrinae, pul-
sus paruus, frequens, & ad duritiem de-
cliuus. Signa hypofaræ sunt inflatio totius
corporis, velut in defuncto corpore imp-
quantur membra, & propriè facies, & cu-
premitur digito, remanet fouea: nulla a-
est suminis inflatio aut commotio, vt in-
scite & tympanite, fluxus interdum sang-
nolentus, pulsus, vndosus, latus & lenis. Si-
gna tympanitis, egreditur sumè plurim-
exitu, nulla adest grauitas, sed tensio pl-
rima, membra ab ariditatem tendunt,
percussio ventre sentitur sonus vtri-
que non aqua pleni: adest ructationis volun-
tas, ex qua leuius se habet: pulsus vt plu-
rimum velox & frequens, ad duritiem de-
cliuus, nulla adest inflatio pedum, &c. Si-
gna distinguuntia hydropem à prægnant-
sunt, quia ab vmbilico infrà prægnan-
tis venter extenditur, in hydrope ven-
ter infrà & suprà, &c.

Loc

*Loci consentientes de signis
hydropis.*

De signis in genere hydropis lege Auic.
tra. 4. cap. 8. ibi, Omnē speciem hydro-
sequitur corruptio coloris, &c. lege
in locū fusiū. Gal. 5. de loc. aff. cap. vlt. In
anasarca per aluū nihil cruentum, neq; in
ascite, neq; in tympania excerni solet, sed
tū quod est inter peritoneum & partes
subiacentes aquoso humore impletur:
his verò qui ex frigida aqua potu hydro-
pici facti sunt, vehemētes ciborū appetitus
sunt, &c. De signis particularibus mētio-
nem facit Alex. lib. 3. cap. 29. ibi, Quum in
re circa abdomen humores aquosi col-
lecti fuerint, &c. Lege etiā de hac re Auic.
c. 9. ibi, Cū ascite est grauitas sensibilis
in vētre, &c. Et cap. 10. loquēs de anasarca,
dicit, Apparet inflatio in corpore toto si-
cut accidit corpori mortuo, &c. Et cap. 11.
de tympanite egreditur sumē plurimū exi-
tus, &c. Vide fusiū Arcul. & Sauonarolam.
hipp. prognost. 2. tex. 2. ibi, Si quibus ex
tanti parte cōsistit hydrops, &c. Lege etiā
fusiū Galen. in hoc commento, &c.

De curatione hydropis.

In Ascitis cura tres tantū intentiones
surgunt, quarū prima versatur circa vitē
gimen, ita vt sex res nō naturales ad ea-

lilitatem & siccitatē vergant, quum cū
 ascitis sit frigida & humida. Nā hepatis
 à causa calida primū molestetur, nilo-
 minus ex imbecillitate & spirituū res-
 tione tandem frigescit. Diēta igitur si-
 cuis, si vires patiātur. Cibaria parētur un-
 pipere, caryophyllis, &c. Vinū sit subie-
 album, paucae quantitatis, aquam vitæ.
 Altera intentio est in remouēda causa
 iuncta, quæ perficitur cum pharmacis
 dragogis, vel cum vrinam prolicientis,
 vel cum his quæ insensibiliter aquā re-
 uunt, vt sunt fomēta, emplastra, sacculi
 rata, &c. Solutiua fiunt cū rheub. agarb.
 cum succo rad. iridis, ebuli & sambuciū
 soldanella, vel eius succo, cū electuario
 Mezereō quæ laureola dicitur, cum pi-
 lis de serapino, de euphorbio, &c. Diure-
 ca sunt syrup. bisantinus de duabus radi-
 bus, oxymelle, syrup. de absinthio. Fom-
 ta fiunt cum rebus calidis resoluentibus
 saluia, maiorana, rosmarino, menta, absi-
 nthio, pulegio, camomilla, origano, foli-
 lauri, alumine, sulphure, sale, &c. Empl-
 stra, quale est de granis lauri, de stercore
 prino &c. Sacculi parātur ex milio sale, f-
 fure. Vnguēta, quale est illud Agrippæ,
 mille alia quæ parari possunt. Conueni-
 etiā diacurcuma, dialacca, troc. de rheu-

Terti

ertia intentio malam hepatis dispositionem remouet cum his quæ hepar roborant, perierunt, ac obstructions dirimunt, extrinsecus cum ceratis & linimentis ex oleo rutæ & momillino paratis, intrinsecus cum confessionibus iam memoratis, &c. Quod si per ascites non cessauerit, cute compuncta qua extrahatur, &c. Anasarca siue hypotarca hisdem intentionibus indiget: nam præter regimen calidum & siccum etiam caui coniuncta remoueri debet cum medicinis bluentibus & aliis, ut dictum est. Verum hoc plus habet: ut sectionem venæ suppressis hæmorrhoidibus, mēstruis, vel si ab aliquo apostemate fieret, & humorum præparationem requirit, quod in ascite minimè dictum est: & hoc fit cum rhodomelle, syrulo duabus rad. de bisantio, oxymelle simp. &c. Aduerte tamen quod syrupos in hoc casu simpliciter sine aquis & decoctis exhiberem, quoniam aquæ apud me suspectæ sint. Laudatur in hoc casu hiera simplex, rheubarbaricus, pilule de rheubarbaro. Mala autem dispositio hepatis, si ab apostemate, vel ab obstructione eius proueniat, quo pacto curanda sit, supra habuisti: quæ si à mala interie oriatur frigida, tunc damus electuarium diacurcumæ, dialaccæ, rheubarbari, hepatis lupi, absinthii, eupatorium: in calida, diar-

rhodon, absteriasand. In causa mixta troc.
de rheub. cū speciebus diarrhodonis Abba-
tis. Tympanias verò perinde ac dictum
est curanda erit, dummodo soluētia phar-
maca iam dicta flatuosum vētum vnà cum
aquofo humore resoluant, vnde laudatur
diaciminum, diagalanga, diamusculus, ele-
ctuarium de baccis lauri, item fodus ex re-
bus calidis & siccis, &c.

Loci consentientes de cura

hydropum.

De regimine victus loquitur Paul. lib. 3.
cap. 48. ibi, Cibus erit salsamentū, sinapi &
albia ex auib. syluestres & siccae magis.
Inter olera asparagus, porrum, sinapi. Vi-
num sit vetus & tenue, potio liberalis vi-
tanda est, & aqua in totum, calidioribus a-
crioribúsque cibis & auxiliis, vbi febris cum
hydrope fieret, absterneatur, &c. Auicē. 14.
cap. 13. Oportet comedere cum mēsurā, &
dimittere aquam, ita vt prohibeatur à vi-
sione aquae, ne dicam à potu, quātum pos-
sibile sit, &c. Lege Alex. de omnibus oleri-
bus, piscibus, volucribus, leguminibus, siue
bellariis fusius c. 30. De curatone per hy-
dragoga loquitur Gal. 7. aph. cōmē, 6. ibi,
Curatio hydropis sit per medicamenta a-
quositate soluentia, per epithemata, ac
per ea quae ciendi vrinam & in vapores
ralem

talem humorem soluendi facultatē habet.

Item 14. meth. triplicem innuit curā dī
rationem: prima vt tumorem in viscere cō
tentum sanemus. 2. vt humiditatem solua
mus. 3. vt per medicamenta vrinā citemus.
Habet etiam quōd calidior & siccior tem
peries exile corpus reddat, quod fit ex acu
ta exercitatione, & medicamentis attenuā
tibus, & victu, & animi cogitatione, &c.
Paul. lib. 3. cap. 48. Curatio communis ab
euacuatione incipit, verū ascites & tym
panias medicamentum aquam educens re
quirat, anasarca sanguinis detractionem,
modò affectus ex hæmorrhoidē vel men
struis retentis oriatur, &c. Gal. 4. de vic. in
mor. ac. tex. 3. ibi, Hydropum dux sunt na
turæ. In com. ment. Anasarca, inquit, inter
dum sanguinis detractionē, dum incipit,
expostulat, si ex retentione hæmorrhoida
rum vel muliebrium, vel ex quapiam quæ
ita sit plethorica causa inceperit: tympa
niam verò & ascitem nullus per sanguinis
missionē sanare ausus est, &c. Lege Auic.
14. tra. 4. ca. 13. Similiter Mar. Car. & Arcul.
Gor. & Alex. de cura hydropum in particu
lari. Gal. 7. de tēpe. ca. 3. Medicamē id quod
cantharides recipit, hydropicis prodest, ra
met si cātharis ipsa vesicā omnino vlcerat:
verū vbi per ea quæ admiscētur castiga
ta,

ta, corpori plurimo humore grauato
tur, & illū & per vrinas expellit, &c. Et
meth. cap. 13. Harum euacuationem me-
camentis quæ digerant. molimur, vel
rurgia in ascite, adhibita punctione, qua
paracētesin vocāt, &c. Lege quomodo ha-
fiat punctio ex Arcul. & Gulielmo Plac
ab aliis omnibus qui chirurgiam perti-
ctarunt. &c.

Observationes de euacuatione.

Auic. 14. trac. 4. cap. 13. Primū in ascite
aqua, in anasarca pituita, in tympanite fi-
tus euacuetur. 2. Soluentia ita soluit, vt
hil hepatis & ventriculo mali inferant, se-
sint leuia. 3. Reiteretur euacuatio, ne ma-
riæ multum congregetur, cauendo ne pr-
vice ita copiosa sit, vt virtutem deiciat. 4.
A soluētibus statim hæpar & ventriculus
cum stypticitate moderatè aromatica. 5.
Prouocetur vomitus vt materia in ventri-
culo contenta euacuetur. 6. Enæmata con-
ueniunt, dummodo causam antecedentem
& coniunctam euacuare possint.

Observationes de sectione venæ.

Gal. 4. de vic. in morb. ac. com. 3. Primū
si expedit in principio fiat: secundum non
est fienda, nisi sui causa fuerit retentio san-
guinis, vel aliqua plethorica causa, vel in-
flammatiō hepatis, &c. Auic. loc. cit. Sectio

venæ

na vitanda est quatenus sit possibile, & cum sit consilium de phlebotomando, inue prius materias dominantes, &c.

Observationes in attenuantibus

& incidentibus medicinis.

Auic. loc. cit. quatuor habet annotata di-
na. Primò, quòd misceatur cum rebus, he-
r & ventriculū roborantibus. Secundò,
quòd varianda sūnt & mutanda, eò quòd na-
ra ab eo quòd est consuetū non patitur.
tertium, quòd in puluerē redigantur, vt ci-
us ad partē hepatis gibbam perueniant.
quartò, quòd post eorū vsum iura pingua
chibeamus, ne urinarij meatus exhauriā-
r. B. Caue tamen ex hoc textu, ne decipia-
s, quū in omni specie hydropis iura sint
inspecta. In puluerē, intellige vt Gal. cras-
culū. De observationibus circa victū,
ge fufius Alexan. lib. 3. cap. 30.

Noxia ac conferentia hydropi.

Noxia hydropi, vsus aceti assiduus, bo-
inæ carnes, lentes cum corticibus, meze-
on, aloes, & quicquid hepatis temperiem
nolescat accorripit. Conferunt hydropi
bīnthium, agaricus, anisum, apium, beto-
lica, calamentū, calamus aromaticus, cha-
nepitrys, chamēdrys, cantharides, electua-
iū, cuscutæ, cichoriū, succus radicis ebuli,
elleborus, eupatoriū, fœniculus, caricæ,
fumus.

fumus terræ, chebuli, lac asininum, canum, lactuca limaciæ, meu, mezereon, robalani, myrthus, organū, pastinaca, p. dices, petroselinum, prasiū, rheubar- rū, rosmarinus, ruta, sansucus, sambuc, sinapis, scilla, scenoāchos, vrina, hyper, hyssopus, iris. Cōposita sunt, vnguentum Agrippæ, confectio alcacangi, dialacca, curcuma, diatrion pipereon, emplastrum Aristarchi & Andromachi Mes. pilulæ rheub. de agarico, theriaca, triphera fen- ginea, troc. de lacca, de rheubarbaro, de- gno aloes, vnguentum Artanitæ mag. c. confectio de mezereō, de eupatorio Mes. ol. de cherua, de mezereon, pilulæ de mez- reon, theriaca, diateffaron, &c.

De prognosticis hydropum.

Hip. aph. 3. aph. 2 2. Autūno plurimi æ- ui morbi, febres quartanæ & erraticæ, & aquæ inter cutē, &c. vide Gale. in cōment. Et aph. 4. aph. 1 1. Quibus tormina & circ- umbilicum dolores, & lumborū dolor, qu- neque à medicamento. neque aliter solui- tur, in hydropem siccā firmatur. Et aph. 6. aph. 8. Aqua intērcute laborantibus vlcera in corpore facta difficulter sanantur. B. Quia exiccari expostulant, sed hoc difficil- limum ob humiditatis immoderantiā. Et apor. 6. aph. 2 7. Quicumque suppurati, aut
aquam

quam intercutē patientes, vruntur aut sentur: si pus aut aqua vniuersum effluxerit, omnes moriuntur. B. Eò quòd natura bitaneas mutationes nō tolerat. Et aph. aphor. 35. Aqua inter cutem laborātis tussis superueniens, malum. B. intelligi, nisi à materia à capite in subiectas partes stillante tussis oriatur: nam si aquo-humiditas adeò excreuerit, vt asperas arrias occupet, periculum de suffocatione imminet. Et apho. 6. apho. 43. Quicumque enosi difficultate intestinorum capiūtur, perueniēte aqua intercute moriūtur. Et aphor. 7. aphor. 5. In mania dysenteria aut drops, vel mentis alienatio, malum. Et h. 48. eiusdem lib. Aqua intercute laborans, si à rufsi habeatur, desperatus est. Et h. 56. eiusdē, quibus hepar aqua plenū inuentum eruperit, his venter aqua repletur & moriūtur. B. Quia effluere ad omen aqua non potest, nisi aliquo modo exadatur, vnde mors sequitur, &c. Et alph. aph. 12. A diuturnis sanato hæmorrhoidibus: si vrina non seruatur, periculum est quam intercutem vel tabem aduenire. Et aph. 14. eiusdē lib. Ab aqua intercute habita, si aqua è venis in ventrē defluerit, soluitur morbus. Et prognost. 2. cap. 1. Aqua intercutis omnis si ex acuto morbo existit, malum

lum est: non enim sedat febrē, sed dolor
admodū infert ad mortē. B. Eò quòd in-
nire remedia, quæ vtriq; affectioni val-
respōdeant, difficillimū est. Auic. 14. tra-
cap. 3. multa habet prognostica. Primò ai-
res malignior omnibus, deinde hyposar-
deinde tympanitis. Secundò, deterior h-
drops illa est, quæ fit cū ægritudine ac-
& vehementius timēda, quæ homini tēp-
raturæ calidæ & siccæ aduenit: non eni-
sine causā maxima per cōtrariū suæ cōp-
xioni ægrotat. Terriò, hydrops ex durie
splenis magis salua est, quàm quæ à durie
hepatis prouenit. Quartò, si ex hydro-
dispnoea, & cōstrictio anhelit⁹ cōtingat,
solutio ventris, propinquā mortē in trib-
diebus significat. Quintò, & dicit^r quòd q-
do hydropico descendit sicut caro, præ-
ciat mortem eius. Sextò, & habenti mel-
choliā resoluitur melācholia, eò quòd h-
drops eā humectat. Septimò, & scias quò
fluxus ventris in hydrope est mortali.
Octauò, dictum est quòd quādo in facie h-
minis, aut in manu eius sinistra mollities
& in naso pruritus accidit in principio
quòd moritur in secunda vel tertiā die. No-
nò, & si fuerit apostema durum, tunc non
speretur in sanatione hydropis quæ sequi-
tur ipsum: nā et si aqua auacuetur qualibet

ena

acuatione, redit ramen & replet, &c.

*Authores dissentientes circa
hydropem.*

Adserere, cachexiam non præcedere hydropem quæ paulatim facta sit.

Adserere, tympaniam ita à frigiditate fieri, sicuti ascitem.

Adserere, hypofarcam esse ascite deteriore.

Adserere, in ascite hydrope semper incisionem esse opportunam.

Adserere, omne genus lactis in ascite nullo modo competere.

Adserere, tussim in hydrope semper esse signum malum.

*Confutatio dissentientium circa
hydropem.*

Ad primū: Auic. 4. ca. 3. Quando corū digestio hepatis, & antecedit eius debilitas, in primis accidit dispositio ad hydropē antecedēs, quæ vocatur cachexia: sed inper digestio hepatis in qualibet specie dropis corrūpitur, & antecedit eius debilitas: igitur semper præcedit cachexia.

hæc opinio cōfirmatur à Dino, vnde magis decipiuntur, qui contrariū adfirmāt.

Ad secundū: Gal. aph. 4. com. 11. Videtur itē à maiori frigiditate generari aquosus hydrops, quē asciten vocant, à minore

X

tympantias: nā humida substantia in statum aërem sine calore aliquo transmutari non potest, & sic isti decipiuntur, qui opus situm astringunt, &c.

Ad tertium: Auic. l. 4. cap. 3. Ascites est malignior omnibus, &c. Præterea illa species est deterior, quæ causas & symptomata luvissima habet: sed ascites est huiusmodi cum adsit sitis vehemens, gravitas, suffocatio & syncopis: igitur erit hyposarca deterior, &c.

Ad quartum: Conciliator diff. 199. refert ex Gal. neminē vidisse ex incisione liberatum. Præterea Auic. loc. cit. de incisione mirach, Scias, inquit, quod parum proficit nisi in corpore forti valde, quando potes est tolerare sitim & minorationē cibi. Unde nō oportet ut audeat fieri, dum possibile est alia cura, &c. imò, ut refert Conciliator, plerique ex hac incisione moriuntur.

Ad quintum: Auic. loc. cit. Non respicias ad illud quod dicitur in ipso, ex hoc quod decipiuntur sophistæ, quod natura lætis est contraria hydropi: imò scias quod hoc medicamentum est iuuativum per illud quod est in eo de abstersione, & est cōueniēs per id quod est in eo de proprietate. Et paulò infra, Et scias quod laccamelarū & caprarū Arabicarū est vehemētis iuuamēti, &c.

Ad

Ad sextum, Gal. aph. 6. com. 37. Neque
nim quū ex alia sit occasione, in homine
quam intercutē patiēte, tussis est signum
critiale, sed quando ex ipsius morbi ratio-
ne, & sic non est perniciosum signum.

*De leuitate intestinorum,
id est lienteria.*

Leuitas intestinorū, quæ λυγρὴ ἀπὸ Græ-
cis dicitur, est celerrima ciborū expulsio,
qua nulla alteratricis facultatis actio
pernitur, sed tales cibi quales deuorati
sunt secernuntur.

*Loci consentientes de leuita-
te intestinorum.*

Galen. aphor. 6. comment. 1. Leuitas inte-
stinatorum est velox exitus eorū quæ come-
untur ac bibuntur, quæ talia deiiciuntur,
qualia deuorata fuere, quibus egredienti-
bus nulla mutatio alteratricis facultatis
inuenitur, siue in qualitate, siue cōsistētia,
colore & odore, &c. Lege de hac re Gordo-
ij definitionem & aliorū neotericorum.

De causis leuitatis intestinorum.

Causæ procatareticæ ipsius lienteria,
sunt cibi, potus, & pharmacā secundū qua-
ritatem, quantitātē, & ordinē ventriculum
infectantia, inter quæ aēr quoque humidus
cōnumeratur. Causæ antecedentes & con-
iunctæ sunt mala stomachi intēperies, hu-

mores vel nimium frigidi, vel mordace flatus quoque non sinens stomacho cibum inhærere, vnde putrefit & expellitur. Item vlcera, abscessus, & similia dolorem stomacho inferentia, siue per se, siue per aliorum morborum consensum, ita quod nec ventriculus ciborum contactum toleret, vnde facultas expultrix ad id expellendum irritatur. Item stomachi ac intestinorum imbecillitas, ex qua retinere contenta ne exigui quidem tempore possunt, sed illico, perinde ac si graue aliquod onus deponerent, e secernunt, &c.

Loci de causis.

Galen. apho. 6. com. 1. Causa leuitatis intestinorum est triplex: quarum prima est mala retentricis facultatis stomachi intemperies: secunda fit ab humorum mordacitate superficiem ventriculi exulcerante: quare cibi & potus quum ad locum ulceratum perueniunt, membrum illos continere non potest, absque concoctione illos deiecit. Tertia est, quum pituita in ventriculo continetur, quæ cibum & potum extra ventriculum & intestina lubricare facit, &c. Itidem adferit aphor. 4. comment. 12. Auic. 16. tra. 1. cap. 2. præter causas assignatas enumerat etiam solutiuarum medicinarum impressionem in superficie intestinorum & stomachi. Item imbecillitatem

tem digestionis, qua deficiente cibus cor-
umpitur & expellitur. Item catarrhū ci-
um corrūpentē. item ciborum malā qua-
tatem. quantitātē, malitiā sui ordinis, ar-
ficiū, & denique ventositatem & infla-
onē. lege etiā Auic. 13. cap. de lubricitate
omachi. Item Gal. 6. de sympt. cau. cap. 1.
item 1. de loc. aff. cap. 2. Item 6. de sympt.
au. cap. 2. vbi de nausea loquitur. Item 6.
de loc. aff. cap. 1. ibi, Sunt quædam acciden-
tia, quæ haud absurdē intestinis & ventri-
culo simul affectis euenire creduntur, vt
ienteria. Vide etiam Paul. lib. 3. capit. 4.
item Marcum Cat. qui omnes causas ad
stogenarium numerum reducit, cap. de
ienteria.

De signis leuitatis intestinorum.

Signa in genere sunt exitus cibi & po-
us indigesti, dolor in regione stomachi,
& ægritudo eius præcedens, sicut nausea,
subuersio, vomitus: & hic fluxus ordinem
non habet, sed quādocūque cibus sumitur,
egreditur, &c. Signa si à medicamine fiat,
sunt, dolor & mordacitas stomachi, præ-
cessit pharmacum, & statim sequutus est
fluxus, sapor etiam testatur pharmacū, &c.
Signa intemperiei frigida & humida
sunt adbedo faciei & linguæ, paucitas si-
tis, tarda digestio, multitudo sputi, non

adeſt grauitas vel nauſea ſtomachi, & e-
 ſtente pituita adeſt dolor ſtomachi, ace-
 ſa eructatio, laeditur à frigidis, nauſea a-
 eſt & vomitus. Signa intèperiei calide ſu-
 oris amaritudo, ſitis, vomitus frequēs, li-
 lis, ſapor amarus, & humores calidi per
 ceſſum emittuntur, &c. Signa vlcerū ſu-
 vomitus ſaniei, eructatio, puſ redolens,
 lor, &c. Signa apoſtematis ſunt, rumor, d-
 rities, grauitas, aſſiduus dolor, febris co-
 tinua, &c. Signa flatuſ ſunt, quum ſentiri
 flatuoſus motus, dolor modò vnā, mox
 alteram ſtomachi partem moleſtat, iuuat-
 tur ſi crepitum vel ructum emittant. Signa
 imbecillitatis facultatū ſunt, ſi imbecilli-
 ſit digeſtiua, egreditur cibus ſine digeſtie
 ne, ſi retentrix vel expulſrix, egreditur v-
 lociter. Signa interſtinguētia liēteriā ſto-
 machi & inteſtinorum ſunt, quia lienterii
 inteſtinorum, id eſt cœliaca paſſio habet
 cibum ſatis bene eductum, dolor eſt in in-
 teſtinis, & præceſſit agridudo inteſtinorū
 & econuerſo, ſi fuerit ſtomachi, &c.

*Loci conſentientes de ſignis
 leuitatis inteſtinorum.*

Pau. lib. 3. cap. 40. Verū in vtroque le-
 uitatis genere celerius quā in cœliacis,
 qua aſſumpta egerūtur, tamque intenſa eſt
 cruditas, vt alimenti aſſumpti genus co-
 gnoſc

noscat, &c. Lege de his signis Auic. 16.
a. 1. cap. 3. ibi, Fluxus stomachicus nō ha-
et ordinem neque horas, in quibus per
ipsum crescat, immō est secundum regi-
onem: nam si digestiua est debilis, egreditur
ne digestionē: si retentiua & expulsiua
debilis, egreditur velociter, &c. lege eum
usq; de aliis signis. Item Arcul. & Gord.
c. Mar. Cat. qui breuiter omnia lienteria
signa exponit: lege etiā alios neotericos.

De cura lentitatis intestinorum.

Consideranda est in primis à qua causa
hic morbus proueniat: nā si ex parte cibi
corrupti, tunc ventrem soluere vel vomitum
prouocare vtile est. Si verò ex nimia
ibi quantitate assumpta fiat, tunc facta
uacuatione paucus cibus exhibeatur, de-
inde mala stomachi cōplexio corrigatur:
si autem causa fuerit nimia humiditas in
entriculo contenta, tunc medendi insur-
gunt quatuor intentiones. Prima erit cir-
ca victum: nam cibandi sunt ex chondio,
ariza & pane, cum aliquibus adstringenti-
bus, vt malis punicis, pyris malis cydomis,
vel diaeironite: conueniunt etiam testes
gallinacei & pisces saxatiles, &c. 2. inten-
tio est humoris frigidi preparatio cum
rhodomelle, sy. de menta, de absinthio,
cum decoctis vel aquis mentæ absinthij.

3. Intentio est euacuatio, quæ fit per sectionem ventris, ac per vomitum, maxime materia in suprema parte ventriculi contenta, cum pilulis aleophanginis, mastice, & de hiera simpl. diaphinicone & dicitonite solutio. 4. Intentio est ventriculi roboratio, ac discrasie derelictæ oblatio & perficitur cum exterioribus vnguentis calefacientibus, ac stypticis in se habentibus, quale est oleum de spica, de absinthio, de mastice, de menta, de citroni, item cum emplastris & ceratis eandem vi seruantibus, ex menta, absinthio, rosis, serenoantho, spica, balustis, galanga, ciper &c. Roboramus etiam cum interioribus electuariis adhibitis, quale est aromaticum ros. diaciminum, diagalanga, diacitonite cum speciebus & zacharo. Si verò causa fuerit materia calida, victus & regimen declinet ad frigidum: digestio fiat cum syr. ros. de granatis, de cydoniis, de myrtho. Euacuatio, cum rheubar. aloë lota, hiera simpl. Robur denique indimus, ac malam derelictam intemperiem remouemus cum zacharo ros. diarrhodone Abb. cōfectione de tribus sandalis, &c. Si verò causa fuerit vlcus, primò oportet abstergere, deinde consolidare, vtpote cum rhodomelle, abstergere & conglutinare cū bolo armeno, &c.

Si cau

causa fuerit ventositas, primum fiat euacuat^o ac digestio, præsertim si materia foens sit, deinde resoluatur cum electuario baccis lauri, vel fomento, vel vnguentis emplastris ex rebus calidis stomacho inferentibus, &c.

Loci consentientes de cura leuitatis intestinorum.

Mar. Cat. Cura variatur secundum varietatem causarum, &c.

Gal. 8. meth. ca. 5. Cibandi sunt fluente ihuc ventre ex polenta & pane, quæ Græ. oxylipe vocât, qui mimum aceti habeat: spargere tamen polentam debebis, ubi ilicet vëter adhuc plus iusto excernit, vel mali punici, vel pyrorum, vel malorû succocitoniorum: si amplius venter non excernit, sufficit alica ad modum ptisanæ reparata, hoc est, aceti habens pauxillum, militer gallinacei testiculi, saxatiles ex albo iure pisces, & fructuum aliquis ex his ui adstringunt. Lege de his cibis Paul. leg. lib. 3. cap. 40. ibi, Si biliosa sit digestio, &c.

Lege etiã Auic. 13. tra. 5. cap. 7. ibi, Et sit ibus, &c. Vide etiam Gal. in lib. de san. uenda, &c. De cura malæ complexionis plura habes etiam ex ipso Auic. in loc. cit. ibi, Quod si causa fuerit ex frigore, cum

calefactiuis curentur ebibitis: & si illic
rit materia, euacuetur, & administretur
mitus in omni septimana: & si fuerit
litia cōplexionis calidę cum materia, op-
ret vt educatur humor cū facilitate, &c.
ge fusius, & omnem curam intelliges.
ge etiam Arcul. 9. almans, & ipsum A.
lib. 9. cap. 51 Item Auic. 16. tra. 2. cap. 2. e
fluxu stomachi lubricatiuo, &c.

Observationes in cura.

Marc. Cat. cap. de lien. Medicinę sol-
tes sint quę à lōginquo nō attrahāt. Au.
16. tra. 2. cap. 2. In quibus non sunt vlcer
fac vt permisceas styptica fortis styptic
tatis, cum medicinis calefactiuis in po
& in emplastris, & vtantur medicinis n-
turam iuuantibus & confortantibus sp-
ritum, vt theriaca magna, &c.

Conferentia leuitati inte-

sternorum.

Conferunt lienterię fofus ex balaustris
radix bedegar, cassanea, cupressus, aqua ve
vinum extinctionis ferri, fax vini cum a
qua myrthi: cataplasmetur fraxinus, cha-
rabe, licium, lini semen, margaritę, olsi-
fraga, anisum, polygonum, hypocystis, zin-
giber. Comp. athanasia Nic. diacitoniten
Nic. mitridatum Nic. cum decocto balau-
stiarum, mīua, mīchleta, pilulę stypticę
Nic.

Electuarium inuentionis nostræ, Mes.
 tuariū de myrtho, Mes. susuf. de myr-
 Mes. confectio de seminibus Mes. pe-
 constringere, manus in feruentem a-
 um mittere.

*De prognosticis leuitatis
 intestinorum.*

Hippoc. apor. 4. aphor. 12. Quorum alui
 estinorum leuitate laborant, hyberno
 mpore suprā purgari malum, &c.

Et aphor. 6. aphor. 1. In longis leuitati-
 s intestinorum si ructus acidus fiat, qui
 us non erat, signum bonum.

Auic. 16. tra. 1. cap. de causis fluxus, Lien-
 tia quæ fit propter complexionem frigi-
 m & humidam est ducens sua longitudi-
 ad hydropem, & est in summo difficilis
 rationis, quā confirmatur. 2. facta à vir-
 te medicinarum soluentium interdum
 rducit ad dysenteriam & vlcera intesti-
 orum. 3. Inquit Hippoc. quòd omnis flu-
 s ventris post ægritudinem subito est
 alus, significans mortem propinquam,

Et singultus cum accidit habentibus flu-
 um ventris, est significatio mali, signifi-
 ns siccitatem facientem arefactionem. 5.

Hippoc. dixit, quòd habentibus lubrici-
 tem intestinorum vomitus est malus, &
 dlicium occultā habet causam, &c. Her-
 culus

culus cap. de lien. Succedens fluxibus antiquis, & ad chronicas ægritudines morlis. Et perseverans ex debilitate contumaciæ perducit ad hydropem siccam, & tandem ad mortem. &c.

Authores dissentientes circa leuitatem intestinorum.

1. Adserere, cum Erasistrato, muscosa sanguinolenta cum crudis excrementis excerni.
2. Adserere, non posse inueniri lienteris speciẽ, in qua semper adsint acidi ructus.

Confutatio dissentientium circa leuitatem intestinorum.

Ad primum: Gal. aphor. 6. comment. Hæc Erasistratus inquit, nescio qua ducta opinione, adiiciens crudis excrementis muscosa ac sanguinolenta: hoc enim nulli apposuit, neque eorum qui eius ætate clauerunt medicorum, neque eorum qui posterius fuerunt, &c.

Ad secundum: Gal. eodẽ comment. Quicunque à pituita ventriculum refrigerant fiunt leuitates intestinorum, semper cum ipsis sunt acidi ructus, ut casus quidam, & sic species lienteris inuenitur, in qua adsunt isti ructus acidi.

De dysenteria.

Quæ à Grecis *δυσεντερία* dicitur, Latinè diffi-

ficulatem intestinorum, seu tormina
cant. Est autem dysenteria fluxus ven-
is sanguinolentus cum excoriatione &
cere intestinorum, &c.

Loci consentientes de dysenteria.

Gal. lib. fin. med. Dysenteria est intesti-
norum ulceratio cum phlegmone & cruē-
rum fæciūque similium strigmentorum
cretione, non sine alui intestinorumque
orsu ac cruciatu. Lege etiam Gal. 6. de
c. aff. cap. 1. ibi, Sanè in præsentia nomen
dysenteriae, &c. Pau. lib. 3. cap. 42. *Δυσεντερία*
νόσος ἐστὶ τῆς ἐντέρας. Lege etiam Aet. ser. 9.
p. 43.

De causis dysenteriae.

hic affectus vel per se, vel per consensum
eri potest. Per se vel ab externa vel ab in-
terna causa orietur. Ab externa, sicut à fri-
giditate, ardore, venenatorum pharmaco-
rum potu, & ab acris cibis, &c. Ab inter-
na, sicut ab humoribus acris paulatim
rodentibus, sicut à bile, pituita salsa, ab a-
cribili, exusta, vel ab aliquo abscessu abru-
to. Per cōsensum fit totius, ut in fine fe-
bris, vel partis, sicut à crassioribus intesti-
nis, à meseraicis, à gracilioribus hepate, &c.

Loci consentientes de causis dysenteriae.

Auic. 16. tra. 1. ca. 2. Et excoriatio est do-
lor abrasionis ex superficie intestinorum,
quæ

quæ aut est à materia cholericâ, vel san-
 nea acuta, aut virulenta, aut saniosa, & ce-
 ge fusius hunc locum Gal. aphor. 6. comen-
 Difficultates intestinorum sunt ex humi-
 bus acris intestinum, summa prima
 infestantibus: deinde progressu tempo-
 se profundentibus, ita ut ulcera putrilai-
 ni obnoxia, ventriculo etiam compatie
 efficiatur, &c. Vide etiam Gal. 5. de loc. E.
 cap. ult. Item 1. de loc. aff. cap. 2. Vbi de-
 struat quod affectus à quapiam causa orti
 non semper remota causa remouetur, &
 permanentem habeat dispositionem, affe-
 de dysenteria exemplum. Hippoc. aph.
 4. aphor. 11. Quibus tormina & circa vni-
 licum dolores, &c. Galenus tormina si-
 inquit, vel propter morsum vehementem
 vel spiritum flatuosum qui non habet ex-
 tum. B. Nota tamen quod tormina si-
σποποι non semper pro dysenteria acci-
 piuntur, sed pro intestinorum torminibus
 qui à mordacitate humorum, vel à spiri-
 flatuoso fieri solent, ut testatur Gal. aph.
 comment. 41.

De signis dysenterie.

Signa dysenterie sunt dolor, ventri-
 punctio, & frequens assellatio, in qua fr-
 sta intestinorum cernuntur. Signa ulceri
 sunt sanies exiens, excoriatio, & foetidus
 odor

dor. Locus vlcis pluribus modis cognoscitur, primū ex dolore supra vel infra umbilicum existente: nam in superioribus dolor magis vehemens est, quā in inferioribus: præterea vomitus, nausea, & singultus interdum ventriculo ex consensu patiente fiunt. Cognoscitur etiam ex corporibus intestinaorum exentibus: nam testes & parui ex gracilibus, crassi verò & qui ex crassis intestinis descendūt. Cognoscitur etiam ex tempore: nam quum inter dolorem & affellationem prolixum est tempus, tunc ex gracilibus, si breue, ex crassis. Cognoscitur etiam ex qualitate eius quod greditur: nam à superioribus proueniens est magis foetidum, & sæpenumero loturę carnis simile. At quod ab inferioribus intestinis prouenit, ex dolore infra umbilicum, & ex sanguine, & sanie ante faeces reunte cognoscitur. Vlcus plurimę sordis esse deprehenditur à longa ægritudine, & quantitate eius quod egeritur, & ex dolore non sensato. Vlcus sordidum à corrouo scernitur ex virulentia, a qualitate alida, odore graui: ac corrosiuū est vehemens doloris factorisq; colore ad nigredinē tergente. Signa vlcis profundi sunt sanguis plurimus exiens post abrasionem intestinaorum, item ægritudo vehemens, &c.

Loci

*Loci consentientes de signis
dysenteriae.*

Gal. 6. de loc. aff. cap. 1. Dysenteria nō solum fieri solet, sed protinus ab ipsius initio bilis mordax secernitur, quū deinde intraneorū abrasiones sequuntur, postea paululum cruoris simul excerni videtur, quando affectus ipse in dysenteria esse censetur. Considerandū insuper nū per se solā abrasiones exeant, aut simul cū quopiam pingue excernatur, quia tunc indicium est in crassis intestinis vlcus cōsistere, &c. Lege hunc locū fusius, & omnia signa intelliges. Legetiam Gale. primo de loc. aff. cap. 1. vbi per exemplo inquit, Quum intestini tunica per dysenteriam deiectam cōspexeris, & Vide etiā Gal. 5. de loc. aff. ca. ult. Item leg Auic. 16. cap. 3. ibi, Communia signa sunt dolor, punctura & alchurati, & quod vlcerum cognoscuntur per excoriationem, odorem foetidum & per alchurati, id est, abrasiones intestinorum, &c. Lege fusius hunc locū, & inuenies quaecunque à me sub breuitate recitata sunt. lege etiā Arcul. & Aetser. 9. cap. 43. ibi, Si circa intestina crassa ulceratio contingat, &c.

De cura dysenteriae.

Requiruntur in cura dysenteriae quatuor intentiones: prima circa regimen, vnde si
vicer

ceratio intestinorum à causa calida pen-
 eat cibaria & aër ad frigidum alteranda
 unt: vnde comeduntur oua sorbilia, hepar
 allinarum, sorbitiones frumentaceæ, &
 ermittentibus febribus etiam lac, oriza,
 alciarij panes, amyllum, & quæcunq; hu-
 mores obducunt & spissant, & quæ corpora
 xata & rarefacta adstringunt & siccant,
 pultes ex alica, ex oriza, milio, &c. conce-
 untur interdum ob stomachi imbecillitatē
 inum, cæterum aqua pluuiialis frigida a-
 ds cōuenit. Secūda intentio versatur cir-
 a causam excoriationis, quæ si fuerit à bi-
 osa materia, primū humores, deinde
 orationes, demum sanguinem educente,
 atim nō expectata digestionē, euacuanda
 rit, cū myrobalanis citrinis & rheubarba-
 o nō vsto vt aliqui, & facta aliquali eua-
 natione, tūc materiā præparamus cū syr.
 of. de citoniis, de endiuia, myrthino cū a-
 uis endiuia, plantaginis, acetosæ rosaceæ,
 c. & facta digestionē iterū euacuamus cū
 heub. Et pro roborando hepate epithema
 aramus cum sandalis, rosis, aqua endiuia,
 ofarum, spodio, &c. Deinde styptica exhi-
 enda sunt. Si verò causa fuerit sanguis vl-
 ra iam prædicta, vena secetur. Tertia intē-
 io est circa excoriationem: quæ si fuerit
 ine vlcere, tunc lavare & conglutinare

opus est. Lauamus cū aqua hordei, vitel
ouorū, & zaccharo rubeo per clysterem
fufis. Conglutinamus quotienscunque
profundo non est immersa excoriatio, si
tantū superiores partes attingit: & h
fit cū albumine ouorum, gummi Arabic
adipe renū caprarum, oleo rosaceo, cū bo
armenio, dragacantho, brodio pingui, v
cū aqua hordei, si lauare simul ac congl
tinare quærimus, omnia per clysterem i
fusa. Si verò excoriatio cū vlcere iuncta, s
tunc duplex erit intentio, quarū prima ei
abstergere ac mundificare, secunda con
lidare. Mundificamus cum decocto furs
rum frumenti, vel aqua mellis, iure ciceri
rub. aqua lactis, vrina, lixiuio dulci, vin
rub. rhodomelle, vel decocto pisciū salite
rum & oliuarū, demum cū decocto, troc. d
arsenico, & c. Consolidamus postea cum re
bus stypticis, quale est decoctum lentium
rosarū, balaustiarum, cor. granatorum, su
mach, coriandrorū: & addimus boli arme
nij, sanguinis draconis, terre sigillatæ, thu
ris ana ʒj. ouorum binos vitellos, vt cly
stere magis intestinis adhæreat. Quarta
intentio est fluxus cohibitio, ne ex super
fluo fluxu virtus prosteratur. Idcirco in
trinsecus conueniunt syru. ros. de citoniis,
de granatis, troc. de spodio cū semine ace
tosæ,

osæ, zucharum ros. triasandali, myua citiorum cum corallis, spodio, sandalis, &c. Quæ nisi profuerint, ad narcotica procedendum, vt cū athanasia, phylonio Romano, vel cū supposito ex licitio, quod filo complicandū est, vt cū lubeat, possit extrahi. Extrinsicus autem profunt linimenta ex oleo myrtheo, masticino, vel de citiis, cum aliquo puluere styptico, vel emplastro de diaphinicone Mes. Proderit etiam suffumigium siue lauacrum ex vino rub. in quo styptica aliqua incocta sint, lauando manus & pedes, vel fumum in ferro recipiendum, ferro continuè in dicto vino excandescente, &c.

*Loci consentientes de cura
dysenteria.*

Paul. lib. 3. cap. 42. Alimentum erit pernitia, oua ex lacte, sorbitiones frumentaceæ per se & cum lacte, lac mediocriter coctum, holera non sunt necessaria, gustare tamen possunt endiuia coctam, intybum & arnoglossum, &c. Poma adstringentia, dummodo carnes reiiciantur, cruda esuanda, & aqua potioni frigida, sitque celestis, & læso stomacho vinum propinandum, &c. B. Lege Auic. 16. tra. 1. cap. 4. ibi, Ex cibariis eligat frigida & facientia conglutinationem, &c. & 16. tract. 1. cap. 7.

ibi, Et cū volueris cibare, &c. Lege etiam
 fusius Aet. ser. 9. cap. 43. & intelliges figi-
 latim quæcunque ad victum pertinent, &
 De secunda intentione loquitur Auic. re-
 tract. 2. cap. 7. ibi, Oportet te considerat
 quæ sit dispositio causæ facientis excoria-
 tionem & vlcera intestinorum, & an fiat
 vel facta sit à ruptura, à repletionem, ab apo-
 stemate: & si fiat, præpara in abscindend
 eam & constringendo ipsam: & si fuerit
 necessaria euacuatio propter malitiā hu-
 moris fluentis, fac eam cum timore & cau-
 tela, &c. Galen. 12. meth. cap. 2. At sanguini-
 missio, quæ scilicet vires non deficit, sym-
 ptoma spectantis medici opus non est, sed
 eius qui totum affectum adimere studet. B
 Intellige, si in toto fuerit repletio, aut si in
 causa fuerit iecur sanguinem multipli-
 cans, vel sanguis hæmorrhoidarum ve-
 menstruorum retentus, &c. Auic. loc. cit. E
 rheubarbaro inest proprietas mirabilis
 vlceribus intestinorum, & fluxu excoria-
 tiuo, & propriè quando datur in potu cum
 aqua arnoglossæ & paucō vino, &c. Lege
 Auic. loc. cit. cap. 3. de cura vlcerosi, ibi, Et
 multotiens sanat, &c. & habebis multa pro
 secunda intentione. Gale. 6. de loc. aff. cap. 1.
 Si in superioribus intestinis fuerit vlcus,
 ab epotis medicamentis petendum est præ-
 sidium:

fidium: si. verò in humilioribus, clysterem submittere magis conuenit. B. Hoc idem sentit Auic. loc. cit. ibi, Oportet vt cures id quod est in superioribus intestinis. & c. De tertia intentione loquitur fufius Auic. 16. ra. 2. cap. 7. ibi, Et non cures in corrosione, nisi de medicinis conferentibus corrosioni, vt sunt mundificatiua, absterfiua cum exiccatione & stypticitate: & quum sciueris quòd vlcera sunt sordida, mūdifica cum eis quæ sunt aqua mellis, & fortior aqua salis, aqua oliuarum salita: & si necesse fuerit, administra tro. de Arsenico, & c. Lege Gale. 5. meth. cap. 1. vbi methodum sanandi vlcera demonstrat, quàm nō inutile foret, i ad hunc locum transferres. Vide etiam 2. meth. cap. 1. vbi habet duplicem curandi viam, quarum altera vacat symptomatici, altera penitus morbo: lege locum fufius, lege etiam de hac re Arcul. & Sauo.

De 4. intentione loquitur Auic. eodem loco, ibi, Et quando non cessat dolor, tūc sedeat infirmus in tinna, in cuius aqua decocta sint styptica cum aliquanto anethi, fœnugræci & altheæ: & si adeò fortis fiat, vt appropinquet syncopis, non erit excusatio narcoticorum, & c. Lege de his Marc. Cat. Gord. & Matthæum de Gra. lo, & c.

Observationes circa victum.

Auic. 16. tra. 1. cap. 4. In cibis eorū oportet vt non sit mordicatio, nec falsedo plurima, nec acetositas plurima nociua quæ virtutem expulsiuam moueant, quantitas cibi sit pauca. Secūdo, cibaria sint actu frigida non sumat in potu nisi infrigidatum: nam frigidum constringit, tepidum verò resoluit. Tertiò, & rectius est, vt non comedant cibos plurium specierum. Quartò, & scia quòd dormire est ex rebus magis iuuatiuis. Quintò, & si cū fluxu fuerit tussis, dimittat id in quo est acetositas vehemens & stypticitas, &c.

*Observationes circa pharmaca
& syrnpos.*

Marcus Cat. Non exhibeantur solutiua quæ noceant loco vlcerato, vt scammoniaza. Auic. loc. cit. Cūque administras medicinas, tunc incipe cum singularibus: si verò non valent, tunc tende ad composita. Et sint restrictiua, aut exiccatiua, aut constipatiua, aut infrigidatiua, aut conglutinatiua, &c. Et non oportet vt sit superfluitas in assatione eorum, ne liquefiat eorum virtus. B. Ex his intellige, quòd noua non sit opinio de non vrendo rheubarbaro, sicuti plures existimarunt, sed Auicennæ, &c.

Obfer

Observationes circa narcotica.

Auic. loc. cit. In narcoticis est timor, licet quandoque accadat, ut sint necessaria, & non portet ut administrentur, quandiu ab eis excusatio esse potest. Et quando necessaria est administratio, non exhibeantur eis quoniam in frigidatur corpus, & debilitatur vis, & id apparet in pulsu, &c. Hoc idem adferit Alex. lib. 3. cap. 10. ubi de præpostero medicorum imperitorum iudicio facit mentionem Auic. Et ex regimine clysteriorum est, ut clyster fiat paulatim per vias, & pingua clysteria sedant dolorem ulceris corrosiui, sed non sanant.

Observationes circa curationem.

Auic. 14. cap. 15. Nullus creticus fluxus prohibendus est, nisi superfluous fuerit, quia tunc à natura non regulatur, sed à multitudine humorum, vel ab eorum acredine provenit. Item nullus fluxus est constringendus, nisi primum materiam peccantem evacuaueris, vel saltem minoraueris. Item fluxus diuersorum colorum nunquam cohibendus, quia multitudinem humorum ac diuersitatem significat, si virtus tolerauerit. Item infirmus non adeat sedem, quoniam molestatur, sed retineat, &c.

Conferentia dysenteria.

Simplicia frigida ad dysenteriam cōfe-

rentia sunt, acatia, hypocystis, balauſti-
 galla, gummi Arab. lutum Armenum, ſpo-
 diũ, granata, ſumach, berberis, acetofa, pe-
 tulacæ ſemē, coriandrũ, plátago, roſa, my-
 thus, mora immatura, citoniũ, glans, aqua
 chalybeata, camphora, lithargyriũ, pan-
 cum, miliũ, phlomos, nenuphar, cornu ce-
 ui uſtũ, pyra pontica, papauer, lapis, hæma-
 rites, ſanguis draconis, charabæ, agreſta
 bleta nigra, corallus, corrigiola, dragacar-
 rum, lactuca, liciũ, lentes, meſpila, hordeũ
 opium, partes animalium, ſemperuiua, &c.
 Compoſita frigida ſunt rhob de ribes, de
 berberis, de citoniis, troc. de charabe, de
 terra ſigillata, de ſpodio, emplaſtrũ diaphi-
 niconis Meſ. electuariũ de ſorbis, michle-
 tæ, diacitonites, diarrhodon Nic. zachari-
 roſ. triaſandali, manuſchriſti, parlatũ, &c.
 Simplicia calida ſunt vinũ nigrum, ſtypti-
 cum, chalybeatum, thus, ciminũ, aniſum,
 cortex, citri, colophonia, laudanũ, caſeus,
 coagula, nuclei daſtylorũ, oriza, acorus, al-
 thea, aqua piſciũ ſalſorũ, butyrũ, bitumen
 Iudaicum, caro leporis, charta combuſta in
 clyſteri, cypreſſus, fœnugræcum, lignum
 aloës, maſtix, rheubarbarũ, adeps caprina,
 hircina, arietina. Compoſita ſunt theriaca
 antiqua, & phylonium, athanaſia magna
 Meſ. & Nic. troc. de eupatorio, &c.

De

De prognosticis dysenteriae.

Hipp. Aph. 4. Aph. 24. Difficultas intestinorum si ab atra bile inceperit, lethalis est. Quia nihil ab ulcerato cacro differt, vel uia nullum pharmacum illi continuo adhæ-
ere potest. Pro expositione Aphor. huius
age 22. Aphor. ibi, Deiectiones, nigrae, &c.
sque ad 24. Et Aphor. 4. Aphor. 26. A' diffi-
cultate intestinorum habito si veluti carun-
culæ exeant, lethale est. B. Quia carnem in
his concrefcere vel cicatricem induci non
possumus. Nota tamē, quod dysenteria ha-
bet triplicem differentiā. Prima, quū pin-
guia quædam corpora excernuntur. 2. quū ex
superficie intestinorum interiore quædam
amenta exeunt. 3. quū intestinorum substan-
tia abraditur, & hæc est incurabilis, &c.
Hipp. Apho. 6. Aph. 3. In longis difficultati-
bus intestinorum inedia ex fastidio malum,
& cū febre peius. B. Intellige si accidat in
processu morbi: nam dictū est Aph. 7. Aph.
In morbo diuturno fastidium cibi malum,
ut Aph. 6. Aph. 43. Quicumque lienosi diffi-
cultate intestinorum capiuntur, iis super-
ueniente longa difficultate intestinorum,
ut aqua intercute, aut leuitate intestino-
rum, moriuntur. Et Apho. 2. Aph. 14. In pro-
luuiis alui mutationes excrementorum iu-
uāt, nisi ad malā mutatio fiat, &c. Et Aph. 5.

Apho. 34. Mulieri vterum gerenti si alui plurimum profluat, periculum est ne abortiatur. Et Apho. 6. Aphor. 48. Lienosis difficultas intestinorum aut dysenteria superueniens, bonum. Et Apho. 7. Aph. 5. A' fure re difficultas intestinorū bonum. 8. Ratione transmutationis, quū à capite ad inferiora humores noxij trāsferantur. Et Apl. 7. Aph. 24. A' deiectione sincera difficultas intestinorū malum. lege etiā Aph. 30. lib. 7. ibi, Quibus in alui profluuiis excrementa spumosa sunt, &c. Aet. ser. 9. cap. 43. Dysenteria in colo aut recto cōsistens, facile curatur: quæ verò in tenuibus intestinis, maxime in ieiuno, difficilè. Secundò, quæ post abscessuum eruptiones fiunt, graues sunt: & quæ cū inflammatione oboriuntur, & quæ cū febre & appetitus perditione, pessimæ, quæ pori aspectum habent, sūntque nigra, plurima graueolentia: & quæ vnā cum excrementis pelliculas cum sordibus mixtas emittunt. Tertiò magis in his deficiunt mulieres quàm viri, magis senes & pueri quàm iuuenes, &c. Auic. 16. tract. 1. ca. 2. Primum magna effusio sanguinis puri post dysenteriam valde mala, quia ad intima adeò penetrarūt vlcera, vt venæ scindātur. Secundum, vlcera intestinorū perducunt ad hydropem. Tertiū, conuulsio, vomitus, singultus

ultus & conturbatio rationis post dysenteriam, mortem significant. Quartum, in br. Hippocr. Qui habet dysenteriam, & paret post eius aurem sinistram veluti nigra similis orobo cum vehementi si-
moritur in decima, & non tardatur, ceuadit, &c.

Authores dissentientes circa dysenteriam.

Adserere, omnem vehementem fluxum in principio morbi factum, esse compe-
scendum.

Adserere, dysenteriam à sanguine dete-
rioris esse curæ, quàm à bile.

Adserere, dysenteriam ab atra bile sem-
per esse lethalem.

Confutatio dissentientium circa dysenteriam.

Ad primum, Damascenus in Aphorif. Si
is per multum tempus neque vomitum
eq; solutionem ventris habuit, & ei subi-
eveniet, videndum ne restringere festi-
es, quia huic corpus pravis expurgatur
umoribus, vnde Auicen. 16. tertij dixit,
uxum fluxu curari: verùm si imbecillitas
irium ex fluxu fieret, esset restringendus.
ide Concil. differ. 200.

Ad secundum dicimus, quòd deterioris
curæ est dysenteria ab atra bile: nam Gale.
1. aphorif. comment. 24. Quæ ab atra bile
it, insanabilis est: deinde quæ à bile & à
pituita

pituita falsa, deinde quæ à sanguine.

Obiectio.

Auicē. ponit deterio- rem esse, quæ per adustionem cholerae amaræ, quam- græ: itidem Haly. Abb. in sua praxi, Quo- modo igitur deterio- rem dicis, quæ ab atra bile fit?

Responsio.

Dico quòd ratione subitæ impressione deterior est quæ à bile adusta fit, sed rati- ne eradicationis deterior est quæ fit ab atra bile. De hac re lege Concil. differentia 10

Ad tertium respondet Galen. aphor. 1. comment. 43. quòd qui durum habent li- nem, iis superueniens dysenteria soluit di- positionē. Quare si atra bilis aliunde pro- uenerit, nec fixam ac permanentem cau- sam in intestinis habuerit, salubris est & non lethalis: & hanc solutionem habes ab Auicē. 3. can. capit. de solutione ventris o- mnium modorum, & sic non est semper lethalis.

De fluxibus hepaticis.

Omnis fluxus, qui vitio hepatis accidit, hepaticus solet appellari, & eius species sunt nouem, ut chylosa, pituitosa, biliosa, atrobilaris, sanguinea, lotiua, foetida, viru- lenta, & vltima, quando caro hepatis nigra & crassa expellitur. Chylosa est, quando
pars

is chyli vel totus chylus egreditur, & hoc
 io hepatis & nō vētriculi. Pituitosa du-
 plex: altera à crassiori pituita, altera ab a-
 mosa. Biliosa verò etiā varia, & multiplex
 iuxta bilis species, sicut flaua, vitellina,
 asina, eruginosa, &c. Atrabilaris similiter
 niger est, sicuti sanguis niger, aut ni-
 gi vini fæx, aut melancholiæ per adustio-
 nem bilis genitæ, aut melancholiæ natura-
 lis, vel per adustionē præter naturam geni-
 ta. Sanguinea, quam cruentam vocat Gale-
 nus. Interdum retinet proprium colorem, inter-
 dum niger est sanguis, interdum paucus
 & multus, interdum continuus & interpo-
 situs. Lotiua verò est fluxus rei aquosæ, quæ
 tendit ad colorem rubeum, & est sicuti carnis
 lotura. Fœtida est fluxus rei fœtē-
 tis, siue sit humor, siue sanies, siue hepatis
 substantia corrupta. Virulenta est fluxus
 subtilis, tendentis ad citrinitatem aut
 rubedinem ad modum virulentie. Vltimus
 est fluxus, ex quo res nigra non facile diuisi-
 bilis egreditur, & est substantia hepatis per
 atrefactionem vel adustionem separata.

Loci consentientes de fluxu

bus hepaticis.

Quòd tot sint species fluxuum hepatis,
 tot nuper recitauimus, lege Arcul. & Sa-
 nonarolam, & maximè Auic. vbi agit de
 solu

soluzione ventris omnium modorum
de expulsionibus rerum ex hepate & sy-
ne. Galen. 6. de loc. affect. capit. 1. Nonnulli
antiquorum præter hanc, quæ ab ulcera-
ne intestinorum fit, dysenteriam, alia
quoque cruentam ob excretorum speciem
nominarunt, in qua syncerus interdum
& plurimus sanguis, interdum veluti-
mus & faeces ipsius non parvæ quantitas
excernitur, &c. Lege etiam Gale. 2. de l.
affect. capit. 5.

De causis fluxuum hepaticorum.

Causæ chylosi fluxus sunt quinque. P-
ma, quum chylus est pluris quantitat-
quàm pro nutriendo corpore deceat. 2. c-
paruitas hepatis copiam chyli contine-
non valentis. 3. est abscessus in meseraici
vel in concauo hepatis. 4. est obstructio a-
tenuatoria aut carnosa, aut coarctatoria h-
rum partiũ. 5. est imbecillitas attractric-
siue retentricis facultatis, &c. Causa pitu-
tosi fluxus est mala complexio frigida he-
patis, destruens alteratricem siue digesti-
uam facultatē. Causa aquosi fluxus est cor-
ruptio alteratricis facultatis, & fortitudo
expulsatorię facultatis. Causa biliosi fluxu
est copia bilis genita ab intemperie hepa-
tis calida, vel regimen calidum, qualis est
usus ciborum acrium, amarorum & falso
run

um: item ira, & motus in sole, febres ar-
 entes, abscessus calidi, obstructions cy-
 li fellei, & quæcunque possunt sanguinem
 durere & bilem gignere, &c.

Causæ fluxus melancholici sunt sex: ma-
 ior intemperies hepatis calida adurens, aut
 frigida congelans. Secunda, vlcus in sub-
 stantia hepatis emittens pus nigrum. Ter-
 tia, obstructio hepatis, qua patefacta exeūt
 enigrata materia, iandiu retenta. Quar-
 ta, fortitudo vitutis tales fæces separantis
 & expellentis. Quinta, imbecillitas facul-
 tatis retentoriæ & alteratricis fecalem flu-
 um inducentes, &c. Causa sanguinei flu-
 us vel est scissura venæ, vel copiosa eius
 multitudo, aut obstructio venæ chyli, aut
 abscessus, aut imbecillitas attractricis fa-
 cultatis. Causa lotiui fluxus, vel est imbe-
 cillitas concoctricis facultatis, aut retento-
 riæ, quæ non adeousque chylum retinet, ut
 perfecte digeri possit: aut est imbecillitas
 discernentis facultatis, non separans aquo-
 sitatem à sanguine ob hepatis imbecillita-
 tem. Causæ harum imbecillitatum sunt in-
 terdum mala intemperies aut abscessus aut
 obstructio. Causæ foetidi fluxus sunt longa
 mora humoris retenti in loco præternatu-
 rali, vel vlcus, vel apostema, à quib⁹ sanies
 male olens secernitur, interdum ipsius he-
 patis

patis putrefactio. Causæ fluxus virulen-
est facultas expulso-
symptomaticè expellens, vel sanguinis
aliquo apostemate in hepate aut mesera-
cis rupto resudatio. Causæ fluxus substa-
tiæ hepatis sunt putredines, adustiones,
cera corrodentia substantiam hepatis.

Loci consentientes de causis fluxuum.

Vide in alios neotericos Arcul. de his-
sissimè differentem. Galen. in art. med. ca-
88. de signis hepatis patientis. Item de di-
eorum quæ excernuntur multa habet, quæ
ad hunc locum adduci possunt. Paul. libr.
ca. 42. Iecoraria dysenteria fieri solet, quæ
iecur alimentum distributum non probè
conficit, & retentrix eius facultas vel ali-
atrix imbecillis est. Galen. 1. de nat. hun-
tex. 41. Fieri, inquit, frequētissimè à multæ
sanguinis copia in venis contenta, quæ à na-
tura per venas perinde excernitur, ac in
mulieribus per vterum, & aliis per nare-
vel mariscas: vide etiam Galen. 9. de com-
posi. med. per loc. cap. 5. Item 2. de loc. affec-
cap. 5. Vide insuper Alexand. libr. 3. de Ie-
coraria dysenteria. Item Gord. & alios neo-
tericos.

De signis fluxuum hepaticorum.

Signa fluxus chylosi sunt nota illis qui
chylum cognoscunt, & est albus subtilis.

V

prorsana hordeacea. Signa quum fit à par-
 itate hepatis sunt, quia à generatione
 contractum est hepar, & quòd iuuatur
 paucitate cibi. Signa quòd fiant ab apo-
 emate siue ab obstructione, sunt satis
 nota per ea quæ dicta sunt de imbecillita-
 te hepatis. Signa fluxus biliosi cognoscun-
 tur per colorem & substantiam eius quod
 greditur. Signa fluxus pituitosi aquosi,
 cognoscuntur ex præcedenti regimine, vt
 ex commestione fructuum, ex potu aquæ
 superfluo. Signa malæ complexionis hepa-
 tis & apostematis, & obstructionis patent
 ex supradictis. Signa fluxus humoris me-
 lancholici cognoscuntur ex colore nigro
 pendente in rubeum, & interdum est ve-
 rti sæx vini, vel sanguinis nigri conge-
 ti. Si est à caliditate humor magis lucet,
 magisq; foetet, & præcedit liquefactio hu-
 morum, & fluxus ventris virulentus & fe-
 res, &c. Quando fit à frigidityte, adsunt
 signa in contrarium, &c. Si proueniat ab
 apostemate rupto, primò præcesserint si-
 gna apostematis, sicuti grauitas, dolor,
 & febris continua. Si ab obstructione, præ-
 cesserunt signa obstructionis. Signa san-
 guinei fluxus ex hepate, sunt hepatis no-
 mēta præcedētia. Si à ruptura vene, præ-
 cessit casus vel percussio hepatis, sangui-

Z

nîsq; copia egredit, quæ nec facile, nec
 tim supprimi potest. Sanguis acutus cog-
 scitur ex ciborum acredine, & ex eo qui
 per loca dum transit, mordicat. Obstruc-
 tionis hepatis cognoscitur ex grauitate, tumo-
 re, &c. Signa lotiui fluxus cognoscuntur à cr-
 lo non probè digesto exeunte simili lotus
 carnis. Cognoscitur ab imbecillitate re-
 tentricis vel digestiua, ex caliditate & f-
 giditate in hepate contenta: nam à frig-
 iditate debilitatur digestiua siue alteratur
 à caliditate retentrix virtus. Signa fluxus
 foetidi sunt ipse foetor rei egredientis. Si-
 gna virulenti, sunt signa hepatis calidi si-
 cute subtili, & signa inflammationis he-
 patis liquefacientis. Signa substantiæ hep-
 atis exeuntis sunt nota, quoties res exierit
 similis est hepati, quod nil aliud est quàm
 sanguinis coagulum, nec diuidi potest, ne-
 in aqua solui sicut frustum sanguinis con-
 creti, &c.

Loci consentientes de signis.

Arcul. omnia hæc signa habet, & mult-
 plura quàm dixerim, 9. almanf. capit. pro-
 prio. Gale. 6. de loc. affect. capit. 1. Discerni-
 tur hæc à vera dysenteria, quia ab initio
 tenuis sanies sanguinis ab hepate reiici-
 tur: deinde aucto malo crassus humor foe-
 tibus vini haud absimilis. Præterea in iec-

nc

oris excrementis nihil abrasū expellitur, interim per duos vel tres dies euacuatio premitur, sed rursus redente malo excrementa prioribus multò peiora excernuntur, quod in intestinorum vlceribus haudquaquam apparet, &c. Paulus libr. 3. capit. 1. Si retentrix vel alteratrix imbecillis saepe eiusmodi descendunt, ut recens in s. caro lora esse videatur. Lege Aetiū de ic. re. & Alex. Cord. & alios neotericos.

De cura fluxuum hepaticorum.

Fluxus chylosus, si à nimia quantitate chyli proveniat, cibus detur in minori, quā state. Si fuerit nimium crassus vel viscosus, dentur attenuantia & incidentia, sicutius cicerum & decoctiones apertive cum dic. fœniculi, petroselini, &c. Si fiat ab hepatis parvitate, cibari debet frequenter cum cibis tenuibus, boni nutrimenti & paucarum superfluitatū, sed parū proce. Si fiat ab apostemate, tunc fiat diuerso & euacuatio cum sectione venæ, deinde topica suis temporibus congruentia adhibeantur. Si verò fiat ab obstructione vel debilitate attractoriæ facultatis, tunc res opus sunt intentiones: prima digestio, quæ fit cum syrupo de duabus radicibus, bintino. oxymelle simpl. syrupo de eupatorio, de cichorea cum Rheubarb. cum aquis

aperiētibus, qualis est aqua absinthij, foliuli, cuscuta, cichorij: quibus etiam interdum adhibemus syrupū de endiuia, ros. &c. Secūda est euacuatio, quæ fieri poterit cum rheubarbaro, agarico, pilulis de rheubarbaro, de eupatorio. Tertia est malæ compactionis derelictæ in hepate ablatio, quæ perficitur cum confectiōibus & electuariis, qualia sunt, diacalamentū, diacinnamon, theriaca, diacurcuma. Troc. de lacca, rheubarbaro, de eupatorio. Et in causa cæca, diarrhodon, triasandali cum semibus frigidis aperientibus, &c. Omnis præterea fluxus hepaticus siue à caliditate, siue à frigidityte productus, quatuor intētioribus curari debet. Primò regimine vitæ, secundò remouēdo causam ipsius fluxus, tertio roborando omnes hepatis facultates, quartò corrigendo symptomata. Regimen in fluxu chyloso erit ex calidis vel frigidis prout hepatis discrasia requirer: vt plurimū tamen ad siccum cum stypticitate aliqua temperata victus tendat. In fluxu bilioso regimen sit frigidum & humidum cum temperata stypticitate. In fluxu melancholico interdum ad frigidum, interdum ad calidum, interdum ad tenuitatē, interdum ad crassitiem, iuxta longitudinem & breuitatem morbi victus ordinetur, cū virtutis robo

robore. In fluxu lotiuo fit ex his victus qui
nutrimentum bonum paucarum superflui-
tatum inferat, facilisq; digestionis, sparga-
turq; vices. Causa fluxus remouetur in pi-
uitoso fluxu, euacuando primū humorem
pituitosum cum decocto iridis & myroba-
lanorum chebulorum, & educendo per vri-
nam cum dialacca & vino albo, &c. In flu-
tu cholerico euacuetur per cholagoga cū
decocto prunorum, tamarindorum, myro-
balanorum cit. rheubarb. &c. In fluxu me-
lancholico cum myrobalanis Indis, epithi-
mo, sena, in sero decoctis cum confectiōe
hamech. Et si multitudo sanguinis ad fue-
rit, fiat sectio venæ, & aperiantur hæmor-
rhoides & menstrua prouocentur: in fluxu
lotiuo educatur aquositas multiplicata per
eccessum, per urinam, per sudorem In fluxu
fætido procedatur, primū cū mundifican-
tibus & solutiuis, prout humor corruptus
exegerit, vtputa cū decocto hordei aut hy-
dromelle, oxymelle, &c. Similiter in viru-
lento mūdificetur virus cum decocto pru-
norū, tamarindorū, myrobalanorū cit. &c.
Roborantur facultates hepatis, & discrasia
frigida aufertur cum calidis temperatis,
quales sunt passulæ, phistici, auellanæ, cin-
namomū, hepar lupi, caro limatiarum, cro-
cum, &c. In causa calida cū endiuiā, cicho-

rio, semine sandalis, vino granatorū, aqua
 plantaginis, portulacę, cum camphora, &
 In melancholico cum syrupo de absinthio
 de eupatorio, de epithimo, cum diagala-
 ga, diacalamēto, theriaca, mithrydato, &
 In lotiuo, cum electuario de passulis Aui-
 & quibuscunque in capite debilitatis he-
 patis dictis. Corriguntur accidentia, ut
 adsit excoriatio, cum mundificantibus &
 abstergentibus, ut puta cum aqua horde-
 adipe renum caprę, albumine oui, & vite-
 lo, oleo violaceo, &c. Dolor auferatur cur-
 clysteriis modò abstergētibus, modò an-
 dinis, modò stupefacientibus, prout oppor-
 tunum videbitur, &c.

*Loci consentientes de cura flu-
 xuum hepaticorum.*

Auicē. 16. tra. 2. cap. 1. Iam sciuiſti cau-
 ſas fluxus hepatici, & ſciuiſti curam cuiuſ-
 cunque cauſę: oportet igitur ut redeas ad
 id, & cures malitiam complexionis eius,
 & apoſtemata, & debilitatem, & oppilatio-
 nem, & repletionem eius, ſcilicet vnum-
 quodque cum eo, quod dicitur in capi-
 tulo ſuo: & cū hac feceris, iam curasti.
 Lege Arcul. Gordon. Marcum Cat. Aetium
 & Paul. Aegin. & intelliges omnia.

Obſervationes in euacuatione.

Marcus Catin. Oportet cauere ne euac-
 uem

temus cum rebus nocētibz hepati, ideo
imur rheubarbaro in infusione.

Observationes in topicis agendū.

Auicē. 16. tra. 2. cap. de cur. fluxus hepaci, Et multoties linit insipiens hepar in ac assellatione cum inspissantibus sanguinem & extinguentibus hepar, per hoc iōd sunt frigida: & in hoc est mors & reparatio ad putrefactionem, &c.

Conferentia fluxui hepatico.

Conferunt fluxui hepatico bolum cyricum potum, vel per clysterem impositum emplastrum diaphiniconis, Mes. & uacunque suprà recitauimus, &c.

De prognōsticis fluxuum hepaticorum.

De fluxu chyloso loquitur Arcul. sic: Fluxus chylosus nisi pendeat ab apostemate, plurimum curatur. Hippoc. aph. 7. apho. 6. Quibus hepar aqua plenum in omentum eruperit, iis venter aqua repletur & moriuntur. Arcul. Fluxus cholericus perducit ad excoriationem & vlcera intestinorum, prout cholera erit magis vel minus acuta ac adusta, & curatur, nisi ab apostemate ortum habuerit. De fluxu melancholico lege aphor. 4. aphorif. 21. ibi, Deiectiones nigræ, qualis est sanguis niger, spontè venientes, siue cum febre, siue sine febre, pessimæ, &c. Et aphor. 4. aphorif. 22.

Morbis quibuscumque incipientibus si a bilis vel suprâ vel infrâ exierit, lethale. apho. 4. apho. 23. Quibuscumque ex morbo acutis aut diuturnis, vel ex vulneribus, si quovis alio modo extenuatis, nigra bilis, siue uti sanguis niger de subter exierit, perstridie moriuntur. Et apho. 4. apho. 24. Difficultas intestinorum si ab atra bile incipit, lethalis. Et apho. 4. apho. 25. Sanguis quidem suprâ, qualiscumque fuerit malus, infrâ autem bonus est. Arcul. Fluxus sanguinis nigri foetentis & sanguinis rubri est deterior, quàm fluxus nigri: alij vero fluxus si ab humoribus ortum habeant, plurimum curantur, si ab apostemate vel ulcere, nunquam aut difficulter sanantur.

Authores dissentientes circa fluxum hepaticum.

- 1 Adserere, in omni fluxu hepatico convenire styptica.
- 2 Adserere, in fluxu hepatico tenuem victum non esse exhibendum.
- 3 Adserere, fluxum hepaticum esse facilis curationis.

Confutatio dissentientium circa fluxum hepaticum.

Impugnat primum Avic. 16. tertij, de cura eius, ubi inquit: Illud quod cadit de errore in hoc est, ut dentur illi qui habet fluxum

xum

in hepaticum oppilatum, medicinæ
 instipatiuæ addentes in oppilationem,
 sem confortantes ut stringāt materiam,
 id ad errorem maximum perducit.

Ad secundum respōdet Conciliator dif-
 ferentia 202. dicens: Sunt quidam moder-
 orum qui in hac passione præcipiunt non
 se diætā tenuem exhibendā, cuius con-
 arium indicat Auicē. dicens, In assūm-
 one assellationis hepaticæ plurimū est,
 non appropinquet panis, quia hepār non
 recipit ipsum, imō rectius est, ut sit cōten-
 is aqua sauc bis in die, &c. Igitur iuxta
 conciliatorem & Auicē. tenuis victus con-
 enit, & non e contrā, &c.

Ad tertium Haly abbas 7. practicæ, Dy-
 enteriæ hepaticæ medela perdifficilis est,
 perpauci liberātur ab ea. & subdit, Mul-
 ti enim parum cognoscunt hepatis debili-
 tatem & eius causā. Galenus 5. de loc. aff.
 uosdam cognouisse ait, quibus fluxus he-
 paticus acciderat ex debilitate hepatis, &
 eruisse ex pauca curatione. Prætereā au-
 thores succinctam huius morbi causā
 de circo scribunt, quia parum fidunt de eius
 alute, & sic potius est incurabilis, quā
 curabilis, &c.

De tinesmo, id est intestinali fluxu.

Tinesmus, est mala recti intestini dispo-

fitio, in qua egerendi prompta quedam cupiditas cum gemitu ac conatu ægri ad paucis admodum sequentibus excrementis muscosis ac sanguineis. Hic duplex, verus & mendosus. Verus, quum causa sui recto intestino affixam tenet. Mendosus, quum causa non est fixa, sed aliunde niens eum producit, sicuti materia flux per intestina ad anum, &c.

Loci consentientes de tinesmo.

Galenus lib. finit. med. Tinesmus est dispositio recti intestini ad partes inferiores pertinens, in qua impetus cupiditatisque desidendi plures, sed paucæ excretionem sequuntur, &c. Aet. ser. 9. capite 43. Tinesmus est egerendi promptitudo, quæ differri deuitari non potest, nihil tamen præterquam pauca cruentum aspectum habenti propellens, &c. Lege de hac re Paul. lib. cap. 41. Et Galenus 6. de loc. affect. cap. 1. ibi. At vlcera quæ recto intestino oriuntur, &c. Lege etiam Mar. Cat. & Arcul. Auicen. 16 tra. 2. cap. 16. Primum oportet te scire in dispositionem tinesmi, an sit tinesmus verus, an tinesmus mendosus, &c.

De causis tinesmi.

In genere considerandum, num causa in longanone existat vel à supernis partibus descendat. Si causa erit fixa in recto intestino,

no, tunc erit vel inflammatio, vel vlcus
 erodens, vel fistula, vel occultæ hæmor-
 roides, vel ragadiæ, vel abscessus durus.
 verò à supernis partibus defluat, vel erit
 humor impactus pungens ac stimulans, ut
 tuitosus, falsus, biliosus, aut atrabilaris
 lustrus: vel erunt cibi acuti, falsi, viscosi,
 vel pharmacum acutum mordax, aut sup-
 positorium acre, vel mala intemperies fri-
 gida absque alio complexu, &c.

Loci consentientes de causis tinesmi.

Paulus libro 3. cap. 41. Causa tinesmi est
 inflammatio in longanone facta cum molli
 et laxo tumore, quod œdema vocant, quæ
 mercurio insidentis suspicionem præbet,
 quod exitum quærat. Auicennas 16. tra. 1.
 et causa Zair, id est, tinesmi, aut est aposte-
 ma calidum aut durum, aut mollificatio
 incerti, aut tensio, ex qua lacertus impedi-
 tur ab operatione sua, aut superfluitas sal-
 is, aut baurachia, aut chylus grossus, aut
 cholera ingrediens, aut frigus adueniens,
 aut longitudo sessionis super durum, aut
 rarsities fæcis, aut eius durities, aut hæ-
 morrhoides, aut fistula, aut ragadiæ, aut ru-
 gitus, aut corrosio, aut grauitas sensata, &c.
 lege etiam Arcul. & alios, &c.

De signis tinesmi.

Signa quòd adsit tinesmus sunt desiden-
 di

di cupiditas cum conatu ad excernendum
ubi primum pingue, deinde muscosum
cruentum egeritur. Signa inflammation
vel abscessus sunt, grauitas, dolorq; con-
tinuus, qui nec emissionē stercoris remou-
tur, excrementaq; difficulter excernuntur
mollientia & anodina valde conferūt, ali-
in contrarium ludentibus. Signa vlcer-
sumuntur à præcedentibus rebus, vt ab hu-
moribus vlcérantibus, sicut in dysenteria
aut à fluxu flauo, prasino, & nigro præce-
dente, aut ex abscessu ad vomica deuenien-
te, aut ex pharmaco exulcerante iam al-
sumpto. Signa fistulae & hæmorrhoidarum
vel ragadiarum cognoscentur ex his qua
suis in locis dicentur. Signa humorum sunt
quia si à bile efficiat tinesmus, cognosce-
tur ex victu præcedente, bile multiplicat, & ex
aliis bilem indicantibus, sicut ex punctione
in recto intestino, ex flauis excrementis, &
q̃ à calidis læditur, &c. Si pituita, cognosci-
tur à pituitosis excrementis, à pruritu in in-
testino recto, & ab aliis pituitam indicati-
bus. Si ab intemperie frigida absq; alio cōple-
xu, aderit desidendi voluntas & conatus ad
excernendum, sed nihil egreditur, à calidis
deinceps iuuatur. Si à flatu incluso, tūc in-
diciū erit, quod emissio flatu statim ti-
nesmus cessat, & retento augetur, &c.

Loci

Loca consentientes de signis tinesmi.

Aetius ser. 9. cap. 43. In principio si gradistensionis sensus circa imum vētrem est, & maximè circa partem dextram, constare oportet stercorū multitudinem in eo intestino insitam esse, &c. Galenus illa alia signa ponit præter quædam communia, quæ sunt desidendi cupiditas cum natu ad excernendum, ubi primò pinne, deinde cruentum egeritur, &c. Avicennas 6. cap. 3. multa signa affert, ibi: Tinesmi autem diuisiones significant id quod creditur, &c. Vide in hoc Razen 8. comment. & Arcul. 9. Alman.

De curatione tinesmi.

Si causa tinesmi fuerit bilis vel pituita, tunc clysteriis lauatiuis indiget: sed primum prohibeatur causa antecedens cū diuersionibus & euacuationibus, deinde causa coniuncta remoueatur cum clystere aqua hordacea zuch. & vitellis ouorum causa calido parato, aut in frigida, cum modomelle, aqua cicerum, sero capri, &c. Quòd si ab inflammatione vel ab abscessu fieret tinesmus, considerandum num per viam defluxus fiat, & tunc prius causam euacuatione & diuersione, si opus fuerit, amputabimus. Euacuatio fiet

fiet per sectionem venarum vel cum phar-
maco leniente. Diuersio fiet cum urina-
m sudorem prouocantibus, cum cucurbitu-
lis, frictionibus, &c. In causa coniuncta
fuerit calida, in principio repellenda
cum anodinis, ut cum oleo rosaceo, mi-
nthino: & in causa frigida, cum oleo can-
millino, anethino, sycamino. In augmen-
tatione repellentibus calida resoluentia & em-
ollientia addantur, quale est oleum liliorum
alborum, adeps renum caprarum, bdellii,
butyrum. Quod si ab ulcere fiat tinea
tunc eductis primum si quæ fuerint fac-
ibus, vlcus abstergatur cum hydromelle
vel rhodomelle: vel si putredo cogat, add-
atur aqua salsa, vel decoctio aluminis, qu-
bus interdum addi potest vnguenti Aegy-
ptiaci vncia vna: quo deinde repurgato
tunc his, quæ ad cicatricem perducunt
opus erit. Si verò fiat à facibus siccis, cure-
tur cum emollientibus sæpe reiteratis. Si
mala intemperie frigida, cum calefacien-
tibus tam in victu, quàm in medicamine
exhibitis. Si ab intemperie calida, cum re-
frigerantibus anodinis. Si à flatu, per ea
quæ flatum resoluunt. Quod si dolor ma-
gis urgeat, nec per anodina cessare velit,
tunc urgente necessitate ad soporifera ve-
niendum, inter quæ laudatur supposito-
rium

um de licio, filo tamen appensum, vt ad
bitum possit remoueri, item anathasie
licolai 3 j. & c.

Loci consentientes de cura tinesmi.

Aetius ferm. 9. cap. 43. Si impacta fuerit
ercorum multitudo in cæco intestino, tol
nda erit cum emollientibus clysteribus,
furfurum decocto, fœnugræci, melle,
leo, & c. lege eum fusiùs. Auicenn. 16. tra. 2.
ap. 16. Si fuerit fæx sicca, cura cum clyste
ribus lenitiuis. Si fuerit caliditas, indige
is eis quæ sunt cassia, fistula, & syrupus
iolaceus. Si fuerit causa frigus adueniēs,
um potionibus & clysteribus calidis, & c.
it si fuerit causa apostema calidum, stude
a retinendo id quod currit ad apostema,
curetur in principio sui cum phleboto
nia, & cum minoratione cibi, & c. lege
um fusiùs: lege etiam Arcul. 9. Almanf. &
Marc. Catin. & reliquos practiçantes. Sera
io, Cura tenasmonis vertitur ad causam
& ad morbum. Ad causam triplex inten
io: Prima, prohibitio materiæ imbibitæ
n intestino. Secunda, eius resolutio. Ter
ia, est sedatio acuitatis materiæ, & æqua
io malę complexionis eius, & c. Razes lib.
liuif. cap. 72. In fine, inquit, iuuantur ha
bentes tenasmonem suppositione collyrij
plusquam reliquis curationibus, & c.

Obse

Arcul. 9. Alm. Clysteria communiter ebent esse paucæ quantitatis, vt decem vel duodecim vnciis: nō enim oportet vt trans- eant vltra intestinū rectum, & cū hoc r- lius retinentur. Item collyria sint vsque ad digitos septem. Auic. 16. tra. 2. c. 16. Et scilicet quod frigus facit tenasmon in pluribus horis. B. Quia materiam frigidam siue- lidam impingi illic cogit. Arc. Sint omnia cibaria humida, insipida, paucæ dulces, vitetur sicca, amara, acris, salsa, acrisa, & quæcunq; faciem exiccant & exas- rant. Vide Auic. ibi, Et quū cum cibis, &

Inducentia ac conferentia tinesmo.

Inducunt tinesmum, colocynthis, ephorbium, sarcocolla, scamonium. Conferunt tinesmo adeps porci, capræ clysterzatus, balauſtia, bdellium, brassica, cauc equina, colophonix suffumigiū, scœnugraecum, ferruginis cum aceto suffumigiū gummi Arab. ius galli veteris, pisciū, charabe lacasini, litium, lini semen coctū cum oleo ros. malua meu, eneasma, nasturtium myrrha cū olibano & croco, oleū persicorum, origanum, pini cortex, porrum, psyllium, sauina, spica storacis, suffumigiū phlomos, therebentina, ruta, confectio de storace Mes. electuarium nigrum Haly 16. ant

et Micleta Auic. 4. 5. Troc. de Almeze-
on, de balauſtij Auic. 8. quinti, &c.

De prognosticis tinesmi.

Razes 8. commen. Tinesmus plurimum
post dysenteriam, & quod non fit post
dysenteriam est leuioris curæ: idem adse-
c. Auic. dicens: Facilius est id quod nō suc-
dit dysenteria. Hipp. aph. 1. ἐν γὰρ τῇ ἐξέσει
μυῖος ἐγγύγωνος ἐκτρωσιν ποιεῖται. id est, Mu-
erem in vtero habentem tinesmus inna-
tis abortire facit, qui aphor. tantum in
translatione Constantini inuenitur, nulla
ec à Theodoro, nec à Leoniceno facta
mentionem. Auic. 16. tract. 1. cap. 2. Et singul-
is quum accidit habentibus fluxum ven-
is, & propriè habentibus tinesmum, est
significatio mala, significans siccitatem fa-
entem arefactionem, &c.

De doloribus in genere.

Altius nunc exordiar de doloribus in ge-
nere aliquid demonstrans: deinde ad mor-
um colicum me conferam. Dolor est tri-
is sensatio à subita ac violēta mutatione
acta, & tantūmodo ad tactū, & non ad aliū
sensum. Dolorum igitur differētię sumun-
tur à loco, vt si dolor sit in omnibus inte-
linis, vel in eorum parte. Si verò sit in o-
mnibus, tunc erit vel cū motu, vel cū quie-
te. Si cum motu, erit tertio: si cum quiete,

A 2

vocabitur nomine generis, dolor. At si
in parte, vel erit remissus, & vocatur
Auicenn. punctio, vel intensus, & in cras
intestinis, & erit colica dispositio. Sin
gracilibus, erit ileus siue voluolus. Rursus
dolorum species sunt sex, scilicet punctu-
ria, grauis, stimulans, extensiuus, pulsati-
& ulcerosa. Punctorius dolor circa me-
branas potissimum consistit. Grauis circa
hepar, lien, renes. Stimulans circa parte
ossibus vicinam, & in cute fieri potest. Ex-
tensiuus pertinet ad partes, quibus nullae
sunt arteriae, ut membranae, cutis, adens
quibus nullae insunt arteriae: nam infla-
matae extensiuo tantum dolore vexantur.
Pulsatilis circa ipsas arterias vel in par-
tibus ipsas continentibus, & in inflamm-
tionibus consistit. Ulcerosus non solum
cutem sed ad imas quoque partes velut
ossa extenditur.

Causae horum sunt, quia punctorius, ul-
cerosus & stimulans fiunt à bilioso vel pi-
tuitoso humore falso, aut à corrupto san-
guine, aut à vermibus suis aculeis punge-
ntibus, aut à quopiam ulcere. Grauis verò ex-
tensiuus ac pulsatorius à materia pituito-
sa, crassa, vel ab atra bile grauante & exten-
dente, vel à flatu incluso, aut à copia alicu-
ius materiae extendentis, &c.

Loc

*Loci consentientes de doloribus
in genere.*

De diff. doloris lege Gal. 12. meth. cap. 7.
Im de elementis primo. Itē in lib. de pla-
tis Hippoc. & Platonis. Quod ad sensum
pertineat, lege Gal. in lib. de cōst. art. med.
c. 8. Item de inæquali intemperie cap. 3.
Im 3. de sympt. diff. cap. 3. De diff. dolo-
re Auic. Arcul. & plerisque alios practi-
cantes. De speciebus dolorum, lege Gal. 2.
de loc. aff. cap. 3. 7. & 8. vbi loquitur de mor-
bo colico.

De dolore colico.

Morbus intestini plenioris, quem Greci
colicon vocant, nihil aliud est quàm dolor
invisibilis intensus in intestinis crassis, maxi-
me in colo vocato, cum quo ea quæ à
superioribus ad inferiora expelluntur, difficul-
ter exeunt, vt sunt humores, excrementa,
vermes, flatus.

*Loci consentientes de dolore
colico.*

Gal. lib. finit. med. Colica dispositio est
constitutio plenioris intestini diuturna, in
longo spatio temporis interiectis cruciatus
intolerabiles, difficultates spirandi, su-
dores, perfrictionesque adoriuntur. Aui-
cenna. 16. Tract. 3. cap. 6. Colica est passio
longa, intestinalis, dolorosa, cum qua

fit difficilis exitus eius quod egreditur
per naturam, &c.

De causis dolori.

Causæ vel per se, vel per cōsensum fiunt.
Per se binæ sunt, altera à mala intem-
perie cal. frig. sicca, nō autem humida, quæ
per se dolorem non efficiat: altera à solu-
continuitate. Intemperies calida dupli-
ter colicam efficit, vel nimis calefaciend.
vel nimis resoluendo & faeces exiccand.
Frigida vel obstruendo, vel facultatem e-
pulsoriam imbecillem reddendo. Solu-
continuitas fit ab incisione, exesione, fr-
ctione, tensione, & tunc vel ab humo-
acri, vel multo, vel flatu, vermibus & a-
fcessu. Causæ per cōsensum fiunt vel à ve-
triculo humores vel flatus aggregante, v-
ab hepate, vel liene, materias ad intestin-
expellente, vel à renibus lapidem patien-
tibus, vel à vesica, aut vtero abscessum p-
tiente, aut à toto, sicuti in febribus, quæ
ex venis ad intestina humores extrudun-
tur, &c.

*Loci consentientes de causis
doloris colici.*

Gal. 12. meth. cap. 7. Porro naturalis no-
titia nos docet, vitiū id corporis ex quo si-
doliturū aut cōtinuitatis diuisionem esse
aut alterationē aliquam. Primū illud spe-
culat

dabimur, cuiusnam naturæ esse debeat,
 quod continui tatē soluit: necesse igitur est
 quod sit vel ructio, vel contusio, vel erosio,
 &c. Et in art. med. cap. de sig. Thorac. Do-
 lores quencunq; obsederit locum, aut conti-
 nuitatis solutionem, aut subitam altera-
 tionem ostendit, soluitur cōtinuitas inci-
 sione, exesione, fractione, tensione: altera-
 tur substantia à caliditate, frigiditate, &c. le-
 getiā Gal. 2. de loc. aff. c. 5. Paul. lib. 3. cap.
 7. Dolores grauiissimi fiūt plures ob cau-
 sas: vel enim à crasso & pituitoso humore
 intra venas subsidēte, vel à spiritu crassi o-
 flatuosoq; exitum nō habēte, aut ab in-
 finiti inflammatione, vel ab vlceribus ac
 mordacibus succis infestantibus, &c. Lege
 his Galen. 4. de loc. aff. cap. 7. ibi, Plures
 sunt dispositiones, quas per vehemētes mo-
 dus dolor comitatur, &c. Et Auic. 16. tra. 3.
 cap. 8. has causas etiā enumerat, & multifa-
 ctā obstructionem, ex qua fieri colicā asse-
 rit. Vide illum fusiū. Vide etiam de causis
 spiritus flatuosi. Gale. 12. meth. cap. vlt. vbi
 duplici causa fieri inquit, &c.

De signis doloris colici.

Indicia incipiētis colicæ sunt, quia pri-
 mū minimū quid excernitur, cōsuetudōq;
 excernendi variatur, appetitus minuitur:
 tū verò ad incrementum tendit, dolores

crescūt, alius siccior euadit, ita vt flatus quidem egredi possit. Vigiliæ sitisq; multiplicantur, & si quid excernitur, simile bulo stercorei cernitur: quum verò ad fa- tem tendit, excrementa ac flatus exire i- piūt, dolor de loco ad locum mutatur, adeò frequens est, sed per enæmata rem- titur. Si vero ad mortē tendat, dolor est ten- sissimus, nō minuitur, non remittitur, nil excernitur, vomitus ad vomitum sue- dit, sudor frigidus apparet, &c. Signa i- stinguentia colicam à nephrit sumuntur quantitate, à loco, à motu, ab exeuntib; à causis præcedētib; à quantitate: quon- nephriticus dolor paruum occupat spaci- colicus quàm maximum: nam totum ve- trem & stomachū obtinet. A loco, quon- nephriticus in renibus, colicus paulò al- ri loco continetur. A motu, quoniam col- cus ad plures partes mouetur, nephritici- fixus ac immobilis permanet. Ab exeunti- bus, quoniam in colico fæces retinentur sed non in nephritico, verum arenosa ma- teria in vrinis apparet. A causis præceden- tibus, quia in colico deicitur appetitus nausea & vomitus fiunt grauiore: sed in nephritico non ita, sed præcessit vrina ar- nosa vel crassa. Signa interstinguentia co- licum à dolore vteri sunt, quia ad inferio-

velut ad pubē & coxas dolor vteri, sed colicus ad superiora magis tendit, item in dolore vteri præcesserunt mensiū suppressiones, & si aluus leniatur, ac fæces educantur, nō cessat: at colicus habita sede placatur. Item in dolore vteri mulieres suffocari videntur ex vaporibus eleuatis, quod colicæ non accidit, &c. Signa humorū colicæ sumuntur ab ætate, regione, tempore, ictu præcedente & similibus. Signa pituitosæ colicæ habentur, si victus pituitā generās, si senilis vel puerilis ætas, si hyems, si regio frigida & humida præcesserunt, si satietas, cruditas, ocium, si adsit grauitas, si obtusus dolor, si longioris moræ absque dubio colicā pituitosam esse cōiicies. Caueamē ne interdum ex siti & inflammatione & vrina rubea decipiaris, tanquam colicam calidam putans, vt inquit Auic. quoniā illud commune est omnibus colicis. Signa latuosæ colicæ sunt, quia præcesserūt causæ flatus, sicut porus aquæ frigidæ, holera, fructus, ruētus, extensio, nulla adest grauitas sicut in pituitosa. Interddum etiam inflatio manu pereipitur, nec egredientibus humoribus dolor mitescit, eò quòd in tunicis crassus flatus retinetur. Signa colicæ ab inflammatione sunt, tumor, durities, tēsiua, dolor cōtinuus extendēs, grauis perma

nans ac pulsans, febris acuta, sitis, vigil,
& interdum vrinae retentio: similiter cu
stercore ob ascessum vias comprimente

*Loci consentientes de signis
doloris colici.*

Gal. 2. de loc. aff. cap. 5. Protinus affectu
colo inflatio quædam & extensio, & flatu
complures, & tormina, & excrementa si
tibus plena videbuntur, quæ stercorei bul
lo simulentur: quin etiã cibi tum cupidita
tum concoctio deterior euadit, &c. Leg
Auic. 16. tract. 3. cap. 7. vbi de signis colicis
absolutæ agit, & inuenies quæcunq; à n
sub breuitate enarrata sunt. Lege etiã R
zen in 9. almanf. cap. de doloribus ventri
& ibi etiam Arcul. Gale. 6. de loc. aff. cap.
& 2. ponit signa interstinguentia colicum
à nephritico, ibi, Primum vomitus & nau
sea urgent, sed grauiore, & magis assidui
dolente colo, &c. Lege etiam Auic. 16.
tract. 3. cap. 10. Paul. lib. 3. cap. 43. Qui ex
humore pituitoso laborant per totum ab
domen, ac si pertunderetur colon, in alto
excruciantur: ad sunt tormina, ructus, nau
sea, vomitus potissimum pituitæ, aluus re
tinetur: præcessit continuus ciborum fri
gidorum crassique succi usus, satietas, cru
ditas, ocium, &c. Lege Auic. 16. tract. 3. cap.
11. ibi, Quandoq; significat colicam phlegma.
antec

atecessio causarum phlegmatis ex satietate nauseatiua, & ex speciebus ciborum, ætas, & regio, & hora & .Lege Gale. 12. meth. cap. vlt. nam multa indicia declarat, in curam aggreditur.

De cura doloris colici.

Omnis dolor in genere curam admittit simpliciter: primò remouēdo eius causam, nam ablata dolor euanescit, sed quia in ablatione causæ plura requiruntur, ut sunt humorum præparatio, reuulsio, resolutio, & evacuatio, quæ moram ad longum tempus trahunt, idcirco alia insurgit curandi intentio, quæ est doloris remotio cum anodinis ex caliditate ac humiditate temperata constantibus, ex quibus plerunq; mala inæperies illius mēbri aufertur, quibus etiā non proficiētib; tertia medēdi intētio oritur, quæ dolorē cū narcoticis mēbra stupefaciēdo remouet, aliis præsertim non iuuantibus. Si igitur inducias dederit dolor, ab ablatione causæ incipiemus: si minus, sed intēlissimè, ægrū cruciet, cū secūda intētio ne procedemus, scilicet cū anodinis dolorē mitigātib; quæ tū intrinsecus cū extrinsecus applicari possunt: in quorū numero laudātur enæmata anodina & lenitiua, sicut ex decocto camomillæ, anethi, melliloti, semine lini, fœnugræci, maluæ, althea cū

vncia cassiæ extractæ, & tantundem zuchari cū oleo de semine lini, butyro &c. Cōueniunt etiā iura pingua cū croco, aqua decoctionis camomillæ, &c. Extrinsecus conueniūt iunctiōnes, cataplasmata, fots, balnea, quæ parari possunt ex oleis camomillæ, anethi, &c. cataplasmata ex rebus anodinis, &c. quæ omnia nisi contulerint, ad narcotica transeundū, inter quæ debilior est egerthea, quæ stupefacit & resoluit, patū validior athanasia, valentius est philoniū. A proprietate curant colicam, stercus lupi, ossa mespilorum, castoreū, lumbrici terrestres puluerizati. Cura colicæ pituitosæ quinque intentiones requirit: prima est ventris lenitio, secunda est humorū digestio, tertia est euacuatio, quarta residui resolutio ac mēbrorū roboratio, quæ intētiōnes non solum in pituitosa, sed etiā in biliosa & melancholica cōducūt. Vētris igitur lenitio perficitur per leniētia, qualia sunt clysteria cum cassia, zucharo, hiera simpl. &c. Digestio fieri potest cum syru. de duabus rad. bisantino, oximelle simpl. & rhodomelle, modò materia sit viscosa ac crassa. Euacuatio perficitur cum hiera simpl. cum diaphinicone, &c. Et nota quòd materia in viis ductuum existens, absque alia præparatione euacuari debet, iuxta duo carmina

mina à Iacobo Foroiulienſi poſita, quæ ſunt,
Synocha cum colica phrenesi ſquinantia
& anthrax,

Materias crudas euacuare iubent.

Reſolutio reſidui ſit cum oleis ruta, lilio-
rum alborum, camomilla, in quibus con-
cocti ſint cymium, fœniculum, abrota-
num, pulegium, aniſum, &c. vel fiat cū ele-
ctuariis calidis, ut cum diamuſco, electua-
rio de baccis lauri, aromatico roſ. diagalā-
ga, diacymino, &c. Cibaria ſint in colica le-
nientia ac roborantia ob appetitus imbe-
cillitatē, ſintque calidiora & ſicciora in fri-
gidis doloribus, qualia ſunt porra & allia:
ſed ab initio morbi ieiunare oportet: in
ſequentibus diebus cibaria ſint boni ſucci,
vitentur cruditas & ſatietas. In doloribus
à materia acri, victus ſit humidior & frigi-
dior, vitentur acria tam in cibo quā in po-
tu, vitentur etiam in genere omnia holer-
ra, legumina, graueolentia, &c. Conueniūt
aqua carnis, vitelli ouorum, medulla panis
in vino carica & paſſula, &c. Cura ſæcum
ficcarum perficitur cum lubricantibus ac
mollientibus, ut cum clyſteribus ex camo-
milla, anetho, althea, violis, fœnugræco,
cum oleo amygd. dulcium, butyro, &c. vel
cū iure galli, in quo coquantur tamarindi,
ſebeſt

sebesten, &c. Cura inflammationis in colico est, ut primum sanguis mittatur à vena: secundo considerandum, num inflammatio ad suppurationem vel ad resolutionem tendat. Si ad resolutionem, in primis recutientia in incremento, resoluentia cum percussivis & mollientibus, in statu, discutientia cum mollientibus conveniunt. Si ad suppurationem, tunc suppuratio adjuvanda, deinde ad vomitum irritanda. Quæ rupta abstergentibus primo, & lenientibus, deinde de conglutinatione indiget.

Cura flatuosa colicæ consistit tantum in resoluentibus flatum, qui si habeat materiam fouentem, frigidam, obstruentem primo abstergentibus lenientibusque clysteriis, deinde incidentibus ac attenuantibus: & de obstruentibus indiget, quibus peractis educatur materia fouens, deinde resoluatur flatus.

*Loci consentientes de cura
doloris colici.*

De cura in genere lege Arcul. & Mar. Cat. De cura pituitosa colicæ lege Galen. 12. meth. cap. 8. ibi, Dolores igitur, quos humor crassus excitauit, &c. Et de cura biliosa, ibi, Si mordens humor sit qui affligit, &c. Et de cura ex inflammatione facta, ibi in eodem loco, Si sanguinis abundan-
tia

fit, quòd distendat, veluti in phlegmo-
 fieri solet, protinus vbi vires agri va-
 ntes fuerint, sanguis mittendus est, &c.
 de cura flatuosa etiam mentionem facit,
 i, Pari rōne qui ex flatuoso spiritu, &c.
 ic. i 6. tra. 4. cap. 2. etiam curā habet ibi,
 ratio vera est incisio causæ, &c. Lege
 ul. & Aet. fusius de hac re. De cibariis lo-
 nitur Auic. i 6. tra. 4. cap. 28. & 27. ibi, Co-
 si indigent cibo leniente & roborāte ob
 becillitatem appetitus, &c. Lege etiam
 ul. lib. 3. cap. 43. ibi, In doloribus frigi-
 s victus sit calidior & siccior, & per ini-
 a morbi à cibo abstinēdum: deinde acia
 sumantur, vt porra & allia, in sequētibus
 ut boni succi, concoctu facilia, &c. lege
 et. ser. 9. cap. 30. particularē de victu men-
 onem facientem. Lege etiam Razem in
 uis. ibi, Quum sedatur dolor, &c.

Observationes in victu.

Auic. i 6. tra. 4. cap. 1. In regimine colicæ
 interdicitur repletio, & si qua sit, per vom-
 um expellatur, item sitis toleretur, aut si
 abstinere nequeat, bibat parum, &c.

Observationes in curatione.

Marc. Cat. Oportet aduertere ne differa-
 tur cura colicæ, quia est dolor intentissi-
 mus, citò virtutem prosternens, &c.

Obfer

*Observationes de solventibus
pharmacis.*

Auic. loc. cit. Cauendum ne in principio pharmacum valde solutium exhibeatur, nam humores & schibalæ sunt plutes, fortè penetrare nō possunt, sed incipient à lenientibus ac lubricantibus, & c. 2. In talibus casibus medicamenta valde soluent exhiberi debent. Primus, si materia ante dens in coniunctam causam transeat, ut à venis ad intestina. Secundus, si humor adeò crassi existant, qui nec clysteriis, v. leui pharmaco educi possint. Tertius, si v. que adeò vehemens sit obstructio, ut null pacto per prædicta aperiri possit: item nullo modo hieræ addatur agaricus, nam fac eam retineri & profundari, & c.

Observationes in clysteribus.

Auic, loc. cit. Debemus esse contenti de clysteribus, quoniam à longinquis partibus non attrahunt, nec humores commouent, nec febrem excitant, sicut pharmaca solutiva: præterea clysteres absque nocu mento reiterari possunt. 2. Si clysteres acuti non soluunt, supersedendum donec concocta sit materia: quandoque enim hepatis, cordi & capiti sua acredine nocent. 3. Non fiant clysteres, si quid crudi fuerit in vètriculo, ne ad inferiora trahatur: & hoc aduer te

propter eos, qui in omni colica & in omni
 bus horis enemata imponi iubent. Mar.
 cat. Si in intestinis causetur excoariatio, nō
 debemus fortia & acuta clysteria admini-
 strare: sed loco eorū lauatiua, & dolorem
 allentia. 2. Quòd æger se taliter debet fi-
 gere, vt clysteria declinent ad locum dolo-
 ris. 3. Quòd reiteranda sunt pluries. 4.
 Quòd suppositoria debent esse longa ad
 mensuram septem digitorum, vt virtus
 eorum possit longius communicari, &c.

Observationes de narcoticis.

Mar. Catin. Non debemus narcotica à
 incipio approximare, sed quādo alia nō
 efficiūt: quia ex his materia in frigidatur
 in crassatur, si fuerit frigida, si oppilati-
 ta, magis oppilabitur: si ventositas, magis
 crassabitur. Hoc idē sensit Gal. 12. meth.
 p. 8. ibi, Cauendus est magnopere in affe-
 ctibus qui à crassis & glutinosis humori-
 bus sunt, &c. Item dixit quòd extrinsecus
 non adhibentur, & si intrinsecus præbean-
 tur, sint bene rectificata, &c.

Observationes de balneis

& fomentis.

Auic. 16. tra. 4. cap. 1. Cauendum ne caput
 apores balneorum & fomentationū susci-
 piat, & hoc cū frigidis applicitis Mar. Cat.
 Non debemus vti fortibus calefactiuis,
 neque

neque fortibus resoluentibus, vbi stercus
pletio materierum: nam augent dolore,
& materias crassas subtiliant, & in veni-
tatem conuertūt, nec competit remedium
de allio à Gal. 7. meth. cap. 15. descriptum,
nisi sit minorota materia.

*Nocentia & conferentia do-
lori colico.*

Inducunt colicam aqua aluminosa, ci-
ta animalium, caseus, vsus citri, cito-
pontica, cucurbita, faba, fungi, granatū
uestre, lac omne, melones, menta, hord-
pyra, tubera, &c. Conferunt ad colicā an-
gdalæ amaræ & dulces, apiū, betonica,
lamentum, chamæleonta, cartamus, ca-
posia, casia, fistula, cētaurea, colocynth,
enula, esula, euphorbium, galanga, gale-
ta, auis carduelis, gith, ius galli decrepi,
hyosciamus, laurus, limaciæ, matricari-
myrobalani, chebuli, nasturtiū, ozimur-
cyclamē, polypodium, radix piperis, rut-
sagapenum, sisamum, stercus canis, capræ,
lumbi, lupi, porci, vrtica, aqua mellis fe-
rea, diaphinicon, electuarium de baccis la-
ri, diaprasium Nic. diacitoniten laxatiui
diaciminū, electuarium indum, elefcopl-
phylonium Rom. oleum de carthamo, la-
rinum, rutaceum, de piperibus, nardinum
liliorum, pilulæ iliacæ almās. foetide ma-

ione

res Mes. sagenea Auic. theodoricon ma-
gum Auic. theriaca magna, troc. de vio-
lac. troc. de epithimo.

De prognosticis doloris colicis.

Hippoc. prognost. 2. cap. 13. Dolores qui
in febre affligunt circa lumbos & infe-
riores sedes, si præcordia attigerint, inferas
res relinquētes, exitiales admodū sunt:
Id cōsideranda sunt alia signa: nā si quod
viciū prauū fuerit, desperandus est eger.
Intellige de his quæ symptomaticē mo-
ntur ab vna parte ad aliā. Hippoc. aph.
apho. 6. Quicumque dolētes parte aliqua
corporis dolorem non sentiunt, iis mens
grotat. B. Id est, quicumque dolet, & dolo-
ris qualitatem non sentit, hic sensu ægro-
tatur: non refert si sensum vel *γνώμην*, vel ani-
mum dixeris. Et apho. 6. aphor. 7. Dolores
vnteris sublimēs, leuiorēs: qui verò non
sublimēs, fortiorēs. B. Nota non secūdum
corporis longitudinem intelligi Hippoc.
sed secūdum profunditatem, id est, nō se-
cūdum infimā & supremam corporis par-
tem, sed secūdum exteriorem & interio-
rem, &c. Et aphor. 6. apho. 40. Quibus do-
r circa præcordia fit absque inflammatio-
ne, iis febris superueniens morbum soluit.
Et aphor. 7. aphor. 26. In forti dolore vnteris

B b

partium extremarum frigiditas, malū. Frigiditas fit vel ab inflammatione, vel caloris innati defectum (deficit calor quia extinguitur, vel quia à multitudine suffocatur) vel ob dolorem vehementē diaphragmatis corporis partes occupantem, ad quam natura contracta cū sanguine partes externas tanquā exangues relinquit. Et aphor. 22. A ventris dolore diurno supratio. Et aphor. 4. aphor. 11. Quibus torina & circa umbilicum labores & lumbodolor, qui neque medicamento, neque alter soluitur, in aquā intercutem siccā immatur siue *isoperari*. Gal. 12. meth. cap. v. Colica quæ à siccitate contingit, insanalis est: cuius rationē postea ipse reddit: lege eum. Auic. 16. tra. 3. cap. 8. & 9. Si colicū erit incolumis retentio, non erit vehemē & dolor mutabitur, & patiens ex administratione clysteriorum ob exitum flatus excrementi quietem inueniet. Si verò fuerit mortalis, aderunt fortitudo doloris, vomitus, ad vomitum, sudor frigidus, extremitatū frigus, rationis turbatio, spasmus & retentio excrementorum: & si vestigiū nigrum, vel bothor apparuerint, postridie moriuntur, &c.

De ileos.

Ileos, quem Latini voluulū vocāt, est tenui

uium intestinorum dolor vehementissimus, cum quo excrementorum per seces in difficilis sit exitus, &c.

Loci consentientes de ileos.

Gal. aph. 6. com. 44. Ileos est intestinorum uium passio, in qua ob interclusam inferiorem viam nulla excrementa inferius cernuntur. Aet. fer. 9. Voluulus est intestinorum affectio lethalem dolorem inferens. Gal. 6. de loc. aff. ca. 1. Hunc ileon, id est, voluulum vocant, nonnulli etiam chordapson, quum scilicet tumor aliquis eminet tenuium intestinorum parte, ut videatur intestinum chordarum similitudine conuolutum. B. Chordapson ab Aet. exponitur intestinorum emollitio, quæ fieri dicitur, quomodo adnota manu durities tactui succumittitur: sed quoniam emollitio, si durities adsit, intelligere nequeo, Galeni expositio mihi magis placet. Vocatur etiam hic morbus à selso chordios.

De causa ileos.

Causa ileos est intestinorum vel obstructio, vel retentricis facultatis fortitudo & contractricis, vel potio frigida, vel intestinorum descensus in scrotum. Obstructio deinde fit vel ab inflammatione, vel à tumore duro, vel ab alio quopiam abscessu, vel ab excrementis siccis, vel ab alia intestino

rum compressione facta, aut à veneni-
iuspia potione, &c.

*Loci consentientes de causis
ileos.*

Gal. apho. 6. cōment. 44. Visum est an-
quioribus medicis, vel ab inflatiōibus, &
ab aridi stercoris obstructione huiuscen-
di tenuiū intestinorū affectus oriri. Itida
ait 6. de loc aff. cap. 1. Vide etiam Gal. 6.
sympt. cau. ca. 2. ibi. Fit etiā ab humorib:
præter naturam adeò intestina obstipan-
bus, &c. Paul. lib. 3. cap. 44. & Aet. ser. 9.
28. Feri voluulum dicunt intestinis vnā
stercore in scrotum descendentibus: itē
plagis quibusdam, ex frigore vehementi
& ex acernata frigida potione. Auic. 16. t.
4. cap. 29. Et quandoque accidit propter p-
tionem venenorum facientiū ileos. Inte-
dum fit ex fortitudine virtutis retentrici-
nam gracilia intestina ob suam gracilita-
tem magis ad retinendū sunt parata, quā
crassa. Vide Gal. 6. de sympto. cau. ca. 2. ibi
Quēadmodum stercus per lethales voluu-
los, &c. Et Auic. loc. cit. vult quòd ileos at-
hisdemet causis fiat, ac dictum est in colica
Haly Abbas lib. 9. ca. de col. enumerat pr-
mū apostema calidum, obstructionē ex
fimo sicco vel ex humore crasso, rupturam
abdominis, priuationem ciborum, & po-
tum

in lethiferi medicamenti, &c.

De signis ilei.

Signa ilei sunt dolor supra vmbilicū, nō
ex facibus ad inferiora descēdit: Vomī
interdum facum, homorū & vermium:
ctus inanes, foetor oris & totius corporis,
quūtur etiā mala symptomata, qualis est
emor cordis, vigilia, animi defectus, fri-
is extremarū partiū, sudor frigidus, vri-
e difficultas. Signa veneni sunt imbecilli
s virium, mollificatio & tremor cordis,
ec ab alia causa ista fiunt. Signa inflāma-
onis sunt dolor, duricies facis, tumor, fe-
is, &c. Signa interstinguētia ileum à col-
ica sunt. 1. dolor vehementior quā in co-
ica. 2. locus ilei supremū vmbilici partē
occupat, colicæ infimā. 3. ileus magis ten-
et ad vomitū quā colica, quum sit stoma-
cho propinquior. 4. Ileus nō iuuatur à cly-
steribus & suppositoriis, sicuti colica. 5. In
eo maiora sunt & grauiora symptomata,
quā in colica, sicuti syncopis, tristitia, &c.

Loci consentientes de

signis ilei.

Gal. aph. 7. cō. 10. Primū nihil in ileis
ad inferiora descēdit, & hoc est proprium
& inseparabile indicium: vomitus nō sem-
per adest, nisi quando exitiales sunt, si vehe-
mentius distorqueantur, ascendit eis ster-

cus & singultiunt, quidam desipiunt & uelluntur cōpatiente neruorum principio passioni ventriculi. Et 6. de loc. aff. ca. 1. b. lores vehemētissimi in sublimioribus testinorū partibus eueniūt grauiter uotionibus cruciantes, & c. Aet. ser. 9. c. 28. principio adest dolor circunvolutus, uentriculi humiditas multa, exolutio, ructus itines & nihil alleuiantes, murmura intestinorum, stercoris & flatus perfecta cohibtio: in vigore morbi, omnia sursum feruntur, adest vomitus bilis & pituitæ, totius corporis frigiditas, spirandi difficultas, & De signis distinguētibz inter colicā ileum lege Auic. 16. tra. 4. cap. 30. ibi, Amplius signa distinctionum colicæ cū signa ileos sumuntur, & c. Lege etiā de signis apostematum, ibi, Et factū ex apostemate, & c. Et nota hīc in Auic. quod dicit, Et illic febris non erit, & tamen Galen. aphor. 6. cōment. 4. 4. inquit, Quanto maior ac grauior euadit, tanto maiorem febrem effici contingit, & c.

De curatione ileos.

Cura perficitur, ut dictū est, in colica per quatuor intētionēs. Prima, cum regimine uitæ. 2. cum eius causæ ablatione. 3. cum euacuatione. 4. cum resolutione & roboratione. Victus igitur sit tenuior quā dictū

tus est in colica, sit que boni succi, &c.
 ylatio causæ ita erit, vt si venenū sit, dan-
 erit opera vt vomitus prouocetur pro-
 nato calēte oleo, vel aliquo iure pingui,
 enum theriaca exhibeatur, vel quidpiam
 ad, prout species veneni magis requirit.
 Verò in causa fuerit obstructio, proceda-
 tunc cum dissecantibus ac attenuanti-
 bus pharmacis, deinde purgante pharma-
 caluus soluatur. Si fuerit inflammatio,
 dem erit cura ac dictum est in colica. Si
 usa sit descensus intestinorum in scrotū,
 nc intestina ad suum locum compellan-
 r, & resupinato patiente fascia constrin-
 tur. Interim sectione venæ opus est, tum
 venarum meseraicarum copiam, tum
 vehementissimum dolorem: cætera
 int ac dictum est suprâ

Loci consentientes de cura ilei.

De prima intentione loquitur Aet. ser.
 cap. 28. ibi, Cibi sint boni succi, &c. De se-
 unda intēctione loquitur Pau. lib. 3. ca. 44.
 i, Qui veneni causa ileon patiūtur, com-
 plendi sunt vt aquæ calidæ potu euomāt,
 inde oleo calente propinato, vel iure ali-
 o pingui, deinde interpositis aliquibus
 ebus theriaca exhibeatur. Quod si ob-
 structio discutiat purgante aliquo phar-
 maco, aluum inanire cōfert. Si ex intestini

in scrotum descensu ileus accidat, in in-
na intestinum compelletur, & fascia su-
nato patiēte ligabitur. Auic. 16. tract. 4.
31. tria notat: primū quod ileos est co-
fortior, idcirco in cura properandum,
xta illud Hipp. Extremis morbis extre-
sunt opportuna remedia. 2. quod id quod
bibitur, magis iuuat in ileo, quā in co-
ca: nec multum referre, an a bibitis ve-
suppositis inchoetur. 3. quod in ileo mag-
sectio venæ conuenit quā in colica, &c.

Nocentia ac conferentia ileo.

Inducunt ileon argentum viuum & c-
ro porcina. Conferunt ileo absinthium,
corus, agaricus, allium, betonica, cham-
drys, chamæpitys, camomilla, centaure-
cyperus, eupatorium, pastinaca, ruta, sau-
ba, stechas, turbit. Composita sunt, vng. a-
labastri, aragon, aureum vng. Nic. vng. la-
xatium Nic. martiaton Nic. oleum lili-
bibitū, oleum de cherua, confectio phar-
Auic. 1. lib. 5. confectio Hermetis Auic. di-
cironiten Nic. electuarium ducis Nic. phy-
lonium catarcticum imperiale Nic. stomi-
ticum calidum Nic. theriaca magna, pilu-
læ sine quibus & fœtidæ, &c.

De prognosticis ilei.

Hippoc. aphor. 6. aphor. 44. Quibus ex
stillicidio vrinæ ileos superuenerit, in se-
ptem

em diebus pereunt, nisi febre superue-
 ente satis vrina fluxerit. B. Quoniā adul-
 rinū ac spurium vocauit aphor. Gal. id-
 eo damnatur ab Auic. eo quòd causam
 hor. ignoraret, quasi id nō legerit Auic.
 od in fine commenti inquit Gal. quòd
 ilicet si veritatem debet habere aphor.
 mortet multitudinem humorum crudorū
 à cum multa frigiditate causam arbitra-
 , quam febris superueniens liquefaciat
 dissoluat, & per viam vrinae dissolutam
 tura emittat, &c. Et aphor. 7. aphor. 10.
 b ileo vomitus singultus, desipientia vel
 nuulsio, malum. B. Quia intestina cogū-
 tandem ex se cum molestia contra na-
 ram vidētis materiam molestantem ex-
 udere, vnde singultus, vomitus, &c. pro-
 niunt. Aet. ser. 9. ca. 28. Familiaris ileos
 t puerulis, sed naturalis beneficio humi-
 tatis euadunt: senibus verò si accidit, nū-
 quā conualescunt, in chordopso vocato su-
 itum instat periculum, vt plerunque 3. vel
 horā non excedat. In inflammatione ve-
 o si suppuratio vel longa mora cōtingat,
 ericulo non vacat, quanquam sint ex eis
 qui seruati sint. Auic. 16. ca. 29. Et deterior
 leos est, in quo expellitur per superiora
 tercus, deinde in quo est sudor foetidus ha-
 dens foetorem stercoris: deinde in quo est

B b 5

anhelitus foetidus & eructatio foetida, &

Authores dissentientes circa

ileon & colicam.

1 Adferere, in colicæ principio conueni-
narcotica.

2 Adferere, theriacam nouam esse ven-
nosam, & non esse exhibendam.

3 Adferere, cum Auic. ileon posse gener-
ri ex stranguria.

4 Adferere, ileon curari non posse per fi-
xum urinæ, mediante febre.

Confutatio dissentientium circa

colicam & ileon.

Ad primum respondet Conciliator dif-
ferentia 204. per plures differētiās. Prima
sumitur à morbo vel ab accidente, vel à vi-
rium robore: vnde nisi symptoma super-
morbum stante virium robore, quòd nullo
modo conueniunt. 2. diff. sumitur à causa
morbi, vel à cōplexione morbi: vnde per-
manente virium robore, & causa existente
frigida cum dolore remisso, non conue-
niunt narcotica, sed adhibenda sunt ano-
dina: verùm si symptoma esset vehementis-
simum, & causa esset calida, vbi esset timor
de casu virtutis, tunc posset, sed magna
cum cautela exhiberi.

Ad secundum, Gal. 5. meth. cap. 13. Mulie-
ri cum dormitura esset dedi theriacā qua-
tuor

non menses antè confectam: habet enim
 datatis adhuc praualentē papaueris suc-
 um, qui in antiquatis ignauus redditur:
 gatur nō est venenosa, & potest exhiberi.

Ad 3. Gal. aphor. 6. comment. 44. Aiunt
 nim quòd vesica inflammata angustia lo-
 i facta ex compressione in intestinis pas-
 sionem affert, quē ileos nominatur. Ego ve-
 ò multos me puto in tota vidisse vita, nō-
 ullos tantum periclitantes, non paucos
 tiam mortuos, nō potētes mingere, quo-
 um nullus factus est ileosus: & sic tener
 quòd ileos non generetur ex stranguria.

Ad quartum responderetur per id quod di-
 ctum est ex Gal. in eodem aphor. suprā cō-
 tra Auic. ibi, Multitudinem humorum, &c.

De renum & vesicæ calculo.

Morbus calculosus, qui à Græcis *λιθίασις*
 dicitur, est lapidis generatio ex humori-
 bus viscidis & immēso calore orta, in qua
 urinæ excretio retinetur. Id tamen notū
 est, quod plerique medici attestati sunt,
 quòd non solum in vesica & renibus, sed &
 in colo, pulmone, felle folliculo, iūcturis,
 stomacho & inguinibus lapides oriantur:
 vnde lapides inter se differunt magnitu-
 dine, duritie, asperitate, colore, numero, lo-
 co & materia agente, de quibus satis co-
 piose infrà mentionem faciemus.

Loci

*Loci consentientes de renum
& vesicæ calculo.*

Galen. lib. finit. Med. Lithiasis, id est, ularis morbus, est calculi generatio in-
nibus & vesica, ex qua urinae excretio pi-
hibetur. Quod calculi in partibus enun-
ratis gignentur, lege Galen. 6. de loc. cap.
ibi, Nonnulli à forti excernendi cona,
&c. Et 4. de loc. aff. cap. ult. ibi, Quidam
diuturna tussi vexatus frustum quoddam
paruo grandinis grano, &c. Deinde se-
disse lapidem in fellis folliculo attestat
Gentilis, & in iuncturis & stomacho qu-
dam Gilbertus, & in inguinibus Arci-
Aet. ser. 2. cap. 4. Consistunt lapides in re-
bus iuxta ipsorum ventriculos aut par-
aut maiores, interdum plures & pauciores
magnitudine, forma, colore, asperitate,
multitudine inter se differentes, &c.

*De causis renum & vesicæ
calculorum.*

Causæ initiatrices sunt cibus potusque
crassus ac viscidus: causæ coniunctæ sunt
binæ, quarum altera erit materialis, alte-
ra efficiens. Materialis à crasso terreoque
humore conficitur. Efficiens est ignea re-
num aut vesicæ caliditas, quæ tum natura-
lis, tum aduēticia esse potest, ut quæ ab ali-
qua re calida renibus adnata proueniat.

Causa

causæ verò humores in renibus tardantes
sunt, vel expultricis imbecillitas, vel ob-
stusio, quæ tum attenuatoria à superflua
viscosa materia, tum carnosa ab ali-
qua carne innata vel ab apostemate proue-
nit, &c.

*Loci de causis renum & ve-
sicæ calculorum.*

Gal. 2. de natura humana, tex. 13. Pleri-
que pueri qui plurimum voraces sunt hu-
morem non modicum aggregant, quem
vulgariter propriè vocamus qui calculo gi-
gnendo in primis opportunus est, acceden-
te calore, tanquam causa effectrice. Itidem
serit 3. aphor. comment. 26. ibi, Lapis est
propria passio puerorum, qui ob edacita-
tem non paucos humores crudos coacer-
ant, &c. Auic. 18. cap. 16. tres causas calcu-
li assignat, materiam scilicet quæ est hu-
miditas viscosa & crassa, virtutem agen-
tem, sicut est caliditas ab æqualitate egres-
sa, & materiæ retentorem, qui est ex-
pultricis imbecillitas, quæ ab intempe-
rie vel ab inflammatione & vlceribus ori-
tur, &c.

Gal. 14. meth. cap. 4. Similiter & calculi
generantur in renibus, asso scilicet in his
rasso glutinosoque succo: prouenit enim
 hæc affectio ex ciborum crassorum succo
fi

si quis liberalius his utatur, &c.

Obiectio.

Quid non omnibus hoc vitium contingit, quum utraque causa sit omnis parata?

Responsio.

Dilucidatur hec tua dubitatio à Gal. meth. cap. 16. ibi, Siquidem credendum quibusdam esse densos admodum ren. vel per angusta in iocinore ora, &c. locum, & rem intelliges, &c.

De signis renum & vesicæ calculorum.

Signa generationis calculi sunt urini exiēs pura & aquosa, in qua non excernuntur arenosa iam prius visa, sed retinentur. Signa iam generati lapidis sunt dolor, gravitas, urinae suppressio, maximè si in utraque renibus lapis extiterit.

Signa motus lapidis sunt dolor vehemens usque ad inguina communicans scrotū & testes. Vehemens inquam ob loci angustiam & sensibilitatē, sed quū iam in vesica lapis fuerit, dolor mitigatur tādē mingitur. Signa lapidis in vesica sunt pruritus pudendi, ex cuius contractione penis intenditur, urina suppressitur, nec nisi magna cum difficultate & conamine emittitur. Sunt qui duos longiores digitos ante intro-

promittant eleuatis prius sursum versus
uribus, & aluo ab excrementis purgata,
lapidem manifesté adesse sentiant. Are-
na in super quæ sublidet, si rubra vel flaua
erit, è renibus descēdit: si alba & cineri-
a, ex vesica. Egreditur autem arena, dum
confirmari & dissolui lapidem contingit:
quo cōfirmato, & obstructione completa,
ō amplius arena exit, &c. Item lapis renū
st rotundus, vesicæ est oblongus, &c.

*Loci consentientes de signis
calculorum.*

De his signis lege Auic. 18. tra. 2. cap. 17.
ignorum lapidis in renibus primum est
rina crassa, quæ deinde incipit cōuer-
tenti ad enuitatem propter retentionem turbi-
di, &c. lege locum fusius. Gal. 1. de loc. aff.
ap. 1. Indicia lapidis in vesica sunt aquæ si-
milis vrina, in qua subsident sabulosa quæ-
dam, laborantes assiduè, pudendum scal-
unt, idque vel laxum, vel intentū præter
modum, postea de repente vrina supprimi-
tur. Vide Galen. 6. de locis affectis, ca. 1. ibi,
Nephritici dolores eodem in loco stabi-
les permanēt, &c. Lege fusius Aetium ser-
mone 2. cap. 4. ibi, Adest loci dolor absque
tumore foris apparente, & plura de si-
gnis annotatu digna inuenies. Lege etiam
Arcul. 2. alm. plura enarrantem. Item
Galen.

Galen. 6. de locis affectis, cap. 1. vbi Hippocratem damnat in illo aphorismo, Qui in vrinis arenosa subsistunt, iis vesica laceratur calculo. Vide insuper Alex. Tra. lib. cap. 34. Item Gord. & alios.

De cura calculorum renum & vesicæ.

Corpora quæ parata sunt ad calculi præseruatiuam curationem expostulant quæ actu ægrotant, curatiua indigent. Præseruatio igitur has in se intentiones requirit: prima, vt materia quæ lapides generat, nullo pacto efficiatur: secunda, si quæ facta sit, ne ad renes vel vesicam fluat, sed ad intestina mittatur, hoc efficit: tertia, vt si quid ex hac materia ad renes caeuenerit, ne illic figi ac retineri permittitur: quarta, calorem renum qui est cau efficiens, remissiorem efficit. Prima igitur intentio prohibet omnia crassa & viscosa tam in cibo quàm in potu, vnde panes azimi, caseus, & animalium extremitates, lacticia procul absint, similiter vitentur satietates & cruditates, sed attenuatori sit diæta, vrinam ciens, vitentur etiam dulcia, &c. Secunda, qua ex renibus ad intestina materiam diducimus, completur per pharmaca lenientia, scilicet cum cassia vel decocto glycyrrhizæ, semine alchechengi, vel per enœmata lubricantia ventrem

ve.

al per terebinthū assumptum: nam valde
 uat. Tertia non permittit figi materiam
 renibus, sed eam expellit cū diureticis,
 cum brodio cicerum rubrorum, cū de-
 octo glycyrrhizæ, in iure galli decrepiti,
 i paritaria in sero lactis decocta, vel cum
 ius succo, &c. Quarta remouet, ac calo-
 rem intensum mitigat cum oleo violaceo,
 enupharino, amygdalino, dulci, vitando
 a quæ euidenter adstringunt, &c. Cura-
 iua verò ratio concretum in vesica vel re-
 nibus lapidem auferre intendit, primò lu-
 ricado vias cū cassia, & minuendo materiã
 er ea quæ frangunt lapidē, & vrinã prori-
 ant & ora venarū referūt, facta in primis
 ectione venæ, si sanguinis multitudo ob-
 scuros dolores ad partē læsam se cōtulerit.
 Cōminuunt igitur lapidem quædã à pro-
 prietate occulta, quædam verò à manifesta
 ualitate. Quæ igitur hoc à manifesta qua-
 itate efficiunt, sunt pulegiū, calamentum,
 riganū, saxifragia, radix graminis, amy-
 gdal, amar. Itē radices petroselini, aspara-
 gi, brusci, fœniculi, apij, decoctū cicerum
 rubr. cor, fabarū & rad. maluarū, &c. Fran-
 gunt à proprietate occulta lapis Indicus,
 puluis leporis cōbusti, vitrū multoties in
 aqua saxifragiæ extinctū, puluis lapidum
 cancrorū, limatariū & mandibularū, luci

Cc

piscis. Item sanguis hircinus, cortex lauri
 & intercompolita laudatur. Iustiniam
 rontiphron dialacea, &c. Competunt etiam
 clysteres ex decocto maluarum, parietariae,
 camomillae, melliloti, fenugraeci cum
 tyro, oleo scorpionum, benedicta, cassia,
 charo, vel cum oleo amygdalarum dulcium.
 Extrinsecus conveniunt omnia mollienda
 qualia sunt unguenta ex oleo amygdalarum
 dulci pinguedine gallinae, butyro, oleo
 scorpionibus, &c. Similiter & brodia per
 guia exhibeantur, &c. Ad roboracionem
 machi, qui plerunque imbecillitatem
 hoc morbo suscipit, ista conferunt, scilicet
 oleum de absinthio, de menta, unguentum
 absinthio, &c. Si qua vero opus fuerit
 gestione, perficietur cum oxymelle simpliciter
 vel composito, cum aquis saxifragiae, parietariae,
 granorum iuniperi, &c. Quod si de
 tus ex renibus lapis circa collum vesicae
 tineatur, tunc supinatus aeger, elevatisque
 sursum coxis, adeo concutiatur, donec
 ipso meatu lapis excidat, deinde si minus
 per urinam exierit, tunc per cautherem
 instrumentum, vel per ea quae calculos confrin-
 gunt, amoveatur: quod si minus per haec
 curatio ad vota successerit, tunc per incisio-
 nem inter anum & testes in vesica collo-
 catur, & cum adunco ferro euellitur lapis.

Lo

*Loci de cura calculorum renum
& vesicae.*

De primis intentionibus lege Auic. 18. 10. 2. cap. 18. ibi, Intentiones in curatione ut abscissio materiæ & prohibitio generationis ipsius, cū abscissione causæ & reificatio eius, deinde mūdificatio & cominutio, & fractio, & cōpressio, & eradicatio eius, quæ omnia lōgo satis sermone explicat. De victus ratione lege Aet. ser. 11. p. 6. ibi, Deligant cibos, è quibus neque fietatēs, neque cruditates cōtingunt, &c. al. 10, de comp. med. per loc. cap. 1. Quæ calculosis auxiliant vnica facultate indigent, quæ siccare & extergere cū manifesta soliditate possunt: sunt autem talia ferè omnia amara, &c. Paul lib. 3. ca. 45. Medicamentis vti oportet, quæ confringere siue necare calculos possunt absque manifesta soliditate: sic enim Græcè habet, αἰὲν τοῖς λίθοις ἐπιχρῶν. Vnde vereor ne mendacium in Paulo, nam quæcunque ab eo in hoc sectu recitantur, sunt manifestè calida, cū & in Gale. qui vititur pipere, myrrha, niso, dauco, apio, &c. Aet. ser. 11. cap. 5. Si tibi adlit, ne multitudo sanguinis ob acuos dolores materias ad affectam partē aduocet, secanda est vena cubiti à latere affecto, nec copia extrahēda, quum ex hoc fu-

turum nō sit, vt à renibus lapis excidat, Gal. i. de loc. aff. ca. i. Itaque supinato æg
vt crura reliquo corpore sint sublimio,
multifariam ipsum concuties, vt lapis
meatu recedat, deinde iube vt æger vri
reddere tenter: quòd si vrina supprime
rursus vehementius concute, & si sic p
manferit, demissa fistula ænea lapidem
cervice vesicæ repelles, &c.

Generantia ac curantia calculos.

Inducunt ac efficiūt lapidem, amygdala
caseus, camphora, candrus, farina cā lac
lac coctū, lagana, porcinae carnes, triticum
coctum. Curant lapidē radix acetosæ, ac
rus, amygdala amara, anisum, vrina porci
apium montanum, abrotanum aqua mel
lis & cicerum rubrorū, batheca, cap. Ve
betonica, chamæleonta, cancer fluuialis
myrrha, cardui agrestæ, cinis radicis ca
lis, cicada, ciminū, cinis testarum, cochle
rum, cyperus, conditi, cordonum, corul
cubebe, daucus, fion id est, cresconi, fœn
culum syluestre, lac ficus, genista, gum
ceraforum, prunorum cum vino, gramin
semen & radix, lapatiū, lauri cortex & r
dix, renes leporis, lumbrici terreni, malu
matricaria, semen mellonum, milleped
stercus muris cū aqua mellis, nigella, pe
lium montanum, porri semen, succus ra
phan

ani, rubus, saxifragia, sauina, senation,
 rapenum, serpillum, scolopendria, cinis
 scorpionum, scenoanthos, finus turturis &
 tribulus, vitis aqua cadens, vitru vstum
 tum, succus vrticæ, iringi, vsnea, hyperi-
 m, agarius. Composita sunt, Adrianum
 infectio. Nic. antidotum hæmagogum,
 merina confectio Haly, confectio cona-
 ris Auic. i. semen, dialacca magna Mes.
 sulphur Mes. diapiretrum Nic. diapræ-
 m Nic. electuarium Ducis Nic. electua-
 um cabadij Haly, philonium Rom. iusti-
 um confectio. Nic. Imperialis confectio
 licen. i. semen litontriphon Nic. milium
 cum myrtho. syluestri, Nephrocatar-
 cum Nic. oleum benedictum Nic. oleum
 granis citri, oleum de cerasis Mes. de
 peribus, de scorpionibus, oleum alche-
 engi, de sauina, petroleum, syr. maior Nic.
 neodoricum magnum, theriaca magna,
 guentum laxatiuum Nic. Zeneliten cō-
 lectio Auic. Reseruant à generatione lapi-
 s aqua mellis, cassia syringa, genista, gra-
 pini maioris comesta.

*De prognosticis calculorum re-
 num & vesicæ.*

Auic. 18. tra. 2. cap. 16. In illo in quo est se-
 men arenosum nō aggregatur lapis, quo
 materia nō est coarctata. Et scias quod

parum accidit puellis & mulieribus, quoniam
 nam meatus vesicæ earum ad exteriora
 uior ac latior est & paucorum anfractu
 &c. Et scias quod lapis renum & vesicæ
 ex iis quæ hereditantur, &c. B. Quod dic
 mulieribus non accidere lapidem, mihi
 placet: nam sua ratio potius ad facilem
 pulsionem, quam ad lapidis generationem
 pertinet: sed fortè ratio potior est, quia
 mulieres calorem non usque adeo vehementer
 habent, ut materia in lapidem verti possit,
 quia ex menstruis omnia superflua expu
 gantur, &c. Hipp. Apho. 6. Apho. 6. Renum
 & vesicæ vitia in senioribus difficulter
 curantur. B. Quia in motu semper sunt, du
 contrahuntur & dilatantur, vel quia in sen
 bus ob calorem innatum imbecillem, multa
 alia ægri tudines longè curantur, &c.

*Authores dissentientes circa
 calculum.*

1. Adserere, calculum generari posse à
 humido temperato.
2. Adserere, calculosis dormire super do
 sum valde nocere.
3. Adserere, lapidem renum curari pos
 se per incisionem.
4. Adserere, diuretica in principio calculi
 contineri, nulla facta evacuatione.

Conj

Consutatio.

Primum impugnat Gal. Aph. 3. cōm. 26, cens, quòd materia crassa, cui vehemens caliditatis accedit, est causa generatio-
lapidū; & Auic. inquit, Virtus verò au-
ns est caliditas quū egressa est ab aqua-
te, vbi inquit Gentilis, non nisi ab ex-
llenti caliditate lapidem posse generari.

Ad secundum Auic. 18. cap. 16. Et dormi-
super dorsum est ex eis quæ lapidi con-
runt: nam ad resolutionem materiæ con-
rt: & sic non semper nocet, imò plerun-
le iuuat, &c.

Ad tertium Auic loc. cit. Et sunt quidam
laborant extrahere ipsum per incisio-
m ilij & dorsum, sed est timor magnus
eo qui rationem nō habet, quoniā opor-
t penetrare per musculos, per dorsum,
er ossa magna, per nervos & arterias, &
enas magnas, in quo casu accidit syncop-
is, & mors, & sic cura est potius impōssi-
ilis quàm fieri posse putetur,

Ad quartum respondet Conciliator diffi-
os, quòd diuretica nō conueniunt in cor-
ore cacochymo vel plerorico, nisi facta
uacuatione & digestionē. Item nec con-
ueniunt in vlcere recenti, nec vbi fuerit
obstructio: nam vt ipsa calida resolunt ac
putrificant. Præterea in ardore vrinæ non

sunt adhibenda, eò quòd ad locum læs-
materias ducunt, & plus ad mingendū
stimulant, ex quo dolor augetur, &c.

*De inflammatione, abscessu, & vl-
ceratione renum.*

Dictū est sæpius, quid inflāmatio, qu-
ue abscessus & ulceratio, quare nō est vt-
ries à nobis reperatur. Cōrinet in se omne
hos affectus nomen nephritis iuxta. Ga-
lio. de compos. med. per loc. cap. i. Vnde N-
phritis lib. fi. med. ita describitur, Neph-
tis est renum phlegmone cū dolore vel
menti, interdū cum meiendi difficulta-
ac fibrosis vel arenosis excrementis cū m-
dico sanguine, &c. Variant deinde abs-
sus tum ab efficiente materia, tum ex pa-
te locorum, pro quibus vide Auic. 18. cap

De causis horum affectuum.

Causæ inflammationē renum extrin-
tæ sunt, equitationes, percussiones, attri-
tiones, plagæ, pharmacorum poriones, &c.
Causæ intrinsecæ sunt vel repletio totius
corporis vel membrorum cōsentientium
vel sanguinis mala qualitas, vel excori-
tio lapidis, vel urinæ retentio renes exter-
dens: causa coniuncta est sanguinis calidi
influxus. Causæ aliorum abscessuum sunt
aliorum humorū influxus, vel multitudo
vapō

porosorum spirituum. Causæ vlcerū sunt
æcunque sunt causæ solutionis cōtinui,
uti apostema disruptū, vel humores ero-
ntes, biliosi, acres, vel lapis egrediens, &
aliquid scindere vel aperire vel erodere
his partes potest, &c.

Loci consentientes de causis.

horum affectuum.

Aet. ser. 2. cap. 16. Renum inflāmationes
non solum humores corrupti, sed & plage,
pharmacorū potiones, & attritiones, &
ræsertim continuæ, aquilonares. Auic. 18.
ap. 1. Causæ apostematis renū sunt reple-
tio in toto corpore, aut in membris cōmu-
nicantibus, aut qualitas & quantitas san-
guinis, aut excoriatio lapidis, aut retentio
urinae apud renes extendens. Gal. Aphor. 4.
comment. 75. Fit magna ex parte à lapide
incuto, vel admodum aspero, aut à disrupto
aliquo abscessu. Et in lib. de tumorib. ca. 2.
et 2. ad Glauc. ca. 6. Abscessus fiunt ab alio-
rum humorum influxu, & à multitudine
porosorum spirituum, &c. Auic. loc. cit.
Causæ vlcerū sunt causæ continuitatis
solutæ & apertionis, &c.

De signis Nephritidum.

Inflamationis renum & vesicæ indicia
sunt, loci affecti ardor, & cū gravitate do-
lor, febris continua, mentis alienatio, bilis

Cc 5

syncera vomitus, mingendi impotenti-
 præsertim existente in vesica inflammatio-
 ne. At si circa ilia dolores fuerint, & ho-
 ror inæqualis, & febris inordinata, abs-
 cessus in renibus cum loci cruciatu testantur.
 Signa ulcerum renum vel vesicæ sunt vri-
 crassa cum exiguis carunculis. Dolor in af-
 fecto rene interdum exiguum pus mingitur
 interdum sanguis & ramenta. Item fuff-
 racea vrina, squamulae & grauis odor, cum
 mictu sanguinis & puris, ulcerationem my-
 sticæ denotant. Cognoscitur affectus esse
 renibus vel in vesica per dolorem qui
 differentiis locis accidit. Nam si vlcus
 in vesica, dolor erit in pube: si in iliis
 dorso, erit in renibus: si in vrinae meatibus
 erit in media regione, &c.

Loci consentientes de signis.

Hipp. Apho. 3. Aphor. 36. Quibus autem
 morbo renali laborantibus prædicta acci-
 dunt signa, doloresque circa spinæ muscu-
 los fiunt, siquidem circa exteriora fient
 abscessus quoque exterius futuros expe-
 cta: si verò dolores magis circa interiora
 loca fiant: etiam abscessus interius futuros
 expecta. Lege Gale. 6. de loc. aff. cap. 2. ibi,
 Renem affectum esse cognosces, si do-
 lores cum horrore interpellato varioque
 infesta

estane videantur. Hipp. aphor. 4. Aphor.

Quibus in urina crassa existente carun-
æ parvæ aut veluti capilli unâ exeunt, his
enib⁹ excernitur, &c. Et aphor. 4. aphor.

Quibus in urina crassa fursures quædã
mul exeunt, iis vesica scabie laborat. Et
aphor. 4. aphor. 75. Si sanguinẽ aut pus min-
it, aut renum, aut vesicæ exulcerationem
significat. B. Disce in comment. Gal. quomo-
do renum affectus & vesicæ inter se distin-
guantur. Vide etiam Avicen. 18. trac. 2. cap.
ibi. Signa ulcerum. Et Hippoc. Aphorisi-
aphor. 81. Si sanguinem aut pus minxe-
it, aut squamulâs, & gravis dolor adfit, ve-
sicæ exulcerationem significat. Vide de his
guis Arcul. 9. almans.

De curatione nephritidis.

Cura inflammationis renum & vesicæ
consistit in ablatione causæ. Causa autẽ est
influxus sanguinis, qui si adhuc influat, pro-
hibendum est ne influat, divertendo cum
sectione venarum, quæ in cruribus circa po-
pitem consistunt, & cum cucurbitulis fric-
tionibus, &c. Quod si quidpiam iam flu-
xum est, per euacuationem sanguinis in cu-
bito, deinde inflammationi ipsi per catapla-
smata & fots medendum: ita tamen ut si ad
resolutionem tendat, cum his quæ pluries
dicta sunt, sicut in principio cum repri-
mentibus

mentibus, in vigore cum mixtis, in deo-
mento cū resoluentibus, &c. Cura vlceru
etiam in abstergentibus ac mundifica-
bus consistit, deinde cum his, quæ cicat-
cem inducunt ac consolidant, &c.

*Loci consentientes de cura
nephritis.*

Act. ser. 11. cap. 16. Si inflammationis ac-
men nō remittatur, sed vehementior exu-
gat dolor, vena cubiti secanda, sanguin
detractione repetita: & si quid inflāmati-
nis relinquatur, ad cataplasmata proceden-
dum, &c. Lege eum fufius. Auic. 18. tra.
cap. 3. Initio curationis est abscissio caul-
per phlebotomiā ex basilica, si sanguis e-
vincens: interdū fit incuruatura poplitii
vel ea non apparente, in saphena: & si sin-
cum sanguine humores acuti, calidi, per
solutionem ventris, cū cassia fistula & aqua
casei. Et de cura vlcerum lege eum fufius:
18. cap. 12. ibi, In curatione vlcerū renum,
&c. Lege de hac re Gord. & Arcul. ibi, Cau-
sa antecedenti hæc conueniunt, digestio,
euacuatio, & diuersio, sed coniunctæ, quæ-
cunque à me dicta sunt.

*Observationes circa victum in
inflammatione.*

Auic. loc. cit. Oporteret vt detur in potu
aqua dulcis frigida, sed non ita frigida vt
prohi

phibeas maturationē. 2. Abstineat à car-
 & dulcibus, aqua calida, & omne cali-
 um nocet eis, & aqua plurima non eua-
 etur, quin laborare faciat renes suos in-
 flu & motu. 3. Et non est vlceribus & apo-
 matibus aliquid magis cōgruum quā
 ies. 4. Et balnea conueniunt eis, nisi in de-
 natione apostematum calidorum, &c.

Observationes circa medicamenta.

Gal. 10. de composi. medi. per loc. capit. 1.
 uē ad inflammatas & vlceratas affectio-
 es medicamenta componuntur, medica-
 mentis mitigatoriis opus habent. Quum
 erò impossibile sit hæc citò ad regiones
 enum peruenire, ob id ipsis pharmacha-
 cinam cientia miscemus, &c. Itidem ait
 meth capit. 7. ibi, Quoties in vesica, &c.
 alen. 13. meth. capit. 6. Ne quum circa se-
 em vel aliam, huic vicinam partem ini-
 um phlegmones incidit, aluum deiciet,
 eque cū in vesica vel cole vel renibus
 st coepta, pharmaca quæ urinam prouo-
 ent, bibenda dabis. Itidem ait 13. meth.
 apit. 11. ibi, Si quum in renibus, &c. Et
 3. meth. capit. 16. Calida quoque vitanda
 unt, quum renes facillimè in duritiem
 occallescant, &c.

Aetius sermone 2. capit. 16. notat non es-
 se exhibendum pharmacum purgatiuum,
 sed

sed per clysterem alium esse leniendam
nec multam clysteris copiam infundendam,
ne repleta intestina, renes commo-
mant, &c.

Observationes circa topica.

Auicenn. 19. tract. 1. cap. 10. Reprimenda
frigida non longo tempore applicanda
nam illud nocivum est, & indurant aposte-
mata velociter 2. statim, si fieri potest,
dandus est dolor, quum vesica sit membrum
neruosum 3. quod sumus solliciti in pro-
canda vrina, quum frequentius retine-
tur in apostemate vesicae, &c.

De prognosticis nephriticorum.

Hippocr. aphor. 6. aphor. 2. Atrabile
xatis & renum passionibus hæmorrhoeis
superuenientes, bonum. B. Ob id quod
la qualitas humorum euacuatur, &c. Auicenn.
18. tract. 2. capit. 1. Omnia renum aposte-
mata velocia sunt ad hoc, ut in lapidē co-
uertantur. Et quando apostema calidum
est in rene, & non sit vacuum à febre, de-
inde accidat commixtio rationis, tunc e-
mortale. Et capit. 10. loquens de ulceribus
inquit, Quod multoties ex ulceribus re-
num proueniunt fistulae, quae nullo modo
sanantur, & ille cuius rem discumpitur
moritur. Et fen. 19. capit. de ulceribus vesicae
inquit, quod difficiliora sunt quam renum

&

ille cuius vesica dirumpitur, moritur
 secundum plurimū: quod si scindatur, non
 carnatur, nisi in parte carnosā, &c.

De Diabete.

Hunc affectum vocant quidam hydro-
 matellæ, alij urinæ fluorem, alij di-
 acon ab inexplebili siti, alij diabete[m],
 si nihil aliud est quàm renum affectio,
 qua potio statim qualis assumpta est per
 inā reiicitur, & rarò accidere solet, &c.

Loci consentientes de diabete.

Galen. 6. de loc. affect. cap. 2. Diabetes est
 proprius renum affectus, qui caninæ in ore
 ventriculi cupiditati proportionē respon-
 det, accedente præterea retentricis facul-
 tatis imbecillitate. Paul. libr. 3. capit. 43.
 ἡ ἀφάντης ταχὺν τὴν ποσὶν ὅτι διὰ τοῦτο ὅτι
 ὡς τοῖς τοῖς αἰσθητοῖς ἐπὶ τοῦτο. διὸ καὶ διὰ τὴν αἰσθη-
 τὴν καὶ διὰ τὴν ἐν τῇ τοῦ πάθους, &c. Avicen.
 tracta. 1. capit. 17. Est ut egrediatur
 quia sicuti bibitur tempore breui, & pro-
 portione respondet ad lubricitatem sto-
 machi.

De causis diabetis.

Causæ sunt vel retentricis facultatis im-
 becillitas, vel facultatis attractoriæ vehe-
 mentia. Prima fit à mala intemperie frigi-
 da intrinsecus vel extrinsecus adueniente:
 secunda fit à vehementi renum calore nu-
 do

do vel complexo, attrahens à venis em-
gentibus, & ex eis ad hepar extenditur
ex hepate ad stomachū, & ad omnia me-
bra, vnde humiditates membra irrorare
attrahit, & fit sitis vehemens, quæ pa-
non sedatur, vnde *diſſanus* dictus est, idē
ficriculus morbus, &c. Fit etiam à resolu-
ne lacertorum colli vesicæ, &c.

Loci consentientes de causis diabetis.

Auicē. 19. cap. 17. Causa diabetis est cō-
positio renum ob imbecillitatem accid-
tem & dilatantem orificia meatuum, qu-
re fit vt aquositas non figatur in renib.
Et quandoque fit ex frigore, toto corpore
vel renibus dominante, aut à potu aque
gidæ, aut propter vehementiam attrac-
tæ, &c. Lege eum diffusius. Gale. 6. de h.
affect. cap. 2. Fit hic affectus à reentricin-
cultatis imbecillitate, &c. Vide eum
fius, & plura intelliges.

De signis diabetis.

Signa quando fit ex caliditate sunt lur-
borum caliditas, vrina multa in principi-
sicut lotura carnis recentis, minus tamen
infecta & rubea, ac si defectu hepatis
proveniret: deinde processu temporis
qualitate & colore potus egreditur. Si fu-
rit à frigiditate, tunc circa lumbos perc-

ur frigus, & vrina in principio est quantitas consueta: deinde multiplicatur, & et sicuti lotura carnis, sed minus tincta, cum in fortitudine attractricis facultatis. Adest semper sitis, nec ex bibitis satiatur, sed quo plus sunt pota, plus sitiuntur, &c.

Loci consentientes de signis diabetis.

Aet. ser. II. capit. I. Comitatur sitis pertinax, ex qua nulla ex potu satietas continetur, quare assidue bibere coguntur, &c. de hac re Galen. 6. de loc. affect. cap. Auicena nullam de signis diabetis mentionem facit, lege tamen fusius Mar. Cat. de inuoluntario exitu vrinae, ibi, Adest sitis intensissima, &c.

De curatione diabetis.

Cura in duabus intentionibus consistit, quarum altera ad ablationem causae studet, altera ad membrorum vrinae roborationem. Si causa igitur fuerit acritudo humorum, euacuatione demitur, deinde res intrinsece & extrinsece cum succo granatorum & limonum infrigidantur. Si causa fuerit frigiditytas, ex qua retentrix immixtis sit, roboranda erit cum calidis stypticis, sicut cum decocto myrthi, sumach, calaustiarum, absinthij, cum vino chalybeato, aut cum puluere tali.

D d

cupularum glandium ꝑ. i. thuris m.
 ih. ꝑ. ꝑ. ꝑ. pelliculæ stomachorum g.
 ratum ꝑ. iij. Misce, & fiat puluis. Con-
 nitit etiam Tro. de spond. cum semine ace-
 fæ T. de terra sigillata, de balauistiis cum
 no vel aqua abünz hij. Si causa fuerit ve-
 mentia attractoriæ facultatis à supersti-
 caliditate innata, tunc expedit infrigi-
 re & stypticare, qua ratione conuenit
 syrup. de agresta, de acetositate citri, cu
 aquis portulacæ, lactucæ, & vng. sanda-
 num comitisse infrig. Galen. Si causa est
 relaxatio musculorum colli vesicæ con-
 niunt quæcunque de paralitide scripta sunt
 qualis est diacorus, acorus conditus, &
 Sitis remouetur, si dato potu euomatur
 rursus frigidior dato iterum reuomatur
 donec sitis extingatur, & aquositas à
 nibus diuertatur. Somnus etiam hac in-
 commendatur. Quod si prædicta morbu
 omnino non abstulerint, non erit præti-
 rem, si stuporem inducentibus utamur,
 cuti lactuca, papauere, vel ceratarum e
 succo papauere admota.

Loci consentientes de cura
diabetis.

Auicē. 19. tract. 2. capitu. 18. Diabete
 ut plurimum accidit ex caliditate ignea
 quapropter plurimum curationis eius est
 infr

infrigidatio & humectatio, &c. lege eum
sius.

Aet. ser. II. capit. I. Scopus medendi est ut
umorum acredinem auferamus, sangui-
nemque, ac cum eo permixtum humorem
rosu ad tardiores motum reddamus,
renum intemperiem reuocemus. Vide
etiam Aet. ibi, Vetus sit boni succi morda-
tate carens, ut sunt oua sorbilia, alica,
arnes porcinæ, vinum rufum crassius, fri-
gidum, dilutum, item casens recens sine sa-
e. Vide etiam Paulum & Marc. Cat.

Observationes in cura diabetis.

Anicen. 9. tract. I. capi. 18. Quæ oportet
osum vitate est labor dorsi, & assumptio
intericorum, &c.

Observationes in euacuatione.

Galen 7. meth. cap. 12. inquit, quod eua-
cuatione est renum, thoracis, arteriarum &
enarum, & cordis, & vtriusque vesicæ com-
mune quoddam opus, fit tamen euacuatio
nians ut Anicen.

Conferentia diabeti.

Infrigidant renes, ac diabeti conferunt,
amphora illinica vel bibita, calsia, fili-
qua, cucurbitæ conditæ, oleum cucurbitæ,
plumbum, &c.

De prognosticis diabetis.

Aet. ser. II. cap. I. Si amplius mordens cali

ditas in visceribus augeatur, venter superior corrugatur, & venæ in ipso eleuantur, vniuersumque habet gracilem habitum, & tabes totius corporis accedit: qui vero non mingunt, nec ex eis potus transpirat ob potus satietatem & humoris inundationem & vesicæ circumtensionem, acervata ventre rumpuntur. B. Si quis Act. intelligere voluerit, supponere habet duas diabetes differentias: alteram, in qua talis potus qualis assumpta est, per urinam reiecitur alterum in qua nihil penitus mingitur, nec potus per alia loca transpirat. Qui igitur primo diabete laborant, incurrunt marasimum vel tabem, consumpta scilicet omni venarum humiditate, unde gracilis habitus oritur & tandem mors. Qui vero non mingunt, nec per alia loca potum excreant, dum bibere non desinant, venter rumpuntur. Vide Galen. 6. de loc. affect. capit. 2. ad finem: & Auicenn. 19. cap. 17. Quandoque perducit ad liquefactionem & ad ethicam, &c.

De urinae stillitio & eius difficultate.

Mingendi actio bifariam læditur in emittendo scilicet urinam, & in retinendo. Actio emittendi urinam, vel abolita est, vel imbecilis, vel deprauata: si abolita, tunc *ischuria* dicitur, & est quæ nullo pacto egerminat

ingere potest. Si verò imbecilis fuerit, ne *δυσουρία* à Græcis dicitur, à Latinis difficultas urinae, quæ nil aliud est, quàm mendi desiderium cum urinae difficultate, & ifariam consideratur: primò, quum ceuiter mingitur: secūdò, quum in mingendo patiens longam moram occupat: tertio, quum mingere incipit, & in mingendo peruerare non potest, sed plerunque interciuitur. Si verò actio mingendi fuerit depravata, tunc excretio urinae non nisi guttatim destillabit, & vocatur *σπάρυρσις* à Græcis, à Latinis verò urinae stillicidium, & est excretio urine guttatim stillantis.

Locis consentientes de stillicidio urinae & diff.

Galen. 6. de sympt. cau. cap. 2. At huiusmodi ambo vesicae morbi vnum commune symptoma, ischuriam, id est, urinae suppressionem. Est & aliud symptoma, quum nihil penitus urinae in vesicam delabatur, solita nimirum renum actione, &c. Et phor. 5. comment. 58. Quando aliquis paucum & frequenter mingit, hæc passio urinae stillicidium nominatur, &c. Vide hac de re Alexand. lib. 3. capit. 38. Item Arcul. 9. almanf.

De causis stillicidii & difficultatis urinae.

Causæ primitivæ vel sunt extrinsecæ, qualis est casus, percussio, & læsio instru-

mentorum vrinæ: vel non extrinsecæ, sive
sex res non naturales: assumptæ, &c. Causa
antecedens est triplex, vel ex parte vesicæ,
aut à læsione facultatum eius, aut à dispo-
sitione vrinæ. Si ex parte vesicæ, tunc laesio
aut est in meatu colli vesicæ, aut virgæ
tunc vel est aliquis abscessus, vel vlcerus,
scabies, ex quibus dolens timet extra m-
tere vrinam: vel erit quædam obstructio
obstruens vrinæ meatum. Si verò à læsi-
one eius facultatum, tunc vel erit viri-
sensibilis læsa, quæ nec mordacitatem
grauitatem vrinæ percipit: vel motiua
voluntaria læsa, dum muscoli relaxantur
& incontinentia vrinæ accidit, vel
centricis & expulsoriæ facultatis imbeci-
llitas, quæ à mala intemperie, aut à de-
fectu spirituum provenit. Si à dispositi-
one vrinæ, tunc vrina quantitate aut qua-
litate peccat: quantitate, quum ipsa vel ni-
mis sit pauca, vel nimis copiosa, vnde ex-
pelli non potest: qualitate, quum nimis
calida, mordicans, vlcerans, &c. Causa
etiam potest esse imbecillitas renum, non
valens aquositatem attrahere vel expelli-
re, ob malam intemperiem frigidam, aut
calidam, aut ob earum obstructionem.
Causa per consensum erit ex parte mem-
brorum principalium, sicuti hepatis in se
quest.

estratione aque deficientis, vel ex par-
cerebri spiritum animale retrahen-
, &c. Auic. 19. tra. 2. ca. 6.

Loci consentientes de causis.

Auic. 19. tra. 2. cap. 6. Et fortasse causa est
igus, aut calor de foris, aut percussio,
t retentio vrine plurime, &c. Aut fit pro-
et causam in meatu colli vesicæ & capi-
s virgæ. Aut propter causam in virtute,
it propter causam in instrumento, aut
opter causam membri mittētis, aut pro-
er causam in vrina, &c. Galenus aphor. 3.
mment. 16. & apho. comment. 58. causam
le inquit imbecillitatem retentricis fa-
ltatis, quæ ab intemperie & aliquo præ-
r naturam tumore fieri solet, vel acrimo-
iam vrinæ, quæ etiam à renum passione,
el à superfluitate serosa ex venis ad ipsas
ercolata prouenit. Et stillicidium vrinæ
eri inquit, recto intestino & vtero inflam-
natione patiente, & hoc per compatiendi
tionem, aut à puro ex renibus ad vesti-
am euacuato.

Obiectio.

Galenus stranguriam esse quoddam re-
entricis potentie symptoma hinc inquit.
tenim 6. de sympt. caus. reposuit eam in-
er expultricis potentie symptoma.

Responsio.

Soluit dubium Galen. 6 de loc. aff. cap. dum inquit, Humores mordaces omnium intestina & vesicam ad excretionem excitant: qui verò mordaces non sunt, imbecillitatem intestinorum sequi consueverunt quia retinere contenta nec exiguo quidem tempore possunt. Ac si dicat, si à mordacitate humorum stranguria fiat, ad expultricem pertinebit facultatem: si verò ab imbecillitate, ad retentoriam lege de his casibus Aet. ser. 11. cap. 19. & Paul. & c.

De signis stillicidij ac difficultatis urinae.

Stillicidium urinae, & eius difficultas esse manifesta sunt. Signa eius causarum erunt (si provenit à frigore) urinae tenuitas & crassities cum albore, & frigus sentietur. Signa ab humorum acrimonia habentur ex urina acri bilem attestante, vel ab habitu ipso, vel à colore, & ab his quae intemperiem calidam denotant. Signa apostematis sumuntur ex febre, vel quia paulatim fit affectus, & ex dolore loci, & eius extensione & tumore. Signa lapidis & obstructionis per syringam intromissam habebuntur. Signa humoris crassi cognoscuntur ex gravitate sensata & pondere. Signa flatuosi spiritus est tensio sine gravitate loci

ci, quæ interdum permutatur. Signa molificationis musculi vesicæ sunt egressio-
 nes vrinæ absque voluntate. Signa contra-
 ri musculi vesicæ sunt, quia vrina retine-
 rit, nec potest educi, nisi cum valida com-
 pressionem. Signa debilitatis sensus sunt,
 quod æger mordacitatem vrinæ non sen-
 tit. Signa expultricis facultatis læsæ sunt,
 ex compressionem facilis fiat vrinæ edu-
 ctio. Signa difficultatis vrinæ per consen-
 sum hepatis & cerebri, sunt eorum ægri-
 tudines præcedentes, & quod non apparent
 æsiones aliæ in instrumentis vrinæ.

Loci consentientes de signis.

De his signis lege Auicennam 19. tra. 2.
 capite 7. ibi, Signa eius, cuius causa est
 frigus, est albedo vrinæ cum crassitie &
 tenuitate, & multitudo surgendi ad min-
 gendum, & sensibilitas frigoris, &c. Lege
 diffusius librum, & plura inuenies. Paulus
 libro tertio, capite quadragesimo quinto,
 Si neque ab inflammatione, neque à calcu-
 lo, sed ab vrinæ acrimonia dependeat, co-
 gnoscet per signa bilem attestantia, Si ve-
 rò à frigido fiant, aderit vrinæ tenuitas al-
 borque, & præter alborem crassities, quæ
 humorem pituitosum denotat. lege Arcul.
 Alexand. & Gord. &c.

D d i

*De cura stillicidij & differen-
tia vrinae.*

Cura huius morbi consistit tantummodo in eius causarum ablatione, ac in vri prouocatione. Inquiratur ergo omnifido eius causa: nam si fuerit à frigore, tunc calefaciendo, & regimen calefaciens instituendo facile curabitur: proderunt inter clysteres ex rebus calidis, inunctiones foris calidi prout sermo erit. Si causa ei obstructio colli vesicæ, vel fiat ab apostemate, cura erit apostematis, prout millies dictum est: si à materia lapidea, recurratur ad caput calculi. Si à materia pituitosa, siniosa, vel sanguinis coagulatione, tunc intentio erit materiam attenuare cum incidentibus, attenuantibus ac aperitiuis, scilicet cum syrupo bisantino de duabus rad oxymelle simp. cū aquis fœniculi, apij, &c. deinde vrinam prouocare. Prouocatio vrinae multifariam fieri potest: primò leuiter vesicam comprimendo, vel cum supposito-rio ex sale gmeo, vel cum titillatione in capite virgæ, cum fricatione in collo vesicæ prope anum. Proritant vrinam validius inunctiones ex oleo scorpionum & liliorum alborum: nam præterquàm quòd calefaciunt, etiam resoluunt ac relaxant. Similiter foris ex parietaria, ex senecione, cum dictis

et oleis in sartagine frixis, & pubi ad
oris, vel ex rebus magis calidis, vt cum
lameto, pulegio, sabina. Intrinsecus con-
ueniunt clysteres ex hiera picra, benedi-
a, cassia, zaccharo, & oleis scorpionum.
conueniunt etiam decocta fœniculi, aspa-
gi, brusci, apij, petroselini, vel decoctum
miperi, sabinae. Item puluis corticis oui,
quo pullus egressus sit, à suo cortice de-
urati, ad quantitatem drachinae vnius. Item
ubea tinctorum, cantharides, amoris pe-
libus & alis. Prouocant etiam urinam dia-
acca, diacurcuma iustinianum, & confe-
ctio de cineribus scorpionum, &c.

Loci consentientes de cura stillicidij

& difficultatis urine.

Paulus libro 3. cap. 45. Si ab acrimonia
umorum dependeat, conuenit ptisanæ
remor, pisces, balnea, victusque idoneus.
Acrida vitanda sunt, vinum, exercitium, &
arda comestio. Si verò à frigida intempe-
rie, conuenit vinum calidum, & cibi qui
urinam prouocent: & hæc de regimine.

Aetius ser. II. cap. 19. Considerandæ sunt
præcedentes causæ: nam si fuerit frigidi-
tas, cum calefacientibus, & urinam prouo-
cantibus tollenda est, addito etiam ad pe-
ctinem foru. Si verò caliditas præcessit, si-
cut urina acris & biliosa attestatur, tunc
sanè

sanè exuberantem humorē vitiosum quā
celerrimè purgare oportet, vitatis inter
omnibus falsis & acribus. Quòd si nec ac-
monia adhuc auferatur, lac ipsum cu
amylo in vesicam deiiciatur, &c. Auic.
tra. 2. cap. 8. Si causa est humor vel sanio
opus est vt curetur cum aperitiuis ac di-
reticis, &c. Lege cum fusiùs, lege etia
Arcul. 9. Alman. Item Marc. Catin. & re-
aptiùs ac dixerim intelliges.

Conferentia stranguria.

Conferunt stranguriæ decoctio acor
cap. Veneris, althææ, allij, amygdala am-
ra, apium, cassia lignea, cicera, cyperus, se-
men cucurbite, gladiolus, gramen, chamæ-
drys, assarum, phu, cardamomum, locusta
suffumigium, maiorana, mel. meu, meze-
reon, millefolium, ruta, serpillum, sisim-
brium, asparagus, scilla, terebinthus, por-
celliones, virga pastoris, vsnea, rapa sativa,
raphanus, miliū panicum. Composita sunt
cōfectio alchechēgi Auic. egezeacōf, Mes.
philonium romanum mitridatum, oleum
amygda. de sabina, de ossibus persicorum,
oxymel scilliticum. socrita confect. Haly.
theriaca T. de absinthio.

De prognosticis stranguriæ & dysuriæ.

Hippoc. apho. 6. aphor. 6. Renum & vesi-
cæ vitia in senibus difficulter sanantur. B.
Et

hoc aut propter inquietudinem renum,
 it humorum acrimoniam, aut virtutem
 num imbecillem. Nam qui morbi seni-
 is accidunt, longi plerunque ad mortem
 sos concomitantur. Auic. 19. tra. 2. cap. 6.
 p. 19. Si acris humor diutius in vesica mo-
 tur, partes ipsas corrodit & exulcerat, &c.
 Hippocrat. aphor. 2. aphor. 16. In fine, In sic-
 catibus lippitudines, articulorū dolores,
 inæ stillicidia, dysuriæ, &c. Lege etiam
 aphor. 3. & 31. eiusdem, ibi, Senibus spi-
 ndi difficultas, vrinæ stillicidium, dysu-
 riæ siue vrinæ difficultates. Et aph. 5. apho.
 Retento intestino aut vtero inflamma-
 onem patiente, vrinæ stillicidium acci-
 t, & renibus purulētis vrinæ aduenit stil-
 cidium. Et apho. 49. lib. 7. Vrinæ stillici-
 dum & mingendi difficultatem seu dysu-
 riæ vini potio & venæ sectio soluit, inci-
 ere ante interiores in talo est bonum, &c.

De retentione vrinæ.

Quæ à Græcis *ισχυρία* dicitur, est exa-
 ta prorsus vrinæ retentio periculum affe-
 ens, &c. Et hoc attestatur Gal. lib. fin. med.
 ibi,

ibi, Ischuria est exacta prorsus, &c. Vide etiam Gordon. &c.

De causis retentionis urinae.

Causae huius affectus sunt octo, inflammatio, durities, sanguinis grumus, expultricis resolutio, lapidis procidentia, membrorum compressio, ulceratio & lithiasis, vel alia obstructio. Retinetur etiam urina ob negotiorum importunitatem, vel per somnum, &c.

Loci consentientes de causis retentionis urinae.

Galenus 6. de loc. aff. cap. 3. Ischuria provenit, quum circa id quod continetur, contrahi non potest, ut ipsum exprimat: interdum obstructio in inferiori meatu, aut à crassis humoribus, aut impactu lapide: nonnunquam ab inflammatione, vel alio tumore, ut angustior meatus reddatur, vel omnino obstruatur: lege locum hunc fusius, & antedictas causas invenies, &c. Lege etiam Aet. ser. 2, cap. 21. ibi, Accidit & finis saepe urinae ipsorum cohiberi ob negotiorum importunitatem, ac si durius in conditionibus, foro iudicatio, somnifici, mictionem retinuerint, &c. Lege Galen. loco cit. & Avic. & Arcul. & alios modernos.

De indicis retentionis urinae.

Ischuria ex compressione urinae statim cog

cognoscitur, sed causarum suppressionis indicia non tamen usquequaque sunt nota. Signa igitur sunt, quod ex facultate excretoria hæc fiat, cognoscitur ex compressiona vehementi, ex qua urina excernitur. Signa obstructionis erunt, si minus per compressionem urina excernatur, & tunc obstructio erit à grumo sanguinis, si nulla adsit lapidis nota, & sanguis effluat: vel erit ab abscessu, si pus excernatur, vel inflammationis notæ non aderint: vel erit à caruncula, si vlcus & vlceris indicia præcesserint: vel erit à lapide, si intromissa fistula anea lapidem remouendo urina euacuetur. Similiter si à crassis humoribus fiat obstructio, cognosces ex victu præcedente, si in otio educatus, si multis cibis crassis ac viscidis humores generantibus usus fuerit &c.

Loci consentientes de signis retentionis urinae.

Galen. i. de loc. aff. cap. i. Intueri oportet præterita & præsentia: nam si à resoluta facultate vesicæ ischuria proueniat, tunc hominem ita figurato, ut declinans sit ceruicis vesicæ positus, ac tumorem præter naturam comprimere, ut urina expellatur: quod si minus profeceris, tunc facultatem non resolutam, sed potius urinae fistulam obstructam conice. Si igitur obstructio à lapide fiat,

fiat, &c. Lege totum hunc locum, & in-
 nies quæcunque à me suprà posita sunt.
 ge etiam Galen, 6. de loc. aff. cap. 3. ibi, b-
 fungente suo naturali munere vesica, c-
 B. Nota, quòd in omnibus corporis pai-
 bus est naturalis quædam vis excreto-
 qua excrementa secernuntur, naturalis
 cta, eò qd voluntati nō obediat, sed naturi-
 ter agit. Vnde musculus cervicē vesicæ
 cundans, tanquam voluntati ipse obed-
 volentibus nobis eòvsque ab actione qu-
 scit, donec vesica suo munere fungatur, c-

De cura retentionis vrinæ.

Quamprimum ischuriæ causam ag-
 ueris facilis erit cura: nam suppressio
 vrinæ causas amovere est curatio. Si igit
 inflāmatio causa sit retētionis vrinæ, cu-
 tur inflammationū curatione: quòd si p-
 vel humor, vel sanguinis grumus in cau-
 sit, per dissoluētia pubi admota (vitatis vi-
 nam cientibus, ne maior vel obstructio v-
 extensio circa vesicam fiat) statim curabi-
 vel his non conducētibz, ea mittēda sui-
 in vesicā quæ dissoluūt per syringā. Si ver
 propter obtusum vesicæ sensum vrina sup-
 primatur, irritādo excitare eius actionem
 expedit cum infessionibus aut cimicibu
 capiti virgæ admotis. Si causa sit lapis, tū
 admota syringa lapis excutiendus est, &

si

de singulis, prout supra de destillationis
inæ cura dictum est, &c. Aduertendo etiã
æcunq; à Paulo superius de regimine di
a sunt, &c.

*Loci consentientes de cura reten-
tionis vrinae.*

Aet. ser. 2. cap. 21. Si ex inflammatione
rina supprimitur, sectione venæ curabi-
r, adhibitis etiam fomētis & cataplasma
is, quæ sæpius ad inflammata dicta sunt: si
erò supprimitur à sanguinis grumo, tunc
rumus eo pacto dissoluendus, quo de eru-
tione sanguinis dictum est: si verò lapis
rinam supprimat, à loco excutiendus est,
&c. Lege Arcul. 9. almanf. vbi de sectione
gitur, quæ aliis non iuuantibus in collo
elica fieri solet, &c.

Stranguriæ & ischuriæ conferentia.

Conferunt strāguriæ & ischuriæ abro-
anū, acorus, agaricus, alliū, althea, ameos,
mygd. amar. anethum, apiū, arthemisia,
acca lauri, balsamū, baucia, chamædrys,
hamepithys, carpobalsamū, castoreū, cen-
aurea, ciminū, cimices, cinnamomū, cype-
us, cypressus, cuscuta, crocus, daucus, ele-
niū, epithimū, fœniculū, fœx vini vsta, fili-
pendula auis, fursur tritici galbanum, ge-
nista, melāthion, iuniperus, calsia, terebin-
thus, lapatium, lithospermon, locustarum

Ec

suffumigium, lumbrici terreni, maiora
 matricaria, myrthus, nasturtiū, origanū,
 ocimū, parietaria, peonia, peucedanū, c.
 Ven. portulaca, raphanus, rapa. satiuā, fil.
 ruta, rosmarinus, saluia, sabina, saxifrag.
 senapium, sepia, serpillum, filer, sisymbi.
 sinapis, scordeon, asparagus, scenoanth.
 stechas, tamarischus, trifolium, betoni.
 vinum scilliticum, hypericon, hyringu.
 iris, porrū, cepæ, asphodellus petroselin.
 iuncus odoratus, calamus odoratus, res.
 mulei pini, lentiscus, hordeū, mel, eruū, p.
 po, piper, capparis, cētauriū. Cōposita fu.
 aureū vng. Nic. diaprasiū, diapiretrū Ni.
 Iustinum conf. Nic. etiam mucos minger.
 tibus, pilulæ diacastoreæ Nic. vng. melli.
 dio. c. antidotum hemagogum Nic. & c.

De prognosticis retentionis vrinæ.

Hippocrates apho. 4 apho. 80 Si sangui-
 nem mingant, & grumos & stillicidiū vri-
 næ habeant, & dolor in anum incidat ven-
 trem & pectinem & fræmen, circa vesicam
 labor est. B. Intelligit pro labore morbū
 nam non refert siue *uovē* siue *uocā* quis di-
 xerit, & intelligitur de omnibus vrinæ in-
 strumentis: nam partē pro toto, id est pro
 vesica, totum quod vesicæ annectitur, hic
 accipit, & c. Et apho. 4. apho. 82. Quibus in
 urinaria fistula tubercula nascuntur, iis
 suppur

suppuratione facta & eruptione, solutio. B.
 Hic subauditur, quod ex his tuberculis
 ischuria fiat, quibus disruptis proculdubio
 sanatur. Nota tamē quod in antiqua trā-
 slatione Gal. pro ischuria legitur malē strā-
 guria, &c. Actius ser. 2. c. 24. Quum nō ei-
 iant lotium, subiecta membra mortifican-
 tur, neque ita longē pōst moriuntur.

De vrinæ incontinentia.

Quū vrina inuoluntariē excernitur, tūc
 resolutione vesicam laborare dicimus, &c.

*Loci consentientes de vrinæ
 incontinentia.*

Act. ser. 2. c. 24. Quibus resoluta est ve-
 fica, iis vel præter voluntatē vrina excerni
 tur vel supprimitur. Lege Auic. 19. cap. 13.
 de inuolūtario exitu vrinæ. Et Paul. lib. 3.
 de vrinæ incōtinentia. Lege etiam cap. 18.
 ubi de resolutione, quæ vnamquanq; parti-
 culam obsedit, mentionē facit. Lege etiam
 Arcul. 9. alm. & Sauonarolam, &c.

De causis incontinentiæ vrinæ.

In causa est vt plurimum resolutio mu-
 sculi, qui ceruicem vesicę ambit, item facul-
 tatis retentoriæ imbecillitas, item nimius
 potus, hepatis imbecillitas segregare a-
 quositatem non valens, item nimia renum
 caliditas & superfluum frigus, acuitas vri-
 næ, & luxatio vertebrarum spinæ.

E e 2

*Loci consentientes de causis
incontinentiæ urinæ.*

Gal. 6. de loc. affe. ca. 3. Si musculus qui vesicam claudit resoluitur, tum inuolutaria urinæ excretio prouenit, &c. Auic. tra. 2. cap. 13. Fit ut plurimum propter superfluitatem frigoris & molificationem lacerationem & debilitatem virtutis attractiuæ in vesica & renibus, & propter caliditatem plurimam attrahentem ad vesicam resudationem à corpore, & propter coarctationem stercoris compimentem, & propter acuitatem urinæ, & Lege Aet. ser. 2. cap. 24. Et Gal. de loc. a. cap. 3. ibi, Alter luxatis ad extremas partes spinæ vertebris inuitus urinam profundi nullo infestante vesicæ dolore: coniecimus eius musculi neruum, qui vesicam claudit esse affectum, proinde spinam curare volumus, &c.

*De signis incontinentiæ
urinæ.*

Nota esse possunt signa tum ex relatione infirmi, tum ex his quæ dicta sunt: nam quotiescunque copia urinæ frequenter emititur, & in mictione ardor non sentitur, nec sitim ager patitur, nec corporis extenuationem, tunc iudicamus musculum vesicæ esse resolutum, à quo excretio inuolutaria urinæ procedit, &c.

Loci

Loci consentientes de signis.

Lege razem 9. almans. de fluxu vrinæ, & auic. 19. cap. 13. ibi, Et scire facile fit ex eis ia præterierunt, &c.

De cura incontinentie vrinæ.

Cura talis sit, qualem diximus in cura diabētis, pro quibus lege diffusius Aet. ser. c. 24. & vbi ad eos qui se in somno perlingunt remedia scribit, & Auicen. vbi de iactu in lecto sermonem facit, & est fen. 1. tract. 2. cap. 15. Item curam de inuoluntario exitu vrinæ, &c.

Conferentia inuoluntario exitui vrinæ.

Conferunt inuoluntario exitui vrinæ molificationi vesicæ, acetū scilliticum, torus, calamus aromaticus, chamepithys, minimum, cinis vngularum apri, cyperus, rodea, pulmo hœdi heleniū, carnes ericij, eniculum agreste, chubebe, laurus Alexandrina, cerebrum coagulum leporis, linum aloës, mumia, ostraca, grana pini, cortices populi, si ſimbrium scolopendria, efica apri, mures elixæ & comestæ. Composita, confectio Aristomachi Auic. confectio philosophorū Auic. ibi, 1. 5. Vinū extinctionis ferri, oleū nardinū, oximel scillitici, electuariū piperis Haly, tamaricon cōf. Haly, trifera magna, trifera de scoria maior Auic. Tro. alchechēgi Aui. hiera Gale.

De prognostic. incontinentiæ urinae.

Aet. ser. 2. cap. 24. Qui præter voluntæ
urinā emittunt, quanto plus eis contingit,
eò minus periculo sunt obnoxij.

*De ramicum generibus, id
est, de hernijs.*

Quod ramicem siue herniā Latinè di-
mus, Græci κήλας omnes ferè testiū tun-
res vocant, & sunt numero octo. Primus
Hydrocele, quæ est incocti humoris in p-
te scroti collectio. Secundus Enteroccele,
intestini in alterum locū paulatim vel
mel delapsus. Tertius, Hidrenteroccele,
est delapsus intestini, aqueiq; humoris co-
lectus in scroto. Quartus, Cirrocele, & e-
guorundā vel omnium vasorum, quæ testi-
alūt, dilatatio. Quintus, Hydrocirrocele,
& est dilatatio vasorū vnde aluntur testes
& crudi humoris in scroti aliqua parte co-
lectio. Sextus, Epiplocele, & est omenti lap-
sus in partem scroti. Septimus, Enteroplo-
cele, & est intestini & omenti in scroto
partem delapsus. Octauus, Sarcoccele, id
est, carnosus ramex Inuenitur etiam exō-
phalos, id est, procidens umbilicus, & est
umbilici prominentia diuersis de causis
proueniens, sed nos de hernia aquosa &
intestinali tantū, & inguinali verba fa-
ciemus, &c.

Loci

Loci consentientes de generibus ramicum.

Gal. lib. de Tum. prater naturam. c. 17. & Induratis testibus *σκληρόν* nomē im-
suere: quū verò in testiū tunicis humor
quosus colligitur, *ὕδρον*: si verò omen-
im in testiū tunicas descendat, *επιπλοκή*,
ω, si verò peritoneū in inguina profluat,
βουονήλω: si circa vmbilicum *βέμφαλον*, &
de Gal. lib. finit. med. Auic. 22. cap. 2. enu-
merat etiam octo species herniarum, quæ
sunt ventosa, aquosa, saniosa, carnosa, vari-
osa, zirbalis, intestinalis, & apostemosa, &
hoc sub rupturæ nomine. Caput deinde
aliud facit de vmbilici augmēto, quod alij
de eminētia inscribūt, & habet tot species,
tot de herniis nuper diximus. Vnde ven-
osa à Græcis dicitur *πυσμήμφαλον*, carnosa
ρυσμήμφαλον, aquosa *ὕδρήςμφαλον*, Zirbalis *επι-
βέμφαλον*: & est omenti in vmbilicum de-
iursus, & sic de singulis. Lege de his fusius
iuxta Aet. ser. 14. cpa. 22. 23. & 24.

De causis ramicum.

Causæ sunt intrinsecæ & extrinsecæ, si-
cut casus, percussio, plaga, saltus, vel qui-
vis alius motus violentus. Causæ intrin-
secæ sunt per se notæ, nam à flatu flatuosa
in parte abdominis contenta, varicosa à la-
titudine venarum & ab earum imbecilli-
tate provenit: aquosa ab aqueo humore in

Ec 4

scrotum delapso, & sic de reliquis. Hærem
tem proueniunt peritonei membrana in
nimium extenta aut rupta, &c.

Loci consentientes de causis ramicum.

Aet. ser. 14. cap. 22. Aquosa hernia interdum ex occulta, interdum à manifesta contingit. Ex occulta, quum aquosus humor circa partes corpusculorum, quæ scrotum contexunt ac implicat, sanguini admixtus, collectus fuerit: ex manifesta, quum ex perga collisis vel fractis vas sanguis fluens in substantiam aquosam transmutatur. Gale. lib. de Tum. præter naturam cap. 1. Interiorem membranam quam Græci περιτρίαιον vocant, vulnerata ac rupta fiunt ramices, & Lege hunc locum fusius. lege etiam Aulsen. 22. cap. 2. ibi, Ruptura fit propter solutionem paniculi, &c. lege etiam Arcul. & Pau.

De signis ramicum.

Signum commune omnibus rupturis est tumor inter abdomen & peritoneum apprensus. Signa herniæ apostemose sunt signa abscessuum communia, scilicet tumor, durities, grauitas, dolor, & quod paulatim augetur. Signa herniæ zirbalis sunt, quia paulatim aduenit, non sentitur, rugitus est paruæ quantitatis, nec multum ad profundum olei se extendit, nec resupinato agro ita facile reuertitur ac intestinalis. Signa enterocele,

s, id est, intestinalis sunt, facilis reductio, im resupinatur, rugit dum intromittitur, nisi vel flatus, vel siccae faeces in causa sit, ne tam citò introducatur: est præterea magnæ molis, acciduntq; dolores, vehemenssi, dum oseum extendit, & testiculum comprimit. Signa aquosæ sunt, quòd tactui cedit, & extenditur oseum: cognoscitur etiam per eius splendorem, lenitatem: item quia cum mollitie grauis est, & paulatim fit, nec quocumq; æger situetur, interiora petit. Signa flatusosæ sunt, quia redit absque dolore, statim facta compressione, absque quòd æger resupinetur, etiam percussa resonat: nec adest grauitas, nec lubricitas, sed cum lenitate tendit. Signa sarcocoeles, id est, carnosæ sunt, quia cum duritie tumet, & est absque dolore: nō augetur, nec minuitur. Signa varicosæ sunt, quia ipsa est dura, oblonga, veluti virga, cuius crassities excedit aliquando crassitiem digiti: cognoscitur etiam ex repletis venis. &c.

Loci consentientes de signis ramicum.

Auic. 22. cap 3. Signum autem cōmune rupturis est additio apparens, & sentitur inter sisach & mirach. Signū herniæ intestinalis est redditio eius cum velocitate cū resupinatur, & sensibilitas rugitus, & propriè quū premitur. Hernia verò ex zirbo

Ec 5

SIO IOAN. BACCHAN.

& sisach cognoscitur ex aduentu eius p-
latim, &c. lege cum fusus: lege etiam
cul. 9. alm. Item Aet. ser. 14. cap. 22. & pl-
ra intelliges.

De curatione ramicum.

Scopus curandi hydrocelem & flatu-
sum ramicum est, causam à qua humor aqi-
sus vel flatusosus gignitur, amouere. Quo
fiet primò cum phlegmagogis, vel aqua
sum humorem educētibus pharmacis. si-
clysteribus, deinde cū resoluentibus, sicut
cum farina fabarum, cimino, emplastro, d-
baccis lauri, & similibus: deinceps prohi-
bendum est ne noua eodē in loco aqua ve-
l flatus generetur. Prohibent nōnulli extra-
hendo aquā, alij cū cauteriis vrēdo vsq; ad
epidimin, quē Arabes didimum vocāt, sec-
reuera in hoc casu vstionē valde timeo: nā
si epidimis totus vratur, vereor ne testes
corrumpantur. Si minus, certum est quòd
per partem non vstam adhuc aqua descen-
det: quare satius mihi videtur aquam re-
soluentibus extrahi, quàm vrentibus. Cu-
ra enteroceles & epipeloceles, sive est, hernie
intestinalis & zirbalis in duplici intēctione
consistit, in reductione scilicet intestinorū
ad suum situm, & in retentione in situ suo
conuenienti, & in constipatione seu con-
solidatione rupti ac laxati. Reducuntur ad
suum

sum situm intestina & omentum, si resu-
mato patiente cruribus sursum eleuatis
i manu comprimantur, & leuiter agi-
tuntur, quibus ob ventum renitētibus pri-
mū cū resoluentibus ac discutientibus
collientibúsq; flatū succurrimus, vt cum
cocto altheæ, camomille, melliloti, semi-
lini, fœnugræci, anisi, cimini, cū spōgia
applicato, vel cum oleis camomillæ, ane-
li, amygdalarū dulciū, adhibita interim
ligētia vt emolliētibus ac vnctuosus cly-
steribus faeces extrahantur. Retinētur etiā
in suo situ intestina pluribus mediis, pri-
mò cū fotu ex aqua vino & aceto decoctio-
is gallarū, nucum, cupressi & aluminis.
ecūdò, cū cerato de pelle arietina, descri-
ptione Gētilis, stringēdo locū in quo emi-
ētia apparet cū angulo, quod vulgò bra-
heriū dicūt, nō mutādo id, nisi ad decimū
quartū diē. Tertiò, cū potionibus cōstipan-
tibus, vnde aliqui vtuntur, scrupulo vno li-
naturæ chalybis cū vino, in quo heparica
errestris, gallæ virides, & nuces cupressi
incoctę sint. Quartò, cū manuali operatio-
ne, sicut cū incisione ac actuali, siue potētia
li vstione. Et modū incidendi docet Auic.
& Albucasis. & pleriq; alij, quos videre po-
teris. Cura sarcocoles, id est, carnosæ her-
niæ, eo modo erit perficienda, ac si esset
quid

quidam scirrhus. Similiter apostemofia
ramicē curabis non aliter, ac curari solet
alij abscessus: eminentia verò umbilici ei
dem ferè curationem requirit, ac de he
niis dictum est, &c.

*Loci consentientes de cura
ramicum.*

Act. ser. 14. ca. 22. Tutissima itaque cu
rio herniarum chirugia & vstione perfec
tur, si peritus artifex contingat: potest et
medicamento scrotum inuri, & cōsumpt
humore & cicatrice inducta firmari, &
Gal. meth. 14. c. 13. Quod humor qui in hy
drocelis visitur, alienus à corporis substa
tia tota natura sit, sicuti etiā quæ in asciti
hydropibus continetur aqua, dixisse suffi
cit, quarum certè euacuationem vel medi
camentis quæ digerans molimur, vel chi
rurgia in hydrocele quidē immisso sypho
ne in asciti adhibita punctione, quā para
centesis vocant, &c. Vide hac de re Arc. 9.
alman. Auic. & Marc. Cat. Auic. 2. 2. cap. 5.
Si ambo ad oseum descendant, possibilis
est reductio cum resupinatione & qualibet
compressione cum manu. Quòd si adda
tur ruptura, incipiatur in desiccando illud
quod dilatatum est propter humiditatem,
& adunando quod scissum est, & ingenie
tur in consolidatione eius. Quòd si fiat in
obed

mediēs ad redeūdum, sedeat æger in aqua
lida, & emplastretur ruptura donec re-
eat, deinde cōstringatur, &c. De cura sar-
celes lege Gal. 14. meth. ca. 17. nam cum
irrhis eum enumerat.

Observationes circa regimen.

Auic. 2. 2. c. 4. Regimen vniuersaliter ha-
entibus rupturam est dimittere repletio-
em & motum plurimum, & saltus, & in-
estum subitum & coitum. Item dimittere
ibos inflatiuos, & non multum vti potu-
quæ, & dimittere omnes res mollifican-
es, &c. B. Cōsidera quòd cuiq; ramicis spe-
iei victus ratio sit in cōtrariū exhibenda.

Cōferētia enterocelis & hydrocelis.

Conferunt enterocelis & hydrocelis bar-
ba hirci, bdellium, adeps canis cū alumine
cisso, cupressi folia & nucis, glutē de co-
iis, muscus, herba, plantago, psylliū, semen
ini cū resina & myrrha, pentaphilon, ruta
yluestris, symphitum, betonica, tritici pa-
leæ, filix herba cum axungia, lenticula in
modum emplastri, peucedanum, cerotū de
pelle arietina. lege de his in consiliis Mon-
tagnanæ. Item Gord. Sauo. & Arcul.

De prognosticis ramicum.

Auic. 22. c. 2. Et scias quòd ramex intesti-
norū & tribr̄ est ægritudo multū difficilis,
quātumuis sit parua, & ramex aquæ est æ-
gritu

gritudo facilis, & si sit magna: ramex ve-
ramicosus ac carnosus difficulter aut nu-
quā sanatur, & tandē oēs ramices inueter-
ti, ac longo tēpore facti, suspecti sunt, ne-
stes corrūpant. Aet. ser. 1 4. c. 2 4. Caterū
nosse expedit intestinorū herniā, qualiso-
que fuerit, semper aquosa deteriorē. Gor
Et quū pertransit septem dies, tunc lab-
sunt dura & obturata, quorum vnio vid-
tur impossibilis, &c.

De gonorrhœa.

Quod semini profluvium Latine dicitur
Græcè γονόρροια ἀπὸ τοῦ γόνις, quod est genit-
le semē, & ροῖα quod est fluere, appellata est
quæ nil aliud est quàm inuita ac præter vo-
luntatem & pudendi tensionē, seminis ex-
cretio. Sunt tamen qui differentiam inte-
semen & geniturā esse dicant, ut semē ra-
tūm in his esse velint qui generare adhu-
non possunt, econtrā verò genituram.

Loci consentientes de gonorrhœa.

Gal. 6. de loc. aff. ca. 5. Gonorrhœa est in-
uita ac præter voluntatē seminis excretio.
Et paulò post, significantius dices esse as-
siduam seminis excretionē haud quaquam
cole extēso. Aet. ser. 1 1. cap. 33. Gonorrhœa
est seminis excretio præter voluntatem ac
pudendi tentiginem.

De

De causis gonorrhœe.

Causæ sunt vel spermatis copia, vel eius
 multas & acrimonia, vel multitudo eorū
 æ generant sperma, vel erunt imbecilli
 retētriciis aut facultatis, aut expulsoariæ
 titudo in seminariis vasis: vel gonor-
 œa ex conuulsione cōtingere potest, aut
 renibus ob eorū adipis liquefactionē,
 æ fieri potest à nimio coitus desiderio,
 it à multitudine coit⁹, aut ei⁹ cogitatiōe.

*Loci consēientes de causis
 gonorrhœe.*

Gal. 6. de sympt. cau. ca. 4. Gonorrhœa si
 idendo non intento euenerit, retētriciis
 cultatis in seminariis vasis imbecillitatē
 quitur. Si verò intento cole acciderit, cō-
 llsioni quodāmodo similis erit affectus,
 c. Vide Gal. 6. de loc. aff. ca. 5. ibi. Nā sicut
 tentio, & c. Vide etiam Aet. 11. cap. 22. ibi,
 it gonorrhœa ex vasorum seminaliū flu-
 one, & c. Vide etiā Auic. 20. c. 30. ibi, Cau-
 aut est in spermate, aut in vasis semina-
 bus, aut in renibus & lacertis, aut in prin-
 piis ex spermate vel ob eius copiam, &
 enuitatem, & c.

De signis gonorrhœe.

Signa quādo fit ex multitudine seminis
 int, quia ad copiam coitus nulla corporis
 imbecillitas siue diminutio sequit⁹. Signa
 tenui

tenuitatis seminis sūt manifesta inspicit
 sperma. Signa mordacitatis seminis sui,
 quia in exitu dolor percipitur, adest ard
 urinæ, & color eius ad flauitiam declin
 est. Signa imbecillitatis retentricis sui,
 quia sine erectione virgæ semē egreditur
 si à conuulsione hoc malum proueniat,
 erit erectio, &c.

Loci consentientes de signis

gonorrhœæ.

Auic. 20. cap. 3. Illā, in qua causa est sp
 matis multitudo non sequitur debilitas
 diminutio cum multitudine coitus, &c.
 illa quæ fit à tenuitate eius, cognoscitur
 turmis spermatis præsentia. Et illa quæ
 propter acuitatem & mordicationē ei
 sentitur ipsa in egressione, &c. Lege A
 ser. 11. ca. 33. & Gal. 6. de loc. aff. cap 5. &c.

De cura gonorrhœæ.

Similis erit huic cura, qualis in omni
 xu parari solet. primò cū pauco cibo & p
 tu, & si à læsa retentrice gonorrhœa ori
 cataplasmatibus, in sersionibus adstringen
 bus vtendū, ex lentisco, rubo, myrtho, ac
 tia, hycisthide paratis. Si fiat à multitudine
 seminis, euacuetur primū, deinde spe
 ma exiccetur. Exiccant sperma rad. nen
 pharis. 5. lactucæ, portulacæ, rutæ, agni, l
 est casti, folia salicis, ciminū, calamētū, m
 rh.

ia, euphorbium, item diaciminum, &c. Si
 it à tenuitate spermatis, tēperetur cū sty-
 icis calefacientibus exiccando & crassi-
 em inducendo. Si à facultate expulso-
 ria, tunc vtendum est frigidis & parumper stu-
 pefacientibus, &c.

*Loci consentientes de cura
 gonorrhææ.*

Auic. lo. ci. c. 22. Minoretur cibus, fiat
 euacuatio, & administrētur ea quæ exiccāt
 sperma, & minorant ipsum. Euacuatio te-
 nuitatis eius est cū eis quibus inest styptici-
 is, & calefactio cū exiccatiuis permixta,
 &c. Vide illum fusius. Aet. ser. II. cap. 33. Pri-
 mum in quiete & paucō cibo & aquæ potu
 affectos obseruare oportet, cibi non facile
 corrumpātur, nec difficulter permutētur,
 resiccandi vim habeāt, &c. B. Quod sint
 in quiete, intelligendus est Aetius in pri-
 mo morbi tēpore: nam post hoc exercitiis
 egros esse committendos ait Paul quibus
 totum corpus & affectæ partes fimentur.

Observationes circa curam.

Cauendū est primū, ne quum crassitiē
 tenuitatis genituræ inducere quæras, ali-
 quid in medicamentorū compositione ad-
 datur, quod genituram adaugeat, &c.

Conferentia gonorrhææ.

Cōferūt gonorrhææ agnus, id est castus,

F f

aqua frigida, calamentū, camphora, lac
præcum melle potatū, castoreū cum su
agni, casticoreū, hæmatites lapis, eruca,
etruca semen, nymphaea, portulaca, plun
lamina, semen rutæ, ireos, diaprasium N
colai, electuarius Sauo.

De prognosticis gonorrhæa.

Aet. ser. 1. ca. 33. Non solūm autem
ris, sed & mulierculis hoc malum accid.
& in feminis ægrè tollitur, &c.

De priapismo.

Priapismus est genitalis mēbri tentis
in longum & latū citra veneris appetenti
aucta, & denominatur à Priapo, quē tale
membrū habuisse suapte natura finxerunt
homines. Sunt qui hanc affectionē Satyr
sim nominēt, à Satyro etiā priapo dictam
sed quū Pau. distincta capita de satyriasi
& priapismo habeat, describatūq; ab ipsi
ἀ σατυρισὶς ὅτι πάλαις το αἰσίοις, &c. fecit
rem à priapismo distinctā aliquāliter esse
dubitarem ob eorum causam, de qua infra
filius dicitur.

Loci consentientes, de priapismo.

Gal. 6. de loc. aff. c. 5. Priapismus est, cū
coles & in longitudine & circulo totus au
getur, nullo stimulante ad libidinē deside
rio, aut acquisito calore, ut quibusdam acc
dit, qui supini decūbunt. Lege similē descri
ptio

ionem iuxta Gal. 9. de compos. med. per
ic. capit. 9. ibi, Priapismus est auctio pu-
ndi, &c.

De causis priapismi.

Causæ huius affectus sunt tres, prima ar-
riarū ora immodicè patētia: secunda, va-
rosus spiritus in fistuloso neruo ortus:
tertia, est rei venereæ abstinētia. Ora arte-
riarū patēt vel ob humorū vitia, vel ob fla-
tuosum spiritū sine ordine & violēter eua-
natū: flatuosus verò spiritus fit ab humore
viscoso crassoque, cum caloris paucitate.
Abstinentia rei venereæ accidit ob seminis
exenti multitudinē, &c. Satyriasis, de qua
superius mētionem fecimus, est assidua co-
is palpitatio, quæ cū vasorū seminis inflā-
natione, interdū cum intentione accidere
solet: quæ si tantum à flatuoso spiritu fiat,
nullo modo à priapismo differre potest.

Loci consentientes de causis.

priapismi.

Gal. 6. de loc. affect. ca. vlt. Fit priapismus
vel ob arteriarum ora immodicè patentia,
&c. Lege etiam Gal. in lib. de Tum. præter
naturam cap. 15. ibi, Pudendorū tensiones
præter naturam quæ non desistūt, quidam
σαρβασιμὸν, quidam *πριαπισμὸν* nuncu-
parunt. vide horum differentiam postea 6.
de loc. affect. capit. vlti. Vide etiam causas

flatuosi spiritus. 1. meth. ca. 7. Item 6. sympt. cau. cap. 2. De satyriasi, vide Pauli prima palpitatione locutū. De secūda mentionē Aet. vnā cū priapismo. Auic. 3. c. 37. Causa propinqua tensionis est multitudo ventositatis crassæ in partibus membrorum coitus aut materiæ vêtosæ, in ipso morbo cōcauo, aut superueniens eis exterius aut valis spermatis.

De indicis priapismi.

Indicia per se sunt manifesta ex definitione data. & ex infirmi relatione: lege tamen Gal. 14. meth. ca. 5. In iis qui sic sunt affecti etiam inuitis pudendum arrigitur, quod ubi viderit quispiam, statim intelliget et ex inflammationum genere, &c.

De cura priapismi.

Si causa fuerit materia flatum efficiens tunc tres medendi intentiones insurgunt. prima regimen victus, secunda est euacuatio, tertia materiæ discussio & resolutio. Regimē sit attenuās absq; manifesta caliditate. Euacuatio fiet vel per sanguinis missionem, vel per purgationē, tum per vomitum, tum per ea quæ per inferiora solvūt. Residuū materiæ discutitur per frictiones crebras, per exercitium & balnea ex aquis digerentibus, & per ea quæ vnico verbo calefaciunt & exiccant. Sed interim per

in initia si calidior materia fuerit, ea im-
menda quæ caloris proportioni respon-
dent, ut cum cerato rosaceo, infrigidante
caleni, cum lamina plumbi, &c. Digesta
materia tunc ad dissoluentia accedendum
ne calefactione vehementi: si autem cum
momilla agno, id est, casto, &c.

*Loci consentientes de cu-
ra priapismi.*

Aet. ser. 2. cap. 32. loquens de regimine
inquit, Hac affectione prehenso, inedia us-
que ad tres dies adseruare conuenit, ut eni-
umque esse cibis qui leniter attenuare va-
leant citra manifestam caliditatem, &c.
idem ait Gal. 4. met. & cap. 8. & 9. de cō-
f. med. per loc. cap. 9. ibi, Palam est non
portere membra ipsa calefacere sed refri-
gerare leniter per ceratū rosaceū, &c. lege-
tiam fusius in meth. cap. 8. ibi, Principiū
irrationis cōmune est, ut totum corpus ea-
dem ferre potest euacuatione euacuetur,
euacuatio fiet per missionem sanguinis,
&c. lege eum fusius, & plura à me recitata
intelliges, &c.

Observationes in cura.

Aet. ser. 2. cap. 32. ait cauenda esse quæ-
cumque vrinam citare possunt, & omnia
quæ venerem prouocare valeant. Auic.
en. 20. cap. 39. Dimittat coitū omnino, &

cogitationem in eo, & confyderationem
id quod mouet defyderium, nifi acciderit
priapismus propter emiffionem coitus
nam tunc coitus est curatio &c.

*Prohibitia satyriasm &
venerem.*

Prohibent satyriasm & venerem vit,
allium, berbena, camphora, cicuta, catap
mata, coriandrum, eruca, ruta, lactuca n
ta, fumus muris, & nymphaea, salicis fol
portulaca, rofa, plumbum, stannum, ne
ta, faba & diaolibanum Nic.

De prognosticis priapismi.

Aet. ser. 2. cap. 32. Caterum dolores e
cōtingunt; quales tetanici habēt, & hi q
reliquis mēbris distendūt, & ex præcipi
hōc modo affecti pereūt, nifi confestim e
auxiliū feratur: quū verò moriūtur, vē
eorū inflatur, & frigidū exudāt, &c. Aui
loc. cit. cap. 37. Et hoc accidens quando n
curatur, peruenit ad tetanū vasorum spei
matis, & accidit apostema calidum cū eo
& interficit, &c.

*Authores dissentientes circa
Venerea.*

- 1 Adferere, defyderiū coitus esse tantū
ex cerebro ob virtutem imaginatiuam
 - 2 Adferere, gonorrhœam esse passionem
propriā pudēdi & expultricis facultatis
- Adfer

Adserere, coitum nec per se, nec per accidens valere in ægritudinibus cerebri pituitosis.

Adserere, satyriasm esse morbum ridiculosum potius quàm curandum.

Confutatio dissentientium.

circa Venerea.

Ad primum respondetur, quòd duplex desiderium: alterum scilicet animale, quod in concupiscentia inuenitur: alterum naturale, ex repletione spermatis, quã euacuare tentat natura. Primum vt quædã concupiscentia à corde oritur, licet per cerebrum postea perficiatur. Secundum preuenit iecore, vnde Auic. Et desiderium coitus non ab hepate, &c. igitur non tantum ex cerebro, sed ex aliis etiã membris principalibus.

Ad 2. dicitur, quod iuxta Galeni placitum nonorrhœa sit passio per se retentoriæ facultatis, & propria vasorum seminalium, sed per accidens expulsiuæ, & secundum apparentiam ipsius pudendi, & hoc affirmant Auic. & Sera. Non erit igitur proprius expultricis nec pudendi affectus, sed per accidens.

Ad 3. inquit Auic. coitum maximè præstare ad euacuationem & diuersionem superfluitatum, vnde in ileo morbo præsertim iuuat, quoniam causam ægritudinis,

Ff 4

quæ fit ob amorem, remouet, & parat
cadere in ægrotudines phlegmaticas
eius multitudine liberat, si moderatus p-
cipuè fuerit, &c.

Ad 4. Auic. Perducit hominē ad spasm
& tetanum vasorum spermatis, & inter-
cit. Vnde morbus hic valde timendus e-
& non ridentius, vt aliqui adserunt, &c.

De suppressione mēstruorum.

Menses sunt mulierum profluvia, à v-
riato humore dependētia, eoque dicti su-
quod lingulo mense accidunt. Tempus d-
rationis mēstruorum multis mulierib-
est à primo vsque ad tertium diem nō p-
cis à primo vsque ad quintum, aliis ad s-
ptimum, & rarò ad duodecimum acced-
profluendo incipitque fluere à quartode-
mo anno, paucis ante 13. aut 12. nec vlti-
quingagesimum fieri solet: imò à trigin-
ta quinque annis præsertim obesis mulie-
ribus solet cessare, &c.

*Loci consentientes de suppressio-
ne mēstruorum.*

Gal. 6. de sympt. causis cap. 4. Mense
sunt deprauatæ per vterum fluxiones, qua
expurgato per hanc partem vniuerso corpo-
re fiunt. Pau. lib. 3. cap. 60. Mulierum plur-
mis menses quarto decimo anno fluere in-
cipiunt, paucis ante 13. aut 12. plerisq; post

erumpunt Haly. Abb. 9. de pass. matri. latitudinem inceptionis menstruorum esse quod à quarto anno completo usque ad . . . & latitudinē desinētiæ à 36. usque ad 50. hoc idem affirmant Auic. & Arist. 9. de animalibus & hoc intelligitur de vniuersali durationis tēpore. Particulare verò incipit à duobus diebus, & se extendit usque ad septem. Gal. 5. apho. Tempus menstruationis durat à 3. die usque ad 8. quod si ultra citrà que fluxerit, talem fluxum præter naturam diximus, &c.

De causis suppressionis menstruorum.

Menstrua supprimuntur vel per se affecto utero, vel per consensum. Per se afficitur uterus vel ex duritie contracta, vel ex enarum angustia, vel ratione facultatis expulsoariæ, quæ ob malam intemperiem riri solet. Supprimuntur rursus, obstructis vasibus, quæ ad uterum descendunt, & hoc vel ratione caloris desiccantis, vel ob opiam humorum crassorum, vel ob abcessum, vel carnem aditam. Sistuntur etiã nenses, si ad alia loca sanguis transferatur, vel ob varia excretionum genera, &c. Per consensum etiam supprimuntur, vel ratione hepatis sanguinem non discernentis, vel ratione obstructionis totius corporis, vel aliorum membrorum particula-

rium, &c.

Loci consentientes de causis suppressionis menstruum.

Gal. 6. de sympt. cau. ca. 4. Suppressio causa menstruum vel est durities uti quæ vel illico ab origine contrahitur, post generationem: & hoc ratione uti affecti, qui ex venarum angustia, aut ex fori uteri compressione, quum immodice corpus crassescit, aut ex intemperie utri procedit. Detinentur etiam menses ob materiam ipsam, quum crassum fuerit vel visum quod enacuatur. Supprimuntur rursum obstructis ob huiusmodi humores, val quæ ad uterum descendunt, vel ratione universi corporis, &c. lege tu fusius Aet. sc. 16. ca. 51. Sistuntur menses quibus sanguis crassus est & viscosus, & quibus ad alia loca transfertur, velut per nares & sedem. Quin & sanguinem ex torace reieciuntibus vel quibus per venæ sectionem multus extrahitur, &c. Lege de his causis Gal. aphor. 5. cōment. 57. Item Auic. fen. 21. cap. 25. ibi Menstrua retinentur aut propter causam propriam, aut communem, &c.

De signis suppressionis menstruum.

Suppressio menstruum quæ fit à frigore, cognoscitur gravitate, somno, coloris albedine, pulsus raritate, copia urinae, & excret

cretione pituitosa. Que verò fit à caliditate, demonstratur ex inflatione ac exiccatione vteri, vel ex his quæ vterũ radunt ac ardent: quæ verò fit à siccitate, manifesta ex his quæ præterierunt, præsertim ex tenuatione corporis & venarũ tenuitate quæ autem fit ab abscessibus vel carne indurata per obstetricem, cum signis abscessuum cognoscitur. Similiter quæ fit à duritie, vel à conceptione, per obstetricem vtericervicem tangentem cognoscetur, &c.

Loci consentientes de signis suppressionis menstruorum.

De signis lege Auic. 21. cap. 27. Illius quæ tendet à frigore, signũ est grauitas somni & profundatio in ipso, & albedo coloris, viriditas venarum, & raritas pulsus, & multitudo vrinæ, & phlegmatica egestio, reliqua. Lege eum vberius. Gal. 6. de loc. f. cap. de vteri aff. citat aphor. 39. lib. 5. Si mulier quæ neque grauida est, neque peperit, lac habet, menstrua huic efecerunt, & ibi alia indicia suppressionis ponit: nam inquit, Grauitas totum corpus molestat. Item fastidiũ, vt nulla adit cibi cupiditas, horror inæqualis. Quod in inæqualitas sine horrore euenerit, aliequæ cupiat, iube quòd obstetrix vteri cervicem tangat: nam dictum est ab Hippoc. aphor.

aphor. 5. aphor. 34. Quibus os veteri dicitur
est, his vteri os comprimi est necessariū: quod
si citra duritiem clausum sit, eam prægin-
tem esse conicies: quod si clausum sit, et
duritie, effectum esse vterū portendit, &
lege tu fulius. Lege etiam Aet. ser. 16. c.
54. ibi, Supprimuntur ex frigidiorē tēpe-
tura, &c. Quod per excrementa corporis
signa habere possimus, elice ex Gal. 6.
sympt. cau. cap. 4. ibi, Talem semper refe-
speciem id quod excernitur, quale est
quod in animante redundat, &c.

De cura suppressionis menstruorum.

Cura retentionis menstruorum duobus
scopis indiget: primū in remouenda causa,
si, alterum in prouocandis menstruis. Si
causa igitur fuerit vehementissimus calor
menstrua cohibens, tunc prouocare ea no-
licet, quum sat sit ab hoc calore superflui-
tates absumi. Si verò in causa fuerint lon-
gæ ægritudines præcedentes cum imbeci-
litate virium, tunc nec prouocanda sunt
quum corpus potius reficientibus quàm
euacuantibus indigeat. Si verò causa fuerit
materia pituitosa, tunc in medendo opus
est, materiam, à qua menstrua corrumpun-
tur, & à suo naturali ordine mutantur, præ-
parare, & præparatam euacuare. Præpara-
tur crassa attenuando, & obstructa aperiendo

cum oxymelle, sy. bisantino de duabus
oil. cum aquis fœniculi, apij, cuscuta. Eua-
ntur cum his quæ humorem superfluum
ducunt, vt cum aggarico, electuario indo,
aphinicone, &c. & si qua mala fuerit in-
temperies relictæ, tunc his remoueri debet,
æ stomachum & hepar roborant, quales
sunt multæ confectiones, &c. Quod si men-
strua retineantur ab aliquo abscessu, curatur
per apostematum, vt pluries dictum est. Si
causa fuerit pinguedo, tunc adbibitis resol-
utivis, &c. Si causa fuerit aliquod vlcus, tunc
curatio erit impossibilis: & si quid curæ fue-
rit, tunc per regimen & frequentem venæ
sectionem fiet vt sanguis per tenuem vi-
scerum & sanguinis missionem, qui fluere
per intestina consueuerat, discutiatur ac
vacuetur. Prouocant deinceps menstrua
per coctum quinque rad. cum sabina, pule-
gio, calamento, mentastro, origano cū syr.
per duobus vel quinque rad. Prouocant va-
riè per trochisci de Razes, cassia lignea,
zocus, cinnamomum, borax aurificum.
Item balnea, frictiones & cucurbitulæ po-
sitibus ac coxarum parti domesticæ appli-
catis, item saphenæ venæ incisio, & pessa-
næ ex mercuriali & melanthio cum mu-
do in rara syndone, &c.

Loci

Loci consentientes de cura suppressionis menstruorum.

De cura lege Aet. ser. 16. cap. 53 ibi, Quob nimiam caliditatem non purgatur, & maximè humectare oportet cū balneis vberiore ac humidiorē cibo & potu, & ob nimiam frigiditatem oppositam curationem exposcunt, &c. Gal. aph. 5. com. 36. Intentio sanationis est primū orarum adaperire, quæ ad vterū pertingit sanguinēque extenuare, deinde purificationem adhibere: nam quando crassi euacuantur humores, tales sanantur dispositiones, &c. De prouocandis menstruis le aph. 28. lib. 5. ibi, Suffitus aromatū mēbria ducit, sēpius verò & ad alia utilis est nisi capitis facerent grauitatē, &c. B. Veritatem nō cōtinet apho. in omni mēstruæ suppressione: nā si detinētur menstrua vteri inflātionē, aut tētionē, aut ob alia similes causas, nihil suffitus aromatū predest, sed si sistūtur ratione sanguinis crassitatis, verū est, q̄ per aromatū suffitus menses euocātur, quum crassa extenuat, obstructa incidendo reserat, & obserata aperit. Quæ verò sint aromata docet Ga. esse anmū, cassiam, costū, cinn. &c. vide Auic. 2 tra. 3 ca. 28. Vide etiam Arc. & Marc. Ca
Prou

Prouocantia menstrua.

Prouocāt menstrua ablinthium, acorus,
 aricus, agnus castus, alliū, aloës, amara-
 m, amygdalæ amaræ, abrotanū, artemi-
 sa, ciclamē, calamentum, chamedrys,
 amapithys camomilla, cantarides, casto-
 rum, centaurium, cinnamomum, cupres-
 s, cyperus, cucumer agrestis, naucus, hele-
 um, eupatorium, phascoli rub. lens sylus
 tis, galbanum ammoniacum, iris lupini,
 iorana, cuscata, laurus, laudanum, mar-
 bium, melissa, mentastrum. matricaria,
 ercurialis, myrrha, nasturtium, ouum a-
 tis, origanum, ozimum, papauer, rub. pa-
 naca, peonia, peucedanum, pulegium, ra-
 manus, rosinarinus, rabea tinctarum, ru-
 sambucus, saluia satiregia, sauina, ser-
 illum, sinapis scamonium, scilla, spica, vr-
 ca, vsnea. Composita sunt diacalamentū,
 atrion, pipereon, diaphrasium, troc. de
 yrrha, theriaca magna, triphera magna,
 lula fœtida de serapino.

*De prognosticis suppressionis.**menstruorum.*

Act. ser. 16. cap. 52. Suppreſſis menſtruis
 inguinis reiectationis ac syderationis pe-
 culū imminet, &c. lege nōnulla etiā iux-
 Gal. 6. de loc. affe. cap. 4. Quæ intelli-
 gi possunt de menſtruis quā de retēto se-
 mine

mine. Auic. 21. tra. 3. cap. 26. Suppressis menses ei cui virtus ad excernendum efflorescens, assimilatur vtris, & multiplicatur capilli, & nascitur ei veluti barba. Quare igitur forma eius & incrassatur, deinde corrumpitur, & interdum prouenit ante mortem ad dispositionem, cum qua non est possibile ut prouocentur menstrua. Hippoc. ap. 5. aphor. 34. Menstruis deficientibus sanguis ex naribus fluens, bonum. Et aphor. 57. eiusdem, Si menstrua plura fiant, addunt morbi: & si non fiant, ex utero morbi contingunt. B. Quasi dixerit, si menstrua detinentur, necesse est processum tempus ipsum uterum pati: lege Gal. comment. 1. aphor. 5. aphor. 61. Si mulieri cessent purificationes, neque febris neque rigor superueniat, & fastidia accendant, iudica ipsam in utero habere.

De mensium profluvio & eius causis.

Duplicem hic affectus habet causam, vnde ab utero vnde emanat, vel ab ipso humore fluente. Prima fit aut ab uteri imbecillitate aut ab eius venarum apertione aut à quopiam ulcere corrodeute vel scissura. 2. bifariam fieri contingit, vel ab ipsius sanguinis quantitate vel qualitate. Quantitate vel causa repletionis nimium corpus aggrauatis vnde

nde fit euacuatio, quæ vel naturalis vel nō naturalis erit. Naturalis, quum à natura fiat, vt superfluum tantummodo expellitur: non naturalis, quum ob suam multitudinem & dominium immodicè profluat: malitate, vel causa caliditatis sanguinis vel tenuitatis. Interdum etiam superfluunt menstrua causa abortiui fœtus, vel ob partibus grandiores, &c.

Loci consentientes de causis profluuij menſtruorum.

Gale. Aphor. 5. comm. 57. Fit immodica menſtruorum euacuatio, si ora vasorū quæ d vterum pertingunt, vltra modum apertantur, aut si sanguis vel calidior vel tenuior fiat, aut sua multitudine modum naturæ conuenientem excedat, aut totū corpus aggrauet, &c. Lege etiam Auic. 21. tra. cap. 2. ibi, Superfluitates quandoque fiunt secundum semitam ægritudinis, aut propter dispositionem in matrice, aut propter eius debilitatem, aut malitiam completionis, aut propter vlcera & corrosiones, &c. Lege etiam Paul. lib. 3. ibi, Fit etiam ob partes grandiores & crebrò ob abortiui fœtus causam, &c.

De signis profluuij menſtruorum.

Signa menſtrui ab imbecillitate vteri, aut ab apertione venarum prouenientis

Gg

erunt, si sanguis exierit purus, nullū dolo-
rem inferens ab vlcere, si profluat paula-
tim, & maximo cū dolore prodeat. Consy-
derentur tamen & quantitas ipsius fluentis
sanguinis, & modus delationis: nā amplio-
ribus vasis ruptis magna sanguinis copia
statim profluit, minoribus verò nō itidem.
Signa ex quātitate sanguinis nimium cor-
pus replentis sunt. Signa repletionis, vt ve-
narū latitudo, exuberans faciei & corporis
repletio, quę interdum cū dolore est. Signa,
quando fit à mala qualitate, sunt, caliditas,
tenuitas, acrimonia & color prauus. Signa
immoderatę euacuationis sunt color fœ-
dus, pedes tumescunt, concoctio vitatur, &
prosternitur corporis robur, &c.

*Loci consentientes de signis pro-
fluy menstruorum.*

Auic. 21. tra. 3. cap. 3. Factam à debilitate
matricis & apertione venarum significat
exitus sanguinis puri nō dolorem faciens,
&c. Lege eum fusius. Gal. 6. de loc. aff. ca. 4.
Quū immodicē euacuantur, sequitur co-
lor fœdus, pedes molli tumore attollūtur,
corporis robur prosternitur, ciborum tum
concoctio, tum cupiditas vitatur, atque in
totum omnia quotquot immoderatam san-
guinis euacuationem siue ex hæmorrhoi-
de, siue alio quopiam sanguinis fluore eue-
nient

nientem sequi cōsueuerunt, accidentia huiusmodi fœminas infestant, &c. Lege Arcul. & Act.

De cura profluuij menstruorum.

In superfluo mensium fluxu binæ requiruntur intentiones, quarū altera in remouenda fluxus causa consistit: altera in retinendo fluxum: verū in praxi vltimum quod est in intentione, primum esse debet in exequutione. Si igitur causa multitudinis sanguinis menstrua superfluxerint, tūc sectione venæ, & victu tenui, qui sanguinem non adaugeat, succurrendum. Si verò cōtinui ac calidi sanguinis fluxus accidat, tunc sanguis cum syr. ros. de granatis, de suc. acet. cū aquis acetosæ, portulacæ, plantaginis alteretur: & si quid bilis secum admixtum sit, euacuetur cum myrobalanis, cassia & rheub. Deinde sanguinis discrasia cum diarrhodone, triasandalis, vel cū epithemate ex aqua ros. plantaginis & vnctio nibus frigidis remoueatur. Si vasorum apertio in causa sit, per obturationem, & ruptura per conglutinationem, & erosio per renutritionem curabuntur. Si causa fuerit vteri imbecillitas, per aromata styptica, quæ sua proprietate roborant, curabitur: si causa fuerit vlcus, tunc opus sunt duæ intentiones, absterio scilicet

& conglutinatio, &c. Et hæc de prima retentione. Secunda, intentio est sanguinis cohibitio, quæ duobus mediis perficitur: primo diuersione, ut sanguinem ad alias partes renocemus: secundo cohibitio, restringendo & viam intercepti per quam sanguis debet fluere. Diuersio igitur per sectionem venæ hepaticæ vel basilicæ, aut per impositionem cucurbitularum in manibus ante cibum, vel sub brachiis cum hementi frictione. Interceptio viarum per quas sanguis fluit tum intrinsecè tum extrinsecè fieri potest: intrinsecè cum syr. f.igidis stypticis, qualis est syr. ros. myrt. nus de portulaca, cum aquis plantagin. folatri. acetosæ, quibus adiici potest troch. de charabe, de terra sigillata, de spodio, femine acetosæ, item pilulis corallorum rub. lapidis hæmatitis, electuar. de scor. ferri & triphera ex arte phemonis, &c. Valent etiam in hoc casu nascalia ex coto. suc. plang. immerso cum bolo armenio sanguine draconis, &c. Item balnea & inunctiones ex rebus stypticis, ut ex rosis cor. granatorum, gallis, balauistiis, acatia, hypocythide, &c. Quæ omnia quum nihil profecerint, ad narcotica, considerata primè virtute, refugiendum, qualis est athanasii Nic. & phylonium.

Loci consentientes de cura.

De cura lege Auicen. 21. tra. 3. cap. 4. ibi,
acta à multitudine aggrauante corpus,
&c. Si fiat à bile, euacuetur cum myrobala-
is, in quibus est virtus styptica: si ab vteri
inbecillitate, dentur aromata, &c. Gale. 7.
de compos. med. per loc. cap. 4. Osculi vaso-
rum apertio per obturationem, & ruptura
per conglutinationē, & erosio per renutri-
tionē curatur, &c. Et meth. 5. ca. 4. & 5. Exi-
menda est profusionis quantitas: nam si
perruptum vas aliquod magnū est, aut ve-
ementem reclusum hiat, utique adstrin-
gentibus medicinis opus est, veluti balau-
io, hypocystide, omphacio, acatia, gallis
maturis & malicorio. Sin vel exiguum
est perruptū, & nō multus profluit san-
guis, tunc aloē, & manna, & pini cortex, &
lematum sigillum, lapis hæmatites, &
alia similia ex austero vino nigro utilia
medicamenta. Vide etiam de cucurbitulis
ad mamillas applicandis meth. 13. cap. 19.
ibi, Sic nanque ad mamillas cucurbitulas
imponimus, quum sanguis ex vtero pro-
luit. Itidem meth. 5. cap. 3. Hippo. Aphor. 5.
Aph. 50. Mulieri si vis menstrua cohibere,
cucurbitulam quā maximam ad mam-
illas appone, &c. De regimine victus le-
ge Aet. ser. 16. cap. 64. ibi, Imperandum est

vnus aut alterius diei ieiunium, &c. Le
etiam Auic. fen. 21. cap. 4. ibi, Cibetur ie
cum eis quæ sunt vitelli ouorum, &c.

*Sistentia ac supprimētia
menstrua.*

Sistunt ac supprimunt menstrua acat
acetosa, alumen, aizoon, aqua alumino,
balaustia, barba hirci, bolus armenius, b
Etæ pifantiæ suffumigium, castanearū c
rices, cauda equina, cornu cerui vstum,
cuta, citonia, coagula, cōsolida, coralli,
riandrū, lapis hæmatites, hepatica, vinu
extinctionis ferri, fimus capræ, gallæ i
maturæ, gypsum, gumi arab. glandes, gi
natorum cort. & flores hyosciami, char
be, lapis iaspis, lentes, lentiscus lycium, t
men mādregoræ, margaritæ, mastix, me
ta, millefolium, myrrha, myrthus, fronde
mori, mumia, nymphaea, olibanum, oliu
polygoniū, portulaca, cortices interiore
quercus & vlni, rota, rubri, sanguis drace
nis, filiquæ Aegyptiæ comestæ, solatrū, su
mach, scoria ferri, vernix, spodiū, spica in
da, virga pastoris, flores vitis agrestis, hy
pocysthidis succus, peunidi acerbi & agre
stis. Compos. sunt conf. alchechengi Auic
1.5. cōfectio scorix. Auic. 2.5. diabolibanun
Nic. phyloniū Persicum Mes. syr. de myr
tho, de portulaca, theodoricon magnum

Tr

iphera minor fœnonis, Mes. Troc. de ter
figillata, de charabe, de spodio, de chi-
ra, at hanasia Haly. 6. ant. &c.

*De prognosticis suppressionis
menstruorum.*

Hipp. Aph. 5. Aph. 56. In fluxu muliebri
convulsio & animi defectus aduenerit,
alū. B. Nam ad omnem immodicam eua-
cationem, tanquā casus cōmunis, animi
defectus accidere solet. Vnde Gal. meth. 5.
p. 5. Profluere prohibetur ob animi deli-
rium, quod sæpius accidere solet, &c. Et
ph. 5. Aph. 57. Si menstrua plura fiant, ac-
dunt morbi: & si nō fiant, ex utero morbi
contingunt. Auic. 21. ca. 2. Et illud est dete-
ctus, quod ex cōplexionis malitia oritur.
Et quū superfluit sanguinis fluxus, sequitur
debilitas appetitus & digestionis, aut ex-
emitatum inflatio, & coloris malitia, &
interdum perducit ad hydropem, &c.

*De doloribus iuncturarum, siue articu-
lari morbo & podagra.*

Dolor iuncturarū est tristis sensatio ea-
rum à mala intēperie, vel à soluta cōtinui-
tate eis accidēte proueniens. Cuius species
sunt arthritis, podagra, ischias, gonagra
& chiragra. Morbus igitur articularis,
quem Græci ἀρθρίτις vocant, est defluxus
humorum ad artus siue iuncturas pedum

ac manum, cum dolore & tumore. Podagra est pedum affectio, ab humore calido vel frigido, dolorem inferens, etiã nervis patientibus. Ischias est coxarũ dolor durus ac difficilis, à materia fluente in vertebra ischiæ, & ligamenta, vsque ad poplites & suras. Gonagra est inflammatio genuum cum intenso dolore. Chiragra est manuum dolor, à materia in nervis & tendonibus manuum contenta.

Loci consentientes de dolo. &c.

Gale. lib. fen. med. Arthritis morbus est inflammatio articulis accidens, quæ magnũ dolorem nervis patientibus adfert. Et Apho. 6. comm. 49. Podagra est inflammatio pedum à fluxione humorũ causata. Paul. lib. 3. cap. 77. Coxendix est dolor à nervis inguinibũsque ad genua vsq; in plurimis autem ad summum pedem pertingens. Auic. cap. de dolo. iunct. Sciatica est dolor, qui incipit à iunctura anchæ, & descendit retro ad coxam, & quãdoque extenditur vsque ad genu & ad calcaneum, &c.

De causis articularis morbi.

Causæ efficientes vel sunt extrinsecæ vel intrinsecæ. Extrinsecæ sunt casus, percussio, propulsus, vel luxatio, labor intempestivus, potio frigida insueta, nauseatiua satietas, nimia repletio, & omne quod bonã digest

gestionē impedit, & superfluitates multiplicat. Item consuetarum euacuationum tentio, item mœrores, curæ, & reliqua nimia pathemata. Causæ intrinsecæ sunt vel ex parte membri suscipientis, vel ex parte fluentis materiæ. Causa instrumētalis est dilatatio meatuum naturalium accidentalis, quæ fit vel propter membri imbecillitatem, aut propter eius malam intemperiem. Rursus imbecillitas membri vel rit à sui origine, vel propter caloris vehementiā, aut propter motū, vel dolores, vel causas extrinsecas. Causa materialis maior ex parte erit pituita, sæpe sanguis, raro bilis, rarissimè omnium atra bilis, &c.

Loci consentientes de causis articularis morbi.

Paul. lib. 3. ca. 78. Cæterum hoc mali frequenter antecedit improbus labor, vehemens ambulatio, equitatus creber, usus venenis intēpestius, insueta frigida potio, &c. Lege eum fusius, & plura inuenies. Lege etiā Auic. 22. cap. de dol. iuncturarū, ubi, Et de causis eius sunt cibi generantes, &c. & paucitas digestionis, quies & demissio exercitij, coitus plurimus, frequentia ebrietatis, & retentio euacuationū, &c. Lege locum vberius. Lege etiā Gal. 6. Aphor. comment. 28. ubi causam enumerat, quòd

Gg 5

multi idcirco laborant, quia patres & alii
habuere podagricos, in quibus semen e-
vitiatū, atque ideo natis vehementiores
fecerunt partiū imbecillitatem: vbi etiam
inquit, quòd necesse est, pedes esse natu-
imbecilliores, si quis podagra corripitur
beat, &c.

De signis articularis morbi.

Signa causarum extrinsecarū habentur
ex relatione infirmi. Signa intēperiei sim-
plicis sunt, quòd dolor eius est sine grau-
tate, inflatione, & coloris alteratione. Si-
gna intemperiei cum materia sunt, grau-
tas, tumor, quorū absentia nō semper signi-
ficat materiæ priuationem, quū fieri po-
sit vt materia in profundo delitescat. Iter-
permutatio caloris, loci & doloris materi-
inducant flatuosam vel humoralem. Signa
particularis causæ sumuntur à iuuantibus
& nocentibus, itē ex calore loci, & ex pul-
su, & ab egredientibus, & ex hora doloris,
& ex additione eius & repletione. Item ex
aetate, consuetudine, & ex regimine præce-
dente. Signa sanguinis sunt, quia rubescit
locus nisi in profundo lateat, adest tensio,
pulsatio, grauitas, regimē sanguinē adau-
gens, & dispositio corporis sanguinea. Si-
gna bilis sunt, calor intensus, nulla graui-
tas, paucitas rubedinis, dolor est superfi-
cialis,

alis, mordicās, vrina rubea, pulsus velox,
 imperies biliosa, regimen bilem gene-
 ans. Signa pituitę, color albus, liuidus, do-
 lor grauians, remissus, tumor magnus cum
 mollitie, nō sentitur calor, vrina alba, tem-
 peries pituitosa, regimen pituitam gene-
 ans, & ætas senectutis. Signa melanco-
 iæ sunt, dolor remissus, profundus, tumor
 paruus cum durtie, vrina remissa, tenuis
 habitudine extenuata, regimen præcessit
 nelancolicum.

Loci consentientes de signis.

Auic. 22. tra. 3. cap. de sig. dolorum iunct.
 Complexio simplex fit parumper raro, &
 it in ea dolor sine grauedine absque infla-
 tione, & non est alteratio coloris, &c. De si-
 gnis humorum lege Paulum lib. 3. cap. 78.
 ibi, Deprehendi facillē humorum noxam
 inferentium discrimina posse, tum suis co-
 loribus, tum his quæ superueniunt, &c. Le-
 ge eum fusius etiā de particularibus cau-
 sarum signis. Lege etiam Razen in lib. de
 iuncturis, & plura intelliges, &c.

De cura articularis morbi.

Pro cura articularis morbi siue podagra
 quatuor opus sunt intentiones: prima erit
 auersio, quę fiet sanguine peccante, cum se-
 ctione venę per rectā diametrum: aut cum
 euacuatione, minuēdo materiā, sicuti cum
 pilulis

pilulis de hermodactylis minoribus cum
rheubarb. aut cum vomitu. Secunda est
moris siue calidi, siue frigidi digestio, que
fit stypticis frigidis in causa calida, vt cu
sy. ros. de granatis cum aquis plantagin
acerosæ, &c. Et in causa frigida, cum rh
domelle, deinde cum sy. de stechadæ, cu
aquis betonicæ, absinthij & saluiæ perf
tur. Tertia intentio est præparati humor
omnimodo euacuatio, vnde in causa cali
conueniunt pilulæ de herb. min. cum rhe
in frigida pilulæ de hermamai. &c. Qua
ta est doloris prohibitio, quæ fieri potest
causa calida cum repercutientibus anod
nis, qualis est cassia cum oleo ros. dissolut
vel cum aqua solatri & ros. vel cum medu
la panis in lacte cum vitello oui. Sed si fi
xerit omnino materia, tunc anodina simp
citer conueniunt, sicuti camomilla, anethi
mellilotum, fœnugræcum, &c. Vltimo cur
his quæ resoluunt & emolliunt procedendum
sicut cum oleo camomillæ & stercore vacc
no, aut cum balneo ex vino & rebus stypti
cis, &c. Cibaria in causa calida sint frigida
& humida, vt ptisana hordeacea, cū zucha
ro, cucurbita, attriplices, cucumeres, & si
milia. Vitentur dulcia, acria & salsa: itē ca
nes & vina. In causa frigida vict⁹ sit tenuis
& pro potu sit hydromel. Itidem curatur ac
dixi

xi ischias: verum quum in profundo maria lateat, repellentibus in principio non imur, &c.

Locci consentientes de cura articul. morbi.

De prima intentione loquitur Auic. 27. ap. de cur. dolo. iunct. ibi, Cum autem cau- in eis est cum materia, tunc opus ut prohibeatur quod effunditur per attractionem ad contrarium, & per minorationem, &c. in causa sanguinea opus ut administres phlebotomiam ex parte contraria, deinde administres vomitum, &c. Paul. In quibus sanguineus humor redundat, protinus sanguis mitti debet, qui tamen in pituitosis vel strabulariis non est detrahendus, &c. Razes in lib. de iunct. Incipimus minuere ex latere opposito, propter duo comoda: quorum primum est declinare materiam a suo loco, alterum est retardare cursum materie ad locum doloris. Et in lib. diuis. Opus ut non prologetur phlebotomia in sanguinea, sed fiat cum incipit dolor & pulsatio, &c. Vide de his etiam Haly. Abbatē, Arcul. Mar. Cat. &c. Gal. aphor. 6. comment. 28. Non influet humor, si omnino vacans superfluitatibus corpus extiterit: erit enim vacans, si mediocriter utatur exercitio, & bene cibum concoxerit: unde & desidie & crapulae eis nocent, &c. Lege de discipulis Razem loc. citat. ibi.

Diaeta

Dieta sit frigida & humida, sicut aqua dei, & curcubita, & cucumeres &c. Legumina Alexād. ibi, Vitetur dulcia, acuta, & uosa, salsa, &c.

Observationes in euacuatione.

Mar. Cat. inquit, q̄ in euacuādo pituita nō debemus tātū phlegmagogis uti, etiā cholagogis, quum pituita semper b̄ admixta sit, alioquin ex se nō flueret. Scdō, quōd euacuātibus debemus styptica miscere, quia constringendo vias, prohibet materiæ fluxum. Tertiō, quōd à principio vehementi pharmaco non est euacuandum, quia tunc tenue egrederetur, & quod esset crassum, remaneret, &c.

Observationes circa digestionem.

Sera. super 9. alm. Digestiuū materiæ frigida debet esse calidū stypticū, dū materia fluit: sed in materia fluxa debet esse subtiliatuū & incisiuū. Mar. Cat. Digestiua nō debēt esse valde aperientia. nec quæ nerui & iuncturis noceant, sicut oxymel.

Observationes circa percussione.

Gilbertus, Vti debemus percussiuis donec esset dolor & apostematis pulsatio, & tūc cessabimus ab eis: quoniā si vltius viderimus, ingrossabitur materia, & reddetur difficilis dissolutionis. Auic. Percussio non oportet ut fiat materia existente fortis

ortis effusionis plurimæ resumptionis: nā
materiam inobedientem facit, & dolor ac-
cidit magnus.

Observationes circa resoluentia.

Haly Abb. in sua praxi, Non oportet vti
medicaminibus calefaciētibz & subtiliā-
tibz, nisi post digestionem & corporis pur-
gationem: quoniā si aliter fiat, tunc humor
duritur & indurescit, & difficilis fit sana-
tionis. Auic. Non oportet vt approximēt
resolutiua fortia in principio rei ante eua-
cuationem, quoniam faciūt euenire mate-
rias plurimas, deinde resoluunt subtile ea-
rum, & inspissant residuum, & retinent
ipsam, & hoc in materia viscosa & melan-
cholica.

Observationes circa motum.

Alex. Tra. Non superabundantem sequā-
tur motū, quoniā nocet, sed vrantur eo pau-
catim absque labore, quoniā motus gene-
rat bilē rubeā, & eam attrahit ad articulos.
Razes in lib: de iun&. Caueant ab ambula-
tione, equitatione, balneis, retēctione vrine
& egestionis.

*Conferentia doloribus iun-
cturarum.*

Conferunt doloribus iun&tuarum resol-
uēda quædā ac liquefacienda materiā con-
densatā, vt crocus, mellilotū, anisum, aloes,
mastix,

mastix, iris, stechas arab. Quædam cratiem attenuando, & ex profundo attrahendo, sicut carica, mel, lentiscus, abrotanum, apium sylvestre, calamentum aristolochia, ruta cum melle, vrtica nasturtium, gummatæ sylvestris, ammoniacum, galbanum, euphorbium, resina terebenthina, costus, castoreum. Quædam attrahendo & vesicando, ut cepæ, allium, lac, ficus, anacardi, sacculus, cortex, nouum atramentum, fermentum. Quædam vrendo & vlcerando, ut atramentum, vitriolum, staphisagria, fermentum, sciama, vernix pini, thapsia, cantharides. Quædam penetrando in profundum, ut aqua vitæ, oleum terebenthinæ, oleum philosophorum. Quædam leniendo & molificando, ut adeps arietis, anseris, vulpis, leonis, vrsi, medullæ capri vituli, cerui, asini, æsypus, mucilago, semen lini, scænuigræci, althææ, oleum vulpi, costinum, liliorum, de castoreo, de sinapi, de nucis Romæ cum storace & assa. Quædam euacuando, ut pilulæ fœtidæ, aggregatiuæ de hemodactylis, de serapino, de oppoponace, Mesu, pilulæ arteticæ Nico. pilulæ magistralæ, confectio de turbit, &c.

De prognosticis articularis morbi.

Hippo, aphor. 2. aphor, 46. Duobus doloribus simul eundem locum infestantibus vellemus alterum obscurat. Et aphor. 4. aph. 2.

No

Iō febricitantib⁹ si tormina acciderint, &
 enuū grauatas, & lūborū dolor, purgari in
 trius oportere significatur. Et aphor. 4. ca.
 1. Lassitudinē habentibus in febribus cir-
 ca articulos & maxillas potissimū absces-
 us fiūt. Et aph. 4. aph. 33 Sed si ante morbū
 aliqua parte doluerint, hic morbus firma-
 ur. Et aphor. 4. aphor. 44. Quib⁹ febres lō
 gæ, iis tubercula vel dolores in articulis
 fiunt. Et aphor. 4. aphor. 45. Quibus tuber-
 cula vel in articulis labores fiunt, ij pluri-
 bus vtūtur cibis. Et aphor. 6. aphor. 22. Qui
 cunque dolores ex dorso ad cubitū descen-
 dunt, venæ sectio soluit. Et aphor. 6. aphor.
 28. Eunuchi neque podagra laborant, neq;
 calui fiunt. Et aphor. 29. eiusdem, Mulier
 podagra non laborat, nisi menstrua defece-
 rint. Et aphor. 30. eiusdē, Puer podagra non
 laborat ante vsum venereorū. Et aphor. 49.
 eiusdem, Quicunq; morbi podagrici fiūt,
 hi sedata in quadraginta diebus inflamma-
 tione finiūt. Et aphor. 55. eiusdem, Dolores
 podagrici vere & autumno magna ex par-
 te mouentur. Et aphor. 6. aphor. 59. Quibus
 cunque à coxēdicum dolore diuturno mo-
 lestatis excidit coxa, & rursus incidit, his
 maiores superueniunt. Et aphor. 60. eiusdē,
 Quibuscunque à coxendicū dolore diutur-
 no molestatis excidit coxa, his crus tabe-

H h

scit, & claudicant, si non vrantur. Auicē.
cit. Et humores crudi quum retinentur
corpore, nec euacuantur per egestionem
vel urinam, nec per artem, non est longum
quum quin currere faciant dolores iunctu-
rarum. 2. Et aptiores ad hoc, ut in eis mul-
plicentur ista, sunt senes, & habentes æg-
tudines chronicas, & conualescentes qui
nō reguntur cū rectificatione. 3. Et aptio-
ra tempora ad dolores iuncturarum sunt ver-
na, propter motum sanguinis & humorum:
autumnus, propter malitiam humorum
digestionis. 4. Et cū succurritur dolo-
ribus iuncturarum, in primis quando app-
rent, fit eorum cura facilis. 5. Quod si co-
firmentur, & consuescant propriè illis qui
generati sunt, & humoribus diuersis no-
curantur. 6. Et quando apparent varices in
habentibus dolores iuncturarum & poda-
gram, est eorum sanatio per eas. 7. Et dici-
tur qui habet dolorem anchæ, & apparet in
coxa eius rubedo vehemens triū digitorū
non faciēs ei dolorē, & accidit ei in ea pru-
ritus vehemēs, & desiderat olera, morietur
in 25. die. 8. Et omne membrū in quo est do-
lor iuncturarū macrescit & extenuatur. 9.
Et dolores iuncturarū præter sciaticā & po-
dagrā, quū curantur & eradicātur eorū ma-
teria, nō redeunt velociter. Razes. 12. com.
Deterior

Terior iuncturarū dolor erit, quando acci-
 eit ei, cuius pater vel auus illo laboraue-
 rit. Auic. Sunt ægri- tudes quæ hæreditā-
 riæ. Razes in lib. prog. Dolor iuncturarū in
 tēte breuē fore vitā significat, & qui
 in superiorib⁹, sunt satis deteriores, &c.

*Authores erronei dissentientes cir-
 ca articulares morbos.*

Adserere, in principio morbi articula-
 ris semper esse repellendum.

Adserere, articulares morbos ad sanie
 posse terminari.

Adserere, venæ sectionem ex pede pri-
 mum & nō ex manu esse cōmittendam.

*Confutatio dissentientium circa
 articulares morbos.*

Ad primum respondet Auic. cap. de cur.
 quod repercussiuæ & fortiter styptica
 in hoc casu multū suspecta, quoniā
 materiam in loco profundo incutiunt, &
 nocent nocumento vehementi, & demum
 difficilis eius resolutio.

Ad secundum, Razes in diuis. inquit, hoc
 se eis proprium, quod per sanie non ter-
 minantur.

Ad tertium, Auic. loc. cit. Et non fiat pri-
 mum phlebotomia ex pede, nisi post phle-
 botomiam in manu, materia sit valde pau-
 ca, &c.

H h 2

IOANNIS BACCHANELLI

Regiensis, De consensu Me-
dicorum in curan-
dis febribus,

Lib. IIII.

Febris quid sit, & unde dicatur.



FEBRIS, quæ à feritate vel
feruore dicitur, est calor p
ternaturalis accensus in co
de & arteriis, ad alia me
bra diffusus, naturalibus
ctionibus incommodas. Qui calor dupl
est, alter natiuus & genuinus, alter ve
acquisitiuus ac spurius, qui si per totum co
pus diffundatur, febrē efficit: si minus, la
situdinem inducit.

Loci consentientes de febre.

Alexand. lib. 5. capi. 1. Febris nil aliud est
quàm immodicè auctus feruor, accensu
præter naturam in corde & arteriis, qu
secundum naturam ignis cor possiden
corpori vniuerso dominatur. Galenus. 2
de mort. cau. capit. 2. πυρετός ὅστις τὸ πᾶν τοῦ
ζωοῦ θερμότης τῆς ἀμετρου ἔσται, id est, febris est
totius animantis immodicus calor.

Et

11. aphor. Febris est conuersio natiuæ caliditatis ad igneam. Et 3. de differ. mor. c. 5. si calor totum corpus infestat, febris nominatur: si verò per totum corpus non diffundatur, lassitudo dicitur. Auic. 4. causa, p. 1. Febris est calor extraneus accensus in corde, & procedens ab eo, mediante sanguine & spiritu per venas & arterias ad totum corpus, & inflammatur inflammatio quæ nocet operationibus naturalibus. 1. de difficul. respi. cap. 21. Duplex est caloris genus, alterum genuinum & corpori innatum, alterum acquisititiū ac spurium.

Obiectio.

Eruntne bini calores distincti, an vnus idē calor naturalis & extraneus? Quod bini distincti sint, videtur: nam naturalis temperatus est, vt in 2. de fa. nat. & in com. aphor. Qui crescunt plurimum habent caloris innati: sed in 1. aphor. est mutatus ad igneum, vt in definitione superius allata:

Responsio.

Dicimus vnū & eundem calorē esse quod ad substantiā, sed esse diuersos calores quod ad fundamentū: nam aliter fundatur naturalis, quàm præternaturalis, &c. Nota etiā quod febris est morbus calidus & siccus, calidus *ὑπερθερμία*, siccus verò potestate: nam febris si in superflua humiditate accenda-

tur, non actu sicca dicitur, sed facultate

De febrium diuisione.

Febriū aliquæ sunt substantiales, alie accidentales. Substantiales sumuntur à materia, à modo motus, à quātitate. A materia vel erūt mēbra continentia, ex quibus critica, aut humores, vnde putrida, aut *ὀξυκρα*, id est agitātia, siue impellentia, vt spiritus, à quibus ephemera prouenit. A modo motus, quū *ῥόπος κινύσεως* sit ratio mori calor mouetur. A quātitate, id est, à reſensione & intēſione illius caloris. Febres accidentales dicuntur quæcūque oppilationes & inflāmationes siue alios abscessus sequitur, & nō sunt per se ægritudines sicut alie. Sumuntur etiam accidentales à calore, mordaces, mites: aut à colore, vt pallidæ, uidæ. Febriū alie sunt breues, alie longæ: aliquæ salubres, aliquæ insalubres: alie interpolatæ, alie continuæ: & harum aliquæ sunt simplices, aliquæ cōpositæ. Rursus interpolatarū tres sunt, quotidiana, tertiana, quartana. Continuarū quæ à flaua bile proueniūt, duæ sunt species: altera synoche dicta, altera sortito generis nomine cōtinua dicitur. Rursus synoche tres sunt, quædā principio vsque ad finē æquales perdurant, quædā augētur, quædā decreſcūt: primæ hecticæ & acmaſticæ. 2. anabaſticæ & apacmaſticæ.

asticae 3. peracmasticæ dicuntur. Continuarum rursus nonnullæ singulis tertiis diebus inualescunt, nonnullæ in quotidianarum figura progrediuntur, & aliæ in quartanarum forma.

Loci consentientes de diuisione februm.

Galenus 1. de diff. febr. Principales ac propriae februm differentia sumuntur ab eorum substantia, aliæ verò ab aliquo accidente, &c. Aetius ser. 5. cap. 58. Differentia eius caloris maioris aut minoris ratione distinguuntur, & iuxta subiectum siue materiam, aut ipsum cordis corpus calore occupate, aut humores acrem substantiâ, &c. Alexand. libro 5. Trifariam in summa febres ingruunt, in spiritibus, humoribus, & membris solidioribus: in spiritibus fit febris ἐφύμια, in humoribus bifariam, aut in venis, vt καὶ οὖν, si humores cum sanguine computruerint, & quas σιωχῆς, id est, continuas vocant: aut extra venas, per diversas corporis partes putridi humores discurrunt, & febres fiunt, quas Græci τὸ μακρὰς vocant: in membris fiunt febres hecticæ. Auicenna. Dicamus quòd febres apostematum & oppilationum sunt febres accidentales, & aliæ febres sunt ægrotudines: lege Galenum 1. ad Glauconem, cap. 4. de hac re Auicenna. ibi, Diuiduntur etiam

febres, vt nonnullæ sint acutæ non acutæ, chronica non chronica, nocturnæ, diurnæ, salubres, & horribilia accidentia habites, aliæ dimittētes, aliæ inseparabiles, c. Gale. 2. de diff. feb. cap. 2. Intermittentes sunt omnes numero, quotidiana, tertiana, quartana: quotidiana à pituitæ putredine, tertiana à flaua bile, quartana à atra. Continuarū q̄ à flaua bile proueniunt, duæ sunt species: altera synoche dicta: altera sortito generis nomine cōtinua. B. Ita ait 2. de cris. c. 9. Et nota q̄ πυρετός à conuuo feruore dicitur, de qua Gal. 9. meth. 4. mentionem facit, & harum vniuersum tempus in vna accessione consumitur, &

De causis febrium in genere.

Causa febrium duplex est, extrinseca, intrinseca. Extrinseca fit ab aëre calido vel frigido, à mala qualitate, à corruptione, motu, & ab otio. Intrinseca diuiditur in causas προκαταρκτηνὰς, id est, præincipiētes & in προϋγκινὰς, id est, antecedentes, & in contentiuas siue coniunctas. Procatartica est, quæ cū peractum est opus, recedit, vt exustio solis vel ictus scorpij. Coniuncta est, quæ quum adest, præsentem seruat morbum, sublata tollit, vt calculus in vesica. Antecedens verò à coniuncta prorsus constituitur: nam hac præsentē adest affectus, &

aucta augetur, & minuta minuitur, & blata remouetur. Nota tamen quòd hæc causæ, scilicet præincipientes, coniuncta antecedens referuntur ad causam efficientem; nam causa materialis in febribus erunt membra, vt in hectica humores, in putrida spiritus; in ephemera causa formalis erit calefacere & adurere corpus, & causa finalis, cuius gratia hæc aguntur, erit sensibilis læsio operationum, &c.

Loci consentientes de causis februm.

Galenus 1. de different. feb. cap. 5. Quum febris sit in corde quædam præternaturalis caliditas, eius causas nunc ostendere intendimus: nam non vnus est tantum generationis caliditatis modus, sed aut propter motum, aut propter putrefactionem, vel propter adhæsum alterius caloris, aut propter retentionem calidi effluxus, aut propter mixtionem calidæ substantiæ fiunt, &c. De aliis causis lege Galenum in libro de cau. procatarct. & primo method. capite 8. Vide etiam de causis caliditatis Gale. 2. de morbor. caus. cap. 2. Et nota quòd Galen. 4. meth. cap. 3, inquit, Externæ causæ cognitionem non nisi ad noscendos affectus, qui nostram notitiam fugiunt, vtilem esse, &c.

H b 5

Tempora febrium bifariam cōsider-
tur, aut quatenus vniuersalia, aut quate-
particularia. Vniuersalia sunt quæ tot
morbi, siue febris circuitu absoluūtur. P-
ticularia sunt, quæ paroxysmi siue exac-
bationis partem metiuntur. Rursus vni-
salia non solūm penes morbi essentiam,
& penes symptomata & materię alterati-
nem distinguuntur: nam sicut morbi pri-
cipium tempus dicitur, in quo morbus a-
paret sic etiam principiū erit, quū mater
cruda nullū coctionis vestigiū demonstre-
aut quū sympt. incipiūt. Similiter augm-
tum dicitur, quū morbus augetur, vel acc-
dentia intenduntur, vel aliquod indicium
appareat. Status erit quum morbus & sym-
ptomata non se mutādo in sua dispositione
maneant, aut quū signa concoctionis man-
festa videātur. Declinatio erit quū non so-
lūm febris declinet, sed & accidētia & ma-
teria iam digesta expellitur. Tépora verò
particularia distinguūtur circa caloris mo-
dum: nam si calor à materia submergatur,
in membro erit principiū: quum verò ca-
lor excitatur, erit augmentū: at quū inten-
siori gradū calefacit, erit status: & quū re-
mittitur, declinatio seu remissio morbi di-
citur. Nonnulli inter initiū & incremen-
tum

in inæqualitatis nomen connumerarūt,
ut interuallū ac quietem in declinatio-
ne fine, &c. Nota quòd principium morbi
serdum videtur absconditū, & hoc quū
morbi principiū adeò breue sit, vt cogno-
scere nō possit, sicuti in synocha, epilepsia &
apoplexia, aut quum morbus est paucorum
accidentium, aut quum in prima die mor-
bi concoctionis indicia appareant, &c.

*Loci consentientes de febrium
temporibus.*

Gal. lib. de totius morb. temporibus. c. i.
quiparat morbi tempora ad animantium
vires, vnum quidem principium genera-
tionis eorum tribuens, alterum incremen-
tum, tertium vigori, quartum declinationi,
quintum aëri salui futuri sunt. Auic. 4. can.
cap. 3. Febrium horæ sunt sicut reliquarum
magnitudinū, principium, augmentū, status
pud vltimū, & declinatio: & sunt quinque
articulares causæ cuiusq; paroxysmi, &c.
Aet. ser. 5. cap. 2. Principium febrilis exa-
gerationis est cōtractio extremarum par-
tium omnium, & maximè nasi: augmentum
habet accidentium incrementum, & ces-
sat frigiditas: vigor erit vbi calor æquali-
ter per totum corpus diffunditur, &c. vide
illum fusiū. Galenus in lib. de morb. tem-
poribus, sex tempora enumerat, initij no-
mina

men, inæqualitatis, incrementi, status
 vigoris, declinationis & integritatis
 interuallum ac quietem nominans, &c.
 his plura in hoc libro iuxta Galenum
 uenies: nam secatur etiam periodum in di-
 partes, in accessionem & remissionem
 uel interuallum. Et nota pro iunioribus,
 quod periodus idem importat, ac si dice-
 tur, circuitus, & est tempus in morbis
 intensione & remissione consistens. Typus
 uero est intensio-um remissionumque or-
 dine succedens redditio. Paroxysmus & e-
 acerbatio idem important, & sunt, ut i-
 quit Aet. motus morbi particularis à re-
 missione ad deterius. De principiis morbi
 absconditi lege Auic. lat. 4. can. cap. 3.

*Quomodo status morbi præ-
 cognoscatur.*

Cognosces morbos fore breues vel pro-
 lixos, ab ipso morbi paroxysmo: nam pa-
 roxyfmi longi longum, breues breuen-
 morbum prænunciant. Item ab ipso gene-
 re morbi: nam apoplexia, tertiana, breui
 paralyfis & quartana longo tēpore termi-
 nantur. Ab ipsa virtute debili uel valida
 unde ex debili breuis, ex valida longus
 erit. Ab ipsa ætate & tempore: nam in senio
 & hyeme, longus: in iuuentute & æstate,
 breuis. Ab ipsis accidentibus breuiter uel
 longo

igo tempore durantibus. Ab ipsis excre-
 rentis exeuntibus mutatis : nam in vrina
 illum apparens concoctionis indicium,
 ingum morbum:& ecōtrā, breuem signi-
 lat. Nota quòd peracuti morbi quartum
 diem non transcendunt:acuti verò plerun-
 que 14. Vocandi erunt morbi acuti, si cum
 quibus symptomatibus terminantur. Quare
 breues ephemeræ nō erūt morbi acuti, &c.

*Loci consentientes de præco-
 gnitione status.*

Hippocr. aphor. 1. aphor. 12. Accessiones
 constitutiones morbi indicabunt & an-
 te tempora & circuitum, adinuicem in-
 elementa, siue quotidie, siue alternis die-
 bus, siue per maiora interualla fiant. Gale.
 non solum in hoc comment. sed etiam in 1.
 de crisi 6. lib. quomodo quispiam futurum
 morbi vigorem possit primò cognoscere,
 facile ostendit, quem legere poteris. Auic.
 can. cap. 4. docet cognoscere statum ex
 tempore & motu morbi, ex ipsa virtute, ata-
 que tempore, pulsu, rigore, à paroxysmo, ab
 accidentibus ipsis, & ex euacuatione & di-
 gestione, &c. Vide illum latiùs de his. Hip-
 ocrates aphor. 2. aphor. 23. Acuti morbi in
 quatuordecim diebus iudicantur. Et Auic.
 can. cap. 3. Status diuersus est in morbis:
 morborum enim valde acutorum status
 quart

quartum diem non transcendit, nec feb-
 ephemeræ morbi acuti dicuntur, & si p-
 pinquus sit earum status, quum hoc nota-
 tis sit, sed oportet insuper quòd timor
 inducant, acuti verò absolute morbi su-
 quorum status 14. attingunt, &c.

*Authores dissentientes cir-
 ca febrem.*

- 1 Adserere, febrem esse complexionem
 lidam & siccam.
- 2 Adserere, febrem non posse diuidi
 morbum & accidens.
- 3 Adserere, in omni morbo esse assigna-
 da quatuor tempora.

*Confutatio dissentientium cir-
 ca febrem.*

Ad primum respondetur, quòd si con-
 plexio calida & sicca esset, febris tunc se-
 queretur, quòd complexio biliosa esset fe-
 bris, quod falsum est: nam febrientes si-
 pituitosi siue sanguinei sint, remanēt sem-
 per in eadem cōplexione ac præditi erant.
 Præterea idem homo pluries in comple-
 xione mutaretur: nam febriens esset bilio-
 sus, non febriens pituitosus, quod falsum
 esse omnes assenerant.

Ad secundum Auic. & Concil. differen-
 tia 87. tenent, quòd febres sunt accidētales
 quum mediatè vel immediatè à morbo
 depen-

pendeant: sunt autem morbi, quum nullo morbum sequuntur.

Ad tertium respōdet Arcul. morbos qui nullam varietatem medico sensibilem deprehendunt, & qui in principio generationis contrahuntur, & qui ad mortem terminantur, non habere quatuor tempora, & falsum est, quod in omni morbo sint quatuor tempora.

De febre ephemera.

Febris ephemera nil aliud est quam calidus accensus in spiritibus, & dicitur ephemera siue diaria, non ex eo quod duret tantum per vnam diem, sed quia plerumque accenditur ut in vno die definat: perdurare tamen potest vsque ad quartum diem, sed raro tertium diem progreditur.

Loci consentientes de febre ephemera.

Gal. aphor. 4. comment. 5. Febres diarię omnes ab ipso Hippoc. vocantur, quęcumque ratione vna die durāt: tales vel à tumore inguinū, vel à causis manifestis sūt. De reliquis à me dictis lege Gal. 10. meth. p. 2. ibi, Sanè dicuntur id genus febres omnes diarię, quia solui vna die sunt, &c. Item 9. meth. cap. 1.

Obiectio.

Anceps sum an tantum in spiritibus calor

lor accendatur, quum sanguis & spiritus
vnà permisceantur, vt voluit Galenus
in libro de vsu partium, imò & secundo de
diffinitione februm, capite nono, tenet à
sanguine calefacto fieri ephemerā: quare
non solum in spiritibus, sed etiam in sanguine
calor accendetur.

Responsio.

Dicimus vtrunque à calore febrili
fieri: sed si aduertamus, quòd primò non
in sanguine, sed in spiritibus calor fundatur,
dubitatio nulla erit.

De causis febris ephemeræ.

Quum duplex sit ephemera, vera sci-
et & spuria: vera fit tantum à causis pro-
tarcticis, spuria verò fit per accidēs, vel
obstructione, vel per *ἀντιπαράστασις*, sicut
inhibitione, &c. Causæ ephemerarum
eadem ac suæ species sunt, quæ, teste Au-
cenna, enumerantur 21. Nam aliquæ
animam magis quàm ad corpus pertinen-
t, vt angustia, tristitia, cogitatio, ira, vigili-
somnia, quies, timor & gaudium: aliquæ
magis spectant ad corpus quàm ad animam,
vt motus, quies, euacuatio, dolor, syncopis,
fames, sitis, obstructio, satietas, nauseatio,
inflammatio, soliditas: aliquæ verò extrin-
secè veniunt, sicut ab adustione, frigore, soli-
ditate, balneis, &c.

Loc

*Loci consentientes de causis
febris ephemeræ.*

Auic. 4. can. cap. 5. Omnes febres diariæ
aut aut à causis præincipientibus per se
lesacientibus: aut per accidens, vt oppi-
ndo: aut per antiperistasin, vt cohiben-
, &c. lege eum fufius. Gal. 2. de cris. cap.
. Sunt autem hæ tantummodo spiritus
ssiones absque humorum putredine aut
embri inflammatione, nisi inflammatis
guinibus accidant: earum verò genera-
onis occasiones sunt vigiliæ, cruditas, tri-
itia, timor, ira, curæ, deustio, refrigeratio,
ssitudo, ebrietas, & quæcūq; similia, &c.
ide Act. ser. 5. cap. 58. ibi, Auspicantes ac
ternè laceffentes causæ, &c.

De signis febris ephemeræ.

Signa febrium ephemerarum sumuntur
iocunditate caloris, non incipiunt cum
igore, rigore, somno, velut putridæ, nec
in principio calor concernatur. Concoctio
in vrina primo die apparet: fiunt à primi-
uis tantum causis, pulsus nō est diuersus,
nec systoles magis se accelerat quàm natu-
alis, principiū paroxysmi leue est ac faci-
le, augmentū nō vltra duas horas se exten-
dit, in statu nullū vehemens symptōma vi-
setur. Declinatio fit cum sudore, ad inte-
gritatem desinit, & adhibito balneo nul-

Ius horror sentitur. Signa trāsmutati-
 ephemera in alias febres sumūtur ab
 declinatione febris: nā si absq; sudore
 vel cū sudore, per quem integra recon-
 scientia non sequatur, iam in alias febre
 trāsit: itē si declinatio vltra 24. horas cas-
 symptomatibus & pulsu non naturaliter
 extenderit, aut si remanserint aliqua sy-
 ptomata in sui recessu. Cognoscitur etiā
 quum in hecticam trāsmutatur ex signis
 hecticæ, de quibus infrā latius, aut in sy-
 cham, ex venarum repletionē, ex calidi-
 te, inflammatione, rubore faciei, &c.
 in putridas ex horrore, pulsus diuersitate
 & coarctatione, ex mordaci calore & a-
 hementia symptomatum, &c.

Loci consentientes de signis.

Gale. 1. de diff. feb. cap. 7. Indicia sunt,
 si fiant à procatarcticis causis, & est signum
 inseparabile, sed non proprium, si con-
 coctio in vrinis, si pulsus frequentia à pro-
 prietate deficiat, si nullo modo systoles a-
 celeritatem tendat, si caliditatis adlit su-
 uitas, si cum sudore aut rore, vel optimo
 aliquo vapore declinatio ad integritatem
 sequatur: hæc omnia propria & insepara-
 bilia signa sunt, &c. De reliquis lege Aui-
 cen. 4. can. cap. 6. Item Aet. ser. 5. cap. 58. &
 Paulus lib. 2. cap. 15. Item Galen. 6. de crisi
 cap.

p.13. & 1. art. cur. ad Glauc. cap. 2. & 3. le-
etiam Arcul. & alios neotericos, &c.
signis transmutationis lege Auicen.
can. cap. 8. Item Galen. 1. de diff. feb.
p. 7.

De cura febris ephemera.

Si à causis procatarepticis febres epheme
fiant, tunc alteratione sola curantur: si ve-
à causis corporeis oriantur, tunc triplex
est intentio. Prima circa causæ ablationē
febris alterationē, ita ut calida frigidis
revertatur, ut exustio solis cum umbra, & sic
non efficies, causam remouebis, & malā fe-
bris discrasiam per alterationem expelles. 2.
prohibet ne fiat transitus ab hac febre ad
alias. meatus aperiendo, vapores resoluen-
do, cum balneis in febris declinatione adhi-
beris, vel cum oleo quopiā perfricando. Ter-
tia est quæ symptomatibus occurrit, & re-
media inuenit: ad febrem enim sequitur
color, sitis, vigilia, & ad eius causam syn-
opsis epilepsia, &c. quibus occurritur op-
portunis præsiidiis. Regimē verò nō solūm
febrem, sed eius quoq; causam respicit. Vi-
us igitur ratio humida ac boni succi in
declinatione febris exhibeatur, iis vinū in-
dicatur qui ex inflammatione vel furore
concoctant: in vigiliis tamē cōcedendū: at in
ceteris rebus nō naturalibus semper con-

trarium est offerendū, sicuti in labore
tem iubemus, in vigiliis somnum, in ira
furore animi iocunditatem, &c. Inter
cibus modo quodam coacto & irregu
in principio febris est exhibendus, iis p
fertim qui ex labore, angustia, fame, &
perflua bile febricitāt, &c. Ad species e
merarū particulares scribendo nō desc
dam, siquidem rarissimè opus medici
sideratur, ni prius morbus in putridā
hecticam febrem mutetur, &c.

*Loci consentientes de cura
ephemerarum.*

Aet. ser. 5. cap. 59. vsque ad cap. 69.
omnibus febribus ephemeris particula
curam pertractat. Similiter Auic. 4. cap.
cap. 10. vsque ad 44. de singulis particu
ribus mentionem facit, signa demonstra
do, causas & curationem. Alex. itidem a
lib 5. cap. 1. Paul. vnicum tantum caput
diariis habet lib. 2. cap. 15. Gal. 1. art. cur.
Glauc. cap. 3. Omnes hæc febres balne
curare oportet, & ad consuetam victus r
tionem eos perducere, &c. Et paulò post l
quēs de victu. Interdicitur, inquit, vinu
qui inflammatione inguinum laborant, si
liter & furore percitis, cibo insuper hum
do ac boni succi reficiēdi sunt, &c. quòd a
quos cibare oporteat in principio par
xyssi

smi. lege Auic. 4. can. cap. 9. ibi, Necessesse
in principio febris cibare qui patiuntur
hemerā ex labore & angustia. Itidē ait
al. 10. meth. cap. 5. ibi, Quum adhuc inua-
ra sit febris, vel quum incipit, &c.

*Observationes circa balneum
& euacuationem.*

Auic. 4. can. cap. 9. Balneum non conue-
nit in quatuor casibus: primo, quum time-
r de casu putredinis. 2. quū adest obstru-
tio ab humoribus crassis. 3. quum adest
tietas nauseatiua. 4. quum adest catar-
bus, &c. Itē dixit, quòd in ephamera, nul-
leuacuatō cōuenit, nisi ad sit materia ob-
ruens, aut satietas nauseatiua, aut totius
orporis repletio, &c.

De prognosticis ephemerarum.

Gal. .ad Glau. cap. 2. Cura harū febrium
n promptu est: at earū cognitio maiorem
xigit diligentia, & de qua nemo ante nos
quantum oportuerit, scriptū reliquit, &c.
Itidem ait Auic. 4. can. cap. 5.

Obiectio.

Gal. .de diff. feb. cap. 7. videtur contra-
rium innuere, quum dicat, Nec earum co-
gnitio est difficilis.

Responsio.

Dicimus hāc esse difficilis cognitionis,
quū ipsum adhuc perseverat principiū, sed

facilis, quā iam ad declinationē venit manifestam. Hippo. aphor. 4 aphor. 55. Exguinum tumoribus omnes febres, præter diarias. Vide in hac re Oribasii. ment. filiū. Auicē. 4. can. cap. 5. Homines quibus maximè nocent febres ephemeræ sunt calidi & sicci, quia ad hæcticā citò perveniunt: aut calidi & humidi, quia in febrem putridam incidunt, &c.

Authores dissentientes circa febrem ephemeram.

- 1 Adserere, omnem ephemeram esse febrem accidentalem.
- 2 Adserere, ephemeram coniungi potest cum putrida.

Confutatio dissentientium circa febrem ephemeram.

Ad primū respōdetur, quòd si ephemeræ querētur calorē aut dolorē alicuius apostematis, quòd hoc verū esset, sed nō omnes huiusmodi sunt, igitur nō accidentales.

Ad secundū dicit Arcul. quòd tenēda est eorū pars, qui negāt has febres cōiūgi posse: nā quotiēs calor ad humorum putredinem transit, non amplius ephemerā efficere potest, sed tantū putridam.

De febre hæctica.

Febris hæctica est calor præternaturalis, accensus in membris radicalibus siue solidis.

olidioribus, quæ Græci *μείζων ὑγρότης* vocant, consumptis tamen in ipsis humiditatibus, trius species sunt tres, iuxta quatuor humiditates secundas: quarum prima vocatur humorem non habens, secunda ros, tertia camum, quarta glutē, ita tamē vt quoties humiditas prima desinit, & secunda quæ est ros, incipit accendi, tunc prima species hectica dicitur: quæ si ad cambium, tertiā humiditatem peruenerit, tunc erit secunda species, & vocatur ab Auic. dubalen, id est, arefactio siue *μπαρμύς*, id est tabes: si verò ad glutē deuenerit, tunc erit tertia species, & vocatur ab Auic. almuchasif, siue curuatura: nam ferè eadem forma videtur, ac est in decrepitis curua, &c.

*Loci consentientes de
febre hectica.*

Auicē. 4. can. cap. 1. tra. 3. Cū inflammantur membra radicalia & propriè cor, est illud ipsa ægrotudo quæ est hectica, secundum quod sciuiti, &c. Galen. 2. præd. comment. 60. Quum partes ipsæ corporis solidiores ignitiores euadunt, febres hecticas nominamus. Quod sint tres species hecticae, lege etiam Auicē. loc. cit. vbi etiam enumerat humiditates secundas. Lege etiam Galen. 1. de diff. feb. cap. 9. Tabida febris incipit, quum natiua humiditas

in vnoquoque corpore inspersa in meis
spatiis partiū similariū, ex qua primū
res nutriūtur, & circa cordis corpus pi-
clitatur: quū verò iam res eò periculi ve-
rit, vt nihil iam ex tali humiditate sup-
sit, tunc exquisita talis cōsistit, &c. Et cas-
eiusdem, Tabida febris non tantū sic,
sed etiam calida est passio, &c.

De causis febris heſticae.

Causæ febris heſticae vel sunt febres eph-
meræ, aut putridæ, aut febres ex partiū
nobilium inflammationibus ortæ, sicut
ex pulmonis aut thoracis affectibus, pr-
sertim ex empyemate & ptiſi, aut febris
ardentes cū totius animalis & cordis pr-
sertim siccitate. Interdum causæ sunt er-
res medicorum, qui vīctum nimis tenue
instituant, aut aquam frigidam in inflan-
matione diaphragmatis prohibent, au-
quum ob defectum animi, vinū & aquam
carnis & diamuscū iubent, quæ omnia o-
sui caliditatem ad heſticam ægrum perdi-
cunt, & rarò heſtica per se incipit.

*Loci consentientes de causis
febris heſticae.*

Aui. 4. can. tra. 3. c. 1. Causæ heſticae sunt
febres ephemeræ, aut putridæ, aut febres
inflammationū, quia rarò heſtica incipiēdo
accidit, nisi sit causa valde fortis, &c.

Galen.

Galen. 1. de diff. feb. cap. 9. Exoritur hæc
 febris ipsi cordi nonnunquam per se ipsam
 et ex candescentiis, tristitiis: nonnun-
 quam ex ardentibus febribus: aliquando ex
 pulmonis & thoracis affectibus, præsertim
 empyemate & ptisi, & ex omnibus diu-
 tioribus inflammationibus nobiliores par-
 ticipantibus, &c. lege locum fufius. de
 quibus lege Auic. 4. can. tract. 3. cap. 1. ibi,
 sunt etiam ab aliis, &c.

De indicijs febris hæcticæ.

Februm hæcticarum duo sunt propria in-
 dicia: primum, quod à principio usque ad finem
 sunt æquales, nec accessionem, nec augmentum,
 nec vigorem, nec remissionem habent: secundum,
 quod æger non se febricitare percipit. Reli-
 qua signa sumuntur partim à calore, si qui-
 dem à comestione calor crescit: item in pri-
 mo tactu cæteris ardentibus febribus est
 lauior, sed in processu fortior & magis
 mordens: item pulsus est durus, frequens, debi-
 lis, fixus, partim ab ipso corpore mutato:
 oculi sunt concavi, flos vitalis coloris ex-
 tinctus, adsunt vigilie, corpus extenuatur,
 in urina apparet quedam supernatans vinctio
 crassa, cutis fit arida, squalida. Hæc febris si
 aliqua à læsione membrorum incipiat, ab eo-
 rum arida intemperie, ex qua siccitas no-
 bilis provenit, facileprehendes, &c.

*Loci consentientes de indicij
febris hectica.*

Gal. lib. 3. de praesag. puls. cap. de arte
cordis, Febriū hecticarū duo hāc sunt p
pria signa, vt si perpetuū sibi illa simi
sint, nec inuasionē vllā accessionis, nec i
crementū, nec vigorem, nec remissionē
beāt, nec se febricitare percipiat ager, &
lege Gal. 1. de diff. feb. cap. 9 abundē eni
de his signis pertractat, ibi, Adest oculi c
cauitas, amisso eorū liquore, flos vitalis
loris extinctus, in tota cute squaliditas i
moderata. palpebrae dormitantibus sim
les, &c. lege tu fusius Auic. 4. can. cap. 2. tr
3. sumit indicia à pulsu, à tactu, à cibis: r
pulsus, inquit, est durus, frequens, debili
fixus, & sic de reliquis. Alex. lib. 5. cap. 2:
seorsum de omnibus signis pertracta
quomodo scilicet hectica à diaria putr
dāque distet, & quomodo hectica in ma
rasmum transeat, lege eum si lubeat. Vid
etiam Auic. de signis adubul, &c.

De curatione hectica.

Duplici scopo hecticā curabis, quorū al
ter sit ad sex res nō naturales, alter ad me
dicinalia. Primus fiet, si aēr in aestate decli
net ad frigidū, si victus sit humidus & fri
gidus, plus tamen humectās quā in frigi
dās, qualis est pusana hordei, carnes hœdi
perd

ardicum, caponū, qui ex amylo & frumen
nutriti sint, pisces petrosi, cancri fluuia-
les, testudines nemorales, limaciæ & ra-
e, oua sorbilia, caseus recens. Potus sit a-
ia hordeacea, vel vinū albū olygophorō:
sint motus, vigiliæ, superflua repletio &
iuniū: sit victus ratio paulò plenior, quā
enuior ob morbi longitudinem, gaudeat
ger & lactē. Circa medicinalia quatuor
pus sunt intentiones: prima sit in remo-
enda causa hecticæ, vnde si fuerit causa vl-
us in pulmone, primò remoueatur vlcus,
non neglecta tamen hecticæ cura. Si causa
uerit tristitia, inducendo lætitiā aufere-
ur. Secunda intentio respicit febrē quate-
us febrem hecticam, & tunc infrigidatio
& humectatio tam per interiora quā per
exteriora cōpetunt, sicuti est aqua hordea-
cea cū cancris fluuiialibus decocta, sy. viol.
de papauere, de iuiubis, item electuaria re-
sumptiua veluti quoddam à Gordoni & à
Francisco Pedemontio extat descriptum.
Valet etiam lac asininum & muliebre, mo-
dò asina & mulier ex rebus frigidis & hu-
midis nutriantur, & dosis erit iuxta Auicē-
næ placitum à tertiodecimo vsque ad vige-
simum tertium, & cōmuniter ab vnciis tri-
bus vsque ad quatuor: verū lac præbendū
non est, quū post eius assumptionē sitis &
diffic

difficultas spirandi & caloris recepti
 ri videantur, vel ubi febris putrida hec-
 coniuncta sit. Extrinsicus verò conueni-
 vnguenta ex oleo violaceo nenupharo
 ceratum à Francisco Pedemontio deli-
 prum, & epithema facultate frigidum
 actu tepidū. Tertia intentio est eorū re-
 tio quæ cū febre hectica copulantur, in
 rum numero quā febris putrida adsit, re-
 euacuatio non ratione hectica, quæ est
 materialis, sed ratione putridæ, ex qua
 perflua plurima aggregantur, conuenit
 tamen pharmacum nō valde soluens, tu
 propter virtutis imbecillitatem, tum quia
 periculū esset de maxima exiccatione, quæ
 proculdubio fugienda sunt, sed eius loco
 pharmaco leni ac lenituo vtantur. Vltima
 intentio est symptomatum correctio, :
 sunt syncopis, tussis, & fluxus ventris. Syn-
 copis tollitur cum aqua carnis, vino gra-
 torum, vitellis ouorū, & vino odorifer-
 irroretur etiam facies ex aqua ros. mosc.
 Fluxus ventris ac ipsa tussis emendantur
 ac dictum est suprā, pro quibus recurre
 sua capita.

*Locī consentientes de cura
 hectica.*

De prima intentione loquitur Gal. i c
 meth. cap. 2. ibi, Nutrimētum oportet esse
 humi

idum & frigidum, quod heceticis febris
conducitur, ut praeferat cremor frigi
& c. Vide Pau. lib. 2. cap. 22. Auerrhois
dilig. inquit, quod magis humectatione
get eger, quam refrigeratione, & c. De
enda intentione Gal. in art. par. inquit,
us cuiusque causam prius abscindere
partet, deinde ad eam, quae ex ea facta est,
itudinem deuenire. Auic. 4. can. tra 3.
4. Intentio curandi febrem hecticam
infrigidatio & humectatio, & c. Iridem
Aet. ser. 5. cap. 93. ibi, Scopus curationis
humectantibus & refrigerantibus con-
tit. De exhibendo lacte lege Gal. 10. meth.
2 Item Paul. lib. 2. cap. 21. Et inuenies
odum exhibendi, & c. De balneo similiter
lege Gal. 10. meth. cap. 10. Et Auic. loc. cit.
Aet. ser. 5. cap. 93.

Observationes circa curam.

Auic. loc. cit. Caue tamen in his frigidis
caloris eorum imbecillitatem, ne mul-
tum in gradu extollantur, alioqui calor eo-
rum suffocaretur.

De prognosticis hecticae.

Hip. aph. 2. aph. 28. Febricitantium non om-
nino leuiter permanere corpus, & non mi-
ui, vel etiam plusquam ratio exposulat,
ontabescere malum: hoc enim morbi lon-
gitudinem, hoc verò imbecillitatem signi-
ficat.

ficat. Gal. 1. de diff. feb. ca. 8. Vbi iam felix
 hectica etquisitè consistit, & iam dudū
 coepit, nō modò eandē curare est difficile,
 sed etiā impossibile. Auic. 4. can. tr. 3. ca.
 Hectica est in principio rei difficilis con-
 tentionis & facilis curationis, & finis adu-
 non penitus recipit curationē. B. Difficilis
 est cognitionis, quia parum vel nihil à
 naturali dispositione corpus permutatur
 idcirco postea curatur, quoniā virtutis
 bur vehemētem tolerat refrigerationē
 at quum *μαρμαριζέσθαι* efficitur, in eius curatione
 frustratur medici, tum ob nimiam consumptionē,
 tū ob eorū imbecillimā virtutē.

*Authores dissentientes circa
 hecticam febrem.*

- 1 Adserere, hecticam febrem posse absque
 alia febre per se incipere.
- 2 Adserere, in hectica febre fieri mutationem
 ex specie in aliam speciem.
- 3 Adserere, cibum non esse causam, quum
 in hectica magis calor appareat, &c.

*Confutatio dissentientium circa
 febrem hecticam.*

Ad primū, inquit Auic. 4. can. tra. 3. ca. 1.
 Quod lōginquū est, ut accidat hectica inci-
 piēdo, & posse membra radicalia inflā-
 ri, quin prius humores & spiritus nō inflā-
 mentur, & sic nō posse per se incipere, nisi
 ab

et alia urgente causa dependeat, &c.
 d secundū, Arcul. inquit non esse dicen-
 du eundē calorem numero & æque intē-
 migrare de specie in speciē, sicuti pa-
 ten exemplo Auic. Nā flamma accēsa in
 cynio primū absumit oleum in lucerna
 intum, deinde oleū lychnio imbibitum,
 humiditatē coti, & sic non migrat
 specie in speciem.

Ad tertium, respōdet Gal. 1. de diff. feb.
 quod caliditas arida, humido irrorata ma-
 nifestatur, eo quòd aliquam partem
 tenuem in vapores cōuertat. Vel si ma-
 gis placet opinio Auerrhois, eo quòd cali-
 dis febrilis, quæ non sentiebatur per ci-
 um assumptum, mutatur ex non sensu ad
 sensum apparentem: & sic causa efficitur,
 calor magis appareat, &c.

*De febrium putridarum diui-
 sione & numero.*

Recitat Gal. 2. meth. ca. 7 quòd tres sunt
 febrium diuisiones ex humorū putredine or-
 prima ex eo, quòd causæ ipsius putredi-
 nis adsunt vel non adsunt. Secunda ex eo,
 quòd per totum animal aut eius partē ali-
 quam est diffusa putredo Tertia, quatenus
 in phlegmone est, aut citra hanc. Enume-
 rat deinde in lib. cōtra Lycū has esse febres
 putridas, quæ numero sunt nouem, vt ar-
 deas,

dens, lypiria, hepiala, typhodes pestilēta, semitertiana, quotidiana, tertiana, quartana, de quibus seorsum tractabimus, &

De putredinis definitione.

Putredo iuxta medicorum opinionem, est corruptio humoribus contingens propter ebullitionem extranei caloris, &c.

Loci consent. de putredinis definit.

Gal. 2. meth. ca. 8. Putredo est mutatio, tunc putrescētis corporis substantiæ ad corruptelam à calido externo. Arist. 4. met. Putredo est corruptio propriæ caliditatis ab aliena caliditate in vnoquoque humido. B. Nō mirū quā familiaris & natiua caliditas cōcoctionem adiuuat, externa verò corrumpit. lege Aet. sermo. 5. cap. 74.

De causis putredinis.

Duplex est causa putredinis, altera ipsam complens, altera præparans. Cōplens, si intrinseca fuerit, tunc est respirationis priuatio, quæ à multo, crasso, ac viscido humorum meatu cōstipante fiet. Si extrinseca, tunc erit ab aëris mutatione præparatoria, veluti cibis, quī malè per suā substantiam, qualitatē, tempus, ordinem & artificium disponitur: nam substantia eius vel est nimis viscosa ut anguilla, aut nimis humida ut frigus, aut renuitur à natura, aut corruptibilis per se est, ut lac. Qualitas in causa erit

vb

cibus plurimæ humiditatis erit parti-
tis. Tempus erit etiã causa præparatoria,
cibus in tẽpore nõ opportuno sumatur.
Cdo etiã erit causa, vbi crassa & dura te-
nibus in comedendo præponantur. Arti-
fium, si cibaria malè parantur: at in gene-
rali loquendo, omnis putredo à calido & hu-
ido fieri potest, &c.

*Loci consentientes de causis
putredinis.*

De causis putredinis lege Auic. 4. can. tr.
2. 1. ibi, Putredo fit à cibo, ab obstructio-
ne aëre, humore: vbi de cibo tanquã de cau-
sa præparatoria loquitur: lege eum fufius.
Similiter Aet. ser. 5. ca. 74. Et Gal. 2. de cau-
sa morb. ca. 8. ibi, Putredinem inducunt aut
medicamenta quæ suapte natura putrefa-
cere possunt, aut excrementa in ipso anima-
li genita, aut ea quæ transpirationem im-
pliunt. Hip. 3. epidim. à calido & humido
putredinem fieri dixit: nam si annus, in-
terit, calidus & humidus fuerit, necesse est
magna pestilentia succedat. Vide de hac
Gal. 1. de tẽper. cap. 4. Item de inæquali
tẽperie cap. 4. & 7. ibi, Non tantum quæ
culcata sunt & prospiratu prohibita, sed
putrescunt alia multa, &c. Vide etiam
Gal. 2. meth. cap. 8. &c.

Kk

Putredo est aut in vno solo mēbro tu-
m, unde aliquis abscessus orietur, & lo-
vel ratione imbecillitatis mēbri, vel ea
vehementis caloris, vel eius doloris, &
aut erit in totius corporis ambitu diffu-
que si à maximis venis ad minimas trā-
rit, fiet febris continua: si verò extra veis
in omnes corporis meatus distribuatur,
tunc erit interpolata. Causa interpolati-
onis est triplex. Prima, quia humor velo-
ter vel tardè putrescit. Secūda, quia humor
velociter vel tardè in loco putredinis co-
lligitur. Tertia, quia humor velociter vel
tardè à putredine expurgatur. Pituita igi-
tur quotidianā facit, ex eo quòd veloci-
ob. sui humiditatem ad putredinem mor-
tur, aut citius ob. sui quantitatem collig-
tur, cuius accessio durat horas 27. Quarto
na ratione sue siccitatis duos dies inter-
uens tardè putrescit, & ratione sue pauc-
tatis tardè colligitur. Tertiana verò in-
has seruat mediū, unde si fuerit pura, dur-
et 2. horis, sicuti quartana si fuerit à natura.
si melancholia durat horis 19. Et pro eius
quiete assignantur horæ 48. & in quotidi-
na sex, & in tertiana 24.

Loc

*Loci consentientes de ratione
diversitatis febrium.*

Auic. 4. can. 2. tra. cap. 1. Dupliciter varia
r putredo, vel ratione humorum putre-
rentium, aut ratione loci: quia quādoque
t in vno solū membro, quod quadrifa-
iam contingit, vel ratione suæ imbecilli-
tis, vel ratione vehementis eius loci cali-
tatis, vel ratione acuitatis & doloris, &c.
Gal. 2. de diff. feb. cap. 2. Rationem reddit
ur febres interpolatæ, quū rue conclusæ
int: quam quum in longam orationē pro-
rahat, ad illud caput te cōferes. Vide etiā
de crisibus cap. 3. Quāquam vberius de
his pertractet Auic. &c.

*De signis febrium putrida-
rum in genere.*

Indicia febrium putridarum propria
sunt, quia nulla antecedit causa procata-
tica: incipiunt cū rigore, horrore, sed non
omnes: adest inæqualitas pulsuum, calor
mordax, atque tactui molestus. Sed pro-
prium ac inseparabile est indicatiū pulsū,
systollæ velocitas, & vrinarum cruditas,
debilisque concoctio: præcedit etiam pri-
mum morbi insultum lassitudo, pigritia,
somnia, vigilæ, spirandi difficultas,
venarū tensio, sitis, dolor capitis, inquietu-
do, periodus cum sudore terminatur, &c.

K k 2

*Loci consentientes de signis
februm putridarum*

De his indiciis loquutus est Gal. sa-
vberius primo de diff. feb. cap. 7. ibi, In-
cia februm, quæ humorū ratione accē-
tur, hæc sunt, primū non inseparabile, si
propriū est, quòd nulla ex causis procata
cticis ipsas antecedit: initium sumere à ri-
gore proprium est putridarum, sed nō in-
parabile signum, &c. I ege locum fusius,
plura ad hanc rem facientia inuenies: leg-
in super Paul. li. 2. ca. 2. Et Auic. 4. can. ca.
ibi, Vt plurimū antecedit al mellilotu, cu
associatur lassitudo, pigritia, alices, saltus
commotio, somni, vigilia, anhelitus, con-
strictio, venarum tensio, &c.

*De cura februm putridarum
in genere.*

Morbus quatenus morbus per sui con-
trariū auferri exposcit, febris est morbus:
igitur per sui contrariū tollenda erit. Sed
hæc febris minimè tolli potest, ni prius pu-
tredo, à qua dependet, inhibeatur, quæ nec
causa manente inhiberi potest: igitur pri-
mū erit remouēda putredinis causa, mox
ipsa febris sanabitur. Causa putredinis erit
transpirationis prohibitio, que vario mo-
do oriri solet: nam aut à densatis exiguis
meatibus & constrictis corporibus fiet, aut
ab

humorum abundantia, aut à crassitie-
lentore, quæ singulæ affectiones per sua
contraria remouebuntur, vt densitas per ra-
facientia, constrictio per dilatantia, cras-
sities per incidentia, lentor per detergen-
& si totum corpus iam singula dictorū
cupauerint, etiam toti corpori per con-
traria est occurrendum. Sed quia febris est
orbis de repletionē, idcirco etiam euac-
uari desiderat: euacuabitur manu & phar-
maco: manu, per sectionem venæ, cucurbi-
las, hirudines & frictiones: pharmaco
irgante per inferiora aut superiora, per
inam & sudorem. Demum symptomati-
is complicitis succurrendum, & norma
uendi instituenda erit, &c.

*Loci consentientes de cura febrium
putridarum in genere.*

Gal. 2. meth. c. 4. & 5. Febris sanari nō po-
st, nisi inhibita prius putredo sit: porro
inhiberi causa manēte nō potest, quare
ibimouēda eius causa erit si modò, &c. le-
e eū fusius, & habebis quæcūq; dicta sunt,
cet sub aliis verbis, &c. lege etiā Auic. 4.
in. 2. tract. cap. 7. ibi, Scias quòd intētio in
medicādo has febres, quādoq; vertitur ad
artē febris, quare est infrigidare & hume-
tare: interdū ad materiæ partem, &c. De
ictu lege fusius in lib. 1. vbi oēs aph. ferē

ad propositum accomodauimus.

De febre tertiana pura.

Febris tertiana pura est interpolata
bris, à flaua bile pura ac tenui putrescente
orta, cuius est de tertio in tertium egrum affi-
gere, secundum naturam humoris propriam,
in septem periodis, vel antè, iudicatur.

Loci consentientes.

Gal. 2. de diff. feb. ca. 3. Febris tertiana e-
quisita est, quæ per sensibiles corporis pa-
tes delata oritur, cum rigore inuadens, &
que ardentis febris similitudinem gerit
& bilis vomitibus, aut deiectionibus, a
sudoribus: vel ex horum quibusdam, vel
omnibus soluitur, cuius accessio duodeci
ad summum horarum æquinoctialium sp-
tio finitur. Hippoc. apho. 4. aph. 59. Terti-
na exquisita in septenis circuitibus, quo
tempus longissimum est, iudicatur.

De causis febris tertianæ puræ.

Febres tertianæ puræ fiunt à flaua bil
putrefacta ac mota, & extra vasa lata, præ-
sertim in cōsistentium ætate biliosissima
tempore æstiuo, in regione calida & sicca
& in iis præcipuè, qui laboribus, vigiliis
& solis ardore & cibis calidis & siccis
aut immodico pharmacorum calidorum
ac exiccantium usu, curis & similibus vi-
fuerunt, &c.

Loc.

*Loci consentientes de causis
febris tertiane.*

Gal. 2. de diff. feb. cap. 3. Febris hac à flabile per sensibiles corporis partes delatoritur. Et in 1. ca. eiusdē li. Tertianę fiūt amara bile, & plerunq; in corporibus, iorū naturalis habitus ad bilem accedit, inconsistentiam ætate biliosissima, tēpore iuiuo, &c. B. Nota q̃ tres sunt febres bilisæ iuxta Auic. placitum, tertiana, scilicet continua, tertiana periodica, & caufon. Periodica rursus diuiditur. nā aut est pura, it spuria: pura, quæ à pura bile, cui nullus ter humor admiscetur, oriri solet. lege his causis Aet. ser. 5. ca. 79. Item Galen. de cris. cap. 3. Item Oribas. apho. 4. com. & intelliges febrem interpolatam ex a vasa putrefieri. lege etiam Auic. 4. can. 35. Et Galen. 4. apho. com. 59. &c.

De signis febris tertiane.

Sex sunt ex quibus indicia febris tertiane sumuntur: Primum à modo rigoris, ut incipiat cum horrore & rigore difficili, ita tungi ac vulnerari cutis videatur. Secundum, ab vrina & sudore, nam sudor per totum corpus apparet in paroxysmi recessu, rināque sit rubra ac veluti ignea. Tertiū caloris qualitate, ut sit caufonis calore sauior, ac minus mordens, equalis tamen

Kk 4

quoquo versus, quia primò acris videatur,
 sed paulò pòt à manu remanēte vincit.
 Quartum ab ipsīs symptomatibus, vi-
 sitis quæ hominē exurit, & vigiliæ adsi-
 sine capitis grauitate. Quintum, à pul-
 qui est velox, magnus, non æqualis in d-
 stole & sistole. 6. sumitur ab ætate, region-
 tempore, & à multitudine euentus tert-
 narum & ad infebrecitationem desinit.
 gna quibus tertiana exquisita à spuria di-
 ferat, sunt quatuor: primū, quòd eius acco-
 sio non transcendit duodecim horas. Sec-
 dū, exquisita tertiana in septenis circui-
 bus iudicatur. Tertium incipit cum rigo-
 breui & intenso, & terminatur cum sud-
 re exuberante. Quartum quia in prim-
 vel quarta, vel septima videtur vrinæ co-
 ctio, quod in spuria nequaquam.

*Loci consentientes de signis
 febris tertianæ.*

Gal. 2. de cris. cap. 3. Febris tertiana co-
 gnoscitur, quia æqualē & liberā celeritati
 habet, neq; vllū adest inflammationis signū.
 sitim inuehit, hominē exurit, in vigore cō-
 sistit, calor æqualis est quaque versus, post
 potum plurimus vapor per cutem exhalat,
 sudoris nuncius, vomitus bilis adest, ven-
 ter soluitur, & biliosum mingūt, sudor ap-
 paret vaporosus, calidus per totum corpus
 æqual

qualiter sudans, pulsus velox, magnus, ad febricitationem desinit, & accessione impus ultra 12. horas non se extendit, sætis septem horas, interdum citius & tardius incipit cū rigore, &c. De iudiciis per se distinguitur à spuria tertiana, lege Aescen. 4. can. cap. 3. tra. 2. Oribas. apho. 4. comment. 59. Sex modis cognoscitur exiusta tertiana, nempe materia, natura, tēore, regione. copia ciborum & temperie, &c. Galen. 2. de diff. feb. enumerat de tertio in tertium accessione, breue tempus in rigore inuadens, & per sudores & bilis vomitum & excrementa biliosa, &c. le Paulum lib. 2. cap. 8.

De cura febris tertianæ puræ.

In cura febris tertianæ puræ sex opus sunt intentiones, quarū prima versatur circa regimen sex rerū non naturalium: secūda erit lenitio ventris ac materiæ in contrariū alteratio: tertia erit euacuatio: quarta urinae vel sudoris prouocatio: quinta caloris remanentis alteratio, & membrorū oboratio: sexta accidentiū correctio. Regimen contrarias omnino qualitates requirit, vnde aer sit frigidus & humidus, ficuti & cibi humectare & refrigerare habēt, vt ex oleribus attriplex, blitum, lapathum, lactuca, endiuia, cucurbita, cremor ptisanæ,

Kk 5

& sorbitiones alica, aqua hordeacea. (C)
ueant à melle, sinapi, salitis, & ab omnib
acribus: item à vinis, præcipuè vetustis:
verò morbus concoqui cœperit, dand
est vinum tenue aquosum: quum verò m
bus soluitur, liberius exhibendum. Sec
da intentio est ventris lubricatio & ma
riæ vlceratio: prima fiet cum clysterib
ex cassia, rhodomelle, & oleo violato, &
cum cassiæ simplicis bolo, &c. Alterat
materiæ per refrigerantia & humectantia
vt cum syrup. de endiuia ros. viol. de agr
sta, de suc. acet. acetoso simplici cum aqu
endiuia viol. &c. Tertia scilicet euacuat
fiet per sectionem venæ, si sub forma ant
cedentis causæ materiæ fuerit sanguini ac
mixta, aut in futuro de admiscenda time
tur: quæ si à sanguine fuerit separata, tun
fiet per pharmaca soluentia, sicuti cū rheu
barbaro, cum cassia, diacatholicone, ele
ctuario de suc. ros. &c. Quarta eliciet su
dorem & urinam non rebus calidis, sed po
tius id valentibus frigidis, sicuti cum ace
toso simp. cum emulsione scilicet commu
nium frigid. in aquis endiuia acetosæ, aut
cū balneis temperatis boni odoris. Quin
ta erit caloris derelicti alteratio, ac laxo
rum membrorum roboratio. Relaxantur
enim membra tum ob imbecillitatem ex
resol

olutione spirituum acquisitam, tum ex
 ore febrili, & euacuationibus tam na-
 turaliter, quàm artificialiter factis: his igitur
 succurritur cum rebus frigidis, robo-
 rantibus, siccis, cum Troc. de camphora, sy-
 r. ros. aut cum tria sandalis, diarrhodone
 & ob. zucharo ros. vel cum epithemate tum
 aditum hepatis applicito. Sexta remouet
 accidentia quæ huic feбри contingere so-
 nt, sicut sunt sitis, vigiliæ, dolor capitis,
 asperitas linguæ. Sitis tollitur cum col-
 latione oris multifariam parata, sicuti cū
 quis endiuia acetosæ, cum vino granato-
 rum & omphacio, addito zucharo, cum ele-
 mentariis de vino granatorum, aut cum mu-
 lagine psyllij in syndone rara inuoluto,
 in aqua immerso. Vigiliæ remouentur
 cum vnguento populeone, addita cassia o-
 dorata, opio & croco: aut cum lotionibus
 ex rebus somniferis, &c. Dolor capitis tol-
 latur cum cucurbitulis, frictionibus, cum
 xyrrhodino, & pilulæ cap. frig. &c.

Loci consentientes.

De prima intentione loquitur Gal. 1. ad
 Glau. ca. 9. ibi, Semper oportet contrarias
 qualitates illis, quæ præter naturam inualue-
 rint, opponere, cum hoc multò plus iuuat,
 quàm quomodolibet euacuare. Et paulò post,
 Cibi humectantes & refrigerantes omnes
 exqu

exquisitis tertianis sunt utiles, quantitas
 tanta sit, ut cōcoqui possit, ex oleribus
 attriplex, blitū, lapathū, malua, lactuca
 cucurbita, & ex aliis, ptisanæ succus, &
 licæ sorbitiones, ex piscibus saxatiles,
 volatilibus, quæ mollibus cōstant carnib.
 Itē testiculi gallorū & suū pedes & cereb.
 la. Itē ouorum sorbiliū vitelli, quia hi fa-
 lius quā pars alba concoquuntur, &c.
 ge locū fusiū, & nota prædictam victus
 tionē tantū delitiosis esse exhibendā, rol-
 stis verò qualem nobis monstrauit Hip-
 scilicet tenuem, &c. lege Pau. lib. 2. cap. 1.
 Et Auic. 4. can. cap. 39. De secunda inter-
 tione loquitur Galenus, & similiter de ter-
 tia, primò ad Glauc. cap. 9. ibi, Exquisita
 tertianam, quæ ex flaua bile commota in-
 ualescit, quā maximè fieri potest, refrige-
 rare oportet & humectare, &c. De ceteri
 verò intentionibus lege iuxta Auicem. loc-
 citato, ubi enumerat linientia pharmaca
 & commendat fieri phlebotomiam quan-
 do est possibile, deinde materiæ adæqua-
 tionem cum syr. acetoso, & euacuationem
 demum resoluentia, &c. lege eum fusiū.

Observationes circa victum.

Auicem. lo. cit. Et nō cibes nisi apud has
 condiciones: prima, nisi aluus primū soluta
 sit: secunda, quòd prior cibus sit concoctus
 ante

ge paroxysmi aduentum: tertia, non ex-
beatursibus, nisi in tempore quieris, si-
in declinatione, si possibile est: quarta,
otiens ad statum properatur, tunc victu
gis attenuare oportet, &c.

De prognosticis febris tertiana.

Gal. 1. ad Glauc. ca. 8. Exquisita tertiane
tem circuitibus iudicatur, & præter id
am minimè periculosa. B. Nota quòd in
bribus intermittentibus annumerantur
ntum accessiones & nō dies, vnde in ter-
na septem circuitus 14. dies referunt, in
ibus etiam alij acuti morbi finiuntur.
de aphor. 4. comment. 59.

Hippoc. apho. 4. apho. 36. Sudores febrili-
anti si incœperint, boni tertio die. 5. 7. 9.
12. 17. 20. 27. 34. Hi enim sudores indi-
nt morbos; qui verò nō ita fiunt, laborē
nificant, & morbi longitudinem & re-
diuam. Gal. 3. de cris. cap. 3. Tertiana vo-
ntibus & excrementis biliosis & sudori-
is toto corpore fluentibus finiri debet,
ia humor tenuissimus, si modò ascendit
omitum irritat: si descendit, aluum mo-
t: si ad meatus, cutis sudorem copiosum
sui tenuitatem elicit, &c.

Auicē. 4. can. cap. 37. Et quandoque cō-
mitur in vno paroxysmo ob sue materie
nuitatem, &c. B. Gal. 2. de diff. febr. cap. 3.

Quac

Quatuor causas breuitatis enumerat, sunt humoris quantitas, qualitas, laboris vigor, & corporis dispositio: vt exen-
gratia, si cum pauca quantitate humoris
tenui eius qualitate, vigor cum rara dis-
positione corporis maior fuerit, tunc morbus
erit brevis: sed si multa bilis, crassa, vigor
imbecillitas, & deſa corporis dispositio
mul fuerit, tunc morbus erit valde longus,

*De febre tertiana notha
sive spuria.*

Gal. 1. de diff. feb. ca. 8. enumerans signa
exquisite tertianæ, inquit: Quibus vbi
aliquid horum deficit, hæc non amplius ex-
quiritæ, sed simpliciter tertianæ nuncupantur,
maximè si intermissione *μικροτέρα*, id est
breuiorem habuerint, accessione videlicet
in longius tempus protracta: & notat quatuor
huius febris differentias. Prima vocatur
simpliciter extensa, quæ ad 24. horas
extenditur. Secunda paululum extensa,
durat vsque ad horas 30. Tertia dicitur amplius
extensa, & durat vsque ad horas 36.
Quarta vocatur plurimam extensa, & durat
vsque ad 40. & plures horas, ita vt quæ
tius magis à pura siue exquisita distabit
totius magis notha, siue spuria, siue ex-
tensa nuncupabitur, &c. Similis sensus e-
st ad Glau. cap. 8.

L

De causis febris tertianæ nothæ.

Causa ut plurimum est crassa bilis putres-
cens, interdum bilis cum pituita admixta
pituita, &c.

Loci consentientes.

De causis lege Auic. 4. can. 2. tra. c. 35. ibi,
tertiana non pura fit à putredine bilis cras-
sæ substantiæ, ob commixtionem bilis cū
legmate, commixtione complexionali-
tate, &c. B. intellige ita humores misceri
si ab utroq; vna forma perueniret, & in
hoc ab emitriteo differt, qui à duabus inui-
sibilibus distinctis formis efficitur. Et nota
quod facit differentiam inter duas tertian-
as & duplicem tertianam: nam duplicis
tertianæ causa ab vna tantum minera pro-
cedit, sed duarum tertianarum causa à
duabus mineris loco distinctis efficitur.

De signis febris tertianæ nothæ.

Signa sunt sex, grauitas capitis cū dolo-
rentiuo. Secundū, Accessio durat ob hu-
moris crassitiem vsq; ad 24. vel 30. horas,
et tempus eius vsque ad 48. Tertiū non ap-
paret concoctionis vestigium, sed urina est
albida. Quartam, non extenuatur corpus
sicuti in tertiana simplici. Quintum, nec
per sudorem definit, nec rigorem interdum
habet, nec adest caliditas acris & mordax.
Sextum, nulla adsunt sæua accidentia, ut
dictum

dictum est in simplici tertiana, & idem accessionis tempus semper est.

*Loci consentientes de signis
tertiana.*

De his signis lege Avic. 4. can. 2. tra. 6. 37. ibi, In non pura tertiana adest grauius capitis cum dolore extensiuo, duratque roxysmus vsque ad 24. horas, vel 30. vsque ad declinationem, & tunc repescit donec compleatur 48. horæ, &c. lege eum fusi Gal. 1. ad Glau. cap. 8. ex historia adolestis omnia signa huius febris demonstrat inquiens: Urina cruda admodum, febris accidit cum horrore, quæ neque in caliditate, neque in pulsibus exquisita tertiana similis, accessio durat ab aurora tertiæ die vsque ad auroram quartæ: & semper idem accessionis tempus. lege hunc locum vbius. Et nota quod non idem accessionis tempus semper est, nisi materia crassa bi dominetur, &c.

De cura febris tertianæ nocte.

Curandi intentiones tot erunt, quot distinctæ sunt in febre tertiana simpli. Versatur igitur prima circa regimen sex rerum naturalium, vnde victus in primis non quotidie, sed alternis diebus in tempore quietis exhibendus erit, qui non adeo infrigide & humectet, vt in tertiana simplici, secundum alios

equatenus calefaciat, incidat, & abster-
 gat, sitque non tenuis adeò, sed crassior
 iam dictū est. Cæteræ verò res non natu-
 res eadem ferè qualitate fac vt polleant.
 cūda quæ est ventris lenitio ac materiæ
 præparatio, efficietur primò clysteribus ex
 cassia, hiera picra, oleo camomillino, & sa-
 pparatis. Similiter præparatio materiæ
 syr. acet. simpl. rhodomelle, syr. de dua-
 ls rad. bisantino, cū aquis & decoctis ci-
 corij, boraginis, fœniculi, &c. Tertia erit
 vacuatio quæ peccante materia cum san-
 guine fiet per sectionem venæ, aut corpore
 istente plethorico, quod vbi à sanguine
 paratū cognoueris, tunc vomitu vel phar-
 maco solutiue euacuabis, vt puta cum infu-
 sione rheubarbari, agarici, aut cū diaphi-
 cone & cassia, &c. Quarta erit vrinæ &
 doris prouocatio, quæ cum hordei deco-
 cto, vel petroselini, apij, cichorij, &c. Quin-
 ta erit membrorum quæ laxa sunt, robora-
 tio: & fit cū Troc. de ros. de eupatorio, aut
 romatico ros. Extrinsecus cū oleo de ma-
 lice, de spica, de menta, de absinthio, aut
 i foru ex camomilla, absinthio, mēta, ad-
 dendo semper aliquid vini odoriferi, &c.
 ltima intentio est quorundam sympto-
 matum remotio, quæ sunt in appetentia, &
 mnus profundus, incitatur appetitus cum

capparibus conditis in aceto, aut cum
citronite, cum zucharo, aut inunctioni
suprà scriptis, &c. Somnus etiã remouet
cum aceto calido, vt refert Auicen. cap.
subet, aut cum lotionibus, & cum his si-
libus, quæ ægrum expergisci possunt.

*Loci consentientes de cura febris
tertianæ nocturnæ.*

Gale. 1. ad Glauc. ca. 10. Non oportet ci-
quotidie exhiberi, sed alternis diebus:
ctus ratio non sit quæ humectet & refrig-
ret vniuersum corpus, qualis in exquisi-
tertianis exhibetur, sed aliquem modum
sumat ad calefaciendum & incidendū, &
Post victum, sectionem venæ commenda-
ibi, Quòd si sanguinem mittere oportet,
neque hoc omittendū, sed ab initio statim
faciendum. Laudat etiam humorum pre-
parationem ex hyssopo, origano, spica na-
di, cū mulla decoctis, & post septimum co-
ma absinthij danda est cum oxymelle, sol-
tionem: deinde cum his quæ molliter ven-
trem subducunt, &c. Paul. lib. 2. cap. 20. Vo-
mitus post cibū iis vtilissimus est, quibus
hæc febris in vetustatem incidit. similiter
Auic. & Razes 17. cōti. Auic. 4. can. 2. tra. ca.
40. Et quū videris vrinas, eorū crassas, tunc
phlebotoma, & post hæc adiuuantia ad di-
gestionē sunt syrup. acetosus, &c. quæcun-
que

DE CONSEN. MEDIC.

De à me dicta sunt de aliis intentionibus
de vberius pertractat. Nota tamē ex Ha
Abb. non concedi in principio huius
morbi pharmacum electiuū, nisi materia
ergeat, quamquam iuxta Manardum in
Aristola ad Charandinū videatur legi con-
trarium, imò vix inuenies Gal. in omni fe-
bre absque cōcoctione humorum pharma-
cum solutiuum exhibere, sed in aliis à fe-
bre morbis paucos inuenies, quos per phar-
macum non expurget, &c.

*Observationes de humorum
concoctione.*

Gal. 1. ad Glauc. cap. 10. Ab initio statim
tāda quæ nimis exiccāt & calefaciūt, &c.

Observat. circa pharmaca solutiva.

Auic. 4. can. & Arcul. Rarò & tardè solu-
tiuū exhibendū est, alioqui si importuna
erit euacuatio, tunc tenues tantū exol-
uentur, & crassæ partes remanebunt, &c.

*De prognosticis febris ter-
tiane nocte.*

Auic. 4. can. cap. 35. Hæc quidem nō pura
quandoque prolongatur tempore longo, &
circiter medietatem anni, & quandoque
perducit ad mollitiem & magnitudinem
plenis. Gal. 1. ad Glauc. cap. 8. Vidi quando-
que quum in autumnō incœpisset in vere
cessisse, tū quia æger medici præceptis non

paruisset, tum quia læsus ex hyeme e-
 lien intumuit, præcordia flatibus fue-
 oppleta, & iam subtumida quædam ad-
 in facie decoloratio, & præsertim c-
 crura, adeò vt de adolescente dubitare
 bis contigerit, &c. B. Prorogationis feb-
 causa, Gal. teste 2. prognost. com. 25. est
 plex. Prima fit propter aliquam partem
 fectam curatu difficilem. Secunda fit p-
 pter humores crassos, crudos, incoctosq-
 Tertia, propter aliquod circa ægrum co-
 missum: idcirco dicebat Auicen. In mor-
 longo resupinetur æger, & crura curu-
 tur, & tangantur eius viscera, & videatur
 qua parte corpus tumuerit, &c. Hipp. A-
 4. Aph. 29. Quibuscūque in febribus se-
 die rigores fiunt, difficile iudicium seq-
 rur. Et Apho. 4. Aph. 43. Febres quæcunq-
 nō intermittentes tertia die fortiores fi-
 magis periculosæ: quocunque modo inte-
 miserint, periculum abesse significat.
 Aphor. 4. Aphor. 44. Quibus febres long-
 his tubercula vel labores in articulis fiunt.
 Et Aphor. 4. Aphor. 45. Quibus tubercu-
 vel in articulis labores ex longis febribus
 fiunt, ij pluribus vtuntur cibis. Et Aph. 4
 eiusdem, Si rigor incidat febre non del-
 ciente, ægro iam debili, lethale, &c. Leg
 Galen. comment.

Auth

*Authores dissentientes circa
febres tertianas.*

Adserere, tertianam febrem cognosci
posse per accessionem tantum de tertia
in tertiam.

Adserere, solum humori putrido dige-
stionem conuenire.

Adserere, omnes fructus nocere febricitantibus cum Auic.

Adserere, nullum in febribus vinum esse
concedendum.

*Confutatio dissentientium circa
febres tertianas.*

Ad primum respondet Auicem. 4. can. 2.
act. cap. 36. quod qui considerat tertianam
per paroxysmum, errat in ea, sed oportet
attendat ad significationes alias. Hac
iam de re à Galeno irridetur Thessalus,
si diuturnum in cognoscendo tertianam
expectabat: & 2. de cris. cap. 3.

Ad secundum dicit Gal. 1. de vic. in mor.
ut. ubi loquitur de ptisana ordeacea, quod
nullo modo humori putrido conuenit di-
gestio, quum nec ad benignitatem humor
reduci possit, sed continuo euaporans hu-
midum, quoddam cineritium permaneat:
si hoc forte acciderit in continuis febris-
us, quia tunc humor putridus digeri de-
bet, quum tota materia putrescere incipiat.

Ad tertium, dicimus propositionem esse veram, modò de his omnibus fructibus intelligatur, qui sua humiditate ad corruptionem sunt proni: sed quò multi sint qui sua humiditate corruptioni resistat, ut generata mala, citrina, pruna, &c. Idcirco in libris cōceduntur, quum magis per sua frigiditatem iuuant, quàm per humiditatem putrescibilem noceant.

Ad quartum Galen. 3. de vic. in morb. a comment. 8. Vinum, inquit, aquosum maximè febrientibus est idoneum, & id est quod album est colore & substantia tenui nullam earum, quæ in cæteris vinis insun habens qualitatem, nec austeritatem, nec adstringentiã, nec dulcedinẽ, nec acrimoniam, nec odorem, & quòd in Italia imbecillum est, Sabinũ, quod febrientibus administrant, & quòd reperiri potest tale vinum in Asia, Cilicia, Phœnicia, Palæstina Scyro & Creta: vnde si multa reperiuntur in Italia, Asia, Bithynia, nil mirũ, imò quod plus est, miratur cur nil tactum sit de hoc vino ab Hippocrate, quũ febrientibus plus quàm cætera omnia sit iocundius, &c.

De febre quotidiana simplici.

Quotidiana est febris intermittens, à pituita extra venas putrefacta proueniens, cuius est ægrũ quotidie per sex horas cum
falsa

à quiete dimittere. Vocatur etiam alio
nomine emphemerina.

*Loci consentientes de febre
quotidiana.*

Gal. 2. de diff. feb. cap. 4. Febris quotidiana
exquisita est quæ ex pituitæ putredine
nascitur, per sentientes corporis par-
tes, à natura detrusa, &c. Lege etiam cap. 7.
ius libri.

De causis febris quotidianæ simpl.

Causæ præcedentes sunt téperaturæ hu-
midiores, annique tempora, quies, otium,
repletio, balnea statim à cibo. Causæ ante-
cedentes & cõiunctæ sunt ipsa pituita, quæ
quatuor sit quadruplex, acida, dulcis, falsa &
terrea, quæ est acidæ qualitatis particeps,
quæ quatuor species siue differētia febrium
faciet.

*Loci consentientes de causis
febris quomodo.*

Gale. 1. ad Glauç. cap. 7. Fiunt hæ febres
in ætatibus, naturis, annique statibus & tem-
peraturis humidioribus, &c. Vide latius
extum. Item Auic. ibi Fit febris humidis,
in ætate, senibus, infantibus, nauseatiua in
inquietatibus patientibus & balneantibus se
super repletionē, &c. Gal. 2. de diff. feb. cap.
Sicut tertianæ à flaua bile, ita quotidiana
à pituita fiunt. Et in lib. de plenit. tres

species pituitæ enumerat. & 2. de d
feb. cap. 64, esse dixit vt falsa, acida, du
vitrea, quæ acidæ etiam qualitatis p
ceps dicitur. Vnde Auic. 4. can. 2. tra. ca
quatuor species enumerat ibi, Et phleg
putridum quandoque est vitreum, qu
que acetosum, quandoque dulce, quãdo
falsum. B. Nota tamen, si quæ sint aliæ
cies pituitæ, per has quatuor intelligi:
crudū & mucilaginosum sub vitreo co
prehenditur, sicut insipidum & aquot
sub dulci, & ponticum sub acetoso:
pseum verò febrem non accendit. lege
his fusius lib. 1. cap. de humoribus.

*De signis febris quotidiana
simpl.*

Febris quotidiana cognoscitur, quia
primis diebus nullum habet vigorem,
potius in progressu tēporis refrigerat
nem quandā, ob humoris crassitiem. Pa
Fit inæqualis, submersus, debilis, rarus.
principiis verò particularibus fit frequ
sed non adeò velox nec vehemens, nec m
gnus vt in tertiana, sed rarus. Vrina alb
tenuis: deinde fit rubra, nulla adest sitis, n
si à pituita falsa aut valde putrida fiant, si
dor nō apparet materia existēte crassa. C
ventriculi & hepar malè afficiūtur ob vir
concoctoriā imbecillē. Præcordia ultra na
tura

ralem habitum intumescunt ob caloris
becillitatem. Calor etiam accidit hy-
erno tempore, & fit principiū accessionis
ca vesperū: febris incipit ferè cū synco-
, & principium vniuersale durat 18. die-
is, & declinationis 64. Calor huius fe-
is in primo tactu est debilis, vaporosus:
dum mora fit in tangēdo, sentitur acris
mordax: si verò febris fiat à vitreo & ace-
so phlegmate, multiplicatur valde fri-
is: & in vitreo rigor est vehemētior: quæ
erò fit à salsa pituita, sequitur horror, &
on fit vehemens frigus: quæ verò à dulci,
rò aduenit frigus vel rigor.

Loci consentientes de signis.

De his signis fusissimè loquutus est Gal.
de cris. ca. 5. ibi, Febris quotidiana cogno-
itur, quia nō primo statim die cū rigore
uadit, sed processu temporis refrigera-
ones potius quàm rigores ipsis adueniūt,
eq; in pulsibus seruatur ordo vel æquali-
is, dum accessiones fiunt, &c. Lege locum
unc fusius, & intelliges iam à me pridem
icta. Lege etiā Paul. lib. 2. ca. 23. Item Ra-
en 10. almans. Item Auicen. 4. can. cap. 48.
tem Gale. 2. de diff. feb. ca. 10. Et primo ad
lauc. cap. 7. Vniuscuiusque humoris pi-
uitosi signa etiam diffusè habes ex Auic.
oc. cit. Vide etiam Act. ser. 5. cap. 85.

De cura febris quotidiana.

Quinis intentionibus febrem pituitam curabis: primò cū regimine sex rerum nō naturalium. 2. cū humoris crassi incisione. 3. euacuatione. 4. cū vrinæ prouocatione. 5. cū symptomatum remotione & membrorum roboratione. Prima intentio perficitur cū attenuantibus cibis & incisoriis, ut in primis diebus tenuem exhibeamus victum, sed in processu temporis crassiorē hoc in cura tentatiua. Sint itaque cibi temperati, ad aliqualem calorem vergētes, ut paracōtritrus, caro pulli, borago, fœniculū, vi interdū conceditur album & lymphatū. aliis rebus nō naturalibus non vniformi regula dari potest, quū inter salsam & crūdā pituitā, inter dulcē & acidā magna quippe adsit differētia. Secūda intētio fiet, si primum aliu cū clysteri lenimus: deinde humorem crassum incidimus cum oxymel simp. rhodomelle, vel sy. de duabus rad. v. bisantino cū aquis vel decoctis ca. Ven. fœniculi, petroselini, maratri, apij. Tertia intentio preparari poterit cum agarico, troc. rheub. cōfectione de turbit, diaphinico, elindo, &c. Quarta intētio quæ est vrinæ proritatio, multifariā fieri poterit, tum cū pilulis ex semine vrticæ, cuscute, tum cū decocto apij, fœniculi, tum cū topicis quæ adhiberi

eri possunt. Quinta intentio duo mala
 symptomata, quæ huic feбри coniungi so-
 lent, remouet, sicut est somnolentia quæ-
 in profunda in principio paroxysmi, &
 rigor valde intensus. Somnus remouetur
 in aceto manibus admoto, vel in angulis
 calorum posito. Rigor tollitur cum oleo
 rosæ, in quo tandiu vinum Creticum bul-
 lit, donec consumptum vinum amouea-
 tur, facta inunctione ante rigoris aduen-
 tum circa totam dorsi spinam. Roboratur
 nam stomachus cum oleo mastichino de
 sicca, de absinthio: aut intrinsecus cum aro-
 matico ros. diarrhodone Abb. & c.

*Loci consentientes de cura
 febris quotidiana.*

De prima intentione loquitur Gale. 1. ad
 Glauc. capit. 12. ibi, Et vniuersum totius vi-
 us caput sit ad incidendum efficacius.
 Auic. 4. can. capit. 58. Et fortasse con-
 sententius erit aqua hordei in primis diebus,
 cum speratur status propinquior: & nota
 quod instituitur victus tenuis, dum in co-
 gnitionem febris peruenire volumus, vel
 tenuis ratione quartanæ, vel quia processu
 temporis pituita coquitur, & sanguis effici-
 tur, modò à natura vincatur, vt refert Gale.
 2. de vic. in morb. ac. De aliis intentionibus
 loquitur Gale. 1. ad Glauc. capit. 12. ibi, Cu-
 ramus

ramus quotidianā cum ozymellite in primis diebus, & his quę validē vrinam cie: circa statū habenda est ventriculo sollicitudo, &c. Vide illū fufius. Vide etiā Razē 1. almās. ca. de cura febris phlegmaticæ, &

De prognost. feb. quotidiana.

Hippoc. aphor. 4. aph. 63. Quibus in febribus quotidie rigores fiunt, quotidie febris soluuntur. Razes 10. almans, ca. de quot. interpol. Hęc febris multis moratur mēfibus & mortis suspiciōē habet. Et 18. commē. Quotidiana est periculosa. Et Auer. 4. collig. Deterior omnibus est quę ex phlegmate vitreo, & saluior omnium quę est mūdorum temporum, & quę est multi sudoris: nam humoris significat tenuitatem & corporis raram texturam: & rarō inquit Auic. euacuantur febrientes à læsione stomachi. B. Quia quum locus pituitæ sit stomachus, fieri nō potest vt si sit febris pituitosa, quod non noceat stomacho, sicut tertiana felli & hepatis, & quartana spleni, &c.

De febre quartana.

Febris quartana vt plurimū periodica, est febris à melancholia non naturali putrefacta, per adustionē bilis genita plerunque eueniens. Cuius est ægrū de quarto in quartum diem affligere, & hæc duplex, exquisita & spuria: exquisita fit à naturali melancholia.

cholica, spuria verò à naturali, & hæc
de hum.

*Loci consentientes de fe-
bre quartana.*

Causæ quartanæ sunt quæcunque atram
bilem generant, nam ex solo humore atrabi-
li, putrefacto oritur. Putrefit verò atra bi-
lis ob sui crassitiem, multitudinē, aut ob
iniquā meatuū obstructionē, aut ob facul-
tatis expulsoariæ impotentiam, quæ in cor-
pore corrupta expellere nequit, vnde sequi
putrefactio. Fiunt etiam quartanæ ex
quo hepatis vel splenis affectu, vel suc-
cessionē aliarum ægritudinum, &c.

*Loci consentientes de causis
quartanæ.*

Gal. 2. de diff. feb. cap. 5. Generatur quar-
tana ex solo humore atræ bilis putrefacto,
putrefit interdum ob crassitiem, aut mul-
titudinē, aut tenacitatem materiæ inutilis,
aut aliquam meatuum obstructionem, &c.
Alic. 4. can. cap. 64. Eius causæ sunt que ge-
nerant melancholiā, post ea putrefaciunt
humorem, &c. Euenit autem vt plurimū ex suc-
cessionē ægritudinum febrium diuersarū,
quorum putrefactione quum adduntur
non euacuantur, multiplicatur melan-
cholia. B. Rarò quartana continua accidit
ex eo, quòd quum in venis atræ bilis ad pu-
trefactio-

refractionem mouetur, tanquam virtus
dissimilis extramittitur, quæ putresces
intermittentem efficit. Nota Arcul. ex h.
Auicenn. loco, quòd id verum non sit, quod
putridum à putrido fiat: nam atra bilis
putredine humorum generatur, quæ non
est putrida, quod etiam confirmatur à G.
3. de prognost. comment. 29.

De signis febris quartanæ.

Signa quartanæ vniuersalia sunt, quæ
ipsa incipit cum paucò frigore, quod aug-
tur & minuitur in eodem paroxysmo, ad-
ueniente statu caliditas non est vehemen-
tior in tertiana, sed maior quàm in pituitosa:
præterea quartana paulatim ac insensi-
biliter à frigore ad calorem se confert, si
etiam plerumque in autumno. Cognoscitur
ex victu præcedente, & si homo lienosus
sit, si populariter fiant quartanæ, si vrinæ te-
nues, albæ & aquosæ fuerint. Signa parti-
cularia sunt, vt si fiat à sanguine adusto, ad-
erit rubedo vrinæ, signa sanguinis præces-
serunt, forma, ætas, tempus, & sit post fe-
bres sanguineas. Signa bilis adustæ sunt pul-
sus velox, frequens, incipit cum horrore,
frigore, siti, sudore, inflammatione, tem-
pore, ætate, & febrium cholericarum suc-
cessionem. De signis pituitæ adustæ aliquid
in præsentia non afferam, quum anceps sim
an

pituita ita aduri possit, vt in melancho
conuerti possit, &c.

oci consentientes de signis quartanæ.

e omnibus signis tam vniuersalibus
quàm particularibus loquitur Auicen. 4.
cap. 65. ibi, Signa quartanæ sunt, quòd
prodit cum paruo frigore, &c. lege eum
dis. Gal. 2. de cris. cap. 4. omnia hæc etiã
facit, ibi, Quartana febris cognoscitur, si
minus frigidam & siccã & inæqualem
temperaturam habuerit, quia tunc quar-
tanæ circuitus frequentiores fiunt, &c. le-
ge eum ultra, de pituita vtrum aduri pos-
sit atra bilis euadat, lege Manardum.

De cura febris quartanæ.

Quinque in cura intentiones cõueniunt
primo prima expostulat victũ optimum,
non flatuosum, sed ventrem emollientem.
Secunda est suilla caro, & tenacia edulia,
quæcunque refrigerant ac exiccant: vi-
tæ concedatur album, tenue. Concedan-
tur inter volatilia quæ optimi succi sunt,
vitæ morbi vict' tenuis adhibeatur ma-
gis quã ante & post, sitque calidus & humi-
dus. Secunda intetio est vëtris lenitio, ac hu-
maris aliqua præparatio: lenimus cū clyste-
ribus vel aliis lenientibus, ac præparamus
primũ cū aceto. simp. rhodomelle, sy. de epi-
phraico, de fumo terræ, de suc. borag. bisanti-
no

no cū aquis vel decoctis conueniētibus
fumi terræ, lupulorū borag. epitimi, ser,
polypodij. Tertia intentio est euacuat,
quæ parari potest cū sectione venæ inter-
ris, modò sanguis admisceatur, vel abūe-
re videatur: aut fiet per pharmacum sol-
tium, qualis est infusio senæ in sero capi-
no, aut decoctum myrobalanorum cheb.
ind. aut cōfectio hamec. pilulæ de fumo t-
ræ, indæ de lapide lazuli, & hoc quum d-
cocta ac præparata fuerit materia: intere-
etiam euacuatio fiet per vomitum, per vr-
nas, & sudorem, &c. Quarta intentio roborat
membra, sicuti cor cū vng. de nenupl
citrino, hepar cum rebus hepaticis, simil-
ter lienem & stomachum prout suis loci
dictum est. Quinta intentio symptomat
tollit, perficitque primò remouendo rigo-
rem validum & frigus in vngendo spinan-
dorsi cum oleo rutaceo, costino, cū mithri-
dato & theriaca, &c. Et hæc de febre quar-
tana exquisita. At spuria hisdemet inten-
tionibus curabitur, præter quòd dicta ma-
gis ad humiditatem & frigiditatem ver-
gere debet, præsertim si à sanguine adusto,
vel à bile adusta prouenerit. Digestio etiā
aliter ac dixi fiet, sed cum oxysachara, syr.
viol. acetos. simp. Variabit etiam euacuatio
quæ fieri debet cum myrobalanis citrinis
&

indis, &c. cætera erunt prout dictum est.
Cura quartanæ continuæ erit eadem ac di-
urnum de interpolata nisi quòd in frigidatio-
nem requirit maiorem ob assiduū calorē,
sem audacius vena secatur, & tenuius ci-
endum, quum breuioris sit status.

*Loci consentientes de cura fe-
bris quartanæ.*

De prima intentione loquitur Gal. 1. ad
Aul. cap. 2. ibi, Victus instituendus est opti-
mus, sine flatibus, ac ventrem emolliens: ar-
tandū sunt à carnibus porcorū, & ab omni-
bus edulis tenacibus & tardè exeuntibus,
quæ corpus refrigerant & exiccant. Vide e-
am Auic. 4. can. capi. 68. nam ibi fusi-
us pertractat. De alijs intentionibus lo-
quitur ad vng. Gal. loc. cit. ibi, Quartana
mediocriter ac leniter ab initio tractanda
est, nullū forte medicamē aut euacuationē
dantes, nisi sanguis vehementer abūda-
re videatur: nam tunc vena secetur interior
vel media, quæ est in sinistro cubito: quòd si
ruber ac crassus sanguis videatur, audacius
mittatur: si flauus & tenuis, statim suppri-
matur: quum morbus in suo vigore fuerit,
cuiusmodi est visceribus cum his quæ
emolliunt & laxant, deinde medicamentis
tendū quæ vrinam cient: & si coctionis
indicia apparuerint, cum his purgandum

M m

quæ humores atros exoluunt, non semel tantum, sed sæpius si fuerit necessarium: utendum & à cibo vomitibus, & qui nequeunt vomere, per inferiora purgentur. Auic. de his fusius pertractat 4. can. cap. 66. Et Razes 10. alm. cap. proprio.

Observationes circa euacuationem.

Auic. 4. can. cap. 66. Quando quartana est à melancholia sanguinea, tunc extrahatur sanguis secundum quantitatem necessitatis: & quando non est necessaria, tunc phlebotomia est nociua, quatenus debilitat & ducit contrarium melancholiæ, & quatenus mouet humores ad exteriora, &c. Gal. 1. ad Glauc. capit. 11. Quicumque aliquid ex fortibus medicamentis ab initio exhibuerunt, omnino ante statum, quartanam, quæ erat simplex, sæpius duplicem fecerunt, &c.

Observationes circa victus rationem.

Auic. capit. cit. Prohibeatur in die paroxysmi à comestione: nam rectius est ut eueniat febris ventre vacuo, & non occupetur natura, sed præcipiatur ieiunium, & interdicatur aqua frigida illa die.

De prognosticis quartanæ.

Hippocra. aphor. 2. aphor. 25. Aestiuæ quartanæ magna ex parte breues, autumnales

longæ, & maximè quæ ad hyemen attin-
 ent. Et aphor. 5. aphor. 70. A quartana ca-
 non non admodū cōuulsionibus capiuntur:
 sed prius capiātur, & quartana superue-
 nit, liberantur. B. Quia quum duplex sit
 quartanæ sanatio, excretio scilicet & coctio,
 duo quartana, excretionem scilicet à ri-
 ore, & coctionem à calore febrili efficit.
 Can. 4. can. cap. 64. Saluior quartana est il-
 la quæ non accidit ab apostemate splenis:
 quæ venit ab apostemate splenis, perducit
 ad hydropem & perniciem. Quartana quæ
 libera est, liberat ab ægreditudinibus melan-
 cholicis, ut ab epilepsia, melancholia, & in
 ea est securitas à spasmō, & non durat nisi
 per annum, modò error non accadat. Sunt
 quartanæ quæ per 12. annos perdurāt, qui
 as omnibus inimicus est autumnus, &c.

De febribus sanguineis.

Quum duplex sit genus febrium sangui-
 nis, alterū à putrefacto sanguine, alterum
 non putrefacto, ambo sub vno tantūm no-
 mine synochi continentur: vnde dicimus
 synochon esse febrem acutam, cōtinuam,
 ex sanguine in venis putrefacto ortam: alte-
 ra verò synochus, id est, cōtinens, est febris
 acuta ex sanguine in venis non putrefacto
 in multa copia peccante, id est, succis æ-
 qualiter adauctis. Harum febrium tres

M m 2

sunt species, acmaistica, epacmaistica & paracmaistica, id est, in vigore perseuerantes crescentes & decrescentes.

Loci consentientes de febribus sanguineis.

Gal. 9. meth. cap. 3. Duplex est genus synochi: vnum quod ex natura eadē cum diarris constat: alterū est vbi in omnibus vasis ac potissimū maximis æqualiter succi putrescunt. Auic. 4. can. cap. 44. inquit medium vtriusque scilicet ephemeræ & putridæ synochū sapere: nā differt ab ephemerā, quia humor est qui calefactus est: differt à putridis, quia nulla adest putredo, &c. Lege de his Gal. 9. meth. c. 2. ibi, Quædā enim febrium manifestam habent putredinis notam, quædā non habent. Lege etiā 2. de cris. ca. 6. Et Paul. lib. 2. ca. 26. & habetis vtrāque synochi descriptionē. Gal. 2. de diff. feb. ca. 2. & 9. meth. cap. 3. & 2. de cris. ca. 6. tres species synochi demonstrat, quas Aet. ser. 5. ca. 70. inquit solū competere febribus à sanguine non putrido factis, &c.

De causis febrium sanguinearum.

Sex sunt sanguinearum febrium causæ: prima est obstructio. 2. est repletio. 3. multitudo exercitij non consueti laboriosa. 4. cōsuetæ euacuationis retentio. 5. aquositas ipsius sanguinis ex comestis fructibus elaborata.

porata. 6. Humoris crassi & crudi copia
anguine admixta, &c.

*Loci consentientes de causis
februm sang.*

Paul. lib. 2. ca. 27. Continētium februm
origo ex sanguine est, qui nunc efferuescēs,
nunc putrefactus obstruitur, &c. Galen. 9.
meth. cap. 3. inquit, harum februm in gra-
cili & frigido corpore neutrū cōsistere, sed
tantū in corpulentis qui sanguine abun-
dant. & ca. 4. loquens de iuvene palestræ pe-
rito inquit, quòd suspicio erat hāc esse sy-
nochon, quæ ex sanguinis abundantia &
obstructione præ carnis copia stipatione
prouenit, &c. Lege de his fusius Auic. 4.
can. cap. 44. Et Aet. ser. 5. cap. 7. ibi, Con-
flatur hæc ob calidi sanguinis copiam, &c.

De signis februm sanguinis.

Duodecim signis synochon cognosces:
primo febris assidua est. 2. rubedo faciei
& oculorum 3. inflatio venarum temporū
& eorum repletio. 4. nullus adest rigor
vel sudor. 5. interdum adest nasi pruritus,
& circa locum cui cucurbitulæ applican-
tur. 6. somnus profundus. 7. loquendi diffi-
cultas cum faucium inflammatione. 8. ef-
fusio lachrymarum. 9. pulsus maximi, ve-
hementes, citati, crebri, non mordaces. 10.
vrina neque consistentia, & colore à natu-

rali habitu aliena. II. estus intolerabilis. I.
graues vigiliae, &c.

*Loci consentientes de signis
februm sang.*

De his signis facit mentionem Auic.
can. ca. 45. ibi, Signa febris sanguineae sunt
adhærentia febris, rubedo faciei & oculorum,
&c. Gal. 9. meth. c. 4. Vbi se inueniunt
febrem admodum calidam dicit, pulsu
æquales maximos, celeres & frequentes &
vehementes, calor isque qualitatem, quæ ta-
ctum minimè morderet, & vrinas *cyræas*
id est, consistentia, ac colore non multum
naturali habitu alienas, &c. Lege Paulum
libro 2. cap. 27. ibi, Indicia, &c.

De cura febris sanguineae.

Cura febris à non putrefacto sanguine,
duas tantum intentiones requirit, quarum
prima est euacuatio sanguinis per sectio-
nem venæ usque ad animi defectum. 2. est fe-
brilis caloris alteratio, quæ fit interdum cum
aquæ frigidae potu. Cura verò febris à pu-
trefacto sanguine quatuor exposcit inten-
tiones, quarum prima est circa regimen,
quod ad frigidum & siccum ordinari debet,
vnde in cibando primum morbum & virtu-
tem metire: nam si ultra septimum diem
non se morbus extendere videatur, parum
cibabis, exhibendo prisanam hordeaceam,
pan

nem contritum cum seminum melonis
 pressione: similiter valent lactuca, aceto-
 endiuiā, mala granata, &c. Secunda erit
 euacuatio, quæ fiet per sectionem vene, vel
 per cucurbitulas, vel per pharmaca soluti-
 ua, quæ varia esse debent, prout humorum
 mixtio cum sanguine diuersa fuerit, vnde
 bilis per cholagoga, sicuti cum myrobala-
 nis citrinis educitur, vel cum rheubar. cas-
 sia, &c. Pituita cum phlegmagogis, vt plu-
 res dictum est. Tertia intentio est causarū
 utredinis amotio, quæ adimi solēt per sui
 contraria: nam si à frigida causa densum
 spiritumue corpus reddatur, tunc per rela-
 xantia & rarefacientia curabimus. Si ex ob-
 structione, per aperientia: si ex abundantia
 humorum, per euacuantia: si ex crassitie,
 per attenuantia: si ex tenuitate, per increas-
 centia, &c. Quarta intentio est caloris fe-
 brilis alteratio, quæ fieri potest cum rebus
 refrigerantibus & attenuantibus, præser-
 im si sanguis crassus existat, vt cum oxy-
 acharo acetos. simp. sy. de endiuiā, vel exi-
 stente tenui cum sy. de iuiubis, cū aquis &
 decoctis acetosæ, portulacæ, &c. Vel aliquo
 cum eclegmate, sicuti cū zucharo ros. tria-
 land. diarrhodone, &c. Correctio acciden-
 tiū, sicut dolor capitis, sitis, somni profun-
 ditas fiet, vt pluries dictū est, suis in locis.

*Loci consentientes de cura fe-
bris sanguineæ.*

Gal. 2. meth. c. vlt. loquēs de victu, Si co-
tinens; inquit, vltra septimum progressu
non videbitur, prorsus à cibo continendi
est eger, in virtutē defecturā coniicias, &
Auic. 4. can. cap. 46. Cibi sint ex iuiubis, e-
lentibus cum aceto, granatis & sumach. I
Intellige sanguine existēte tenui. Aet. se-
5. c. 7. Curandi scopus est copiā euacuare, &
calorem præternaturalem extinguere, &
qua adest crassities, ficcare, & debilitati
partibus antiquam temperiem bonam re-
stituere. De sectione venæ lege Gal. histo-
riam de libero & seruo, 9. meth. c. 4. Auic
4. can. c. 46. Intētio in hac febre est euacua-
tio plurimi sanguinis vsq; ad syncopim: &
si sanguis fuerit subtilis, incrassandus: si
cholericus, infrigidandus: si crassus, atte-
nuāndus. B. Conueniūt Pau. Aet. Gal. & Auic.
in extrahēdo sanguinē vsq; ad animi deli-
quiū, sed Auerrhois, qui aliās stimulus me-
dicorū dictus est. 3. sui collig. reprobāt eui-
denti ratione Gal. & aliorum in hac sectio-
ne venæ opinionē, quæ rationes non parui
apud me momēti sunt; vide tu eas si lubeat.
Gal. loc. cit. synochi cum putredine curam
recitat, ibi, Si putredo æqualiter in omni-
bus vasis subsistat, aut in maximis, &c.

Ob-

Observationes in cura.

al.9.meth.cap.4. In sectione serua vitium si ciborum cruditas adfuerit, vel excessus superfuitatum in intestinis, vel fluxus sanguinis fluxus, vel puerilis vel senilis ætas, vel frigidum, vel gracile corpus, nam non secabis usque ad syncopim, imò raram reliquos itidem ait Auic.& Aet.

De prognosticis febrium sanguinis.

Gal.3.de cris.c.4. Synochi raro eueniunt, ubi nullus sit error, in quarto finiuntur, rura propriis circuitibus perueniente, &c. sic.4.can.c.44. Ex tribus speciebus, salubrior est epacmastica, deinde homotena, nequior verò acmastica. B. Nota quod acmastica & homotena idem significant iuxta Galeni placitum, quare in nominum significatio ipse deceptus est, ita ut intelligere vellet, quod decrescens est salubrior, sed acmastica vel homotena seruans, scilicet eundem morem, est minus mala, & epacmastica quæ augendo se semper procedit, cæteris nequior: quanquam ego crediderim ceteris deteriores, quæ acmastica nominantur, sicuti testari videtur & ipse Gal.

De causone febre.

Causon siue ardens est febris continua, ardētissima ex flaua bile putrefacta, accēta, putrefacta inquā, ne crederet quispiam,

M m 5

sicuti Auerrhois 7. collig. quod ex bile
putrida ebulliente fieri posset, ex eo fuit
Gale. comment. deceptus, qui est 59. quod
apho. ubi inquit, Tertia febris ab ea
ardens nominatur, humore faciente in
differt: utraq; enim à flava bile fit. Differt
autem, quoniam febris ardens habet in
nis unam cum sanguine bilem plurimam ebul-
lientem: tertia vero eandem bilem
bet in toto corpore delatam & motam.

Loci consentientes de causone.

Aetius ser. 5. cap. 78. Causon siue ardens
est febris continua, &c. Galen. 4. de vici-
morb. ac. tex. 13. Causon est febris, in qua
vrens caliditas, sitisque incompressibilis
hominem torquet, &c.

De causis febris causi.

Causæ primitivæ causi sunt quæcumque
calida & sicca sunt, ut vini potus, salso-
res, vigiliæ, motus laboriosi, ira, &c. Causæ
coniunctæ & antecedentes sunt, flava bi-
lis putrescens, vel pituita salsa: unde pro-
prium & legitimum causum nominant, qui
à bile: improprium & spurium, qui à pitui-
ta salsa provenit. Interdum causa ipsius
causi est cerebri inflammatio, &c.

*Loci consentientes de cau-
sis febris causi.*

Hippocrates 4. de victu in morb. acutis,
tex

u i. Causus, id est febris ardens, fit, quū
 ulæ tempore æstiuo exiccatae, acres ac
 ofas, quæ tenues sunt, trahunt ad se hu-
 litates, quas *ἰχθῆρας* vocant. Et textu ter-
 Fit causus ob longum iter, longamque
 n, &c. Ex quibus intelligere potest à
 sis calidis & siccis oriri causum. Si vis
 inde scire quomodo venulæ illæ ad se
 hant humiditates, lege Galenum com-
 nt. 58. in 4. aphor. ibi, A febre ardente
 bito, &c. Aetius serm. 5. cap. 77. Ex flaua
 te putrescente incēditur, & alternis die-
 is exacerbatur, & quandam habet febris
 minutionem siue remissionem. B. No-
 quomodo causus differat à synochō: nam
 usus à flaua bile, synochus à sanguine.
 usus habet aliquam imminutionem si-
 remissionem, sed synochus à primor-
 usque ad finem, vnam tantum habet
 exacerbationem, ne fortè, sicuti & ipse Ar-
 l. ambas febres in vnum confundas.
 It enim de mente Gale. causon in epac-
 asticam, homotenam & paracmasticam
 uidi, sicuti synochon, quod nullibi Ga-
 nus (quod sciam) somniauit, ne dicam
 ripserit. Auic. 4. can. cap. 41. Causon fit se-
 ndum duos modos, aut est à cholera, aut
 phlegmate falso putrefacto. Hoc idem
 iam adserit Galenus 4. de vic. in morbis
 ac.

ac. comment. 1. Gal. 1. prorrheu. tex. 18. c.
bris ardens tum ob alias causas, tum ob
pter cerebri inflammationem fit, &c.

De signis causi febris.

Signa sunt, arida lingua, nigra, appi-
tus deiection, vomitus biliosus, vigiliae
terdum deliria, fluxus sanguinis nari,
dolor capitis, oculi concaui, ventris su-
tio, inquietudo, sitis vehemens, nisi tsi
ficca leuiter irritans adfuerit, &c.

*Loci consentientes de signis
causi febris.*

Auic. 4. can. cap. 42. Signa cholerice c-
sonis sunt accidentia mala ex vigiliis,
quietudine, adustione, permixtione m-
tis, &c. Paul. lib. 2. cap. 28. Ardentibus h-
superueniunt, arida lingua, crassa & nig,
ventriculi rosio, deiectiones pallida, sis
vehemens, vigiliae, & nonnunquam de-
rium, &c. B. Hæc omnia eueniunt ex ma-
bilis: sed efficacius reddit rationes. Gale.
de his 4. de vic. in mor. ac. in comment. 4.

Hippoc. aphor. 4. aph. 54. Quibus plu-
mum sicca tusses leuiter irritates in febi-
bus ardentibus fiunt, non multum siti i-
festantur, &c. Vide etiã de his signis Hip-
4. de vic. in morb. ac. tex. 4. &c.

De cura carain febris.

Curatur hæc febris quadrifariam: pr

n

dictus ratione quæ humidis & frigidis
poter. 2. euacuatione, quæ per sectionem
& alui eiectionem fieri potest. 3. cum
unctione caloris febrilis. 4. cum acci-
piū correctione, quæ omnia fient prout
est in cura tertianæ interpolatæ, &c.

Locis consentientes de cura causi.

Aul. lib. 2. cap. 29. Dupliciter solui de-
morbis, aut excernendo humores bi-
lios, aut eos extinguendo. Excernuntur
sudores, vomitiones & imū ventrē, ex-
tinguuntur aquæ frigidæ potu, &c. Auic. 4.
cap. 43. Causus curatur cura tertianæ
& si indiget euacuatione, festina: nam
euacuatio melior est quàm in tertiana, sed
complementum sit apud digestionem, &
phlebotomeretur, nisi in vrina adsit tur-
bitas & rubedo, &c.

De prognosticis causi febris.

Hippocrat. aphor. 4. aphorif. 58. A febre
habito rigore superueniente solu-
B. Rigor incitatur à bili per sensilia
umbra, veluti motu delata, vnde aluus
suiitur, sudores & vomitus excitantur, &
his expurgatur. Hippocr. aphorismor. 4.
aphorismo 48. In febribus non intermit-
tentibus si partes exteriores frigidæ, inte-
iores vruntur, & sitim habeat, lethale est.
Intelligitur hoc de causo: nam Galen. 1.
propr

prorrhēt. textu 7. quando caufus inter
quidem vrit, externa verò nec medioc
ter calefacit, lethalis est. Hippocr. apho
aphorif. 43. Febres quæcunque non int
mittentes tertia die fortiores fiunt, mag
periculofæ: quocunque autem modo int
miserint, periculum abefle fignificatur.
aphorif. 4. aphorif. 49. In febre non int
mittente, fi labrum, vel oculus, vel nafi
vel fupercilium peruertatur, vel non
deat, vel non audiat, iam debili existen
corpore, quicquid horum euenerit, mo
proxima eft. Et aphorif. 4. aphor. 50. Vbi
febre non intermittente difficultas fpira
di & delirium acciderit, lethale. Et apho
6. aphorifmo 26. Quibus in febribus a
dentibus tremores fiunt, delirio folui
tur. Auicennas 4. can. capite 41. Rarò fe
bris ardens fenibus accidit: & fi accida
eis pereunt, quoniam non fit in eis nifi
caufa valde forti. B. Similis fententia ha
betur ex Gale. aphorif. 1. comment. 14. ibi
Senibus non acutæ febres accidunt, et
quando rarenter talis accadat febris, qua
lis iuuenibus, omnino hæc ad ægrotanti
interitum terminatur, quoniam indicium
eft, immenfam quãdam efle cauſæ febrem
facientis magnitudinem, &c. Hippoc. 4. de
victu in morbis acut. textu 10. Si è naribus
flux

arrit sanguis, soluitur ægritudo, atque
 illores superuenerint iudicatorij, legi-
 cum vrinis albis, crassisque, & leui-
 subsidentiis, &c.

De febre epiala.

epiala est febris pituitosa intermitēs, à
 ita vitrea in locis à corde remotis pu-
 tracta, quæ ex sua propria natura eodem
 tempore frigus & calorem inducit. Dicta
 leni afflictione, sicuti *ἰπίαλος* sonat.

*Loci consentientes de fe-
 bre epiala.*

Galenus 2. de differ. febr. cap. 6. Quando
 febricitat, simul & riget, atq; eodem
 tempore in toto corpore vtrunq; affectum
 sentit, ea febris est, quæ propriè epiala vo-
 catur. B. Similis sententiâ est in lib. de inæ-
 ali intemperie, cap. 8. Idem etiam adse-
 Haly Abbas 6. suæ theoricæ, cap. 6. Et
 Razes 16. continentis, cap. 3. Serapio 6. sui
 uiarij, Hæc febris non est continua, sed
 interpolata durans tribus vel quatuor pe-
 riodis. B. Nota quòd Serapio & Auicen-
 in hac febre plurimum à Galeno dis-
 epant, siquidem epialam pro lypiria su-
 unt: nam quoties frigus in interioribus,
 calor in exterioribus sentitur, epialam
 dicunt. Galenus verò quoties vterque
 affectus vna sentitur: sed ideo errant, quia
 non

nomina simul confundunt. Vide Aetium
 ferm. 5. capite 87. Febris epiala à leni
 ctione vocata est, quum simul febricitans
 & rigent, & vtrunque percipiunt eodem
 tempore in omni corporis parte. Paulu-
 bro 2. ἡ πιάλος ἢ ἀπὸ μεταφορᾶς ὅτι ἀλ-
 γὰρ τὸ ἡπίως ἀλγίνειν ὃ παρ' ὧν δερμαίνειν
 est, epiala dicitur per translationem
 le, vel ab epios, quod est molliter, & a
 nem, quod est calefacere, eò quòd vici-
 menter non vrat, sed molliter ac blate
 calefacit, &c.

De causis epiala febris.

Causa est pituita vitrea, partim crura,
 partim putrefacta, interdum cum ama-
 bile coniuncta, atque per sensilia membra
 delata ac mota, &c.

*Loci consentientes de cau-
 sis epiala.*

Galenus 2. de differ. feb. cap. 6. A pitui-
 tantum vitrea partim putrefacta, parti-
 cruda remanente, vnde fit ex putrefacta
 lor febrilis, & ex cruda frigus pari rati-
 ne gignitur. Auicennas 4. can. cap. 51. Ca-
 sa est phlegma vitreum in profundo co-
 poris contentum, quod locum infrigidat
 in quo collocatur, cui si accidat putredo, v-
 por eleuatur, & partes exteriores petes ca-
 lefacit. Gal. de inæquali intemperie cap. 8. S
 pitu

pituitosus succus, qui est frigidus, & quem
 areum Praxagoras appellat, & amara bi-
 liquæ calida est, simul abundant, ac per
 filia membra moueantur, nil miri est
 nunque à cubante pari modo sentiri. Le-
 Paul. lib. 2. cap. 25. Et Aet. ser. 5. cap. 87.

De signis epialæ febris.

Signa sunt, quòd vnà sentitur frigus
 calor, vrina alba, tenuis, cruda, pulsus ra-
 s, tardus, habita scilicet aliarum febrium
 tione, in quibus frequentior esse solet:
 ruat interdum accessionem tertianam &
 artanam ob sui crassitiem & paucita-
 m: nam humana natura humorem hunc
 areum abundare non sinit. Spatium eius
 roxymini, est à quatuor horis vsque ad
 .horas, interdum pauca existente mate-
 a citius absumitur.

Loci consentientes de signis

epialæ.

De his signis lege Auicen. 4. can. cap. 52.
 i, Signa eius sunt quæ prædicta sunt, &
 ina est frigida, cruda, &c.

De cura febris epialæ.

Eadem cura est, ac in quotidiana dictum
 st: verum calidioribus magisque inciden-
 bus præsiidiis indiget, &c.

Loci consentientes de cura epialæ.

Paul. lib. 2. cap. 25. Hæc febris ex pituita

N n.

nascens, quum ex quotidianarum generum
existat, curationi illarum subiicitur
quotidiana tamen differt, quia tanto
dioribus, magisque incidentibus indiget,
quanto frigidior pituita existit.

Observatio in cura.

Auicē. 4. can. cap. 60. Caue ne calio-
ribus in principio medicamentis utar,
sed incipe cum syru. acetoso, mellino, de-
inde ad syr. compositos, demum ad sema-
peritua & ad infusionem aloës, & tr.
de rosis, sed os stomachi præcipue interea
confortetur, &c.

De prognosticis febris epialæ.

Serapio 6. breuia. Hæc febris non ni-
tùm permanet, & fortasse durat per
dies, aut ultra parũ, aut minuitur paru-
quia ob humoris paucitatem longo tem-
pore durare non potest.

De febre lipyria.

Lipyria febris est ea in qua exteriora
superficies refrigeratur, & profundum vi-
tur, & excretiones detinētur, aspera sitien-
tibus lingua est, pulsus parvus & obscurus
ob calorem intra se receptum.

Loci consentientes de lipyria febre.

Gal. de inæquali intemperie cap. 8. Lip-
ria est quum intus in ipsis visceribus calo-
rem sentimus, & in extremis partibus vi-
uersi

frigus. Itidem ait Auicen. & omnes
 actantes.

De causis febris lipyriae.

Causa quor exteriora frigeant, & inte-
 ra vrantur, est calor ad interiora reuo-
 cus, vel spiritus, quum ad interiora se cō-
 trūt, exteriora relinquētes. Vel ideo frige
 it exteriora, quia in externis partibus pi-
 ita vitrea cōtinetur, aut quia vapor à pu-
 ido humore eleuatus, dum à calore sepa-
 tur, multoties corpus infrigidat, &c.

Loci consentientes de causis febris lipyriae.

De his causis lege Auicen. 4 can. cap. 53.
 bi, Quia virtus effunditur ad locū in quo
 t laesio, idcirco exteriora à calore relin-
 uūtur, &c. Lege etiam Gal. aphor. 4. com-
 men. 48. ibi, Quia fortis inflammatio in
 rofundiori parte corporis, vel erysipelas
 enit, vnde totus ex toto corpore san-
 uis ad patientem locum trahitur, vt fit
 i principiis accessionum, &c.

De indicis febris lipyriae.

Indicia & eius cura manifesta sunt, quia
 aratur vt ceteræ phlegmaticæ, & cogno-
 scitur ex descriptione data, &c.

Loci de prognosticis lipyriae.

Hippoc. aphor. 4. aphor. 48. In febribus
 o intermittētibus, si partes exteriores fri-
 gide, interiores vrūtur, & sitim habeat, le-

rhale. Gal. 2. prognosticorum commē. 4. caput, manus ac pedes frigidi sunt, vētr. costisque calētib. malum. Est etiā cō-
quæ possent etiā de lipyria intelligi.

*Authores dissentientes circa
febrem lypiriam.*


- 1 Adserere, lipyriam non esse febrem, quod calor extraneus non diffundatur per totum corpus.
- 2 Adserere, lipyriam esse posse febrem interpolatam.

*Confutatio dissentientium circa
febrem lypiriam.*

Ad primum respondet Auicē. 4. cap. 53. Et si calor non diffundatur per totum corpus, hoc non prohibet, quin sit febris, dummodo calor extraneus aptus, natus sit per totum corpus diffundi, sicut non repugnat hominem esse risibilem, et non rideat.

Ad secundum, Gal. 4. apho. commē. 4. respondet dicens, Nunquid huiusmodi casus possit fieri in febre intermittente? ego neq; vidi inquit, neq; animo capio: videntur siquidem solis accidere febribus quæ causæ ab incendio nominantur perniciosæ, vel si aliter libeat appellare *καλον διαστόν*, velut lypyriis, &c.

FINIS.



IOANNIS
BACCHANELLI

De consensu Medicorum in co-
gnoscentis Simplicibus,

LIBER.

ABRONVM duplex, alte-
rum masculum, quod omni-
bus notum est: alterum fœ-
mellum, quod vulgò dicitur
Santolina, & est humilis cy-
essus. Diosc. cap. 26. tertij libri versione
Marcelli. Gal. 6. de fac. simpl. Plin. lib. 21.
cap. 10. Paul. lib. 7. calefacit & siccatur in 3.
Absinthium triplex, vulgare nostrum,
triphium, quod marinum appellatur: &
antonicū, quod plurimū in Galliavltra Al-
pis nascitur, & est illud iuxta Mathiolum
nēsem, cuius semē vulgò dicitur Semētī,
quę pro verberibus datur pueris. Et no-
quod Canabel Serapionis, nō est Semētī
ut volunt aliqui, sed est terra arenosa
uvialis, vide Dioscor. cap. 24. & 25. lib. 3.
Gale. 6. de fac. simpl. vbi amaram & ad-

Nu 3

strictoriam ac acrem qualitatem illi tribuit. Paul. lib. 7. cal. in 1. sic in 3.

Acacalis nisi sit species tamarisci, haec scio quid sit, quoniam nullum semine videre potest, quod sit huic simile. lege Dioscor. 103. lib. 1. Paul. lib. 7.

Acatia, non habetur vera, sed eius loco accipitur succus prunioli agrestis communiter: quoniam satius foret foliis rhus, sive mach vulgo appellati, uti, quam succo prunioli dicti: quoniam rhus eisdem facultatibus pollet, ac ipsa acatia, teste Dioscorido. Nec eius gumi, quod à Serapione dicitur gumi Arabicum, habetur, sed eius loco gumum utimur, quod 7. de fac. simpl. à Gal. describitur. Diosc. 118. cap. lib. 1. Theoph. cap. lib. 3. nam acatiam simpliciter spinam vocat Plin. lib. 24. ca. 12. Gal. 6. de fac. simpl. Sicca in tertio, & refrigerat in secundo ordine. itidem ait Paul. lib. 7.

Acanthion quid sit nescio, etsi aliqui candidum montanum pro specie acanthij demonstrant. Dioscor. cap. 16. tertij, Galen. 6. de fac. simp. Plin. lib. 24. cap. 12. Paul. calidus est.

Acanthum domesticum & sylvestrem esse id quod vulgo brancham vrsinam dicimus, aliqui affirmarunt: vide Plin. cap. 22. lib. 22. & Dioscor. cap. 17. & 18. tertij: 8
Gal

len. 6. de fac. simpl. Paul. lib. 7. discutit
 fccat.

Achillea non est millefolium, vt pu-
 nt aliqui ex autoritate Plin. cap. 5. lib.
 . vbi ipse habet à Latinis millefolium
 cari. Serapio vocat succum Achilleæ,
 quòd rubeat, sanguinem draconis, qui
 inc paratur ex sanguine arietis, sorbis
 refina, & mille aliis miscellis. de Achil-
 a Dioscor. cap. 34. quarti: Galen. 8. de fa-
 il. simpl.

Acinus est iuxta Manardi opinionem
 asilicum syluestre, & iuxta Ruellium basi-
 cum domesticum: sed huic repugnat Pli-
 us cap. 15. lib. 2. quum dicat, acinum
 non florere, de acino Diosc. cap. 45. tertij.
 aulus lib. 7. mediocres adstringendi vi-
 es habet.

Acorus, secundum Manardum, verus ca-
 mus aromaticus, Brasauola tenet quòd
 t galanga, aliqui quòd sit vulgare gisiru,
 communis opinio quòd sit calamus aroma-
 icus. De acoro, Diosc. cap. 2. primi. Gal. 6.
 le fac. simp. & quinto eiusdem cap. 12. Pli.
 ib. 27. cap. 2. Paul. calefacit & desiccant in
 tertio.

Aconitum voluit Leonardus Fuchsius
 esse herbam paris, sed falsò, quum nulla sit
 um descriptione aconiti similitudo. Leo-

nicenus credidit aconitum esse napel
 Auicennæ, quū sint res dissimiles, nec
 peccauit Auicēnas in descriptione napli
 prout notat Leonicenus, vt videri pote
 Andrea Belunensi, qui Auicennæ textum
 optimè correxit. De aconito, Dioscorica
 75. & 76. quarti, duas species assignat: i
 ma dicitur pardaliches eo quòd pardon
 terficiat: altera cynoctonon & lycocto
 eò quòd canes & lupos perdat: at māsā
 bibita radix non statim interficit homī
 sed aliquos in duobus vel tribus, vel x
 mensibus perdit. Gal. 6. de fac. simp. & lo
 scor. iterum lib. 6. cap. 7. Paul. lib. 7. leti
 lis vis & excedens est.

Adiantum, est vulgaris capillus Vener.
 Theophrast. cap. 13. lib 7. Adianti duæ sit
 species, nigra & alba. vide Plin. cap. 21. l.
 22. Et Dioscor. cap. 131. & 132. de adiantoc
 trichomane. Vocatur & adiantum polit
 chon & gallitrichon ab ipso effectu, que
 circa capillos efficit. Galen. 6. de fac. sim.
 In caliditate & frigiditate symmetron e
 extenuat, desiccāt, & digerit: itidem Pau
 lib 7.

Aegylops, est id quod vulgò dicitu
 segala, & non est auena, vt aliqui volun
 Dioscorid. 134. quarti. Galenus 6. de f
 cult. simplic. Paul. discutit duras inflan
 m:

ationes.

Agallochon, est lignum aloës, nunc habetur Venetiis, & nuper eius loco afferebatur ex Rhodo oliuastrum, quod à Ruellio palathum creditur. Diosc. cap. 21. primi. nullibi, quod sciam nisi succidaneis. Paul. lib. 7. iocinerosis, dysentericis & pleuriticis opitulatur.

Agaricum notum est, ideo appellatum, quod abundanter in Agaria Sarmatiæ nascatur. Plin. lib. 16. cap. 8. Nasceitur in Gallia super arbores glandiferas. Dioscor. ap. 1. tertij: In Galatia Asiæ supra cedros. Int qui dicant in Italia iuxta laricis arboris radices nasci. Galen. 6. de facult. simplic. Paul. digerit crassos humores & indit.

Ageraton sunt qui dicant in Hetruria nueniri, simile origano. Dioscor. cap. 57. quarti, & Galen. 7. de facult. simplic. & 6. eiusdem. Paul. lib. 7. habet vim digerendi.

Allium, Græcè *σκόραλον*, duplex est, domesticum & sylvestre. Domesticum *σκόραλον* à Græcis dictum, sylvestre *ὄφιον σκόραλον*, id est, anguinum, non autem, vt Brasauola, scorodoprason vel ampeloprason: nam ampeloprason nil aliud est quàm porrum sylvestre, quod in vineis reperitur, & sco-

N n 5

rodoprason allium & porrum significat. Diosc. cap. 141. secundi. Gal. 8. de fac. simp. desiccatur & calefacit in quarto excessu: de etiam illum secundo de facultate alim-
torum in fine.

Alcea, vulgò malua sylvestris, siue alia sylvestris, nō habet proprium caput apud Gal. sed in cap. de malua, de hac mētionem facit seprimo de fac. simp. Dioscor. cap. 1. tertij. Volunt aliqui hanc esse quam vulgū dicunt herbam Hungaricam. Paul. lib. sylvestris malux genus est.

Alypon quid sit nescio. Hoc scio plur de mente Athuarij velle alypon esse thubit album: nam hoc ab ipso habetur, vnde de tripheræ compositione agit: aliqui dicunt alypon esse alypiam, vt Paul. Aeg. aliqui dubitant an sit sena. Dioscor. cap. 173. quarti. Paul. bilem atram semen alypi ducit & vlcera.

Alyfma nisi ea sit, quam Ruellius & Fuchsius fistulam pastoris, & ab aliis plantaginem aquaticam, quæ vulgò dicitur barba syluana, affirmare ne quid audeo: aliqui dicunt esse speciem betæ aquaticæ. Dioscor. cap. 160. tertij, & Plin. cap. 10. lib. 25. duas species assignat. Damasonium etiam vocatur à Gal. 6. de facult. simp. & habet vim absterforiam.

Alisson

Alisson ficut ex Plin. cap. 11. 24. lib. excerp-
tur, videtur esse herba quæ Rubia minor
dicitur: verum quia Aet. alisson vocat sy-
ditim heracleam, quæ nullā præ se fert
similitudinem cum rubia minori, idcirco
id sit affirmare non possunt: de hac me-
morat Diosc. cap. 96. tertij, & Gal. 6. de fac.
simp. Nonnulli tamē duas species assignāt,
inter quas facilē posset rubia minor cōnu-
merari: verum ea quæ morsibus canū opi-
latur, deperdita est, nec reperitur. Paul.
lib. 7. siccatoriam illi ac discussoriam, ab-
erforiamque vim tribuit.

Aloës tria sunt genera, hepaticū, succo-
inum & caballinum. Diosc. ca. 23. tertij,
meminit de hepatica, & Galen. 6. de facul.
simp. desiccatur in tertio, & calefacit in pri-
mo, adstringitque modicē.

Althæa, vulgò maluanischio meminit
Dioscor. cap. 154. tertij. Theoph. cap. 19.
lib. 9. vocatur & hibiscus, & est malua syl-
vestris. Galen. 6. de fac. simpl. sub nomine
hibisci, & 7. de fac. simpl. capit. de malua.
Paul. lib. 7. Discutit, relaxat, lenit & con-
coquit.

Alumen, iuxta Diosc. cap. 77. lib. 5. tri-
plex est, scissile, rotundum & liquidum,
loquendo de his quæ in medicinæ vsum
veniunt (nam plura apud nos genera
nunc

nunc habentur, sicut alumē rochæ, plumæ facis, catini, scaioli, & zucharini, scissus: illud est quod nos plumæ vocamus, alumen rotundum non habetur in Italia, nec ludum: quāquam Brasauola affirmet esse lumen rochæ, quem validissimis rationibus cōfutare Mathiolus Sen. conatur. Alumen zucharinum fit ex alumine rochæ, ouorum albumine, & aqua rosacea. Alumen catinum fit ex herba vocata soda, Arabice catili, vnde etiam sal alchali provenit. Nihil est herba apud Hetruscos: alumen scamum fit ex petra lucida, scamosa & tranchenti, vulgo dicta, spechio d'asino: alumen facis fit ex face vini combusta. Gal. 9. de fac. simp. Plin. lib. 35. cap. 15. Paul. maxime adstringit.

Ambrosia, iuxta Ruelliū, notissima est in Gallia, nascitur inter segetes: verū ea nec vidi, nec scio quid sit, nisi sit species altemisia. Diosc. cap. 120. tertij, & Gale. 6. de fac. simp. Adstringit & repellit.

Ambra odoriferæ tres sunt species, colore distinctæ, citrina scilicet, albida, & nigricans, cuius mētio fit à Serap. lib. aggreg. cap. hambar. Auic. lib. 2. Calida in secūdo, sicca in primo, roborat cerebrum, & corroborat. Nullibi quod sciā, fit mentio de hac apud Diosc. vel Galen. aut Paul. vulgò dicit

Ambracane.

niantus, Græcè λίθος ἀμύαντος, lapis est
ex Cypro affertur, similis alumini scif
similis etiam ligno: vnde Brasauola di
cesse aliquos qui eū credant esse lignum
is Christi: nam in igne positus nō com
bitur, sed magis illucescit: meminit Plin.
ca. 9. lib. 36. & Diosc. cap. 113. quinti lib.
lib. 7.

mylum, voce parū deflexa amido. Opti
namyli conditiones recitantur à Plin. c.
lib. 18. vt sit albus, leuis, recens, lenis. Fit
mylum ex granis frumenti, vt Dioscor.
ca. 2. lib. 2. Et Galen. 1. de facul. alimento
m excerptur ex Plinio, cap. 25. lib. 22.
Quod amylum corpus restringit, & fluxum
anguinis, & in doloribus vesicæ media vn
sumitur cum oleo & passulis. Galen. 1.
de fac. alimen. ἀποίχυν, id est, qualitate caren
in Paul. Refrigerat mediocriter & siccatur.
Ammi, Seplasiariis amens, & est simile
men cymino, vt testatur Plin. ca. 15. li. 20.
Galen. 6. de fac. simp. huius meminit, &
Dioscor. cap. 63. tertij. Quod verò accipi
r pro ammi non est verum, sed quid sit
nescio. Paul. Calefacit & siccatur in tertio.
al. 5. de fac. simp. itidem ait.

Ammonicum, vulgò in officinis dicitur
ammoniaco, & est duplex iuxta Plin. ca. 24.
lib.

lib. 12. primum thrausma dictum, & alterum est excellentius. alterum phyrana, & crassum, & veluti resina. Primum thuris similitudinem præ se fert, unde à Paulo Aetio ammonia cum thymiana nuncupatur: meminit Diosco. cap. 89. tertij, & Gal. 6. de fac. simpl. Auer. 5. collig. Calidum tertio, siccum in primo. Paulus lib. 7. Mliendi vires habet.

Amomū verū, nonnulli volūt esse rosā de Hierico, nō verum esse quoddam sem habitum: sed credo verum non haberi, si r etē eius descriptionem perpendamus. Vt mur igitur loco amomi acoro, vt place Galen. Dioscor. cap. 14. primi. Plin. lib. 12. cap. 13. Gal. 6. de fac. simp. Paul. lib. 7. Eiusdem virtutis cū acoro. sed paulò siccioris.

Ampelitis terra, Græcè γῆ ἀμπελῖτις, sicuti & terra heretria, samiachia, selinusia: sunt apud me incognita. De iis Gal. 9. de fac. simplic. diffusè, & Diosco. cap. 138. lib. 5. Paul. lib. 7.

Ampeloprasson, agreste porrum, vulgò porandello: de hoc Gal. 6. de fac. simp. meminit & Diosco. 139. secundi. Plin. lib. 24. capit. 15. Paul. lib. 7. Acerrimum calidissimumque in summo ordine, quamobrem ulcerat.

Anagallis, morsus gallinæ: non defuerint,

qui portulacam sylvestrē esse affirma-
 : aliqui etiam dixerunt anagallidem
 pauarinam, vel centonem, sed longē à
 decipiuntur, quum flores illis nō sint
 qualitatis, ac ab ipso Diosc. pingun-
 cap. 170. secundi. De vtraque anagalli-
 descripsit Gal. 6. de fac. simp. Deceptrus est
 res, interpretans anagallidem pro ma-
 iylua. Paul. Vis est absterforia, subcalida
 attractrix. Serapio lib. aggreg. Calefacit
 um, & siccit sine mordacitate.

Anagyris, planta est arborescens, aliqui
 is herbariis valde cognita: hanc volue-
 rit quidam esse, quam dicunt esse vulua-
 m. Refert Mathiolus eius copiam inue-
 ri in Trentino agro, ego eam minimē
 vi. de hac Gal. 6. de fac. simp. meminit, &
 Diosc. c. 15 8. tertij. Pli. lib. 27. cap. 4. Paul.
 4. Calefacit & discutit.

Anchusa flores habet à buglossa nō val-
 dissimiles: huius tres species à Diosc. c.
 26. & 27. libro 4. connumerantur, & à
 lin. cap. 20. 21. lib. 22. Et à Galen. 6. de fa-
 l. simp. quatuor species. Paul. Adstrin-
 gendi vim habet: aliqui hanc Asini lactu-
 m dixere.

Androsæmon humani sanguinis herba,
 t species hypericonis: differt ab eo, quū
 utex sit gracilibus ramulis, succosus, pu-
 nicco

niceo colore, rubentibus virgis, & c. vt Ioscor. capit. 64. tertij, & Galen. 6. de fac. simplic. Paul. lib. 7. Duplex genus, alterum quod diximus, alterum Dionysias dictum, cuius fructus purgant, & folia desiccant.

Anemone nisi ea sit, quæ à Brasauola, catur papauer syluestris, cuius flores sunt rubei, certè nescio si vnquam viderim: nescio certè non esse herbam venti, vt Ruilius: nam herba venti iuxta placitum Sinis Ianuensis est parietaria, quæ vulgò dicitur vitriola aut grassella: sunt qui anemone viderint longè à papauere syluestri differentem. Dioscor. cap. 167. secūdi. Plin. lib. 21. cap. 23. Paul. lib. 7. Vim habet acris absterforiam, & extrahendi ac recludendi vasorum.

Anethum similem fœniculo effigies præ se fert, vt vix ab ipso nisi per gustum cognoscatur. Gal. 6. de fac. simp. & Dioscor. cap. 60. tertij. Paul. lib. 7. calefacit in secundo ordine intensius, & siccatur paulò remissius.

Anisum, Galen. 6. de fac. simp. semē eius dicit esse calidum & siccum in tertio gradu, & Dioscor. cap. 58. tertij. Paul. lib. 7.

Angelica, calida & sicca in tertio ordine, vnicè valet contra venena, præferuat à peste, comesta confert humori pituitoso.

cra

Io: sanat tussim ab humore viscoso, si decoctum bibatur: consolidat vlcera interiorum, coagulatū sanguinem soluit, morat stomachum, recuperat appetitum, valet defectui cordis & moribus tum.

Anonis, spina est, in aratis terris nascēs, vgo bognacho. Gal. 8. de fac. simp. Anomilla calida in tertio gradu, &c. Huius meminit Diosc. cap. 19. tertij. & Theoph. cap. 6. de hist. plantarum: & Plin. cap. 4. 27. Paul. lib. 7. Vrinam ciet, calculos cōstitit, & dolores dentium mitigat.

Anthemis apud Diosc. est camomilla: & alia species à me non visæ, nec dum agnoscuntur. Diosc. cap. 145. tertij, & Gal. 9. lib. 3. & sex. de fac. simp. inquit, quòd anomilla calida & sicca est in primo gradu. Paul. Virtute tenui discussoria laxatq; constat.

Anthylis, nisi ea sit, quæ vulgò dicitur sola de mente Ruellij, certè quid sit diuinare non possum: huius duæ sunt species, quibus Gal. 6. de fac. simp. meminit. & Diosc. ca. 144. lib. 3. Plin. lib. 21. cap. 29. Paul. 7. Exiccat & absterget.

Anthirrinon, quid sit nescio, sunt qui virint, & vulgarem in Italia nasci passim firman. Diosc. 126. lib. 4. & Gal. 6. de fac.

simp.

Anthera non est flos, vt nonnulli putant, in medio rosarum positus, sed potius quædam compositio, vt ex Gal. Paul. Cor. Cel. elicitor ad oris vlcera, & pedum scissuras, & digitorum pterigia accommodatur.

Aparine inter lentes nascitur, omnibus nota, vulgò (eò quòd folia in modum calaris habet) speronella dicitur, vel, vt aliqui volunt, in modum stellæ folia, hæret vestibus hominum. Diosc. cap. 95. tertij. Gal. de facul. simpl. Paul. lib. 7. Modicè abste git & desiccat.

Aphace similis viciæ, sed non est vici Theoph. 7. & 11. c. lib. 6. cōnumeravit apicē inter species cichorij, similiter & Plin. lib. 21. sed cap. 5. lib. 27. postea historiam eius Diosc. recitat: quare iuxta Diosc. connumeranda est inter legumina, non autem inter herbas syluestres. Diosc. cap. 137. secundum Galen. 2. de fac. aliment. Paul. lib. 7. Adstringit valentius, siccat & mediocriter cōlefacit.

Apium satium, nil aliud est quàm vulgare petroselinum, vt testatur Plin. cap. 11. lib. 20.

Apium syluestre, quo vtuntur seplasiarij pro vero apio, est apium aquaticum, eleoselinum à Diosc. dictum, vt testatur Theophrast.

arast. cap. 6. lib. 7. non autem est, ut placet
 uellio, quod vulgò dicitur il macerone.
 etroselinum verò, id est, saxatile apium,
 maxime Macedonicum, nuspiam in Italia
 nascitur: apium verò hipposelinū dictum,
 test grāde apium, illud esse tenetur, quod
 vulgò leuisticum dicitur. De apio memi-
 nit Diosc. 67. 68. 69. 70. & 71. tertij. & Ga-
 len. 8. de fac. simplic. & 6. eiusdem Paul.
 libro 7. Tanti caloris, ut menses & urinas
 soliciat.

Apios, nisi sit species raphani, haud scio
 quid dicere debeam. Ruellius familiarem
 herbam esse rusticis Galliae inquit, & com-
 muniter ab ipsis edi: sed quum dicat Dio-
 scor. vomitū dicere, nescio an illi creden-
 dum sit. Sunt qui dicant vidisse inter sege-
 tes nasci cum foliis rutae, sed paulò strictio-
 ribus & viridioribus: ego nec vidi, nec scio
 quid sit. Diosc. cap. 170. lib. 4.

Apiastrum, Graecè *μυλισέφυλον*, vulgò ce-
 dronella, aut melissa, aut muliserno, in
 passionibus cordis (si Serapioni creditur)
 multum valens. Diosco. cap. 109. tertij, &
 Galen. 7. de facul. simpl. utitur pro marru-
 bio duplicata dosi. Paul. lib. 7. Viribus mar-
 rubio per omnia respondet.

Arbutus, Graecè *κόμιαρος*, arbor similis
 cotonea malo, vulgò dicitur in Hetruria

albatro. Diosc. cap. 143. primi, & Galen. de fac. simpl. Turdi libenter arbuti fructibus vescuntur in hyeme. Paul. libro; Acerbæ qualitatis est, aduersatur stomacho.

Arction, Latinis personatia, quid finisi, vt Ruellius, sit lappa minor, facile dicere me nescire, quanquam sint qui lappam minorem dicant à Diosc. vocari xanthion. De arctio loquitur Diosc. cap. 101. quarti, & Galen. 6. de fac. simp. Personatia tamen est lappa maior. Plin. lib. 25. cap. 9. Paul. lib. 7. Vis tenuis siccans & mediocriter adstringens.

Argemone inter species papaueris connumeratur, ego tamen nusquam argemonem vidi, etsi vbique nasci Mathiolus Sen. affirmet. Hoc bene scio, non esse agrimonium siue eupatorium, vt nonnulli. Diosc. cap. 68. secūdi, & Plin. cap. 8. lib. 25. De hac apud Gal. nil memini me legisse. Paul. Abstergit & discutit.

Argentum viuum est duplex, artificiale & minerale: sed quo pacto conficiatur, lege Dioscor. cap. 64. quinti, Galen. 9. de fac. simp. nunquam ausus est experiri, an foris vel intus applicandum foret, veluti venenum mortiferum. Auer. 5. collig. capitu. 9. Est frig. & humid. Galen. quarto. de

fac. simpli. capit. 18. Calidum est & sic-
en.

Aristolochia duplex est, rotunda & lon-
ga: tertia species eius est dematitidis voca-
ta quæ in Italia non habetur: de quarta
specie facit mentionem Plin. cap. 8. lib. 25.
vocatur pistolochia. De Aristolochia
testatur Gelen. 6. de fac. simpl. & Dioscor.
capit. 4. libro 3. Commendatur in epile-
psia. Paul. libro 7. Calida, tenuis, ab-
surgens, subacris. Auerr. Calida & sicca in
humido.

Armenius lapis, iuxta Manardi placi-
um, raro inuenitur: licet Mathiolus Se-
nensis dicat in mineris argenti, huius co-
lorem inueniri, & dici vulgò verd'azurro,
quod nec affirmare, nec negare audeo: si
eiusdem sua experientia comprobatum re-
fert in iis omnibus quæ ab antiquis scri-
pta sunt: vide Dioscor. capit. 59. quinti,
Galen. 9. de fac. simpl. & Alexand. Tral-
lanum capit. 22. libro 1. & Plin. capit. 6.
lib. 35.

Aron, species dracunculi siue serpenta-
æ. vocatur in Hetruria vulgò Gingaro,
fit ex eius radicibus aqua ad dealban-
dam faciem. Dioscor. capit. 157 secundi,
Galen. 6. de fac. simpl. Plin. lib. 19. cap. 5.
lib. 24. capit. 16. Et Gal. 2. de fac. alim.

Paul.lib.7. Calore & siccitate est primi ordinis, ex terrestri calida & adstringente substantia.

Artemisia, vulgò Cermisia, in hac deceptus est Brasauola, confundens Artemisiam cum Partenio, vulgò Matricaria appellato: cognosco ego primam & tertiam speciem, & est apud Regienses in usu. Dioscor. capite 118. & 119. tertii Plin. capite 7. libro 25. Galen. 6. de fac. simplic. Calida in secundo, & sicca in tertio ordine.

Asaron, vulgò Bacchara. Dioscor. capite 9. libro 1. Gal. 6. de fac. simplic. Plin. lib. 2. capite 6. Paul. lib. 7. Similem acoro virtutem habet.

Asclepias nisi ea sit herba, quam vocant hederam terrestrem, aut vincetoxico, ut Fuchsius, certè nescio quid sit: hoc scio Empiricos pro mirabili potione in vulneribus sanandis hederam terrestri uti. Dioscor. capite 97. lib. 3. & Galen. 6. de fac. simplic. Plin. ca. 5. lib. 27. Paul. lib. 7. Calida & sicca tenuisque substantiæ.

Aspalatus in Italia non habetur: sunt qui dicant esse sandalum rubeum. Ruelius agallochon vulgare: sed quum non præmanibus habeatur, iuxta Galeni placitum in succidaneis pro eo utemur semine vitic

icis. Diosc. cap. 16. lib. 1. Pau. lib. 7. Con-
t virtute acri & adstringente.

Asparagus duplex est, domesticus & syl-
stris per se nascens. Galen. 6. de fac. simp.
nt absterui. Plin. 10. cap. lib. 20. Visum
erborat, & doloribus thoracis & renū
edetur. Auic. fen. vlt. lib. 4. Bonum odo-
m in toto corpore inspirant, vrinam ve-
malè olere faciunt. Pau. lib. 7. Medius in
lore & frigiditate.

Asphodelus, vulgò apud Seplasiarios di-
tur Haffrodilo, Latinis hastula regia.
al. 6. de fac. simp. ait, cinerem eius radices
cere renasci pilos. Diosc. cap. 159. lib. 1.
lin. lib. 22. cap. 22. Pau. lib. 7. Vim habet
tergentem discutientemque.

Asplenon, vulgare citrach, etiam lingua
eruina est phyllitis apud Diosc. Huius me-
ninit Gal. 6. de fac. simp. & Diosc. cap. 142.
b. 3. Ait Gal. Etsi subtilium sit partium,
hilominus non esse calidum, frangit la-
idem, minuit lienem. Plin. lib. 27. cap. 5.
Pau. lib. 7. Est virtute tenui, sed non cali-
um, vt suprà Galenus.

Aster Atticus in pratis nascitur, Serapio
non distinxit hunc ab iringo, quoniam v-
rique flores in modum stellæ habent.
Diosc. cap. 115. lib. 4. Et Gal. 6. de fac. simp.
Vocatur & bubonium, eo quòd bubones

fanat, & vocatur à Plin. lib. 22. cap. 7. & centum capita. Paulus lib. 7. Mixta estur-
tutis, digerentis & refrigeratoria, iccio
bubonibus prodest.

Astragalus Dioscor. cap. 60. quartus
Plin. ca. 8. lib. 26. Gal. 6. de fac. simpl. Pa.
lib. 7. Non ignauiter desiccatur, & eius rac-
adstringit.

Arbara Diosc. cap. 83. secundi, genus
ticular, quod apud Teutonicos paratur
farina, lacte & butyro, in conuiuijs, &
cibandis infantibus. Galenus primo
aliment.

Attractylis, à Theodoro fusus syluestri
Hermolaus vult carthamum, syluestre
enicum, dictum esse attractylidem. Diosc.
cap. 98. tertij. Plin. ca. 15. lib. 21. & Theophr.
cap. 4. lib. 6. Pau. lib. 7. Vi siccante & me-
diocriter calida pollet.

Attriplex, ἀτρίπλεξ, vulgò trepese, no-
defuerint qui spinachia vulgaria esse vo-
luerint. Diosc. cap. 110. secundi, & Gal. 6
de fac. simp. Facit eius semen vomere &
purgare corpus per inferiora. Razes re-
fert se vidisse hominem acceptis eius dua-
bus drachmis assellasse vsque ad magnam
debilitatem. Paul. Est humidum & frigi-
dum in secundo.

Auellana, Græcè ἀέλιον πόντιον, sylue-
stris

is est & domestica. Diosc. cap. 146. primi
 cl. 7. de fac. simp. & 2. de fac. aliment. vul-
 geditur niciola. Paul. lib. 7. Frigidio
 sunt & austeræ, in cæteris iuglandibus
 uales.

Auena, Græcis *σπῆμα*. Diosc. cap. 85. se-
 cundi, & Gale. 6. de fac. simp. Plin. cap. 25.
 1. 22. Pau. lib. 7. Siccat & modicè discu-
 t, alicuius astrictiõis compos.

Baccaris, non est asaron, ut lucusque pu-
 tum est à Seplasiarijs, nec est scarlegia, ut
 dicit Brasauola de mente Leonicenni,
 cum in radicibus scarlegia bacchari non
 spondeat, ut videri potest ex Diosco. cap.
 6. tertij. quare dicendum est baccharem
 nostris in partibus non haberi. Pau. lib. 7.
πῆμα acris est & odorata, eius folia ad-
 ingunt.

Ballote, marrubium nigrum, adeò fi-
 tile est melissophylo, ut nisi per odo-
 rem malum agnosceretur, vix id per vi-
 um scires discernere. Diosc. cap. 109. ter-
 tijs, & Pau. lib. 7. Acris est & absterforiæ
 cultatis.

Balsamum verum non habetur, sed o-
 rum antiquum pro balsamo vendunt. de
 balsamo lege Plin. ca. 12. lib. 25. & Theoph.
 6. lib. 9. & Iustinum historicum lib. 36.
 Dioscor. cap. 18. primi. Galen. 6. de fac.

simp. Desiccatur & excalefacit in secundo
excessu, & est tenuium partium: itidem
serit Pau. lib. 7.

Barba hirci, Græcè *τραγοπίγωρ*. in Hetruria
vulgo dicitur fassefrica: herba nana
est: sunt qui velint similem esse scaudis
huius aqua chymico more stellata mira-
litor vulnera recentia carnis cum syndio
applicata sanat. Theoph. cap. 7. lib. 7. Dic.
cap. 132. lib. 2.

Bdelliū, res nota est: verum quod pin-
tur à Diosc. non habetur, quod magis
grescit & resinum est, magis mollit. E-
plex reperitur, Sicilianum, quod foliis
radicibus palme assimilatur, & vulgò Ne-
poli dicitur cepheone, cuius germen a-
huc molle comeditur. Et Iudaicum, quod
describitur à Diosc. cap. 61. primi, de pri-
mo loquens. Gal. 8. de fac. simp. dum de pri-
ma mentionem facit, dixit, medullam ei
cephalon vocari, vnde corrupto vocabulo
vulgò cepheone vocatur. Paul. lib. 7. E-
mollit, maturatque.

Beta, Græcè *βῆτα*, nota est, nam pal-
sim nascitur, nigra est & alba, & tertia spe-
cies, ut refert Mathiolus in agro Trenti-
no inuenitur, quæ rubea est, & radices ha-
bet carotis similes: comeditur non minu-
insuavis, quàm ceteræ radices in acetariis
Galen.

len. 8. de fac. simp. Plin. lib. 20. cap. 8. & Dioscor. cap. 112. secundi. Succus betæ al- per clysterem infusus mirum in mor- m ventrem constipatum soluit, etiam si ralia enecmata solui non posset. Pau. lib. Nitrosam vim habet, abstergit ideo- discutit.

Betonica, Græcè κίτρον, notissima res est, habet multas vires quæ ab Antonio Musa- raris Augusti medico exarantur. vide Diosc. cap. 1. quarti, & Galen. 8. de fac. simp. au. lib. 7. duas species enumerat, sunt qui- elint calidam & siccam esse, ob id quod- cidit & subacris est.

Bitumen, quod Græci ἀσφαλτον vocant, est quædam mixtura cum pice & aliis mi- cellis, quare ad eam non confert quæ à Diosc. recitantur. Nascitur bitumen in lu- æa in eo lacu quo Iordanus fluuius ingre- itur, sed de his latius vide ca. de Naphtha. Diosc. cap. 84. primi. Plin. lib. 35. cap. 15. Gal. 2. de fac. simp. Bitumen in mari mor- uo inuentum, vim resiccatoriam & excal- iactoriam habet in secundo ordine, ad glu- inationes vulnorum cruentorū idoneum. Itidem ait Paul. lib. 7.

Blatæ, Græcè σιλφῆ, sunt animalia quæ circa molas & in pistrinis inueniuntur, si- milia grillis vocatis, valent ad dolores au- rium:

rium: vocantur etiam blatæ quæ in chenibus porci falsis inveniuntur, sed non quæ à Dioscor. cap. 35. secundi recantur: quæ verò circa molas inveniuntur ab aliquibus vulgò pintolæ vocantur de Pau. lib. 7.

Blitum vulgò dicitur Biedone, duas habet species: alteram coloris rubei, alteram albi: nullum ferè vsum obtinet in re medica, peruertit stomachum. Diosc. cap. 8. secundi, & Plin. lib. 20. cap. 22. Galeo. de fac. simp. Pau. lib. 7. Frigidum & humidum in secundo ordine.

Botrys, herba aliquibus nota est hennis, quæ nisi sit artemisiæ species, hunc scio planè quid explicem. Meminit Diosc. cap. 121. tertij. Plin. lib. 25. cap. 7. & 27. cap. 8. Pau. lib. 7. Planta est insignis odorata.

Brassica, nota & vulgaris est, vulgò dicitur cauolo siue verza, cuius multæ sunt species, vt refert Theoph. cap. 4. lib. 7. & Plin. cap. 8. lib. 9. Prima brassica est quæ magis habet thyrsus cum longis folijs: est & altera quæ crispa habet folia, & dicitur apinæ: alia est quæ caulem habet subtilem cum teneris & tenuibus folijs, est & apinæ Plin. lagotoria brassica, quam nonnulli volunt esse id quod dicitur vulgò ille puze

20. Sunt & alia quamplures brassicæ
cies, quas narrare longum foret. Semi-
brassicæ inueterata si seminantur in
as transeunt, & econuerso. Brassica ma-
ia est vulgaris soldanella. Vide Dioscor.
2. 111. secundi. Galen. 3. de fac. simpl.
2. 14. & septimo eiusdem & secundo
fac. aliment. Paul. lib. 7. Quæ comedi-
siccatur & abstergit, valentius tamen
uestris.

Britannica, nisi sit bistorta, aut betonica
ex nunc est in usu, certè nescio quid sit.
Dioscor. cap. 2. quarti. Gal. 6. de fac. simpl.
In lib. 25. cap. 3. vocatur ab Auicenna. Ber-
nich. Pau. lib. 7. Adstringit & congluti-
t: quidam dixerunt esse lapatium acū-
m sed decipiuntur.

Bromos herba, similis est auenæ, & est
sylvæ syluestris: meminit Plinius lib. 22.
25. & Dioscor. 135. quarti. Gal. 6. de
simp. Desiccatur & digeritur mediocriter &
te morfu. Et primo de fac. aliment. iti-
m Pau. lib. 7. asserit.

Buccinæ, sunt animalia ostracodermata,
est duri corticis, & nascuntur in mari, si-
ci & purpuræ: sunt similes buccinis siue
bis, unde dictæ sunt. Maiores iis sunt pur-
ræ, & habent liquorem in gulæ venis,
o infectores in tingendis vestibis pur-
puræ

pureum colorem efficiunt. lege Plin. lib. 9.
& Diosc. cap. 4. secundi. Gal. 2 de fac. simp.
Desiccant sine morfu dum vruntur, &
polinem conteruntur.

Baglossum, lingua bouis, nil aliud est
quàm nostra vulgaris borago: de hac re-
minit Gal. 6. de fac. simp. & Diosc. cap. 3.
lib. 4. Paulus lib. 7. Humidum calidum
temperamento est.

Bulbus vomitorius, nisi narcissi sit
cies, & bulbus qui edendo est nisi sit Al-
lonia vulgaris, nescio profectò quid sit.
Diosc. ca. 160. & 161. secundi. Scio nostros
Ascalonias non esse Galeni bulbos, qui
acerrimè sint, nec quales à Galeno scribi-
tur. Vide Galen. 5. de facul. simpl. cap. 2.
& secundo de facul. aliment. Pau. lib. 7.
mari ac adstringentis saporis modicè e-
siccant, glutinat vulnera & abstergit. Vom-
itorius verò multò calidior. vide & Gal.
de fac. simp.

Bunium, vulgò nauone saluatico, du-
eius sunt species, vt Plin. cap. 4. lib. 20. bu-
nion & buniada, Huius meminit Galen.
de fac. simp. & Diosc. cap. 119. quarti. Pau-
lib. 7. Bunium calidum est, vrinam & me-
ses ducit.

Bupthalmos, oculus bouis, non est co-
tula, vt Fuchsius, sed flos similis camomi-
la

luteus est, non circumcirca albus, ut
nulli. Hurus meminit Diosc. cap. 147.
Et Gal. 6. de facul. simp. Plin. lib. 25.
8. Paulus lib. 7. Discutit ac durities
collit.

Cacalia quum semen, ut ait Plinius cap.
b. 25. paruum producat, ac sunt margar-
e parue, nescio profecto diuinare quid
vide Dioscor. cap. 117. quarti. Galen.
7 de facul. simpl. Pau. lib. 7. Valet sicuti
camus.

Cadmia fit ære in fornacibus accēso, ad-
rente fornacum parietibus, & est res,
æ nunc vulgò turia dicitur. Dioscor. cap.
quarti. Plin. lib. 34. cap. 13. vide Gal. 9.
facul. simp. Pau. lib. 7. Desiccat, abster-
, & concava vlcera explet.

Calamintha, est id quod vulgo dicitur
lamēto: huius sunt tres species, ut refert
Diosc. cap. 38. tertij. secunda species vulgò
dicitur neveda, nec est ea vulgaris herba
æ dicitur herba gatta, ut refert Brassa-
ola, nec ista herba gatta est tertia species.
Ruellius putat, quoniam similis est men-
stro, non autem vrticæ vel melissæ, ut her-
gatta. Gal. de calamintha meminit 7. de
cul. simp. Pau. lib. 7. Nepita calida & sic
in tertio ordine.

Calamus aromaticus. i. odoratus: verum
non

non habetur, sed pro eo accipitur radicem
cori. Meminit Theoph. 9. de historia p
tarum, & Plin. cap. 22. lib. 12. Et de
bus canarum cap. 11. lib. 24. Et Gal.
7. de fac. simp. & Diosc. cap. 17. primi. lib.
lib. 7. Calefacit & desiccât in seculo
ordine.

Calx viua, præsertim quæ ex flumini
excoctis lapidibus fit, omnibus nota
hæc si diu lota fuerit omnem mordacitẽ
amittit, & malignis vlceribus prode.
Diosc. cap. 87. quinti, & Galenus 9. de
cul. simp. Pau. lib. 7. Adeo vehementer vt
vt crustam inducat.

Cancamon, est lacha, & lacha est lach
ma arboris Arabiæ, quæ ad nos non aff
tur: quare caueant, qui dialacha comp
nunt, quid per lacha imponere debeat
nam gumi rubeum quod demonstratu
non est lacha, quum odore careat. Nec d
bent seplaciarij lacha artificiali vti, qu
componitur verzino, grana & cremesi, n
vti debent. quod vulgò dicitur sangu
draco in lachryma: quoniam vires lach
contrarias habet: hic adstringit, illa aperi
Diosc. cap. 24. primi. Paul. lib. 7. Ext
nuat, abstergit, aperit.

Canabis duplex, satiua & sylvestris: se
sylvestris non sic nota semẽ domesticę ge
nituran

uram extinguit, sed in gallinis contra-
m agit: nā quæ ex huius semine pascun-
r, multa oua pariunt. Dioscor. cap. 156. &
r. & Gal. 7. de fac. simp. Paul. lib. 7. Semen
icutit flatus, & ita siccat, vt genituram
faciat.

amphora, est arboris Indici. statura ma-
mi, quoddam gumi frigidū & siccum in
rtio ordine. Bona camphora cognosci-
r, si intra panem calidum reposita resol-
itur. Auic. lib. 2. & Serapio lib. aggreg. cap.
camphora. Huius rei non memini quic-
iam me legisse apud Græcos authores:
ultas hæc habet species ex locorum di-
ersitate sumptas.

Capparitis ex Alexandria affertur: de hac
al. 7. de fac. simp. & 2. de fac. aliment. cap.
4. Diosc. cap. 164. secundi. Theoph. cap. 5.
or. 6. & Plin. cap. 8. lib. 19. Paul. libr. 7. Ra-
ix extergit, purgat, incidit, discutit, & sua
erbitate contrahit, stringit & densat.

Cardamomon verum non habetur, sed
quod pro cardamomo venditur triplex est,
naius & minus, quod nielam dicunt. Ter-
tum vocatur ab aliquibus mele getta, aut
granum paradisi, Arabicè dicitur cordu-
neni. Diosc. cap. 5. primi, & Plin. cap. 13. lib.
2. & Gal. 7. de facul. simpl. Pro cardamomo
accipitur cyperus vel myrthus, vt Gæle. in

P p

fuccidaneis. Paul. lib. 7. Acre est, & lumbos interimit.

Carduus, domesticus est & sylvestris, domestici cardones appellati, qui in postma cœna crudi & cocti cum pipere & se comeduntur, vulgò carchiofoli. Theop. cap. 4. lib. 6. & Gal. 8. de facul. simpl. vbi libet, quòd sunt calidi & sicci in secundo ordine. Dioscor. cap. 14. tertij.

Carum, vulgò carui. Dioscor. cap. 59. tertij, & Gal. 7. de facul. simp. Calidum siccum in tertio ordine. & 2. de fac. alimen. itide Paul. lib. 7.

Cassia duplex, vera quæ cinnamomum, falsa quæ cassia ligneavocatur. Cassia verifiliqua est cassia solutiua ex Aegypto proveniens, sed nuspiam à Græcis de hac ququam proditum est. Quum verò apud Græcos legitur cassia, intellige de ea quæ nunc cinnamomum dicitur. Dioscorid. cap. 14. primi. Galen. de antidotis, & 7. de facul. simplic. Exiccat & calefacit in tertio ordine.

Castoris siue fibri testiculi, Græcè *νάσσαρος ὀφθαλμοί*, in usu sunt & cognoscuntur, verum qui iuxta heplasiarios cernuntur, non sunt veri, sed compositi, ut refert Plin. ex renum partibus & testiculis in vesicis repositi. Dioscor. cap. 23. secundi, & Plin. 3. cap. 8.

p.8.lib.& cap.3.lib.32.Gale.11.de facult.
npl.de castoreo lib.scripsit Archigenes.
ul.lib.7.Calefacit, siccátque cum exte-
landi viribus eximiis.

Castanea, res nota est. Gal.4.de fac.simp.
p.7.& 2.de fac.aliment.Dioscor.cap.126.
imi.Vocantur etiã Græcè *λίπυα*, & con-
merantur inter glandes.

Caucalis, secundum aliquos, est id quod
ilgò dicitur petrosello saluatico, eo
quòd apio similia folia habeat. Dioscor.
p.128.secundi, & Galen.7.de facul.simpl.
aul.lib.7.Dauci modo calefacit & sic-
cat: sunt qui vocent caucalim vuam lu-
inam.

Cedrus, est arbor vt iuniperus, sed quid
cedrinus liquor, nisi sit vernix, certè ne-
scio quid dicere debeam. Diosc.cap.9.pri-
mi, & Gal.7.de fac.simpl.Plin.lib.13.cap.5.
Maior & minor, & minoris sunt duo ge-
nera, lycea & fœnica. Paul.lib.7.Calefacit
& siccát in tertio ordine.

Centaurium maius, nil aliud est quàm
haponticum vulgare. Plin.cap.6.lib.25.&
Gal.7.de fac.simpl.& Diosc.lib.3.Paul.lib.
7.Radix est acris, calida & terreæ adstri-
ctionis.

Centauriũ minus, apud Hetruscos vul-
gò biondella, ob affectum quem circa mu-

lium capillos facit, ventrem soluit: non autem maius, ut Arabes. Diosc. cap. 7. tertij, & Gal. ultra particularem tracta. 7. de fac. simpl. etiam mentionem facit. Paul. lib. Radix inefficax, sed colliculi valide & tra morsum siccant.

Calcanthum, latinis atramentum sulfurium, vulgò vitriol. Diosc. cap. 68. quintij. Gal. 9. de facul. simp. Paul. lib. 7. Carnes humiditas absomit, siccátque.

Chamæcissos, nisi sit hedera terrestris, Fuchsius, haud scio quid sit, quò tot hederæ terrestris genera demonstrantur. Diosc. cap. 121. quarti, & Gale. 8. de fac. simpl. Plin. lib. 24. cap. 10. & 15. Paul. lib. 7. Flos eius insigniter amarus.

Chamædaphne, est Dioscor. laureola, sed laureola non est mezereon, ut putarunt nonnulli, sed potius chamelea. Diosc. Plin. lib. 21. cap. 11. id vocauit chamædaphnen, quo vulgò dicitur vinca peruinca, sed postea cap. 15. libr. 24. chamædaphnen appellauit ut Dioscor. cap. 144. quarti. de qua Gal. 6. de fac. simpl. verba facit. Paul. lib. 7. Calida & acris est.

Chamædris, vulgò Calamadrina, recens comesta hominem à peste præseruat: huius meminit Theoph. ca. 10. lib. 9. Gal. 8. de fac. simpl. & Diosco. cap. 103. tertij. Plin. lib. 24. cap.

p.15. Paul. libr. 7. in tertio ordine calefa-
t, exiccátque.

Chamelea & Thimelea apud Arabes est
ezereon. Dioscor. cap. 166. quarti, & 157.
iarti. Gal. 8. de facul. simp. Vincentem ha-
et qualitatem amaram.

Chameleon albus est & niger: albus est
quod vulgò dicitur carlina, niger verò
in medicinis, quæ per os assumuntur, nō est
mittendus: nam teste Gal. 8. de fac. simp. ne-
io quid mortiferi in se habet. Arabes sæ-
e confundunt chameleonem cum chame-
ea. In chameleonis nigri radice nascitur
iscus, quod dicitur ixia, & est venenū: vn-
equum in Plinio legeris remedia contra
iscum, intellige contra ixiam. Diosc. cap.
& 9. tertij. Gale. 8. de fac. simpl. Calefacit
in secundo, & siccatur in tertio ordine.

Chamæpitys, vulgò Iua & regij orbica,
species à Dioscor. recitantur tres cap. 166.
tertij, & Galen. 8. de facul. simpl. Expurgat,
abstergit, calefacit in secūdo, siccatur in ter-
tio ordine.

Camæfice nisi sit species pepli, haud scio
quid sit: interpretatur enim humilis & ter-
estris ficus. lege Dioscor. cap. 164. quarti.
Gal. 8. de facul. simpl. Abstergendi simul &
crem vim possidet. itidem Paul. lib. 7.

Chelidonium duplex, maius quod vulgò

dicatur cerdogna: & minus quod vocatur
à quibusdam scrophularia minor, ob similitudinem quam cum scrophularia indicibus tenet, in Hetruria vulgò dicitur fauoscello. Dioscorid. cap. 172. & 173. l. 2. Plin. cap. 8. lib. 25. Galen. 8. de facul. simp. Chelidonium minus calefacit, & siccat in 4 ordine absoluto. Paul. lib. 7. Chelidonium maius calefacit in tertio, & valent abstergit.

Crysanthemum, Romanis calta: puta ego olim corrupto vocabulo id esse, quod nos vulgò dicimus colta, & est similis comomilla: sed quia non omnes conditiones servat, quas crysanthemum tribuit Dioscorid. nunc certè haud scio quid sit. Dioscor. cap. 5. quarti. Differt autem chrysanthemum à bellidophthalmo, ea differentia quæ est in cap. 147. lib. 3. & cap. 56. quarti.

Chrysocola, vulgò borace, duplex est artificialis & mineralis: quæ verò paratur ex alumine rochæ & sale ammoniaco, vocatur borace re facto. Viridior est in medicinis excellentior. Dioscor. cap. 58. quinti, Galen. 9. de facult. simplic. & Plin. cap. 5. lib. 33. Paul. lib. 7. Abstergit, discutit, siccatque.

Cichorium siue intybum, vulgò endiuivum siue radechij. Dioscor. cap. 121. lib. 2. & Gal. 8.

facul. simpl. vbi inquit, Endiuia est her-
amara, sed multò plus syluestris quæ ab
anaritudine picris siue cichoriũ dicitur.
aul. lib. 7. Siccat, refrigerátque in primo
radu.

Cicuta similis ferulæ, sed mali odoris.
ioscorid. cap. 77. quarti, & cap. 11. lib. 6.
lin. cap. 10. lib. 21. Galen. 8. de facult. simpl.
aul. lib. 7. Habet vires summè refrigera-
orias.

Cinnabaris, vulgò sangue de draco in
achryma, est gummi cuiusdã arboris Aphri-
æ stillans, sanguini humano simile, vnde
nomen habuit. Cinnabaris verò, quo nunc
tuntur seplasiarij, duplex est, mineralis &
artificialis: mineralis nascitur in mine-
is vbi argentum viuum foditur: artifi-
ialis fit ex sublimatione argenti viui &
ulphuris, minium verò Dioscor. est no-
strum cinabrium. Vide Dioscorid. cap. 63.
quinti. Galen. 9. de facult. simpli. Modicè
icrem facultatem habet, & adstrictionis
quippiam.

Cinnamomum verum non habetur, sed
nostrum duplicatum eosdem effectus quos
verum cinnamomum efficit. Diosc. cap. 13.
primi. Vide de cassia Gal. 7. de facult. simpl.
Galéfacit in tertio, non tamen ita desiccát:
itidem Paul. lib. 7. ait.

Circæa nondum à me cognita, nec
est hucusque: de hac loquitur Dioscor. cap.
125. tertij. Galen. 7. de fac. simpl. Paul. lib.
Calida est eius radix & odorata, eius-
men lac generat.

Cirfion, nisi sit nostra vulgaris bug-
sa, nescio profectò quid sit. Dioscor. cap.
lib. 4.

Cistos & hipocistos, apud seplasiar
vocatur corrupto vocabulo hypoquistid,
& est succus radicis tragopoi, id est bar-
de beccho ad solem inspissatus, & nō est
quod habet Diosc. cap. 111. & 112. primi: na
est herba saxosis locis nascens. Galen. 7.
fac. simpl. Paul. lib. 7. Adstringit & modi-
refrigerat.

Citria, siue citromala, omnibus no-
sunt, in quorum numero ponuntur quæ
vocalamus limonia & aurantia poma, vnd
Virgil. *Aurea mala decem misi*, vulgò dici-
tur Arantia, quasi dixeris, aurantia. Diosc.
cap. 136. primi. Plin. cap. 3. lib. 12. Gale. 7. d
fac. simpl. Paul. libr. 6. semen tertij refrige-
rantium siccantiūque ordinis habetur
cortex siccat in secundo.

Clematis daphnoides vulgò vinca per-
uinca, sed altera clematis, nisi sit vitis alba,
aut flamola vulgò dicta, nescio quid sit.
Diosc. cap. 7. & 8. quarti. Galen. 7. de facul.
simpli

aplicium. Paul. lib. 7. Clematis daphnoi-
s siccandi virtute pollet: altera verò cle-
matis acri & caustica facultate donata est.
Clymenon, sunt qui velint esse vulgarem
monariam, sicuti & periclymenon, ma-
ssyluam: decipiuntur verò qui credunt
atrissyluam & caprifolium esse vnum
idem, quum caprifolium sit pixia can-
na Dioscor. Vide de clymeno Dioscorid.
p. 14. quarti, & de periclymeno cap. 15.
quarti, & Gal. 8. de facul. simpl. Plin. lib. 25.
p. 7.

Cnicus à seplasiariis, dicitur carthamo,
ilgo zafarano sarasinesco Dioscor. cap.
2. quarti, & Galen. 7. de facult. simplic. &
Theoph. cap. 4. libr. 6. Paul. libr. 7. Ter-
ordinis siccantium est, semen purgat
uum.

Condrilla, cichorij species est, & alte-
rum condrellæ genus, quod vulgò ab ipsius
ste lattarola nuncupatur: vide Dioscor.
p. 122. secundi, & Galen. 8. de facul. simpl.
p. de endiuvia & cichorio. Plin. libr. 22.
p. 22.

Conyza, vulgo pulicaria, eo quòd puli-
es enecet. Dioscor. cap. 127. tertij, Theoph.
p. 2. libr. 6. & Gale. 7. de facul. simpl. Paul.
libr. 7. Siccat & calefacit in tertio or-
dine.

Corallium album & rubrum omnibus
notum est, lithodendron etiam dictum
album rubro frigidius. Dioscorid. cap. 3.
quinti, & Plin. cap. 2. lib. 32. Auicenn. de
ribus cordis. Paul. lib. 7. Validam fici-
di vim habet, adstringendi verò meo-
crem.

Coriandrum omnibus notum: in vi-
bus eius dissentiunt Diosc. & Gale. nam-
que Dioscor. cap. 64. tertij, quod habeat
res frigidas, & similiter Auic. At Gal. 7.
facul. simp. quod sit tepentis facultatis en-
pauilla adstrictione: itidem Palus lib.
tener.

Cornus, mas & foemina, non plantar
apud apum aluearia, ne apes corni flo-
bus vefcentes moriantur. Dioscor. cap. 14.
primi, & Galen. 7. de facult. simpl. Exicc-
valenter, ac vulnera conglutinant. Paul. li-
7. itidem.

Ceronopos est, ut placet Manardo,
quod dicitur vulgo herba stella, & non Le-
niceni, sanguinella, quae est species gram-
nis spinosae, ut placet Plin. cap. 19. lib. 2.
& vocatur dactylus. Dioscorid. cap. 11.
secundi, & Plin. lib. 22. idem ait quod Di-
oscorid. Galen. 7. de facult. simpl. Paul. lib. 7.
Creditur prodesse ad colicos cruciatu
manducata.

Costu

Costus verus non habetur, sed pro costo
dam vulgaris radix venditur, nec in-
uitur dulcis & amarus, vt vulgus putat,
bene albus & niger, nunc Venetiis opti-
s venditur. vide Dioscorid. capit. 15. pri-
m Galen. 7. de facult. simpli. Plurimam a-
m & calidam qualitatem simul & facul-
tem habet, adeo vt etiam exulceret. Paul.
lib. 7. itidem refert.

Cotonea mala, vulgò pome codogne, for-
Cydone Cretensi oppido oriunda, quæ
nora, & in partes diuisa citrina & lanu-
mosa sunt, cæteris meliora: nam odorem
gè aliis suauioreni reddunt. Struthia
rò à Galen. appellata, sunt quæ in magni-
dine maiora & carnosiora, nec sic citri-
vt prædicta conspiciuntur: muliana ve-
à Plinio dicta sunt cotonea, vulgò pome
starde appellata. Dioscorid. capi. 135. pri-
i. Paul. lib. 7. Frigidi, & terrestri tempe-
menti sunt. Galen. 2. de fac. alim.

Crimmon est ex tritico vel zea granum,
afsius tritum quàm farina, quo anti-
li vice panis vesciebantur. Dioscorid. cap.
i. secundi, & Plin. capit. 8. lib. 18. Galen. 7.
e facult. simplic. & primo de fac. alim. ybi
e zea loquitur. Paul. libr. 7. Valde nutrit,
grè conficitur.

Crithmon, plures existimarunt id esse
quod

quod vulgò dicitur fenochio marino, et
herba di san Petro: ego crederem esse en-
tam Florentinam. Dioscor. cap. 118. secun-
di. Gale. 7. de facul. simpl. Vis eius est ec-
catoria & absterforia. Paul. lib. 7. idem
fert.

Crocodilion est species chameleons,
sed non est carlina. Dioscor. cap. 10. ter-
ti. Plin. cap. 8. lib. 22. & Gale. 7. de facul. sim.
Paul. lib. 7. Calidam, siccam, & discutien-
tim obtinet.

Crocus melior ex aquila Abruci aff-
tur Venetias, nascitur multò preciosior
multis Lombardiæ locis, sed rarior. Dio-
scor. cap. 25. primi, & Gal. 7. de facul. simp. Paul.
lib. 7. Calefacit in 2. & desiccatur in prin-
ordine.

Cucurbita, vulgò zucha, & est vel long-
vel rotunda, vel lata. Ex semine colli cu-
curbitæ fiunt longæ, & ex semine in partem
rotunda contento, rotundæ: sicut & in partem
lata lata oriuntur. Crassiores euadunt cu-
curbitæ, si semen cum acumine versus ter-
ram plantetur. Dioscor. cap. 123. secundi, &
Plin. cap. 5. lib. 18. & Gale. 7. de facult. simpl.
Paul. lib. 7. Humida & frigida in secundo
abscessu.

Cucumis est id quod vulgò dicimus cu-
cumere ouer cedrone, ut probatur ex Plin.
cap.

lib.19. & ex Diosc. nec est anguria ut
 sent aliqui : omnes tamen species cucu-
 um, melopeponum & peponum, ut af-
 rat Gal.2.de facult.alimen.vocantur no-
 me peponis. Melopepones sunt nostrivul-
 ges melones : sed quid sint pepones, nisi
 sint, quos Venetiis vulgò vocant pepo-
 naud scio quid sint : scio hos non esse an-
 gas, quum seorsum Serapio capita de o-
 nibus faciat. Dioscor.capit.124. secundi.
 Pil.Refrigerat & humectat in secundo or-
 de, semen abstergit & incidit:vide etiam
 den.8.de fac. simpl.

Cucurbita sylvestris, vulgò colocynthi-
 da valet mirabiliter in asthma & tussi
 & iuncturarum doloribus. Oleum
 eius concavitate bullitum nigros efficit
 pillos, nec finit canos fieri, & prohibet
 casum, auribus sibilantibus mede-
 ti. Dioscor.capit.171.quarti,& Galen.7.de
 simp. vide etiam Mesu. Paul.lib.7. Vali-
 um habet vim purgandi.

Cucumis sylvestris, vulgò cucumere
 nino, ex quo fit elaterium, decoctum radi-
 cum & eius foliorum, & succus eius valet
 in omni hydropicis, cum melle abster-
 git maculas liuidas ex percussione, valet
 etiam ad lentigines & maculas faciei.
 Dioscor.cap.149.quarti, & Galen.8.de fac.
 simpl.

simpli. Paul. lib. 7. Radix detergit, dissolvit
& emollit, succus verò siccandi vires habet.

Cupressus, fornicis familiarissima, nascitur vbi sit aqua, nec eius lignum necescit. Dioscorid. capi. 87. primi, & Plin. 15. lib. 24. & Galen. 7. de facult. simpli. Plin. lib. 7. Siccandi vires habet absque calore conspicuo.

Curmi Plin. ult. potus veluti ceruisia: de Dioscorid cap. 79. lib. 2.

Cuscuta tantum iuxta Arabes memoratur, & est satis nota herba: habet vim stringendi & confortandi, valet ad obstructions hepatis & lienis & sanguinem purificat.

Cyclaminus, vulgò pan porcino, & omnibus nota: altera verò cyclaminus èta à Dioscorid. haud certè scio quid sit. Dioscorid. cap. 153. secundi, & Gal. 7. de facult. simpli. Paul. lib. 7. Extergit, incidit, aperit, attrahit & dissipat. Plin. cap. 9. lib. 21.

Cyanon puto esse lapidem lazuli, inuenitur in arariis fodinis, & in quibusdam maris littoribus. Dioscorid. cap. 60. quint Gal. 9. de fac. simp.

Cyminum sativum omnibus notum vulgò cumino dicitur. Sylvestre verò, quòd sciam, non cognoscitur, nisi sit quod vulgò dicitur rucheta. Calidum est, vt placet Gal. 7.

7. de facult. simpl. Dioscorid. cap. 61. ter
Paul. lib. 7. In tertio ordine calefacit, fla
discutit.

Cynocrambe, canina brassica, species
mercurialis herbae, Dioscor. cap. 184. quar-
Gale. 5. de facult. simpl. Paul. lib. 7. Letha
homini est, foedi odoris, citra siccitatē,
uiderit etiam.

Cynoglossa, lingua canina, duplex est: al-
ta à Plinio descripta, altera vulgaris,
que vera non est. Dioscorid. ca. 124. quarti,
Plin. capi. 8. lib. 25.

Cyperus duplex, alter passim in Longo-
dia inuenitur, alter angulosi iunci radi-
cimilis, nascitur in India, & est vulga-
nostra curcuma: Curcuma verò Serapio
, non est curcuma nostra, sed radix che-
donia. vide Dioscorid. capit. 4. primi. &
Galen. 7. de facult. simplic. Paulus libro
ultimo. Siccat, calefacitque citra mor-
in.

Cytisus, vulgò trifolio caualino, ouer-
bulo. : Impinguantur equi cytiso, & à
ocunque morbo liberantur libentius
càm hordeo, equi cytiso vescuntur. Dio-
scorid. capit. 108. quarti, & Galen. 7. de
facult. simplic. & Plin. libro 13. capit. 24.
Paulus libro 7. Tepidæ naturæ & leniter
discutientis.

Daphnoi

Daphnoides laureola, non est mezerion, quū sit chamelea Dioscoridis, vt dictū ē, chamædaphne postea est species daphnidis. Diosc. ca. 143. quarti, Plin. cap. 15. lib. 11. & Gal. 6. de facul. simpl. Paul. lib. 7. Calii, acris, & subamara est.

Daucus est secundum aliquos pastinaca sylvestris: verus daucus nondum habetur, quoddam aliud à seplasiariis pro daucoditur. Diosc. cap. 66. tertij. Galen. 6. de fac. simpl. Paul. lib. 7.

Dictamnus nuper inuentus habetur in Creta: verū quod vendunt pro dictamnino, est species fraxinellæ, quæ nec dictamnino Cretensi, vel salsæ conformis est: sed quæ fraxinella nuncupata, quum nullibi ab antiquis mentio fiat, haud scio quid explicare debeam. De dictamno scribit Dioscorid. c. 32. & 33. & 34. tertij. Gal. 6. de fac. simpl. Theophrast. ca. 16. lib. 9. Paul. lib. 7. Virtutem habet pulegij.

Dipsacos, siue labrum Veneris, vulgò dicitur scarzo da scarzare li panni: vocatur & ineptè à seplasiariis virga pastoris, & etiam Pandectarius, vbi dipsacum confundit cum polygonio, qui est centinodia seu corrigiola ouer sanguinaria de dipsaco Dioscor. cap. 2. lib. 3. Galen. 6. de fac. simpl. Plin. cap. 13. lib. 14. & ca. 9. lib. 17. Paul. lib. 7.

De

eficcat in secundo ordine, & nonnullam
lstringendi vim obtinet.

Dracunculus duplex, maior & minor, &
tres ab aro differens & alia, vulgò dici-
tur serpentaria maior & minor, non est ta-
men herba nomine serpentina, siue herba
gentina, quæ in recentibus consolidandis
ulneribus mirabilis est, & in intestinorū
rupturis. Dioscor. cap. 155. & 156. secundi, &
Ale. 6. de fac. simpli. Magis calefactorium
tenuioribus partibus constat ipso aro: iti-
em Paul. lib. 7.

Dryopteris, quercuū filix, similis esset fi-
ci, sed multò minores foliorum incisuras
habet, depilat hæc cum radicib⁹ emplastri
modo imposita. Dioscor. capi. 181. quarti, &
Aalenus 6. de faculta. simpli. Plin. capit. 9.
lib. 27. Paulus. Vim habet exedentem. De-
ceptus est Pandectarius, credens esse poly-
odum.

Ebenus, species ligni guaiaci, vel sancti
appellati, in quorū ordine id melius ac ex-
cellentius esse existimarunt, quod minus
ignorat. Ebenus olim in multa fuit vene-
ratione, vt testatur Plin. cap. 4. libr. 12. & de
ius viribus scripsit Plin. cap. 2. libr. 24. Ga-
lenus 6. de facult. simpli. Dioscorid. ca. 114.
rimī. Paulus lib. 7. Vis est, & calefactoria,
et deterforia & subtilis.

Qq

Ebulus & Sambucus res sunt notissimæ.
 Aqua ex eorum floribus elicita, dolores
 pitis à vaporibus calidis factos mitiga-
 Succus ebuli ad solem cōcretus ac siccat
 pondere vnius drachmæ cum decocto iu-
 datus dolores podagricos, & iuncturaru
 & morbi gallici tollit, & in encemate p-
 fitas sciaticis prodest. Dioscorid. capit. 16
 quarti, & Galen. 6. de facult. simplic. Plin.
 cap. 8. lib. 24. Paul. libr. 7. Vterque desicca-
 di facultatem habet, digerit, conglutina-
 & aquam per aluum educit.

Ebur *ἐλεφαντίνον*, vulgò auorio, & est dei
 elephantis. Aristot. 6. de natura animal.
 Ebur valet fluxui albo mulierum cum la-
 cte ex seminum lactuce extracto cum aqua
 chalybeata bibitum. Dioscorid. capit. 50
 libro secundo.

Echion volunt aliqui esse buglossum
 sylvestre, flores iuxta folia purpureos ha-
 bet, in quibus semen est viperino capit
 simile. Dioscorid. capi. 28. quarti. Plin. cap.
 19. libro 25.

Echinus, vulgò riccio terrestre: vide
 eius vires iuxta Dioscorid. capit. 2. libr.
 2. & apud Razem in tract. 6. animalium
 Galen. 2. de facult. simplic. Plin. lib. 9. ca-
 pit. 25. & libr. 32. capi. 1. Paul. libr. 7. Fe-
 eius pilos fluentes glutinat, caro discuti-
 &

& siccat.

Echinus, herba, nisi sit species spinæ al-
 æ, eò quòd capitellum simile echino pisci
 habeat, certè diuinare nescirem. Plin. ca. 8.
 lib. 23. Gale. 6. de facul. simpl. Acerba repel-
 lit & siccat. itidem Paul. lib. 7.

Electrum, Latini succinum, Arabes cha-
 abe: vulgò ambra da corone, habet vim re-
 inendi fluores stomachi & ventris. Diosc.
 ap. de populo nigra, capi. 98. primi. nec est
 gummi albae populi, vt Brasauola. Plinius
 capit. 2. & 3. lib. 37. post longam improba-
 tionem fabularum Ouidij, inquit certum
 esse electrum gigni in insulis septentriona-
 libus, &c.

Elleborus duplex, albus & niger: voca-
 tur etiā veratrū: & est omnibus notū, cuius
 sum damnauit Mesues, sed conuenienter
 nō solum eius infusio sed etiam puluis nūc
 in usu est absque alienius patientis incom-
 modo: radices quum extrahuntur, statim
 surgantur, & abiecta parte interiore corti-
 ces tantum ad solem exiccantur, ex quibus
 leinde fit puluis. Vide de eius virib⁹ Actua-
 rium. Gal. 6. de facul. simpl. & Dioscorid. ca.
 145. 146. quarti. valet suffusus felle, scabiei,
 lepre, volaticis. Paul. lib. 7. Vterque calefa-
 cit, & siccat in tertio abscessu.

Ephemeron duplex, colchicō & epheme

Qq 2

ron nuncupatū agrestis iris, vulgò gigl
matto. Colchicum verò id est, quod nūc
dicitur hermodactylus, & est res venenos
Hermodactylus verus ac legitimus non i
uenitur, nec ephemera est lilium conua
lium, vt Fuchsius. Paul. Mixte potestatis e
repellentis & discutientis.

Epithymon, thymi inuolucrū, verum
est id quo nunc vrimur. Dioscorid. cap. 17.
quarti, & Plin. capit. 8. libr. 26. Galen. 6. d
fac. simpl. Paul. lib. 7. Siccat & calefacit i
tertio abscessu.

Eryngium, vulgò Rinzzo, non est sec
cul Serapionis, imò nec istud secacul ac
huc cognoscitur: iccirco qui eryngio vir
excitandi venerem tribuunt (quum nulli
bi à Galen. vel Dioscor. hoc dicatur) sum
mopere decipiuntur. Vide Dioscorid. capi
22. tertij, & Galen. lib. 6. de facul. simp. Plin
cap. 2. lib. 25. Paul. libr. 7. Calefacit quiden
non manifestè, siccat verò nec modicè.

Eruca duplex, satiuā & syluestris: satiuā
dicitur Ruchetta in Hetruria, & Ruchula
in Lombardia, & comeditur in acetariis
eius semen tritum cum felle bouino cicā
trices nigras, albas reddit, & cum melle
maculas faciei & lentigines delet. Vide
Dioscorid. capit. 129. secundi, & Galen. 2.
de facult. alim. & 6. de facult. simpl. capit.
de

e vitice. Plin. capit. 13. libr. 20. Paul. libr. 7.
 laculenta est & venerem instigat, sed syl-
 estris valentior est.

Eruum, vulgò orobo inuenitur inter va-
 ias fegetes, & species vitiae esse præsumi-
 ur. Orob⁹ verò qui ex Alexàdria Venetias
 fertur, non est verus: Brasauola putauit
 id esse Eruum, quod vulgò dicitur Ruuio-
 ie, quod à Galeno vocatur ochron, sed deci-
 nitur: nam non prouocat sanguinem cum
 trina vt orobus. Discor. cap. 100. secundi. Et
 Galen. 8. de facult. simpli. Plin. cap. 25. libr.
 12. Paul. libr. 7. Calefacit in primo, siccatur in
 secundo gradu.

Eupatorium est nostrum vulgare agri-
 moniū, sed apud Arabes, & maximè apud
 Auicenn. & Mesu. sunt diuersa eupatoria: nā
 quod ab Auicenn. describitur, id esse volunt
 quod vulgò dicitur canuarola. Eupatorium
 Mesu. est quod in Hetruria dicunt herbam
 Iuliam, quæ vehementer vermes interficit:
 deirco in compositionibus Auicennæ vte-
 rit suo eupatorio, & similiter in Mesu. her-
 ba Iulia, & iuxta Græcos agrimonio vulga-
 ri. Dioscorid. cap. 39. quarti, Galen. 6. de fac.
 simpli. Paul. libr. 7. Tenuem vim & inciden-
 tem sine conspicuo calore habet.

Euphorbium est, quo vulgariter vtimur.
 vide de ei⁹ virib⁹ Mes. & Diosc. c. 87. tertij.

& Gal. 7. de facul. simpli. Plin. cap. 7. lib. 1.
Paul. lib. 7. Vim adurentem habet.

Faba, Græcè *κύνος*, omnibus nota: Aegyptia verò ea est, quæ vulgò dicitur coldesia, vide Dioscorid. cap. 96. & 97. secundi. Theoph. cap. 4. libr. 4. & Galen. 1. de facult. aliment. Paul. libr. 7. Non recedit multum à medio temperamento in refrigerando siccando.

Ferula, *ῥάβδος*, in Apulia maximè cognoscitur, vbi lignorum loco cōburitur: vide Theophrast. lib. 6. & Galen. 8. de fac. simp. & Plin. capi. 24. libr. 20. & Dioscorid. capi. 82. tertij.

Ficus, *σῦκος*, satiua est & sylvestris: vide Dioscorid. cap. 149. primi, & Gale. 2. de facult. alim. & 8. de fac. simp. Paul. lib. 7. Aridae fiant in secundo, maturant, detergunt, ac discutiunt. Ficus verò arbor calidi tenuisque temperamenti, adeò succus foliorum abstergit, vt etiam exulceret.

Filix, *ῥίζα*, vulgò felese, mas est & foemina: vide Diosc. ca. 178. quarti, & Theoph. capit. 20. lib. 9. & Plin. cap. 9. lib. 27. & Gal. 8. de facult. simplic. Paul. lib. 7. vim siccandam & amaram habet, foetus corrumpit, lumbricos enecat.

Flos æris res est diuersa à viridi ære, quæ passim vtuntur seplasiarij pro flore æris
nam

am est pars æris tenuissima ex vapore
ris fusi eleuata: quæ verò vi quadam excu-
tur, ærugo æris dicitur, & est æs viride.
Dioscor. cap. 45. quinti. Plin. cap. 2. lib. 34.

Fœniculum, *μαράθρον*, domesticum &
luestre. Domesticum omnibus notum.
vide Dioscoridem cap. 74. tertij, & Galen.
.de facult. simplic. Plin. libro vigesimo,
capite 23. & Galen. 2. de facult. alimentor.
Paul. libro 7. Calefacit in tertio, siccatur in
primo ordine.

Fœnugracum, *τίλις*, omnibus notum,
uicinas à corniculis suis à Theophrast. vo-
catur. Galen. 8. de facult. simp. Dioscor. cap.
3. secundi. Plin. c. 19. li. 23. Paul. lib. 7. Cali-
um in secundo, siccum in primo.

Fraxinus, *μελία*. Dioscor. cap. 93. primi.
Theophrast. cap. 11. lib. 3. vide de eius viri-
us Plin. cap. 8. lib. 24. Paul. lib. 7. Morsu
iperarum folia succurrunt, ligni ramen-
ta ferunt esse lethalia.

Fumaria, *νάπρος*, vulgò fumus terræ,
omnibus nota: vide Mes. de eius viribus,
Diosc. cap. 105. quarti, Gal. 7. de fac. simp.
Paul. libro 7. Acris & amara est, eò dicta,
quòd lachrymas eius succus eliciat.

Fungi, *μυκήται*. Dioscorid. cap. 81. quar-
ti, Galen. 7. de facult. simplic. Frigidus &
humidus eos appellat. Plin. cap. 3. libro 19.

Paul. libro 7. Frigidi & humidi, nonnul
exitiosi, præcipuè putridæ qualitatis pa
ticipes.

Galbanum, vulgò galbina, liquor est ei
iusdam plantæ nascentis in Syria ferulæ
Dioscor. cap. 88. tertij, & Gal. 8. de fac. simp.
Calidum in primo tertij, & siccum in pr
mo, secundi ordinis. Plin. cap. 26. lib. 12.

Galiopsis, herba similis vrticæ, & est se
cundum aliquos vrtica foetida, vulgò vrt
ica mortua, *ouer quella ortica che ha le mach
bianche.* At secundum Fuchsum est scro
phularia, sed reuera scrophularia non fo
tet, veluti vrtica mortua. Vide Dioscorid
capite 90. quarti. Plin. libro 27. capite 9
Paul. libro 7. Dissipat & emollit scirrhe
sos humores.

Gallion, quo lac coagulatur, herba es
similis rubiæ minori, quæ aparine dicitur
alia certè à presura vocata. Dioscorid. cap
91. quarti, & Galen. 6. de fac. simp. Paul. li
bro septimo. Siccandi vim cum mediocri
acrimonia habet.

Garum est id iuxta Diosc. quod vulgò di
citur salamoia, sed apud Plin. cap. 7. lib. 31.
erat condimentum ex interioribus gari pi
scis maceratis, & cum sale resolutis. Paul.
lib. 7. Calefacit & exiccat.

Genista, *σπάρτον*, vulgò genestro. Diosc.
cap.

ap. 152. quarti, Gal. 3. de fac. simp. & Mesu.
inter alia sua solutiua. Plin. capite 9. libro
4. Paul. libro 7. Semen & flores per infe-
iora purgant.

Gentianæ radicis aqua per balneum ma-
iæ elicitæ, febres oppilationum sanat, ver-
mes interficit, & sæpe lauando maculas fa-
ciei omnes repurgat. De hac Diosco. cap. 3.
tertij. Plin. cap. 7. lib. 25. Galen. 6. de facult.
simp. Paul. lib. 7. Extenuat, perpurgat, abs-
ergit, & aperit.

Geranion, vulgò herba gruaria, quòd in
summitate habeat caput gruis. Huius spe-
cies sunt tres, vna Latinorum, quæ est id
quod vulgò dicitur rostrum gruis: & aliæ
maluæ Græcorum, inter quas est pes colum-
binus, & alia quæ folia maluæ similia ha-
bet. Diosco. cap. 122. tertij. Plin. cap. 6. lib. 16.
Paul. lib. 7. Radicem habet esculentam quæ
inflammationes vteri dissoluit.

Gingidium, nisi sit quod vulgò dicitur
cerofoglio, vt putat Ruellius & Fuchsius,
nescio certè quid sit: nam in Cicilia & Sy-
ria nasci traditur. Diosco. cap. 126. secundi.
Galen. 6. de facult. simpl. & secundo de fac.
alimentorum. Paul. libro 7. Non habet ca-
lorem manifestum, sed siccatur in tertio &
adstringit.

Git, *μυλάνδιον*, siue nigella, idem sunt.

Q 9 5

Brasauola vult id esse, quod vulgò dicitur gitone: aliqui volunt esse quod vulgò dicitur rosola, aut id quod pronigla à seplasiariis venditur: nam omnia in cina præter colorem habet. Vide Dioscoridem cap. 84. tertij. Galen. 7. de facul. simpl. Plin. cap. 17. libro 20. Pau. libro 7. In tertio calefacit & desiccat.

Gladiolus Plinij est acorus, sed gladiolus Dioscoridis est cuius flores in Hetruria dicuntur Monacacie, Græcè dicuntur *ῥοδόλινος*. Dioscorid. capite 22. quarti, & Galen. 8. de facul. simpl. Paul. lib. 7. Radix trahit & discutit, & siccat.

Glaucium est quod dicitur memithe, Serapione & ab Auicen. Nota tamen duobus esse in Serapione capita: alterum de glaucio Græcorum, alterum de chelidonia minoris. Dioscor. cap. 91. tertij. Galen. 6. de facul. simplic. Plin. cap. 10. lib. 27. Paul. lib. 7. Adstringit & manifestè refrigerat.

Glaux nisi sit, vt Ruellius, quod dicitur vulgò galenga, siue ruta capraria, quid esset profectò nescirem: valet enim galenga in peste, & ad venena serpentum, epilepsiamq; si eius succus ad mediam vnciam bibatur: sed quia galenga lac non facit multiplicare, dicere possem non esse glaucum, vide Dioscor. cap. 136. quarti, & Galen. 6. de facul.

simplic. Paul. libro 7. Calida & humida
 mperamento est, vnde lac generat.

Glycyrrhiza, vulgò regolitia. Theophi-
 tica, cap. 13. libro nono. Et Galenus sexto
 facul. simplic. Dioscorides cap. 5. tertij.
 in. capite 9. libro 22. Paul. libro 7. Tepidi
 midique temperamenti, alicuius adstri-
 ionis particeps.

Gramen, ἀγρόν, multas habet species,
 apud nos duæ tantum inueniuntur: al-
 ra scilicet communis, altera quæ vulgò
 citur sanguinella, ouet capriola. Nota ta-
 en non habere proprietatem vllam con-
 a vermes, vt communis erat opinio. Dio-
 orides cap. 31. & 32. quarti, Galen. sexto de
 cul. simpl. Plin. cap. 19. lib. 24. Paul. lib. 7.
 ccat, & modicè refrigerat, tenuis & sub-
 orbæ substantiæ.

Halicacabus est apud Arabes alchechē-
 i, & est species solatri: vide igitur fusiùs
 e speciebus solatri, cap. de solatro.

Halcyonium, vulgò spuma maris, à se-
 lasiariis dicitur, cuius species quinq; enu-
 merantur à Diosc. cap. 90. quinti, Plin. cap.
 lib. 32. non nisi quatuor species recensuit:
 go quum essem Venetiis, vix duas species
 idi. Galen. 11. de fac. simpl. quinque etiam
 memorat. Paul. libro 7. Abstergit, discutit,
 cri qualitate præditum.

Har

Harundo quinque species habet, vt Dioscorid. sed Plinius species 29. enumerat. pite. 36. lib. 16. & cap. 11. lib. 24. Vide Theophrast. cap. 12. lib. 4. & Gal. 7. de fac. simpli. Dioscor. cap. 99. lib. 1.

Hedera, *κίττος*, tres habet species, omnes cognoscuntur. Qui maiorem hedera lectionem cupiūt, legant Theophrast. cap. 18. lib. tertij. & Plin. cap. 34. libro 16. Galen. 7. de fac. simp. & Dioscor. cap. 17. secundi. De hedera terrestri lege Chamepsos. Paul. lib. 7. Hedera contrariis com-
viribus, adstringit, refrigerat, acris est calida, aqueæ substantiæ & tepidæ.

Hedysaron, est herba quæ crescit in ephacen, id est vitiam, vnde Theophrast. cap. 8. libro 8. inquit, quod hedysaron veluti aphacæ pestis, sicut lolium tritici. Vocatur etiam securidaca, eò quod sem in siliquis contentum ancipiti securi simile habeat. Dioscorid. cap. 137. tertij. Plin. cap. 17. lib. 18. Paul. lib. 7. Amarum est, & uiter adstringit.

Heliochryson, nisi sit quod à nobis dicitur garyophilum Hispanicum, haud scio quid sit: vide Dioscorid. cap. 55. quarti. Plin. cap. 25. lib. 21. Galen. 6. de facul. simplic. si nomine amaranthi. Facultatem habet incidentem & extenuantem, vnde grum-
far

guinis liquat ac dissoluit. Paul. libro 7.
idem adserit.

Heliotropium duplex, maius & minus.
maius apud nos vulgò dicitur Mirasole,
ad Hetruscos dicitur verrucaria, & vul-
herba da porri, quoniam porros dissi-
p. Valet etiam mirabiliter cancris, idcir-
dicitur etiam herba cancri: vide Diosc.
p. 185. & 186. quarti. Paul. lib. 7. Maius ca-
lam, siccam & abstergentem vim habet:
minus verò lumbricos interimit.

Helxine, vulgò vitriolo, alij dicunt esse
eciem inuolucris, quod flores in modum
impanæ albos fert. Dioscorides cap. 37.
quarti. Credo ego verè quòd sit parietaria:
de Galenum sexto de facult. simplic. &
in. cap. 15. lib. 21. Paul. libro 7. Vis est abs-
urgendi & leuiter adstringendi cum hu-
iditate subfrigida.

Hemerocallis, est lilium syluestre, non
item lilium conuallium, vt volunt non-
nulli. Germani vtuntur lilio conualli ad
roborandum cor, cerebrum, & omnia
embra spiritualia: valet etiam tremori
ordis, epilepsiæ, & apoplexiæ, morsibus &
uncturis venenosorum animalium. Dio-
scorid. cap. 128. tertij. Galenus 6. de facult.
mplic. Paul. libro 7. Radix viribus lilio
espondet: vide etiam Plin. cap. 21. lib. 21.

Hem

Hemionitis, herba est apud me ignita, nec est scolopendria illa, quæ dicitur lingua ceruina, quum sit phyllitis, apud Dioscoridem capite 143. tertij. Paul. bro septimo. Adstringit, & simul amari lienosis succurrit.

Hiberis duplex, altera Democratis, altera à Paulo & Plinio recitata, quæ habet folia lauro similia. Prima est lepidum Dioscoridis, secunda vocatur piperitis, uel piperella, à sapore piperis acuto: videtur apud Dioscoridem capite ultimo primi, & Plin. cap. 8. lib. 19.

Hieracion, id est lactuca erratica, et herba spinosa similis soncho, id est cicerbitæ, de qua Plin. capite 7. libro 20. Val. cum lacte mixta infirmitatibus oculorum præsertim cicatricibus, suffusionibus, caliginibus: cum aqua verò & aceto bibita ventrem purgat: valet cum vino morsui serpentum & vulneribus, si folia cum caulibus terantur: somnum excitat, Venerem prohibet, refrigerat, & sanguinem auget: videtur apud Dioscoridem cap. 65. & 66. tertij. Plin. cap. 7. lib. 20.

Hippoglosson, vulgò bis lingua vel bonifacia, valet præfocationibus vteri, si cochlear eius radicis sumatur. Valet etiam mirabiliter ruptis siue crepatis, si pulueri

ochleare cum brodio carnis quotidie sumatur: videntur tamen in primis diebus horum velle intestina exire, nihilominus ostea conglutinantur, idcirco diligenter in primis illis diebus ligentur. Dioscorid. ap. 127. quarti. Plin. cap. 10. lib. 27. Paul. libro 7. Molliendi virtute pollet.

Hippuris siue equisetum, vulgò cauda quina, huius aliud genus asprella dicitur. valet, vt testatur Galenus 6. de fac. simplic. in omnibus vulneribus, etiam si nerui essent ræcisi. Dioscorid. cap. 44. quarti. Paul. libro 7. Adstringit, & valenter circa mordacitatem exiccat.

Hordeum, *αἰνῶν*, ex quo paratur ptisan. Dioscorides capite 78. secundi. Galen. 6. de facult. simplic. & primo de facultat. alimentorum. Refrigerat & exiccat in primo ordine cum pauxilla adstrictione: itidem Paul. lib. 7.

Hordeum murinum, *φύκις*, vulgò locum syluestre, vbique nascitur ac ipsum arumentum. Dioscor. cap. 40. quarti. Plin. cap. 25. libro 22.

Hyacinthus, est secundum aliquos id quod vulgò dicitur cipola seluatica, nec est ille hyacinthus, de quo fabulantur Poëtæ, ex Aiakis sanguine natus: nam ille producit florem rubeum iridi similem. Dioscor. cap.

cap. 61. quarti. Galen. 8. de facult. simp. Paul. libro septimo. Refrigerat in secundo, siccatur in primo, semen leuiter abstringit & adstringit.

Hydropiper non est, ut Ruellius, vulgari canuarola, sed potius quædam species persicariæ, quæ nullam in foliis maculam præ se fert: hæc enim seruat omnes illas conditiones, quas illi tribuit Dioscorus cap. 150. secundi. Galen. 8. de facult. simpl. Paul. libro 7. Aquaticum piper calidum, sed piperis modo.

Hyoscyamus albus & niger non inuenitur, sed tantum qui flores flauos profert, vulgò dicitur iusquiamo, *ouer dente cabali*. Dioscor. cap. 67. quarti. Latine dicitur applanaris herba siue altercum. Galen. 8. de facult. simplic. Plin. cap. 4. lib. 25. Paul. lib. Est ex tertio refrigerantium ordine.

Hypecoon, vulgò ruta seluatica. Dioscor. cap. 66. quarti. Galen. 8. de facult. simpl. Plinius cap. 11. libro 27. Paulus libro 7. Refrigerat in tertio.

Hypericon, ascyron, androsomon, & cori, una & eadem res est, & si aliqua in foliis, caule, & floribus differentia adfuerit. Vocatur vulgò perforata, nec est ruta syuestris, ut opinatur brasauola, sed est vera perforata, qua vulgariter utimur. Diosco

cap

p. 162. & 163. & 164. & 165. Galen. 8. facult. simplic. Plin. cap. 8. lib. 26. Paul. 7. Tertias species calefacit, & siccatur substantia prædita. De aliis dictum est in Androsemon.

Hyssopus, vulgò etiam hyssopo dicitur, qui putarunt gratiolam esse hyssopum montanum, sed decipiuntur: nam gratiola locis humidis nascitur, & soluit ventrè, lucens bilem & pituitā, & vlcera conglutinat. De hyssopo lege Dioscoridē cap. 27. tertij. Galen. 8. de fac. simp. Calidus & siccus in tertio ordine.

Iaspis, vulgò dicitur diaspro: meminit Diosc. cap. 160. lib. 6. & Galen. 9. de facult. simp. Paulus lib. 7. Confert non continens cibum in stomacho.

Indicus lapis, vulgò endego, naturalis non habetur: quo verò utimur, fit ex isatide siue gado. Dioscorid. cap. 61. quinti. Plinius cap. 6. lib. 35. Paul. lib. 7. Contra hæmorrhoidas valet.

Inula, *ἐλένιον*, vulgò enola ouer iola. Dioscorid. cap. 27. primi. & Plin. cap. 5. lib. 19. & Galen. 6. de facultate simplic. Valet pectoris humoribus viscidis, item sciaticis in modum cataplasmatum, & fluxionibus paruis ab humiditatibus factis. Paulus lib. 7. Calida est & sicca cum excrementis.

R. r.

ritia humiditate.

Ireon, ἰρέων, modò inter segetes, modò inter herbas nascitur, acuta est ac nasturtium: certè puto quòd res sit similis fysamo: nascitur vbique cum foliis erucæ, floribus paruis & flauis, à quibus corniculæ quædam, in quibus est semen, proueniunt. Dioscorid. cap. 147. secundi. Plinius duobus in locis 7. & 10. cap. lib. 28. & cap. 25. lib. 22. similiter Gale. 6. de facult. simplic. & primo de facultate alimen. Paulus lib. 7. Erisimi semen igneum calefactumque est.

Iris, seplasiariis irios, vulgò zilio morello, de hac nullibi iuxta Galen. nisi in Andromachi theriaca, vbi illyrica commendatur. Dioscori. cap. 1. primi libri. Et Plin. cap. 7. lib. 21. Paul. lib. 7. Affatim calefacit, extergit, & maturat, tenuis substantiæ tussis utilis.

Isatis, vulgò guado da tingere: nam colores in sua viuacitate omnes conseruat. Dioscor. cap. 107. & 108. secundi, Galen. 6. de facult. simp. Paul. lib. 7. Siccandi vires & adstringendi habet.

Isopyron hucusque non vidi, nec qui viderit vel cognouerit adhuc intellexi. Dioscor. cap. 116. quarti. Galen. 6. de facult. simpl. Paul. lib. 7. Abstergit, incidit semen eius.

Iuncus

Iuncus odoratus, *σχίνος*, vulgò squinanto, prouocat vrinam & mēstrua. Vide Dioscor. cap. 16. primi. Gal. 8. de fac. simp. Plin. cap. 18. lib. 21.

Iuncus, *ἰξὺσχίνος*, vulgò zuncho. Diosco. cap. 5 c. quarti, & Galen. 8. de facult. simpl. duas species iunci memorat, vt oxyshenō & oligoschenon. Paulus lib. 7. Oxyshenī semen somnificum est, vtriusque semen fruxum deficcat, & fluxus cohibet.

Iuniperus, *ἀρχουδο*, gummi eius sandaraca siue scriptorum vernix est, sandaraca inquam Arabum: nam sandaraca Dioscorid. est res mineralis, similis auri pigmento. Fit ex hoc gummi, & oleo de semine lini artificialiter vernix liquida, qua vtuntur pictores ad illustrandas picturas: valet combustionis ignis & doloribus ac tumoribus hæmorrhoidarum: gummi verò iuniperi valet catarrhis, cohibet mēstrua, fistulas exiccat, vermes interficit, & resolutis nervis confert. Dioscorid. cap. 89. primi. Galen. 6. de facult. simpl. Valet etiam scissuris manuum ac pedum ex frigore factis, & fluxum sanguinis, & hæmorrhoidarum constringit.

Ixia, viscus est radicibus chamaeleonis adhærens, quo pennæ sagittis adglutinantur. Diosc. cap. 21. lib. 6.

R r 2

Ixus est viscus quercinus, qui paratur pueris in capiendis auibus. Dioscorid. cap. 94. tertij. Galen. 6. de facult. simplic. Paul. lib. 7. Calefacit cum acrimonia, & humores ex alto elicit.

Lactuca, res nota est. Galen. 6. de facult. simplic. Frigida & humida, sed non excessiue, tollit sitim, & semen eius fluxum spermatis cohibet. Et secundo de facult. alimen. Generat sanguinem, quam alie herbe, meliorem, sed non omnino laudabilem. Dioscorid. cap. 125. secundi.

Labrusca, est vitis syluestris omnibus cognita. Dioscorid. cap. 2. quinti. Plin. cap. 29. lib. 12. Paul. lib. 7. Germina habent vim abstergendi nonnihil & adstringendi.

Ladanum, aromatarij laudanum dictum. Plin. cap. 17. lib. 12. & Galen. 7. de facult. simplic. Dioscorid. cap. 113. primi. Paul. lib. 7. Calidum in secundo, emolliens mediocriter, discutiens & maturans.

Lagobus, id est pes leporinus, nisi sit garyophyllata, ut Pandectarius: nescio certum quid sit: valet in potionibus pro vulneribus & menstuis & sputo sanguinis, dysentericis & ramicis per os sumpta, & emplastri modo imposita: est calida & sicca. Dioscorid. cap. 19. quarti. Galen. 7. de facult. simplic. Paul. lib. 7. Desiccatur.

Lana

Lanaria herba siue radícula, res erat tempore Dioscoridis multum in usu, sed apud nos quid sit, nescio: valet enim summopere in dealbandis lanis, cuius semen condiscitur, quod etiam minimè habetur. Dioscor. cap. 152. secundi. Plin. cap. 3. lib. 19. & Gale. 8. de fac. simp. Calida in quarto quodammodo ordine, siccaque est.

Lapathum siue rumex, vulgò dicitur romice, de quibus plura Dioscor. cap. 106. secundi. Oxylapathon enim & hippolapathon, & oxalida sunt species lapathi: vocatur primum lapathium, acutum: secundum, magnum lapatium, quod folia rheubarbaro similia habet ex oxalida, quam acetosam, & vulgò herbam bruscam vocat. Plin. cap. 21. lib. 20. & Galen. 7. de facult. simplic. Paul. lib. 7. Oxylapathum discutit, & pauxillum repellit.

Lapsana, res est incognita, sed iuxta Plin. est species brassicæ sylvestris. Dioscor. cap. 107. Plin. cap. 8. lib. 20. Galenus 7. de facult. simplic. Paulus libro 7. Abstergit, discutit.

Lacer siue lacerpitium, vulgò assa, quæ in foetidam & odoratam diuiditur. Assa foetida est quæ habetur apud aromatarios: odoratus verò lacer, est quod vulgò dicitur belzoino. Nota tamen non ha-

beriaſſam dulcem, nec eius loco ſuccum
glycyrrhizæ poni, ſed potius belzouine
vocato. Dioſc. cap. 85. tertij. Gal. 8. de facult.
ſimp. Paul. lib. 7. Probè calefacit, extrahit,
emollit. Plin. cap. 3. lib. 19.

Lathyrus, eſt quæ vulgò dicitur catapu-
tia ſive cazzapuzza maior: nam minor eſt
riccinus. Dioſcor. cap. 171. quarti. Gal. 7. de
facult. ſimpl. Plin. cap. 11. lib. 27. Paul. lib. 7.
Purgandi vim obtinet.

Laurus, arbor notiſſima, olim in pre-
tio habita. Sunt qui velint per ſe laurum
ignem accendere, dummodo rami ſimul
confricentur & ſulphur ſuſum proiiciat-
ur. Dioſcor. cap. 91. primi. Galen. 6. de fa-
cult. ſimpl. Paulus lib. 7. Folia ſiccant & ca-
lefaciunt inſigniter.

Laurus Alexandrina, ſive laureola, & ſi-
ruſco & hypogloſſo ſimilis ſit, imò pro
hypogloſſo à Fuchſio accipiatur, quum re-
vera non ſit, mihi incognita reſtat. Dioſc.
cap. 142. quarti. Galen. 6. de facult. ſimpl.
Paulus lib. 7. Calida, acris & ſubama-
ra eſt.

Lemnìa terra, eſt verus bolus Arme-
nius, orientalis dictus, ſi bene conſidere-
tur Galeni locus lib. 9. de facult. ſimpl. nec
eſt terra illa ſigillata, quam tanti faciunt.
Dioſcorid. cap. 67. quinti. Plin. cap. 6.
lib.

lib. 35. Paulus lib. 7. Siccat & adstringit mediocriter.

Lentes siue lenticulæ, vulgò dicuntur lenticia. Dioscor. cap. 98. secundi. Galen. 8. de facult. simplic. Paul. lib. 7. Siccant in secundo ordine, medio caloris & frigiditatis temperamento.

Lens palustris, vulgò dicitur Zen vel lenticularia, oritur in aqua. Dioscor. cap. 34. quarti. Gale. 8. de facultate simpliciu. Paul. lib. 7. Humectat & refrigerat in secundo abscessu.

Lentiscus arbor, Græcè *οξύς το δένδρον*, est quæ mastichen producit. Dioscorid. cap. 77. primi. Galen. 8. de facult. simplic. Plin. cap. 6. lib. 13. Paulus lib. 7. Siccat in secundo, medius in calefaciendo & refrigerando.

Lepidum, est piperitis, vt dictum est de Iberide. Dioscorid. cap. 165. secundi. Ruellius, Hermolaus, & Manardus putant, quòd sit Raphanus. Plinius cap. 8. lib. 19. Galenus 7. de facultate simplicium. Calefacit in quarto, & est simile nasturtio. Paul. lib. 7. idem refert, sed ipse inquit in tertio.

Lichen, seplasiariis hepatica. Plinius cap. 4. lib. 26. duas species commemorat: alterā quæ solū latifolium apud radices habet,

Rr 4

alteram quæ petris adhæret, veluti muscus. Valet lichenis, id est volaticis. Dioscor. cap. 5. 1. quarti. Galenus 7. de facult. simplicium. Paul. lib. 7. Extergendo purga mediocriter siccatur & refrigeratur.

Ligusticum, ab aliquibus pro leuistico accipitur, sed si litera Dioscorid. bene ponderetur, non est verum ligusticum: vide Dioscorid. cap. 53. tertij. Galenus 7. de facultate simplicium. Paulus lib. 7. Excalefaciunt ac probe flatus discutunt semen & radix.

Lilium vulgare est, quod vulgò martegone dicunt, de vulgari. Dioscor. cap. 107. tertij. Galenus 7. de facultate simplicium. Plinius cap. 5. lib. 21. Paul. lib. 7. Flos lilij discutit ac emolliendi vireis habet.

Limoniū, simile est betæ sylvestri. Plinius cap. 8. lib. 20. Quauis affirmet Galenus se nūquam betā sylvestrem vidisse. Dioscor. cap. 18. quarti. Gal. 7. de facult. simplicium.

Lini seminis oleum, neruorum & iun-cturarum durities mollit, & est mirabile hæmorrhoidibus, ignis combustionibus cum aqua rosacea lotum. Sumuntur & in principio morbi lateralis ex eo vnciæ quatuor, & sanat. Dioscorides cap. 94. secundi. Galenus 7. de facultate simplicium. Calidum quasi in principio, mediū inter siccum

siccum & humidum.

Lithargyros ex plumbo & ære provenit, dum argentum & aurum depuratur. Dioscorides cap. 56. quinti. Plinius cap. 6. lib. 33. & Galenus 9. de facultate simplic.

Lithospermon, seplasiarij milium solis vocant: crederem ego id esse quod vulgò dicitur lacryme da corone. Miratur Plinius cap. 11. lib. 17. de lithospermo. Diosc. cap. 149. tertij. Paulus lib. 7. Calculos frangit & vrinas elicit.

Lolium, vulgò dicitur loio, nec est pseudo melanthium, vt Fuchsius. Gale. 6. de facult. simpl. Dioscor. cap. 191. secundi. Paul. lib. 7. Calidum in primo tertij, & siccum in fine secundi.

Lotus Aegyptia, vocatur à Serapione handococa, ex cuius semine paratur oleum ad dolorem iuncturarum: verùm de vtraque loto intelligit Serapio. Dioscor. cap. 109. quarti. Galen. 7. de facult. simplic. Plin. cap. 17. lib. 13. & cap. 31. lib. 15. Paulus lib. 7. Lotus arbor extenuat & siccatur, ac mediocriter adstringit.

Lotus satiua, nisi sit melilotus vulgaris, haud scio quid sit. Lotus sylvestris ignota est. Dioscorid. cap. 106. & 107. quarti. Paulus lib. 7. Lotus domestica à nonnullis

Rr 5

triphyllon appellatur: abstersorias vires
& modicè siccanteis obtinet.

Lupini, quamuis amari, coctione tamen dulcorantur & comeduntur, maximè domestici. Dioscorid. cap. 101. secundi, & Galenus 1. de facultate aliment. & 6. de facultate simplicium. Paulus lib. 7. Esculentum obstruit, amarum abstergit, dissipat & sine morfu desiccatur, lumbricos occidit & viscera purgat.

Lychnis, nisi id sit quod vulgò dicitur rossete, profectò nescirem quid sit: nã Plinius cap. 4. lib. 21. inquit. rosarum speciem esse in aquosis locis nascentem cum quinque foliis. Dioscorides cap. 105. & 106. tertij. Galen. 7. de facult. simpl.

Lycium, aliud est quo seplasiarij vtuntur, aliud quod à Dioscorid. cap. 117. primi recitatur. Quod verò in officinis venditur, alij componunt ex baccis ligustri, alij ex matrissylua, vtrisque simul: sed vti possumus pro lycio sumach. vide Galenum 7. de facultate simplicium: nam ex pixiacantha arbore fieri inquit, valens vlceribus oris malignis & serpentibus. Plinius cap. 7. lib. 12. & cap. 14. lib. 24. Paulus lib. 7. Calefaciendo & refrigerando medium est, desiccatur verò in secundo abscessu.

Lycop

Lycopsis, nisi sit species anchusæ, aut
synoglossa vulgaris, nescio profectò quid
sit. Vide Dioscorid. cap. 27. quarti. Plin.
cap. 11. lib. 27. Paulus lib. 7. Radix adstri-
ctoria.

Lyncurion, est electrum siue succinum
plumas siue paleas trahens, vt refert Dio-
scor. cap. 73. secundi: vnde pterygoforon
dictum: vide de Electro.

Lysimachia, non est cereta, sed alia lon-
gè diuersa herba: nam cereta folia lino si-
milia habet, non salici. Dioscorides cap 3.
quarti. Plinius cap. 7. lib. 25. Galenus 7. de
facultate simpl.

Macer, siue macis, est cortex nucis Indi-
cæ, vt coniectari possum. Dioscori. cap. 95.
primi. Galenus 8. de facult. simpl. malè in-
terpretatur à Pandectario cortex mali pu-
nici. Paulus lib. 7. Inter frigiditatem & ca-
lorem medium obtinet, siccatur in tertio or-
dine, & adstringit.

Malabathron, vulgò folium Indicū, no-
bis ignotū, pro quo vtimur cassia vel nar-
do Indico, vt Galen. in succidaneis. Diosc.
cap. 11. primi. Plinius cap. 27. lib. 12.

Malua, *μυλάχη*. Diosc. cap. 109. secun-
di. Galenus 2. de facultate alimen. Theo-
ph. cap. 5. primi. Plinius cap. 21. lib. 20.
Paul. lib. 7. Syluestris mediocriter discutit
&

& mollit, hortensis verò imbecillior.

Mandragora pluribus in locis Italiae
scitur. Vanum est credere mandragoræ ra-
dices habere formam hominis: verum pr-
pter pomum, quod cum radicibus euelli-
tur, formam hominis sine brachiis præ-
fert, vnde Pythagoras ἀνδραπόμορον appell-
uit Diosco. cap. 74. quanti, & Galenus 7. d
facultate simpliciū. Frigidus est in tertio
sed poma eius aliquid caliditatis in se ha-
bent. plura habet Serapio in lib. aggre.

Manna, nō dico thuris, sed solutiū et
in multiplici differentia, vt referunt Ara-
bes. Duplex est quod ad nos affertur, mast-
cinum scilicet & bombicinū: masticinum
dictū, quia simile est grano mastice, & est
excellentissimum bombicinum nullius
ferè pretij. Calabrensis dictum validius est
in foliis, quàm quod in ramis arborum col-
ligitur, vnde vulgò dicitur manna di fo-
glia, minutis granis transparens, graue, al-
bum, dulce, & suaue. Arabes duas species
assignāt, Mannam scilicet & Tereniabim,
nec inter se hæ duæ differunt, nisi quòd Te-
reniabim est liquidius. vide de manna Ga-
lenum 3. de fac. aliment. ad eorum cōfusio-
nem, qui Galenum mannam non cogno-
uisse affirmant, in capite de melle, vbi mul-
ta de manna pronuntiat. Est & manna thu-
ris,

is, & est quidam pulvis, vt testatur Diosc.
ap. 69. primi: vide de manna Auicen. & Se
apionem cap. de tereniabim & memb.

Marrubium, *πράσινον*, Galenus 8. de fac.
impliciū, & Theoph. cap. 2. de histor. plant.
Dioscor. cap. 110. tertij. Est & alterum mar
rubium nigrum, ballote dictū, quod adeò
melissæ est simile, vt vix ab ipsa, nisi malus
odor adesset, agnosceretur. Dioscor. capit.
108. tertij. Paulus libro 7. Nigrum est,
acris & absterforiæ facultatis. Prasion
verò calefacit in secundo, siccatur, & viscera
laxat.

Marum, nisi sit quod vulgò dicitur ma
iorana fina, haud scio quid sit: nam bene re
dolet, vt marum. Vide Galenum de anti
dotis cap. de compos. hedicroi, & Dioscori
dem cap. 44. tertij.

Medica, herba in Hispania abundantis
sima, in Italia non habetur, Arabicè alfafa
fat. Ruellius hanc nasci in Gallia adserit,
vocatque trifolium maius cap. 136. secun
di. Plinius cap. 16. lib. 18. A Medis inuenta
dicitur.

Medium, quum nec viderim, nec apud
me de eo aliqua sit imago (in Media enim
tantummodo nascitur) nescio quid affir
mare debeam. Dioscorides cap. 20. quar
ti. Plinius cap. 12. lib. 27. Galenus 7. de fa
cult

cultate simplicium. Contrariam semini-
cus habet temperiem: nam menstrua he-
ba constringit, quæ semen prorsus elicit.

Melilotus, quem etiam fertulam cam-
panam vocant, affertur ex Neapoli Vene-
tias: quo verò vtuntur seplasiarij, verus non
est, sed species trifolij: sunt tamen qui di-
cant melilotum vulgare esse lotum. Dio-
scorides Plinius cap. 9. lib. 21. Et Galenus
7. de facul. simpli. Dioscorid. cap. 43. tertij.
Paulus lib. 7. Diuersis facultatibus pollet.
adstringendi scilicet & discutiendi & con-
coquendi.

Melissophyllon, vulgò dicitur molifer-
no ouercedronella, cardiacis & tristibus,
vt referunt Arabes, & passionibus cor-
dis valet & aperit oppilationes cerebri.
Dioscorid. capit. 109. tertij. Galenus 7. de
facul. simpli. Paul. lib. 7. Viribus marrubio
respondet.

Menta & mentastrum excitant Vene-
rem, vt Gal. & Dioscorid. quanuis contra-
rium sentiat Plin. cap. 14. lib. 20. Vide in
hoc Galenum 6. de facult. simplic. & Dio-
scorid. cap. 36. & 37. tertij. Vermes etiam
interficat. Paul. lib. 7. Calida in tertio or-
dine, tenuis, acris cum humiditate semi-
cocta.

Mecon et si multa copia nascatur in Hi-
spania,

ania, nullibi tamen, quòd sciam, in Italia habetur: nam quod passim ostenditur ro meo, est radix saporis pastinacæ similis. Eius vice funguntur myrobalani, vulgo dicti bendelli profumeri, unde etiam ibi nomine nucis vnguentariæ appellantur. Dioscor. cap. 3. primi. Plin. capit. 23. libro 20. Galen. 7. de fac. simpli. Paul. libro 7. Calefacit in tertio ordine, in secundo siccatur.

Mercurialis herba, ob ençematum vsum notissima: vide Plin. cap. 5. lib. 25. Gal. 7. de fac. simp. & Dioscor. cap. 183. quarti. Paul. lib. 7. Alium liberaliter subducit, & illuc discutit.

Millefolium duo capita habet. Dioscorid. alterum de stratiote millefolia, & alterum de myriophyllo. Sunt qui velint, stratiotem esse millefolium vulgare nostrum, quum in myriophyllo vnus tantum coliculus, & in nostro vulgari plures inveniuntur. De stratiote loquitur Galenus 8. de facult. simplic. & Dioscorid. capit. 110. quarti: de myriophyllo capit. 100. quarti, & Galenus 7. de facult. simplic. in fine. Plin. capit. 16. libro 24. Paulus libro 7. Vim siccandi adeò obtinet, vt conglutinet vulnera.

Mora tam alba quàm nigra cognoscuntur:

tur: habent vim soluendi & constringendi. Dioscorid. capit. 147. primi. Galen. 8. de facult. simplic. Paul. libro 7. itidem adferit.

Muscus arborum, vulgo dicitur vñe quæ, vt refert Serapio, somnum prouocare vomitum & fluorem ventris cohibet, & e medicina cordis, vt Auicen. Dioscorid. capit. 20. primi, Galen. 6. de facult. simplic. Paul. libro 7. Quod cedris adhæret, distrahendi simul & molliendi vim moderatam habet.

Muscus odoratus est res quæ in gazellarum folliculis continetur, recens & immatura, grauis ac pessimi odoris, sed quando maturuerit, tanquam sanies e folliculis egrediens est gratissima ac pretiosissima calida & sicca in secundo ordine. lege Serapionem lib. aggreg.

Muscus marinus est vulgaris corallina quæ pro enecandis vermibus datur pueris. Gal. 6. de fac. simplic. Diosc. capit. 94. quarri, Paul. lib. 7. in frigidat & adstringit.

Numia vera non habetur, sed posset parari vera, si corpora mortuorum ex aloë myrrha & croco condirentur: deinde id liquoris ad tempus exciperetur. Valet ita parata doloribus capitis frigidis, paralyticiis torturæ, vertigini, si extrahatur per nare

ares cum aqua maioranæ, & doloribus
urium cum oleo violaceo albo. Est calida
& sicca in tertio secundum Arabes.

Myos otis, id est, muris auricula, nisi sit
quod vulgo dicitur cētone, haud scio quid
sit. Galen. 6. de facul. simpli. Dioscorid. cap.
75. secundi. Plin. cap. 12. lib. 27. Pau. lib. 7.
refrigerat & humectat, & vocatur ab ipso
asine.

Myrrha vera non habetur, nisi fortè no-
stra communis sit, quæ à Diosc. dicitur cau-
calis siue ergasine: nam nostra cunctis con-
ditionibus requisitis indiget, quum nec sit
viridis, nec crassa, nec acuta, nec odorata,
nec colore vnita: quare caueant qui in po-
tionibus ac catapotis eam imponunt. Dio-
scorid. cap. 69. primi. Gal. 8. de fac. simp. &
in lib. Antid. in compos. Theriacæ. Paul.
libro 7. Calefacit in secundo, & siccatur, vide
etiam Plin. cap. 16. & 17. lib. 12.

Myrrhis, herba, nisi sit cicutaria, vt com-
munis est opinio, vel cerefolium, vt Manar-
dus, nescio quid aliud sit. Qui tenent hanc
esse angelicam herbam, valde decipiuntur:
siquidem angelica cicutæ folia non habet
sed potius pastinacæ. Dioscor. cap. 11. quar-
ti. Paul. lib. 7. Calefacit in secundo, & non-
nihil extenuat.

Myrrhus, *μυρρίνη*, frigida est & terre-

S s

stris. Galen. 7. de fac. simp. Quod verò mytidanum dicunt, est quoddam gibbosum veluti adnatum myrtho. Diosc. cap. 33. p. mi. Paul. lib. 7. Valentinus siccat.

Naphtha est veluti oleum petroleum vel de monte zibio appellatum: reuera b ruminis genus, quod in mari mortuum quod est stagnum minoris Syriæ, nascitur. Calefacit, exiccat, & vulnera recentia conglutinat. Dioscor. cap. 86. primi.

Napellus Auicennæ nisi sit toxicum Dioscoridis, ut putat Manardus, nesciremp. festo, nisi Dioscoridis capita huc referant: est enim mortiferum venenum Auicennæ, libro 2. Calidum & siccum est i summo.

Napus, βρωχς, vulgò Nauon, ex cuius l mine oleum in Aegypto extrahitur. Diosc. cap. 103. lib. 2.

Narcissus, similis est hermodactylo, folia habet porracea, tenuiora tamē & angustiora, caulem sine foliis, cōcauum, in quo candidus flos existit. Dioscorid. capit. 155. quarti. Theophrastus capit. 6. lib. 6. Plinius cap. 3. lib. 2. 1. Galen. 8. de facul. simp. Paul. libro 7. Vim habet aliquam attrahendi & abstergendi.

Nardus est, quam spicam nardi seplarij vocant, & est Syriaca spica, & non Indica.

ica. Sed mirari satis non possum, quòd si
b vna eadèmq; radice multæ ac numerosq;
picæ pullulent (vt inquit Dioscorides)
ur non spicas, sed radices esse Galenus di-
xerit in Andromachi theriaca. Nec satis
est dicere montanam spicam non ita ori-
gi, quum ipsa, teste Dioscoride, nō nisi bo-
nitate odoris, torosiorèque spica differat.
Quare caueat Mathiolus Senensis, quo-
modo in Manardum alioqui doctissimum
tam apertè latret: nā & Galenus in eodē
loco iubet in his & aliis Dioscoridē con-
suli. Paulus lib. 7. Calefacit in primo. siccat
in secundo. Vide & Galen. 8. de fac. simp. &
Plin. cap. 12. lib. 12.

Nardus gallica, vulgò spica Celtica, nō
habetur apud nos: vide Dioscord. capit. 7.
libro 1. Quòd verò non sit saluunca Plinij,
non est vt probem. Galen. 8. de facul. simp.
Paul. lib. 7. Calidior superiori, minúsque
adstringit.

Narcaphton, vulgò tignamo, ac si dice-
retur thymiama, quod nihil aliud sonat,
quàm suffumigium: vide Dioscor. cap. 22.
primi.

Nasturtium, *καρδωμω*, vulgò agretto, est
familiarissima herba, de qua Galen. 7. de
fac. simp. loquitur. calida est. Dioscor. cap.
244. secundi. Paul. libro 7. Semen modo

finapis vrit.

Nerion, vulgò dicitur oleandro, est v
luti venenum, vt Galen. 8. de faculta. simp
Enecant etiam (inquit Dioscor. capit. 8.
quarti) flores & folia omnes quadrup
des, valent etiam emplastri modo mort
bus venenatorum, non autem sumpta, v
putarunt nonnulli. Plin. capit. 2. libro 2.
Paul. libro 7. Extrinsecus vim habet di
cussoriam, & si intus assumatur, occi
dit. Dicitur etiam alio nomine rhodo
daphne.

Nymphea, vulgò nenupharo, potentio
est, quæ radicem albam fert: vide Galen
8. de fac. simp. Dioscor. capit. 140. & 139
tertij. Plin. capit. 7. lib. 25. Pau. lib. 7. Vire
habet sine erosione siccas, ventrem repri
mit, & genituram arefacit.

Ocra est terra gialla, quanquam alij ve
lint esse terram rubeam: vide Dioscor. cap.
62. quinti.

Ocymoides, vulgo basilico saluatico,
Diosc. cap. 29. lib. 4. inuenitur inter frumē
ra. Gal. 8. de fac. simp. Pau. lib. 7. Radix inu
tilis, semen sine erosione siccatur.

Ocymū, vulgò basilico domestico, Dio
scor. cap. 130. secundi, & Gal. 2. de fac. ali
men. & 8. de fac. simp. Calidum in secundo
ordine cum superflua humiditate: itidem
Paul.

aul. lib. 7. adserit.

Ocymū aquatiquum ^{ῥῖνος}, vocatur. Dioscor. cap. 30. quarti, & est fortè apud Gal. chinum dictum. 6. de fac. simp.

Oenanthe est filipendula, Fuchsi. Theophrast. cap. 7. lib. 6. & Plin. cap. 24. lib. 21. Diosc. cap. 126. tertij. Oenanthe etiam accipitur pro flore vitis sylvestris, qui infusum niter adstringit stomachū, & aluum firmat, sed Oenante Diosc. eiicit secūdinās, illicidio vrinæ & morbo regio medetur. vide Pau. lib. 7.

Olosteon, est species consolidæ, & non est pilosella, ut nonnulli putarunt: nam pilosella est herba valde adstrictoria, ita ut vulnera conglutinet, cohibet flores ventris & sputum sanguinis, & fluxus mulierum albos. vide Diosc. cap. 12. quarti. Gal. 8. de facul. simp.

Olyra, est species zææ, vulgo spelta nominata, nec est segala, ut Virgilius Marcellus: nam ex olyra panis dulcissimus conficitur, & ex segala amarus, nec filigo est segala, ut aliqui putarunt, sed potius species grani, ex cuius flore panis albißimus & optimus olim conficiebatur: quod contrarium omnino accidit nostræ segalæ seu ferragini, ut à Plinio vocatur cap. 16. lib. 18. vide Dioscor. de olyra ca. 82. secundi, &

Gal. 1. de fac. alimen. & 8. de fac. simp.

Opium fit ex lacte, quod à papaueris capite destillat, vt Dioscorid. cap. 63. quart Paulus libro 7. tenet, quòd sit frigidum i quarto: nihilominus eius amaritudo non frigidum simpliciter, sed aliquatenus calidum potius affirmaret, quare diligentiores consideretur. vide Gal. 7. de fac. simp. vbi de papaueris specie agit.

Opopanax fit ex panacis herculei liquore. vide Dioscoridem capit. 50. tertij & Galenum 8. de faculta. simplic. calidum in tertio, & siccum in secundo. Mesu. capit. de opo. Piritam crassam & viscosam in remotis partibus corporis contentam soluit. Paulus libro 7. Mollit etiam & discutit.

Origanū, quo vtimur, vt refert Brasauola, est heracleoticum, sed iuxta aliorū opinionem, est origanū syluestre & heracleoticum, & onitis nostrò tempore non inueniuntur. Dioscorides cap. 29. tertij, Theophrastus ca. 2. lib. 6. Plinius cap. 17. lib. 20. Galenus 8. de facul. simpli. Habet vim incendi, extenuandi, siccandi & calefaciendi in tertio abscessu.

Orminum nisi sit, vt Ruellius, selarea, nescio certè an reperiatur. Diosc. cap. 126. tertij. Plin. capi. vltimo, libro 22. Galen. in
finc

ine primi, de fac. alimen. alteram speciem
 rmini memorat. Paul. lib. 7. Marrubio
 simile, calidum, mediocriter ficeum & ab-
 tergens.

Ornithogalos, quantis vbique inter se-
 getes nascatur, nondum à me visa est: radi-
 ces habet quas edunt pueri vt refert Ruel-
 ius. Sunt in Veronensi agro quædam ra-
 dices dulces, & in sapore castaneis similes
 quæ thrasse vocantur. Dioscor. cap. 133.
 secundi.

Orobanche non solùm orobum stran-
 gulat, sed omnes quæ vicinæ sunt, plantas
 sternit, vnde ab aliquibus herba lupa, ab
 aliis cauda leonis, ab aliis verò herba tau-
 rina, eò quòd à bobus comesta ad coitum
 eas promouet. Dioscor. cap. 131. secundi.
 Theoph. 8. de histor. & quinto de causis
 plant. Plin. cap. vlt. lib. 22. Pau. lib. 7. Est
 temperamenti sicci & frigidi ad primum
 ordinem.

Oryza, vulgò riso, nascitur palustribus
 & vliginosis locis, aluum compescit: vide
 Diosc. cap. 86. secundi. Plin. lib. 18. cap. 7.
 Pau. lib. 7. Vim habet adstrictoriam.

Osyris, vulgò linaria: vide Diosc. ca. 138.
 quarti. Gal. 8. de fac. simp. Plin. cap. 12. lib.
 27. Paul. lib. 7. Amara est, & vires iccoris
 laxat.

Oxyacantha, Arabiæ berberi, nec est, bene huius plantæ notæ considerentur, quod vulgò dicitur crespini. Diosc. cap. 107. primi. Gal. 8. de fac. simp. Pau. lib. 7. Fructu ipsius myrthi baccis responder. Auic. tene quòd sit frig. & sic. in tertio.

Pæonia, fœmina, est notissima, sed mascula non inuenitur. Gal. 6. de facul. simpl. Est tenuium partium, sed non nimis calida, imò magis temperata, aut à temperi parum in calore distans. Diosc. cap. 148. tertij. Plin. lib. 25. cap. 4. Paul. lib. 7. Radix acris leuiter, subamara & siccans, cui non nihil adstrictionis inest.

Paliurus quid sit, re vera nescio: nam omnes antiqui in paliuro discrepant. Theophrast. cap. 17. libri tertij. & capit. 4. lib. 4. Diosc. cap. 113. primi. Plin. cap. 19. lib. 13. & cap. 13. lib. 24. Pau. lib. 7. Adstringit, & semen incidit.

Palma, *palmyra*, res nota est: nam dactylis, quos ipsa fert, libenter vescimur: in quorū numero ponuntur etiam tamarindi, qui nil aliud sunt quàm dactyli Indiani. Diosc. cap. 129. primi. Gal. 8. de fac. simp. & secundo de fac. alim. Pau. lib. 7. Fructus iam maturus calefacit, reliqua palma valde adstringit.

Panax quum triplex sit Asclepium scilicet

et ab Aesculapio, chyronium à Chyrone,
 heracleum ab Hercule: & si aliquibus co-
 nitum dicatur, reuera tamen ego non vi-
 i. Sunt qui pro panace Asclepio mōstrans
 millefolium vulgare, & pro chyronio inu-
 am campanam: vide tamen Diosc. cap. 50.
 & 51. & 52. tertij. Gal. 8. de fac. simpl. Plin.
 ap. 25. lib. 12. & cap. 4. lib. 25. Pau. lib. 7.
 herculeum calidum in tertio, & siccum in
 secundo, mollit & discutit: ex hoc fit opo-
 panax Asclepium & chironium: priora
 iunt calidiora.

Pancration est minor & rotundior scil-
 la: vide Diosc. cap. 165. secundi. vide etiam
 le scilla Gal. 8. de fac. simp. Pau. lib. 7. Spe-
 cie & viribus scillæ simile est.

Panicum omnibus notum. Galen. 6.
 le facul. simpl. Paul. lib. 7. Siccat & re-
 rigerat.

Papauer, *μῆκον*, duplex est, alterum syl-
 vestre, quod flores puniceos, siue rubeos ha-
 bet, qui vulgo in laterali morbo sicci ha-
 bentur pro efficaci remedio: alterū dome-
 sticū quod rursus duplex est, album scilicet
 & nigrum, quanquam horum à Diosc. ter-
 tia species assignetur: vide Diosc. cap. 62.
 & 63. quarti, Gal. 7. de fac. simp.

Papauer cornutum, *μῆκον κεραινός*, sæpius
 à me visum, sed spumeū, quod prope ma-

re nascitur haudquaquam. Theoph. cap. 13. lib. 9. Qui dicunt glaucium ex hoc papa uere fieri, quod & memithe Arabes vocāt reuera decipiuntur. Diosc. ca. 64. & 65. 4. Gal. 7. de fac. simp. Pau. lib. 7. Adstringendi vireis habet.

Papyrus in Italia non habetur, ut Theophrast. cap. 9. lib. 4. & Plin. cap. 11. lib. 13. sed tantum in Aegypto. Olim ex papyro chartæ conficiebantur, unde etiam nomen adhuc retinet. Diosc. cap. 100. primi. Gal. 8. de fac. simp. Pau. lib. 7. Siccatur, chartæ crematur modo.

Paronychia etsi à multis herbariis cognita, nunquam à me visa est, scio tamen folia iuxta radices rotunda habere similia peplo: vide Dioscorid. cap. 52. quarti, Galen. 8. de facul. simpl. Pau. lib. 7. Externuat, siccatur, paronychiis medetur citra erosionem.

Partheniū, vulgò matricaria ouer amarilla, nomen adhuc seruans amaraci, nec est secunda species artemisiæ, ut brasauola & Fuchsius, nec est cotula foetida, nec helxine, quam parietariam dicunt, ut nonnulli sunt qui dicant athanasiam vulgò dane-da vocatam, esse speciem matricariæ. Diosc. cap. 146. lib. 3.

Pastinacæ, *παρνακίον*, tam domesticæ quàm sylu

yluestres, vulgò pastonache dicuntur, nec
 unt carubiæ siue carotæ, vt Ruellius, quū
 non habeant radices sanguineas, vt caro-
 tæ. Decipiuntur etiam qui pro dauci se-
 mine, semen pastinacæ accipiunt, quum
 illa res sit daucus à pastinaca. Dioscor. cap.
 4. tertij, Galen. 8. de facul. simpl. Paul.
 lib. 7. Vrinæ & menses mouet, adstrin-
 gendi viribus prædita, syluestris tamen est
 valentior.

Pastinaca, piscis est qui vulgò dicitur pe-
 sce columbo, in cauda habet spinam acutis-
 simam & venenosissimam, vnde Plin. ca. 8.
 lib. 32. Pastinacæ quoque radio scarifica-
 re gingiuas & in dentium dolore vtilissi-
 mum, conteritque is, & cum helleboro al-
 bo illitus dentes sine vexatione extrahit.
 Dioscor. cap. 19. secundi. Ex oleo in quo
 hepar huius piscis sit decoctum, scabies nō
 solū in hominibus, sed etiam in beluis
 probè expellitur.

Peplus à Seplassariis escula rotunda dici-
 tur, & est herba lacte plena. Peplis verò
 quum in maritimis locis nascatur, nunquā
 à me visus est. Dioscor. cap. 162. & 163.
 quarti. Gal. 8. de fac. simp. Pau. lib. 7. Eius
 liquor tithymalorum modo purgat.

Peucedanum olim Dioscoridi familia-
 re, sed quod pro peucedano monstratur

non

non est verum peucedanum, optimum
Sardinia oritur. Dioscor. cap. 83. tertij. Ga
8. de facult. simp. Plin. cap. 9. lib. 25. Pa
lib. 7. Calefacit, discutit, & siccatur in tert
ordine.

Phalaris, species lithospermi, maior
minor reperitur. Dioscorid. cap. 150. te
tij. Plinius capite 12. lib. 27. Paulus libr
7. Calida est & tenuis, doloribus vesic
prodest.

Phaselus, vulgò fasolo, huius specie
plures enumerantur coloribus distincta
Nam aliqui sunt rubri, albi, alij citri
ni flauique, & ex diuersis coloribus pi
cti. Dioscorides capite 99. secundi. vi
de de smillace Auerrhoim. Declinan
ad calidum & humidum, impinguan
corpus.

Phu Valeriana duplex, maior & mi
nor. Minor autem lanuginosior & bre
uiore est, flores fert albos & purpureos, si
mul mixtos, multas radices tenues ha
bet. Maior verò similis est olusatro, cau
lem habet cubitalem & maiorem, & cæ
tera quæ in Valeriana visuntur, dem
ptis floribus, qui Narcisso non sunt simi
les: quanquam locum hunc in Diosco. cor
ruptum putat Ruellius, quod fieri potest
quum cætera sint satis manifesta. Dioscor.
cap.

cap. 10. primi. Gal. 8. de fac. simp. Vim habet nardo similem.

Phycus marinus, *φῦκος θαλάσσιος*, quid sit nescio, algam vertit Theodorus, sed non est alga, quæ Venetiis in seruandis vitris reponitur. Diosc. cap. 95. quarti. Gal. 8. de fac. simp. Plin. cap. 23. lib. 13. Pau. lib. 7. Refrigerat, siccat in secundo, & mediocriter adstringit.

Phyllitis est lingua ceruina, olim pro scolopendria habita, quum reuera nunc sit asplenon siue citrach Arabicè dictum, nec est hemiotitis lingua ceruina, vt Manardus, Leonicens & Fuchsius & Ruellius adserunt, si locus rectè perpendatur. Dioscor. cap. 112. tertij. Gal. 8. de facul. simp. Diarrhoeam cohibet phyllitis. Pau. lib. 7. Acerba qualitate constat.

Phyllyrea non est tilia, vt Hermolaus, Ruellius & Marcellus Florentinus interpretantur: nam tilia, Græcè *φύλλυρα*, & non *φυλλυρία* dicitur. De tilia scripsit Theophrast. cap. 10. lib. 4. cuius cortex modo emplastri recentia vulnèra conglutinat, & folia eius trita inflammationes pedum resoluunt, & facit capillos renasci, prohibens etiam eorum profluuium. Phyllyrea, arbor, ignota est nostro tempore: vide Dioscor. cap. 110. primi. Paul. lib.

lib.7. Tiliæ folia adstringunt, iccirco vlc
ribus oris medentur.

Phyllon, vulgò folio, nisi sit perficac
maior, vt Ruellius: nescio profectò qu
sit: vide Diosc. cap. 131. tert. Nullibi à Ga
nec à Paulo mentio habita est.

Pityusa à seplasiarijs Esula maior voc
tur, cuius radices ab iis qui à monte Ga
gano siue sancti Angeli veniūt, pro turb
venduntur, à peritis tamen medicis negl
ctæ: hæc verò Esula maior alcebram & sce
bram à Mesue nominatur, cuius rei fider
facit Serapio cap. de scebram: vide Diosc
cap. 160. lib.4.

Plantago, *ἀνθύλλων*, maior & mino
inuenitur: quanquam non desint, qui lan
ceolam herbam esse plantaginis affirmāt
Maior constat septem nervis, media quin
que, minor tribus: habent facultatem a
queam, frigidam, cum aliquali austeritate
vt Gal.6. de facul. simp. Diosc. cap. 115. se
cundi. Pau. lib.7. Refrigerat & desiccāt in
secundo, temperata ex aquea & terrestri
substantia.

Platanus in Italia, vt refert Theophrast.
non nascitur, vide tamen Diosc. de eius vi
ribus, cap 92. primi. Plinium cap 7. lib.15.
& Galen.8. de fac. simplic. Exiccat & infri
gidat, à latis folijs dicta est quæ habet in
stat

tar fici folia. Pau. lib. 7. Frigidior & humidior vi constat.

Polemonia, nisi sit galego, siue gearchacta, ut refert Brasauola, nescio quid sit: non habet tamen in summitate corymbos, ut refert Diosc. cap. 9. quarti. vide Gal. 8. de acul. simp. & Plin. cap. 6. lib. 25.

Polium sunt qui pluries vidisse affirmant, scio ego in hoc seplasiarios decipi: nam herbam pro polio ostendunt, quæ caules valde tenues & lino similes, seminibus rotundis onustos habet, quæ polium reuera non est. vide Plin. cap. 7. lib. 21. & Theoph. cap. 21. lib. 9. Gal. 8. de fac. simp. & Diosc. cap. 115. tertij. Pau. lib. 7. tertij. Calefacientium & siccantium ordinis est.

Poligonon, herba sanguinalis, tam mascula quam foemina omnibus nota, vulgo corrigiola siue centinodia dicitur. Diosc. cap. 4. & 5. lib. 4. Plin. cap. 12. lib. 27. Gal. 8. de fac. simp. Pau. lib. 7. Habet vim adstringendi, frigida & humida in secundo ordine.

Poligonaton, vulgo frasinella siue ginochiella, cuius radicibus mulieres ad fucum vtuntur: ab aliquibus etiam vocatur sigillum sanctæ Mariæ, & sigillum Salomonis. Manardus in hoc deceptus est, credens polygonatum esse secacul
Arab.

Arabum: nam Serapio scribens de secac
nihil refert quod ad polygonatum at-
neat. Galenus 8. de facultate simplicium.
Dioscorid. capite 6. lib. 4. Paul. lib.
Variæ facultatis est, adstrictoriæ, acris
amaræ.

Polipodium, inquit Actuarius, purg-
bilem nigram & pituitam. Manardus, co-
uit sine molestia. Mesues, extenuat corpo-
ra, quod & Galen 8. de facultate simpl. v.
lenter exiccare inquit sine mordacitate
Dioscorid. cap. 179. quarti, Plinius cap.
lib. 26. Paulus lib. 7. Siccat abundè cito
morsum.

Pompholyx, qua vtuntur seplasiarij e-
potius cadmia: quòd verò tunica non sit, a-
paret, quum tunica vera, leuissimus quid-
pulis sit, non autem vt lapis ac nostra vi-
detur. Quare apud pharmacopolas nō in-
ueniri tuciam nunc affirmarem, nisi alian
habere forte inuestigauerint. vide Diosco-
cap. 43. quinti: nec ausus est aliquis, quòd
sciam, hanc in catapotiis siue pharmacis,
quæ per os deglutiuntur, tuciam impone-
re. Gal. 9. de fac. simp. Plin. cap. 13. lib. 34.
Pau. lib. 7. Siccat sine erosione.

Populus, *ξύπος*, tam alba quàm ni-
gra, nota est omnibus, vulgò ab Hetru-
scis dicitur oppi, à Longobardis Prope, ex
quib

quibus fabulantur electrum oriri, sed reuera ab insula quapiam olim Austrauia dicta à quibusdam arboribus nostro pino similibus effluit, & ad Germaniam per maris inundationem aliquādo perfertur. Hoc vulgò dicitur à seplasiariis charabe, nec est gummi populi, vt nōnulli retulerunt. Dioscorid. cap. 94. & 98. primi. Plin. cap. 24. lib. 16. Paul. libr. 7. Nigra calefacit in primo, modicè siccatur, tenuis substantiæ: alba aquosa est, tepida terrestris que substantiæ & absterforia.

Porrum capitatum dictū, quod in tempore transplantationis, si folia & radices porris incidantur, & aliquid quod illud descendere prohibeat, in plantando subterponatur, facile capitatum euadat. Dioscor. cap. 38. lib. 2. De porro verò agresti, lege Ampeloprason, Paul. libr. 7. Mali succi est & acris, extenuat & abstergit.

Portulaca, *αἰδοῦχιν*, vulgò porcellana, Galen. 6. de facult. simplic. Frigida in tertio, & humida in secundo, biliosos ac calidos humores cohibet, & vt refert Plin. cap. 21. libr. 20. rupturas vmbilici constringit. Dioscor. cap. 113. secundi. Paul. libr. 7. Refrigerat in tertio, humectat in secundo.

Potamogeton, vulgò beta aquatica, na

Tt

scitur in lacustribus & aquosis locis, pruritibus ac vetustis & depascentibus vlceribus prodest. Diosc. cap. 96. quarti. Gal. 8. de facul. simplic. Paul. lib. 7. Refrigerat & adstringit.

Psyllij, semen, vt refert Gale. 8. de facult. simpli. frigidum est in secundo, humectat & desiccatur mediocriter. Plin. cap. 9. lib. 25. Diosc. cap. 68. lib. 4.

Ptarmice, vulgò oliuella, ea plerique pro scopis vtuntur, & dicitur ptarmice, eò quòd odorata planta statim sternutamenta irritet. Diosc. cap. 151. secundi. Gal. 8. de facult. simplic. Viridis, calida, & sicca in secundo: siccata verò in tertio ordine.

Pulegium omnibus notum, inuenitur masculum cum floribus albis, & fœmelum cum floribus purpureis. Qui dicunt speciem calamenti esse id quod in usu est, valde decipiuntur, siquidem calamenti species per se omnes inueniuntur. Diosc. cap. 31. tertij. Gal. 6. de facult. simpli. Plin. cap. 14. lib. 20. Extenuat, calefacit, concoctionesque adiuvat, vt Gal.

Pumex, est lapis combustus ex monte Aetnæ, vel Vesuuino monte Campaniæ, qui si iterum comburatur, non erit smyra inferior. Diosco. cap. 79. quinti, & Galen. 9. de facult. simplic. Habet vim exiccandi & abster

abstergendi.

Pyrethrum sua radice notissimum, habet folia veluti daucus & fœniculus agrestis. Diosc. cap. 78. tertij. Gal. 8. de fac. simpl. Facultas eius est caustica.

Pyrites lapis, vulgò Marchesita, probatur qui est aëri similis. Diosc. cap. 96. quinti. Galen. 9. de fac. simpl. Paul. libr. 7. Valide discutit tumores, sanguinemque in grumo concretum.

Quercus, *δρῦς*, connumeratur inter arbores glandiferas, sicuti etiam Elix, Fagus, Cerrus, Suber, Farnia, Ischia: vide Dioscor. cap. 126. primi. Galen. 6. de fac. simpl. Paul. libr. 7. Folia ac fructus siccant, ac tepida vi pollent.

Quinquefolium, *πεντάφυλλον*, maius folia mentæ similia habet, & florem in pallido candidum, secunda species à prima tantum in colore differt, tertia per terram serpit, quarta folia similia viti tenet, ab aliquibus diapensia, vel sannicula dicitur: vide Diosc. cap. 40. quarti. Gal. 8. de fac. simpl. Radix eius exiccat in tertio, nec eundem habet caliditatē. Plin. ca. 9. lib. 25.

Radix, *ῥάφανος*, vulgò Rauanello. Gal. 8. de fac. simpl. Calida est in tertio, & sicca in secundo. Dioscor. cap. 104. lib. 2.

Radicula siue herba lanaria, sicuti tem-

pore Diosco. cognita, ita nunc maximè restat incognita. Diosco. cap. 153. secundi. Gal. 8. de fac. simp. Paul. libr. 7. Calefacit in tertio, siccat in secundo.

Ranunculus, *βαρβάχιον*, est apium rani-
num, cuius species quatuor enumerantur:
scilicet apium, quod est pes columbinus,
pes paipi, pes milui, & apium risus, quod
herba sardonis aliàs appellatur: vnde Ver-
gilius,

Imò ego sardonis videar tibi amarior herbis.

Hæc si ab homine deuoretur, ita inter-
ficit, vt contractis nervis instar ridentis
moriens videatur. Diosco. cap. 166. secundi.
Plin. cap. ult. lib. 25. Paul. libr. 7. Omnia ge-
nera sunt excellenter calida, sicca, acria,
vrentia.

Rheubarbarum, vulgò rheubarbaro, co-
gnoscutur differenter ab omni rhapontico,
de quo satis amplè tractauit Mesues.

Rhamnus, vulgò dicitur spinceruino, aut
id quod Hetrusci dicunt marucho. Diosco.
ca. 104. primi. Gal. 8. de fac. simp. Exiccat &
digerit in secundo. Plin. cap. 14. lib. 24.

Rhaponticum, Diosco. cap. 2. tertij. Plin.
cap. 12. lib. 27. Galen. 8. de facul. simpl. Paul.
lib. 7. compositum ex terrestri frigida &
tenui substantia, aëreâque, calida, & leui-
ter acri.

Rh

Rhodia radix, nisi sit quæ garyophyllata dicitur, certè nescio si vnquam viderim: hoc scio, eam rosas, vnde nomen accepit, redolere. vide Diosco. cap. 43 quarti. Gal. 8. de fac. simpl. Paul. lib. 7. Calefacit in secundo, tenui & discutiente vi prædita.

Rhu obsoniorum, vulgò dicitur sumacho: in condendis enim cibis antiqui hoc, loco salis utebantur, quod etiam nunc in Syria & Aegypto obseruatur. Dioscor. cap. 128. primi. Gal. 8. de facul. simp. Paul. lib. 7. Constringit & exiccat in tertio, detergit in secundo.

Ricinus, frutex, vulgò mirasole, dictus est ricinus ab animale ricino, vulgò zecca, quæ in equis & canibus sæpe visitur, quam heliotropios sit mirasole, dicitur à seplasiariis cherua maior, & à Mes. granum regis. Gale. 7. de facul. simpl. Dioscor. 158. quarti. Paul. lib. 7. Purgat, abstergit & digerit.

Rosmarinum, *λεβανός*, habet duas species, quæ à me nondum visæ sunt: rosmarinum coronarium est, quo passim utimur, & vulgare nostrum. Dioscor. cap. 79. & 80. tertij. Galen. 7. de facul. simpli. Habet vim incidendi & abstergendi. Plin. capit. 12. lib. 24.

Rosæ, excellentiores sunt rubræ, post has

purpureæ, demum albæ. Componuntur ex diuersis substantiis, vt Galen. Putarem ego earum infusionem potiore fieri, si ex Damascenis rosis pararetur. Dioscor. cap. 115. primi. Gal. 8. de fac. simpl. Paul. lib. 7. Iuxta constant substantia, aquosa scilicet calida, adstringenti & amara: flos autem magis adstringit & desiccatur.

Rubus caninus, *κυνόδακτος*, non est rosa syluestris, vt nonnulli putarunt, teste Theophrasto, qui diuersa capita agit: nam de cynosbato loquitur cap. 18. tertij, & de rosa canina cap. 6. lib. 6. Dioscor. cap. 108. primi. Galen. 7. de facult. simpl. Fructus astrictorius, &c.

Rubia, *ῥυβία*, omnibus nota, cuius caulibus & foliis ob suam asperitatē vtuntur fœminæ ad illustrandum stannum. Diosc. cap. 151. tertij. Gal. 6. de facult. simpl. Paul. libr. 7. Radix acerba & amara ita iecur & renes purgat vt sanguinem & menses euocet.

Ruscus, *ῥυσκός*, apud seplasiarios bruscus, herba spinosa, similis myrtho, quam & syluestrem myrthum dicunt: eius germina in acetariis comesta, valèter urinam prouocant, & obstructions aperiunt. Dioscorid. cap. 141. lib. 4.

Ruta, *ῥύτις*, duplex est syluestris montana,

ana, & satiua hortensis, & ambæ species
 cognoscuntur. Gal. 8. de facult. simpl. Cali-
 la in quarto est sylvestris, & satiua in ter-
 tio. Contra fascinationes eam commenda-
 vit Aristoteles in suis problematis. Dio-
 scor. cap. 47. tertij.

Ruta sylvestris, *ῥίγανον ἄγριον*, hanc
 harmel Arabes vocant, ex Cappadocia
 & Galatia affertur, nimirum nostris par-
 tibus non habetur. Qui verò pro har-
 mel, semen cicutæ accipiunt, valde deci-
 piuntur. Volunt aliqui geargam esse ru-
 tæ speciem, vulgò galega dictam, cui at-
 tribuunt in peste & contra venena miram
 quandam virtutem vide. Dioscoridem cap.
 48. tertij. Gale. 7. de facult. simpl. vocat eam
 moly.

Sabina, *σάβινον*, tam quæ similis est cy-
 presso, quàm quæ Tamarisco cognoscitur.
 Diosc. cap. 89. primi, Gal. 6. de facult. simpl.
 Plin. cap. 11. libr. 24. Paul. lib. 7. Calefacit &
 siccatur in tertio.

Saccharum Dioscoridis & Galeni non-
 nulli esse ex eodem liquore quo nostrum
 affirmant, nec à nostro differre dicunt,
 nisi arte & natura: alij verò longè à no-
 stro differentem existimant, nec eodem
 liquore confici, sed veluti ex rore factum
 credunt. Dioscorid. cap. 74. ad finem lib. 2.

Gal. cap. de melle. Paul. lib. 7. ca. de melle. Sachar minus dulce nostro, sed æquales vires obtinet, nec nocet stomacho, nec sitim efficit.

Sagapenum, vulgò serapino, liquor est ferulaceæ herbæ: electissimū habetur Venetiis, potentius est orientale. De eius viribus vide Mesuen & Dioscor. cap. 86. tertij. Gale. 8. de fac. simp. Suffusioni oculorum & debilitati visus valet. Paul. lib. 7. Calidum & tenue, cui absterforia vis inest.

Salix, arbor, ἰτιά: eius species tres recitantur à Theophr. & Plin. de tribus succis eius mentionem facit, scilicet de gummi, & de eo qui fit inciso eius cortice, & de eo qui incisis ramis tempore autumnali per se destillat: habent enim vim exterendi quæcunque claritati oculorum officiunt. Plin. cap. 38. lib. 16. Gal. 6. de fac. simp. Paul. lib. 7. Folia & flores siccant citra rosionem, & nonnihil adstringunt.

Salvia, ἀλελίσφωκ, ab Agrippa herba sacra vocabatur, eius succus bibitus facit quæ steriles sunt mulieres, prolificas, & cōfert sputo sanguinis, vide tamen de his Aetium & Dioscoridem cap. 35. tertij. Gale. 6. de facult. simpl. Plin. cap. 6. libr. 26. inquit, quòd succus foliorum capillos generat. Paul. libr. 7. Evidenter calefacit, & leuiter adstrin

adstringit.

Sambucus & ebulus, ^{an} succus corti-
cum radicum hydropicis succurrit, & se-
men ebuli in decocto iua, dolores iunctu-
rarum, podagræ, & morbi Gallici tollit:
succus etiam eius in sole exiccatus, & in
clysteribus iniectus, sciaticis medetur. fo-
mentum etiã ex eorum radicibus factum
tumores pedum, qui ex longo morbo pro-
uenerunt, optimè resoluit. Discor. cap. 168.
quarti. Galen. 6. de facult. simpl. Exiccat &
conglutinat. Plin. cap. 8. libr. 24. Paul. libr.
8. Desiccat, modicè digerit, & congluti-
nat.

Sampsuchum, vulgò maiorana, nec mi-
retur quispiam, si per diuersa capita men-
tio fiat à Galen. & à Dioscor. de sampsucho
& amaraco: nam hoc fieri potuit, vt rem
melius exprimeret Dioscorid. nam in Ga-
leno creditur in eo textu esse menda, vbi
pro amaraco legi debeat maro, & non
amaraco. Dioscorides cap. 4. tertij. Ga-
len. 8. de facult. simp. Paul. lib. 7. Calefacit
& siccatur in tertio, tenuis ac discussoria na-
turæ.

Sandaracha non est vernix, vt aliqui pu-
tarunt, quum vernix sit gummi iuniperi:
sed est potius res mineralis, quæ ab auri pi-
gmento non differt, nisi in coctura: nam si

Tt 5

quis diu auri pigmentum coxerit, facile illud in sandaracham conuerti efficiet, nec arsenicum chrySTALLINUM ex auri pigmento per sublimationem paratur, vt nonnulli crediderunt, sed potius est res mineralis per se oriens. Verum quod vulgò dicitur risagalum, ex arsenici & auri pigmenti pari portione per sublimationem bene conficitur. vide Dioscorid. de sandaracha. cap. 76. quinti. & Galen. 9. de facult. simplic. & Paulum libr. 7. Adurantis est facultatis.

Sarcocolla, est gummi cuiusdam in perfide arboris, mirè cōglutinat recentia vulnera, & vlcera antiqua mundificat, glutinat, & carnem inducit, & est mirabilis in oculorum destillationibus. Optima cognoscitur, si sit amara & alba, valet etiam vlceribus aurium, si in melicrato bombix intinguatur: deinde pulueri sarcocollæ inuolutus auri imponatur. Dioscor. cap. 90. tertij. Gal. 8. de facult. simpl. Plin. cap. 11. lib. 13. Paul. libr. 7. Siccandi ac opplendi vires habet.

Satyrium non habetur nostris temporibus, sed eius loco testiculi canis: nec Satyrium habet duas radices, vt putarunt nonnulli, sed vnam tantum bulbosam pomeum similem. Plures sunt deinde testiculorum canis

anis species, inter quæ palma christi reponitur. Diosc. cap. 134. & 135. tertij. Gale. 8. de facult. simpl. Paul. lib. 7. Calidi & humiditatem temperamenti est, unde Veneris appetentiam facit.

Saxifraga, vulgò fassifragia, vulgaris herba est, in frangendis lapidibus, & in prouocanda vrina summopere commendatur. Dioscor. cap. 17. primi, & Paul. lib. 7. Vrinam mouet, & calculos conterit.

Scammonia, vera & optima erat quæ ex Myfia Asiæ olim afferebatur, sed quæ à Dioscoride reprobatur, in Iudæa & Syria oriens, tantummodo nunc in usu est, nec vera sic alacriter soluit ac nostra: nam olim drachma leânionia cum duobus granis hellebori pro dosi tribuebatur, sed nostra si ad pondus decem vel quindecim granorum exhibeatur, adeò ventrē exonerat, vt etiam quàmmaximè superque euacuet. Diosc. cap. 165. quarti. Plin. cap. 8. libr. 26. Paul. libr. 7. Gale facit, digerit, & biliosa extergit, magisque eius liquor.

Scilla, vulgò deflexa voce à seplasiariis dicitur squilla: aiunt minutim incisam, & in vase vitreo melle pleno per totam ætatem soli expositam, deinde colatam, præsentaneum esse remedium in epilepticis. Galen. 8. de facult. simplic. Incidit scilla, sed

non

non adeò calida, vt secūdum gradum transcendat. Dioscorides capi. 102. secundi. Paulus libr. 7. Incidit & calefacit, & desiccāt in secundo ordine.

Scordion verum nunc inuenitur, simile chamædrio, differens tamē odore allij. Crense à Gale. in lib. antid. laudatur. Et 8. de facul. simpli. Componuntur ex diuersis substantiis, consolidat omnia viscera, ruptis & spasmus cōfert, valet doloribus lateris modo emplastri, & recentia vulnera ac vlcera conglutinat. Dioscorid. cap. 116. tertij. Paulus. Variis constat facultatibus, quum amarum, acerbum, & acre sit: purgat igitur & calefacit.

Sedum, αἰθυσμ, vulgò semper viuò dicitur, cuius species tres numerantur à Diosc. capit. 85. & 86. quarti. Maius vulgò dicitur orchiella, minus dicitur vermicularis vel pignola, & est mascula & femella. Gale. 6. de facultate simplic. Frigida in tertio mediocriter adstringit, & siccāt leuiter. Plin. capit. 2. lib. 25.

Senecio, ἡγρίεργον, vulgò speliciosa, coliculus quodammodo rubens, foliis longis & incisus veluti in eruca visitur flores lutei citò in pappos desinenteis. Galen. 6. de facultate simplic. Dioscorides cap. 92. quarti. Nonnulli esse carduum benedictum affirmant.

māt. Paulus lib. 7. Mixtas habet vireis, refrigerat enim & modicè discutit.

Serpyllum, Dioscorid. cap. 41. tertij. Galen. 6. de facult. simpli. Plin. cap. 22. libr. 20. Paul. lib. 7. adeò calefacit, vt urinam & menses moueat.

Sesamum, est simile milio, sed aliquantulo crassius, & altius folia fert rubra cum flore viridi, & producit in siliquis semen veluti papauer Dioscorid. capi. 90. secundi. Gale. 8. de facult. simpli. Plin. capit. 10. libr. 18. Paul. lib. 7. Mediocriter calefacit, mollit & opplet. Auer. quinto colliget. Calidum in primo, humidum in tertio.

Seseli, Arabicè fiseleos, notum est, præsertim Massiliense: validissimè urinam prouocat, & epilepsiæ ac spirandi difficultati medetur. Creditur à ceruis inuentū: nam à partu id statim comedunt, vt denuò concipiant, sicut refert Arist. 9. de natura animalium, cap. 5. Dioscorid. cap. 55. tertij, & Galen. 8. de facult. simpli. libr. Plin. capit. 5. libr. 20. Paul. libr. 7. Calefacit, tenuisque substantiæ est.

Sideritis, non est herba Iudaica, vt Ruelius: nam herba Iudaica est quam virgam auream appellamus. Hæc caulem fert rubrum ad duorum cubitorum altitudinem cū foliis modo oliuæ circumcirca incisis.

&

& florib⁹ in summitate aureis, vulneribu
& fistulis mirè confert, similiter in fran
gendo lapide, vt Arnaldus de villa noua
Dioscorid. capit. 33. quarti. Galenus 8. de fa
cultate simplicium. Paul. lib. 7. adstringit

Sinapi triplex est: syluestre, quod semer
habet paruum: commune, folia habet rapæ
similia: tertium, vulgò dicitur Rugetta, al
bum semen ferens, & eo vtimur in seruan
da vinorum dulcedine. Dioscorid. capi. 143.
lib. 2. Galenus 8. de facultate simplicium.
Plin. capit. 8. lib. 9. Auicenn. lib. 2. Calida &
sicca in quarto.

Sifer, propemodum simile est pastinacis
domesticis, nascitur in Germania, & voca
tur rapa citrina. vide Plenum cap. 5. libro
19. Dioscoridem cap. 106. secundi. Galenum
8. de facultate simplicium. Paulum libr. 7.
Calidum in tertio ordine. Radix cocta sto
macho utilis, vrinam cit, semen tenue &
discussorium cum vino valet singultui.

Sisymbrium, est seplasiarum balsami
ta, vulgò menta Romana, vel menta Flo
rentina. Sisymbrium verò aquaticum est
id quod vulgò dicitur crescione. Dioscori
des capit. 117. secundi. Theophrast. capit. 7.
libro 6. & capit. 8. libro 5. de plantag. caus.
& Plinius cap. 10. lib. 19. Galen. 8. de facul
tate simplicium. Paulus libro septimo. Ca
lefa

lefacit siccátque in primo, humidum in secundo abscessu.

Sion, non est quod vulgò dicitur cre-scione, sed aliud: verum vnum absque altero rarò inuenitur. Sion habet folia lata olusatro similia sed cre-scionus habet quales in eruca visuntur. Dioscorides cap. 116. secundi. Plin. confundit vtrunque sion, id est sion verum & sisymbrium aquaticum, vt apparet cap. 22. lib. 22. Galen. 8. de facult. simplic. Paul. libro 7. Calidum est, vrinam citat, discutit, & renum calculos frangit.

Smilax aspera & lenis: inuenitur aspera, quæ folia habet periclymeno similia, arboribus aduoluitur, & habet innumeras viticulas spinosas cum fructu vux, racemi modo rubenti: lenis verò hederæ folia habet similia, & viticulas similes antedictæ, sed non spinosas, vulgò viluchio, & à seplariis volubilis dicitur, flores habet orbiculatos veluti campana. Theophrast. cap. vlti. tertij. Dioscorid. cap. 39. & 140. quarti. Gale. non similacem, sed milacem vocat. 7. de facultate simplicium. Plin. ca. 2. lib. 16. & cap. 10. libr. 24.

Smilax, arbor, vulgò deflexa voce à taxo sic à Romanis appellata, Nasso dicitur. Vide Diosco. capit. 78. libro quarto. Caue tamen ab huius fructib⁹, quoniã interficiunt.

Plutac

Plutarchus inquit, quòd sola vmbra interficit, sed de ea tu intellige, quæ in Carbonia nascitur. Paul. lib. 7. Est virosæ virtutis.

Smilax hortensis, sunt qui esse existimēt phaselum rubeū, qui vulgò fasolo turchesco appellatur. Manardus tenet, quòd sit Galeni dolicus, & vulgò quòd dicit rouiglione: sed credo illum decipi, quoniam quod dicimus rouiglione, Galen & Paul. non dolicum vocant, sed potius ocrum. Diosc. ca. 135. lib. 2. Galen. 1. de facul. alimen.

Smyrnium, vulgò dicitur Macerone, nec est imperatoria, vt nonnulli, quæ commendatur in omnibus frigidis, ægri tudinibus, sicut in doloribus colicis & stomachi, menstrua prouocat & vrinam, dolores dentium tollit, & cum vno strangulatu vuluæ medetur, cerebrum masticata purgat, & eius puluis ad epilepsiam, spasimum, paraly sim, & ad febrem quartanam ante eius paroxysmum per horam vtiliter cum vino bibitur: valet in peste, & ad omnia venena: spiritum reficere, & membra sensuum roborare potest. datur insuper asthmaticis, iëtericis, hydropicis & lienosis. Dioscorid. capi. 72. tertij, Galen. 8. de facultate simplicium. Plinius capit. vltimo libro 19. Paulus libro 7. Calefacit & siccatur in tertio ordine.

Solan

Solanum, *σφύχρον*, vulgò solatro, cuius species à Dioscorid. quatuor enumerantur, hortense, halicacabum, somnificum, & furiosum. Hortense & halicacabum nūc passim cognoscuntur: nam halicacabum est id quod Arabes voce parū deflexa Alchachengi dicunt. Plures etiam species inueniri dicuntur, sed de his quasi per somnium loquuntur authores. Vide Dioscoridem ca. 69. 70. 71. & 72. lib. 4. Galenum 8. de facultate simplicium. Plinium cap. 31. lib. 21. Paul. lib. 7. Hortense & Halicacabum adstringunt, & in secundo ordine refrigerant.

Sonchos, sunt qui scariolam esse dicunt. Scio apud Hetruscos vocari Circebita. Dioscorides cap. 120. 2. Galen. 8. de facultate simplicium. Paulus li. 7. Adstringit & manifestè refrigerat.

Sparganium hucusque non vidi, etsi ab aliquibus reperta esse dicatur: hoc scio, non esse spatulam foetidam, ut Ruellius, ex cuius succo sanantur scabies & volaticae. Dioscorides capit. 23. 4. Galen. 8. de facultate simplicium. Paulus libro 7. Siccandi vireis habet. Plin. cap. 9. lib. 25.

Spina alba, *λευκή ἀκυνθ*, vulgò bedeguar sicuti Arabice. Sunt qui pro spina alba accipiunt carduum benedictū, alij carduum carlinam dictum, alij alium carduum. Ad-

uerte tamen bedeguar tātū nasci in montibus & syluosis locis. Dioscorid. capit. 12. 3. Gale. 6. de faculta. simplicium. Radix deficcatur & modicè adstringit, semē est tenuis essentiae & calide facultatis.

Spina Arabica, est similis albæ. Ego eam non vidi: hoc scio non eam esse, ut Ruelius putat, spinam arboris acatiæ. Dioscorides cap. 73. 3. Galenus 6. de facultate simpli. Validius adstringit & deficcatur.

Spondylion audiui ab aliquibus esse inuentum: valet epilepsiæ eius fructus & orthopnœæ. Vide Dioscorid. capit. 81. 3. Gale. 8. de facultate simpli. Paulus lib. 7. Constat virtute acris & discussoria.

Stachys, nisi sit marrubium album, nescio quid sit. Dioscorid. cap. 3. 3. Galen. 8. de facultate simplicium. Plin. capit. 15. lib. 24. Paulus lib. 7. 3. In calefaciendō tertium ordinem occupat.

Staete, est styrax liquida. Dioscorid. capit. 64. 1.

Staphys agria, ἀστὰφίς ἀγρία, vulgò strafusano, siue vna seluatica. Dioscorid. capit. 150. 4. Galen. 6. de facultate simplicium.

Stibium & stibi, antimonium est, ut placet Auicennæ & Seraph. Funditur ipse, & omnia metalla facit fluida, ut ferrum. Dioscorid. capit. 53. 5. Galen. 9. de facultate simp.

simplicium. Exiccat & constringit. Plinius capit. 6. lib. 33.

Sthœchas, Arabicè stichados, est res notissima. Vide Mesu. & Dioscorid. capit. 28. 3. Galen. 8. de facultate simplicium. Paul. lib. 7. Aperit, extenuat, detegit & confirmat viscera.

Stœbe nō conuenit cum scabiosa, vt nonnulli affirmarunt, ex cuius decocto sanantur scabies & pulmonis vitia. Dioscorid. de stœbe capit. 13. 4. & Galen. 8. de facult. simplicium. Paul. libro 7. Semen & folia intertio adstringunt.

Styrax, vulgò storace calamita. Dioscorid. capit. 70. primi. Galen. 8. de facultate simplicium. Plini. capit. 25. libro 12. Paulus libro septimo. Calefacit, emollit, & concoquit.

Sycomorus, arbor nostro moro non dissimilis, fructum fert non ramis, sed caudice ficorum grossulis dulciorem. Dioscorid. capit. 148. primi. Galen. 2. de aliment. Theoph. capi. 2. libro 4. Plin. cap. 7. lib. 13. Paul. lib. 7. Fructus nullius nutrimenti, liquor arboris emollit, vulnera conglutinat, & tumores discutit.

Tamarix domestica apud nos non inuenitur. Dioscorid. cap. 101. primi. Galen. cap. ultimo 7. de facultate simplicium. Plin. ca. 21.

lib.13. Paul. lib.7. Incidit, extergit, ita tamen vt manifestè non exiccet, sed adstrictionis particeps sit.

Telephium, est faba crassa, vulgò dicta. Dioscorid. cap. vlti lib.2. Galenus 8. de fac. simplicium. Paul. lib.7. Calefacit in primo, & in secundo desiccatur.

Tamarindi, aliàs dactyli Indi vocantur: vide suprà.

Terebinthus, res est nunc nota, olim quasi incognita recesserat. Nunc eius resina non liquida, sed potius cocta ad nos affertur. Dioscorid. capi. 77. primi, Theophr. capit. 15. tertij. Inuenitur tã masculus, quàm foemina. Galen. 8. de facultate simplicium. Fructus adstrictorium quiddam habet, sed in secundo calefaciunt & desiccant.

Teucrium adhuc non vidi. Plin. ca. 5. lib. 25. duas species teucrij memorat, & secundum habere folia fabæ similia adserit: unde nonnulli id esse voluerunt, quod vulgò dicitur faba grassa. Dioscorid. cap. 102. lib. 3. Galen. 8. de faculta. simpl. Exiccat in tertio, calefacit in secundo.

Thaliætron est secundum Ruellium herba Argentina, quæ folia coriandro similia habet. Dioscorid. capit. 93. quarti. Galen. 6. de facultate simplicium.

Thapsia rarò ad nos affertur. Valet liuidita

ditati carnis cum thure & cera, vt refert Plinius cap. 20. lib. 13. Galenus 6. de facult. simplic. Dioscorides cap. 151. quarti. Theophrastus cap. 22. lib. 9. Est radix vomitoria. Paul. libro 7. Acris est & vehementer cum humiditate calefacit, ex alto attrahit, & attractum discutit.

Thlaspi quid sit, non possum affirmare: nam bursa pastoris multum à thlaspi differt, si quis rationem vtriusque perpendat. Dioscor. cap. 145. secundi. Galen. 6. de facult. simp. Paul. lib. 7. Semen viribus acre, vt intestinorum abscessus potu rumpat.

Thymbra siue Satureia, siue cunila, vulgò Sauorezo siue peuerella, apud Tuscos coniella, pollet ac ipse thymus. Dioscorid. cap. 40. tertij. Plin. cap. 8. lib. 19. & cap. 20. lib. 20. Reperitur domestica & sylvestris: quare non mirum si Columella inter thymbra & Satureiam, diuersitatem posuerit. Paul. lib. 7. Sylvestris præstat, quæ thymus, hortensis vero imbecillior.

Thymus inuenitur albus & niger: at niger iuxta Aetij placitum est malus. Dioscorid. capite 39. tertij. Galen. 6. de facult. simpl. Theophrast. cap. 2. lib. 6. Paul. lib. 7. Calefacit in tertio, & desiccet, & glutinosos humores incidit.

Tithymali genera sunt septem, chara-

rias & myrthites, quę sunt nobis incognita: Paralius verò ab aliquib⁹. cognoscit, & vulgò vocatur herba mora, ex qua pisces moriuntur. Cyparisius est esula minor: dendrodes, à me nunquam visus. Plathyphylos, apud Tuscos dicitur torto maglio. Nota tamē quòd cyparisius vocatur à Mesue alscebram, & ab Auicen. scebram, alscebram verò mezeheregi est pityusa à Dioscorid. Lac eorum depilat oleo in sole inunctum, & ortum tandem prohibet. Dioscorid. capi. 159. 4. Galen. 8. de facultate simplicium. Plin. capit. 8. lib. 26. Paul. lib. 7. Omnes è quarto ordine calefacientium, acrimonię & validę amaritudinis participes.

Tragacantha, vulgò draganti eius gumi vocatur, in Creta & Achaia nascitur. Gale. 8. de facult. simpli. exiccat. Dioscorid. capi. 21. tertij. Plin. cap. 21. lib. 13. Paul. lib. 7. Similes gumi vireis habet.

Tragion quid sit diuinare nescio, sicut etiam de eius secunda specie dicerem, nisi fortè sit pīmpinella, vel saxifragia hircina. Gal. 8. de fac. simp. Diosco. ca. 47. & 48. quarti. Plin. cap. 21. lib. 13. Paul. libro 7. Calidum in tertio, attractorium discutiens.

Tragum nisi sit species iunci, haud etiā scio quid esse possit: nā sine foliis Plin. eam cum minimis ramentis pingit, cap. vltimo
lib

lib. 27. Dioscor. cap. 49. libri quarti.

Tragoriganum, vt placet Leoniceno, in acetariis comeditur, vulgò tragone appellata. Dioscor. cap. 30. tertij. Plin. cap. 17. lib. 20. Galen. 8. de facul. simplic. Paul. libro 7. Vires habet origani, & nonnullam etiam adstrictionem.

Tribulus habet duas species, vt Theophrast. cap. 5. libro 6. quarum vna producit fructum spinosum, cuius radices à multis pro iringo condiuntur, & reuera decipiuntur. Diosc. cap. 16. quarti. Gal. 8. de fac. simp. Plin. cap. 16. lib. 21. Paul. lib. 7. Mediocriter refrigerat, sed terrestris siccando valētior est, aquaticus leuiter humectat.

Trifolium, *τρίφυλλον*, omnibus notum, cuius species apud nos tres enumerantur: prima habet folia rotunda & magna, secunda longa, tertia rotunda & minuta. Plinius cap. 9. libro 21. Scripsit etiam de trifolio acuto Scribonius, & est species trifolij acetosi, & vulgò dicitur Alleluia, siue pan' cuculo. Decipiuntur qui pro andacocha semen trifolij accipiunt: nam andacocha nil aliud est quàm lotus syluestris siue Aegyptius. Galen. 8. de facult. simpl. Diosc. cap. 114. tertij.

Trinitas, herba nota ferè omnib⁹, habet enim folium in tres partes diuisum, simile

foliis cyclaminis cum caelestis flore coloris. Conglutinat vulnera & intestinorum rupturas, & quæ in scrotum descendunt, præsertim si medium huius pulueris cochleare cum vino styptico sumatur.

Tripolium etsi ab aliquibus credatur esse turbit, nihilominus decipiuntur; si quidem nostrum turbit odorem non habet ut tripolium, sed creditur potius turbit nostrum esse alipiam Dioscoridis: sed quum verum tripolium non habeatur, id quod à monte sancti Angeli affertur, esse cortex pityusæ creditur. Dioscorid. cap. 110. quarti. Galen. 8. de facul. simplic. Plin. capite 7. libro 26. Paul. libro 7. Calida radix est in tertio, & acris.

Tubera, Græcè *ὄστρον*, vulgò tartusi, de quibus mentionem facit Plinius capite 2. libro 19. Galen. 2. de facult. alimentorum. non habet, ut ipse inquit, euidentem qualitatem. Auicenn. 2. suorum cap. Componuntur ex terrestri & aquea substantia, & sapore priuantur, generant humorem melancholicum, crassum, & quandoque paralytim, stomachum aggrauant, & male digeruntur. Dioscorid. cap. 134. secundi. Paul. lib. 7. Constant ex terrestri substantia cum modica virtute tenui.

Fussillago, Græcè *βήχιν*, vulgò farfara vel

vel vngula caballina dicitur, nota est: eius fumus prodest tussientibus, vnde nomen accepit. Dioscorides cap. 117. tertij. Galen. 6. de facult. simplic. Paulus. Constat ex calida & aquosa substantia.

Turbit Mesuæ est radix alipia, vt dictum est de Tripolio.

Typha, *τύφη*, vulgò mazza surda, hæc nascitur in aquosis ac palustribus locis. Surda idcirco dicta, quia eius lanugo si aures alicuius ingrediatur, facile ille surdefcit, est nota etiam pueris, quum sæpe illam primò manibus habeant, Diosco. cap. 124. tertij. Theophrast. cap. 13. primi libri. Apud Galenum vel Paulum nulla de hac fit mentio. Plin. cap. 10. lib. 18.

Vmbilicus Veneris, Græcè *κοτυλιδιον*, vocatur apud Tuscos coopertorium. Sunt qui in Lombardia cymbaria quadam pro Veneris vmbilico vtuntur. Dioscorid. cap. 87. quarti. Galen. 7. de facult. simplic. Plin. cap. 2. lib. 5. Paul. lib. 7. Refrigerat, repellit, abstergit, dissipat.

Verbascum, Græcè *φλίμος*, vulgò tasso barbasso, & est omnibus notum. Inuenitur mas & foemina; mas ex foliis strictis, foemina ex latoribus; cæteræ species nondum mihi sunt cognitæ, etsi Ruellius primulam veris esse vnâ phlomi speciem

crediderit, sese profecto decipiens, quum nullibi de eius flore agat Dioscorides. Sucus ex flore huius herbae omnes faciei maculas abstergit. De verbasco loquitur Galenus 8. de facul. simplic. Dioscorid. cap. 99. quarti. Plin. cap. 6. libro 26. Paul. libro 7. Folium omnium siccantem & mediocriter adstringentem vim referunt.

Verbenaca tam recta quam supina, à Græcis περιτρεχάρις dicta, vulgò berbena vocatur, nec virtute hae species inter se differunt, nisi quod altera mas, quæ raris foliis constat, altera foemina magis foliosa. Dioscorides capite 58. & 59. quarti. Plinius capite 9. libro 25. Galen. 8. de facul. simplic. vim habet siccantem.

Vetonica, κίσσος, vulgo notissima est, quæ tot virtutes præ se fert, quot Antiochus, Caesaris Medicus, illi attribuit. Vide Dioscor. cap. 1. quarti. & Gal. 8. de fac. simp. Mundificat renes, pulmonem, pectus, & hep. Plin. cap. 8. lib. 25.

Viola alba, λευκίαν, ex qua unguentum iasminum fit, nota omnibus est, sicuti & viola lutea, quæ à seplasiariis vocatur keiri, de cuius viribus Gal. 7. de facul. simplic. tractat. Dioscor. cap. 129. tertij. Paul. lib. 7. Frutex abstergendi extenuandique vires habet, magis autem flores.

Vitex, Græcè ἄγνος, vulgo agno casto dicitur, & est duplex, albus & niger, maior & minor, vt testatur Plinius capite 9. libro 24. Galenus 6. de facul. simplic. Calidum & siccum est in tertio. Dioscorid. cap. 120. primi.

Vitis alba, Græcè ἀμπελοδόκη, vulgò brionia dicitur, siue zucha saluatica, & est res notissima: vide de eius viribus Dioscoridem capite 179. quarti. Galen. sexto de facultat. simplic. Radix soluit splenis duritiem.

Vitis nigra, siue ἀμπελος μέλαινα, vulgo dicitur vua tamina, & apud Tuscos tamaro, & est res nota. Dioscor. cap. 177. quarti. Plin. cap. 2. lib. 23. Paul. lib. 7. Pollet, sed non ita efficaciter vt alba.

Viticella, quæ ab aliis dicitur momordica, ab aliis balsamina, ab aliis coranzana, inuolucris herba est, florem habens cucumeri similem, à quo postea fructus oritur, ouo gallinæ similis, sed minor satis cū quibusdam veluti acutis spinis viridis existens ante maturationem, & rubens post ipsam maturationē: cuius folia neruorum vulnera conglutinant, & oleū ex infusione, eius fructus vulneribus, apostematibus, & vlceribus mammillarū non solum prodest, sed mirum in modū dolores matricis
per

per clysterem iniectum & hæmorrhoidarum, vulnerum, & apostematum maximè leuat ac tollit, cicatrices extenuat, &c. vt videre poteris iuxta Matthiolum Senensem cap. de vite nigra.

Vitis sylvestris, Græcè ἀμπέλως ἀγρία, omnibus nota: longas enim ex se mittit viticulas, vinum vitis modo ferentes, lignosas & asperas. Folia solatro similia, latiora tamen & longiora, florem ceu musculosum capillum, fructum exiguis vuis similem, radices in aqua decoctæ dantur contra cutem subeuntes aqua, acini vuarum asperam & discolorem cutem, omnesque alias maculas repurgant. Dioscor. cap. 17. quarti, Galen. 6. de facult. simplic. Paulus lib. 7. Germina abstergunt, & non nihil adstringunt.

Vrtica, Græcè ἀνελύφη, res notissima est: vide de eius viribus Dioscoridem capite 89. quarti, & Galen. sexto de facultat. simplic. Plin. capite 5. libro 21. Paul. libro septimo, Tenuem habet substantiam, citra rosionem siccatur, tumores discutit, abstergit, & ventrem subducit.

Xanthion, vulgò lappa minor dicitur, inuenitur in pinguibus locis, & in paludibus per æstatem siccatur: vide Dioscoridem capite 13. quarti. Galen. octauo de facult. simp

simplic. Paul. libro 7. Fructus discutiendi
vires habet.

Xyris, sunt qui eum esse velint vulga-
rem acorum, ego eum nuspiam vidi: scio
tamen ex Galeno, septimo de facultat.
simplic. eius semen est validissimum in pro-
ducenda vrina, & induritie splenis. Dio-
scorid. cap. 24. quarti. Paulus libro 7. Te-
nuis & discussoria & extrahentis est facul-
tatis ac etiam exiccatoria.

Zea nil aliud est, quàm nostra spelta vul-
garis. Dioscorides capite 80. secundi. Plin.
capite octauo, lib. 18. Galenus sexto de fa-
cult. simplic. Paul. libro 7. Viribus tritici
respondet, & medium inter calorem & sic-
citatem obtinet.


Zingiber, res nota est seplasiariis, &
affertur ex Arabia & ex Aegypto, germi-
nat quotannis, folia habens harundini si-
milia. Dioscorides cap. 149. secundi. Gale-
nus sexto de facultat. simplic. Paul. libro 7.
Impense calefacit.


Zedoaria, radix est gingiberi similis,
odoratior tamen & aliquantulum amara,
non autem sic acuta vt gingiber, impin-
guat, flatum discutit, & comesta affert odo-
rem alli, ceparum & vini. Confert etiam
morsibus animalium venenosus, resoluit
apostemata matricis, curat vomitum &
do

dolores colichos : & , vt refert Auicennas,
est theriaca Napelli. Serap. lib. aggr. cap.
Zerumbet. & Auic. lib. 2. Calida & ficca est
in tertio gradu.

Zythum, siue *zydes*, nihil aliud est quàm
potus, qui ex hordeo & frumento paratur,
quemadmodum ceruisia. Vide Dioscori-
dem cap. 79. secundi. Plinium cap. vltimo,
libro 12. Paulum lib. 7. Composita est sub-
stantia, acris enim est & frigidus.

F. I. N. I. S.





INDEX EO-

RVM QVÆ IN LI-

BRIS CONSENSVS

Medicorum, de mor-
bis curandis, con-
tinentur.



AN Absinthij succus magis sto-
macho conferat quàm ipsa
herba pag. 613

Aetas quid 29

Aetates quot sint 30

Aetatum temperamenta quot 30

Aetates an sint plures, quàm quatuor 30

Aetates an possint præfiniri 31

Aetatum doctrina an sit utilis 31

Aetas non dicitur calida vel frigida, nisi
ratione subiecti 32

Aegritudines compositionis quot 68

Alfeniari 329

Alteratricis officium 60

Alteratio corporis quot modis fiat 67

Alteratio duplex 110

Alteratio, concoctio, humorumque præ-
paratio ac digestio quomodo diffe-
rant 111. 112

Xx

I N D E X.

Alteratio per se an sit causa doloris	174
Angina quid sit	454
Anginæ differentia 455. causæ 456. indicia 459. cura 460. conferentia, prognostica 464. an conueniant re- percussiuæ	466
Angina an magis à pituita, quàm à ceteris humoribus fiat	465
An omni anginæ conueniat sectio venæ	466
Anhelitus an sit motus naturalis vel vo- luntarius	497
Anima quomodo à natura distinguatur	11
Animæ sedes vbi	58. 59
Animalis virtus ex motu cognoscitur	59
Appetentia quot modis lædatur	592
Appetitus duplex	593
Appetitus canini causæ 594. signa 595. cura 596. conferentia 599. prognostica 600	
Appetitui canino an semper vinum con- ferat	603
Aperitiua in sputo sanguinis ex retēione menstruorum facto an conferant	521
Apertio quid referat	74. 75
Apoplexiæ species 261. causæ 245 signa 246. cura 250. prognostica 259	
Apoplexia an à calido humore fiat	261
Apoplexia an à simplici frigore fiat	262
Apop	

I N D E X.

Apoplexia fortis an possit sanari	262
Error eorum qui apoplecticum dormire non sinunt	257
Aphtarum causæ 444. indicia & cura	545. 546. 547. prognostica
Arquatus morbus siue aurigo	640
Ars curatoria quotuplex	95
Arteriarum tres dimensiones	85
Arteriæ an tantum moueantur motu pulsus	86
Articularis morbi causæ 840. 842. signa	843. cura 848. prognostica
Asciti an semper incisio conferat	688
Asthma an sit verus morbus pulmonis	497
Asthmatis causæ 489. 490. indicia 492. conferentia 496. cura 493. prognostica	497
Asthmati an conueniant valde soluentia	498
Attractricis officium	60
Auctio	58
Auctrix & nutrix an sint idem	61
Aurium dolor 378. doloris causa 379. indicia 380. cura 382. 383. prognostica	391
Auditum acuentia	364
Auditui nocentia	388
Ausonij epigrâma de intentionibus me-	

I N D E X.

dicorum	235
Azaraius prohibet secari venam in phre-	
nitide	188
B Alneum quid proficiat in ophthal-	
mia	332
Balneum quibus casibus non conueniat	
869	
Batrachi causæ, indicia & cura	358.359
Bgynos	469
Bulimi 601. causæ, signa 602. cura &	
prognostica	603
Bulimus an idē cum appetitu canino	604
Bulimo an cibi crassi conferant	604
C Achexia	666
Cachexia an semper præcedat hydro-	
pem	689
Cacochimia	91
Calculorum renum prognostica	773
Calculi an possint generari à calido tem-	
perato	774
Calculosis dormire super dorsum an no-	
ceat	775
Calidum quot modis dicatur	24
Calidiora membra	176
Calor naturalis & extraneus	852
Calor an accendi possit tantum in spiriti-	
bus	863
Caput lædentia	171
Capilli cur defluant	531
Card	

I N D E X.

Cardiaca passio	551
Catarrho conferentia	477
Cataracta oculorum	360
Causæ salubres & insalubres	67
Causæ morbi quot sint in genere	68
Causæ morborum calidorum	69
Causæ frigidorum & siccorum humorum	69
Causæ morborum an semper conside- randa	71
Cephalæa 138. quem locum occupat 139. signa 143. cura 138. cur dolorem per interualla efficiat	145
Cephalæa & hemicraniæ prognostica	171
Cephalæa an à cephalalgia differat	173
Cepæ cur noceant capiti	199
Cerebri ventriculos respirare	90
Cerebri substantia an possit inflamma- ri	193
Charibitus	92
Chiragra	840
Cibi melancholici	278
Cibandum aliquando in morbi vigore	99
Coitus an valeat in morbis pituitosis	822. 823
Colicæ an in principio conueniant narco- tica	617
Colici doloris causæ 739. signa 742. cu- ra 745. nocentia & conferentia 752.	

I N D E X

prognostica	753
Columella	449
Concoctio duplex 112. præcedit digestio-	
nem 115. an à frigido fiat	116
Concoctio quot modis lædatur	581
Concoctionis corruptæ causæ	580
Concoctionis corruptæ signa 584. cura	
586. prognostica	589. 590
Concoctio an lædatur à siccitate & humi-	
ditate absque aliis qualitatibus	591
Contraria contrariis curantur	74
Conuulsio 284. an sit morbus vel sym-	
ptoma 284. diuisio & causæ 385. an	
sit curabilis 289. quod fieri possit à	
flatu 287. signa 291. cura 293. pro-	
gnostica	302
Conuulsio ex helleboro quomodo intel-	
ligatur	302
Conuulsio ab inanitione an semper mor-	
talis	306
Conuulsio ex repletionem, an à febre sem-	
per curari possit	306
Conuulsio incurabilis	307
Cordialis medicina quot modis dicatur	
559	
Cordi nocentia & conferentia	561
Coriza	468
Corpus fluidum quomodo intelligatur	71
Corpus respirat etiam per venas	90
	Corp

I N D E X.

Corporibus sanis quod nutrimentum	100
Cura singulorum morborum in genere	72
Curationis præcipua intentio	73
D elirium fit interdum non patiente cerebro.	192
Dentes an per se patiantur	435
Dentes an ab aliis ossibus ferant	435
Dentes an possint apostemari	435
Dentium dolor 386. causa 387. signa & cura 430. 431. prognostica.	434
Dentibus nocentia	433
Destillatio quid sit	468
Destillationum causæ 469. indicia 471. cura 472. prognost.	478
Destillationes quæ veræ vocentur	478
Desiderium an sit ex cerebro	822
Diabetis signa, & eius cura 783. 785	
Diabeti conferentia, & eius prognostica	279
Differentiæ partium quatuor	52
Difficultas spirandi an proveniat tantum à læsione spiritalium	497
Digestio 112. duplex 116. an sit humorum alteratio	115
Discordia Avicennæ cum Galeno in cura appetitus canini	597
Diuretica an in principio calculi conveniant	774
Dolor, & eius species	737

INDEX.

Dolor an fiat ab humido tantum	173
Dolor an fiat à solutione continui tantum	173
Dolor aurium 379. causæ 380. indicia 380. cura 182. prognostica	390
Dolor dentium 386. causæ. 387. signa & cura 431. 432. curantia 433. prognostica	434
Dolores dentium an magis caliditate, quam frigiditate fiant	435
Dolor stomachi & eius causæ 605. signa 606. cura 607. conferentia & nocentia 612. prognostica	613
Dolori maximo an semper phlebotomia conferat	614
Dolor colicus, causæ 739. signa 741. cura 745. nocentia & conferentia 752. prognostica	753
Dolor iuncturarum	840
Doloribus iuncturarum conferentia	841
Dysenteria quid & eius causæ	701
Dysenteriae signa 701. cura 704. conferentia 711. prognostica	713
Dysenteria sanguinea an biliosa deterior	715
Dysenteria ab atra bile an semper lethalis	715
Δυσήγία	789
Δυσπνοία, & eius causæ	489
Elem	

I N D E X.

E Lementum physicum & medicum

Elementa quot	15
Elementa hominis	16
Elementorum doctrina an sit utilis	18
Empyema	522
Empyematis signa 525. cura 526. prognostica	530
Empyema an per vstionem vel incisionem curandum	533
Epilepsia an sit morbus vel symptoma	223
Epilepsiam excitantia, curantiaque	154
Epilepsia per consensum an post pubertatem curetur	242
Epilepsia an curetur per omnem mutationem calidi & ficci	242
Epilepsia an habeat cum apoplexia eandem causam & locum affectum	242
Epilepsiae causa immediata an sit vapor absque materia fouente	242
Epulis quid sit	436
Euacuatio quot modis fiat	125
Euacuationi quot requiruntur	126
Euacuatio nimia morbum parit	127
Euacuationes quando non debeant fieri	129
Euacuatio an fieri possit in principio morbi materia non turgente	129
Euacuatio an sit optima, si copia humorum	

X x 5

Exeat	130
Excrementa quandoque partes, quãdoque signa sunt	77
Extremis morbis extrema remedia	109
F acultas triplex	54
Facultas vitalis an naturali sit prior	60
Facultates omnes vbi collocentur	55
Facultates propriæ corporis quot sint	57
Facultates naturales an sint in qualibet corporis parte	60
Facultates an alibi sint, quàm in animato corpore	60
Facultatum cognitio utilis	60
Febris quid & vnde dicatur	852
Febris an sit calida & sicca complexio	862
Febris an diuidatur in morbum & acci- dens	862
Febris ephemeræ causæ, signa & cura	863
864.865	
Febris biliosa	887
Febris ephemera an sit accidentalis	870
Febris hectica an possit per se incipe- re	877
Febris hectica cur difficilis cognitionis & facilis curationis	878
Febris hepiala	927
Febris lipýria	929
Feb	

I N D E X.

Febris quotidiana	903
Febris quartana	908
Febris tertiana notha	896
Febris tertiana pura	886
Febris tertianæ causæ, signa, cura, prognostica	879. 882. 886
Febris tertiana an possit per accessionem de tertio in tertium	901
Febres accidentales	853
Febrium diuissio	854
Febrium causæ in genere	855
Febrium tempora	858
Febrientibus an omnes fructus noceant	901
Febribus an aliquod vinum conueniat	901
Febris sanguinæ genera	915
causæ	917
signa	918
cura	918
prognostica	921
Febris putridæ diuissio & numerus	879.
	883
Febris causton	921
Finis medicinæ	8
Fluxionum differentia	457
Fluxus in apostematis hepatis an mortalis	637
Fluxus vehemens an in principio sit compescendus	715
Fluxus hepatici species	716.
causæ	720.
signa	721.
cura	723.
cōferentia	752.
prognost	

I N D E X.

gnost.	
Fluxui hepatico an conueniant stypti- ca	753
Fluxus hepaticus an requirat tenuem vi- ctum	754
Fluxus hepaticus an sit facilis curatio- nis	754
	755
G eneratio non est simplex naturæ a- ctio	57
Gingiuarum affectus 436. causæ 437. si- gna	438
Gingiuæ cur corrochantur	439
Glaucoma quid	360
Gonagra	840
Gonorrhœa 814. causæ & signa 815. con- ferentia 817. prognostica	818
Gonorrhœa an sit propria passio pudendi vel expultricis facultatis	822
Grauedo	470. 478
Gurgulio	452
Gutturi nocentia	463
H ætica	870
Hemicrania 163. causæ, signa 164. cura	166
Hepatis imbecillitas 614. causæ 615. signa 616. cura 619. conuenientia 621. pro- gnostica	117
Hepati	

I N D I X.

Hepati supercalefacto an conueniat ceru-	
fa	638
Hepatis apostematibus an conferant sty-	
pticiora, quàm in morbis stomachi	157
Hepatis apostemati an conferat sectio ve-	
næ in pede, an in brachio	638
Herniarum species	804. 805
Homo an possit viuere sine cibo vel plu-	
res dies	590. 591
Humidiora membra quæ	108
Humiditas quomodo efficiat dolorem	
	175
Humores quid sint	25. 122
Humores vnde generentur, & quomodo	
	35. 36
Humores mali an possint nutrire	48
Humores calidi & tenues num præpara-	
tione indigeant, antequam euacuentur	
	116
Humores craffi an coquendi & maturan-	
di	116
Hydropis species 672. 673. causæ 674.	
signa 677. curatio	679
Hidropum signa	686
Hydropi tussis an semper mala	687
Hiposarca an deterior ascite	689
I ctericia quid	640
Icterici cur flatuosi non sint	651
	Icter

INDEX.

Entericia ante septimum an semper mala 652

Ilei causæ signa 757. curatio 758. nocentia & conferentia 760. prognostica 761

Ileus an possit generari ex stranguria 762

Ileus an possit curari per fluxum urinae 762

Inflammatio quid sit 337

Inflammationis iecinoris causæ 624. Signa 626. cura 629. prognostica 636

Inflammationi hepatis an conveniat aqua hordeacea 638

Insania quid 310

Iocinorosi qui dicantur 615

Ioxypix quid 788. 797

Ischuriae causæ & signa 798. curatio 800

Ischuriae & stranguriae conferentia 801. prognostica 802

Ischias quid 840

L Ac an possit adhiberi in ophthalmia 355

Lac an phthificis conferat 533

Lapis renum & vesicæ 764

Lapis renum num possit auferri per incisionem 766

Lapidem generantia & curantia 847

Lethargi 195. causæ 197. signa 198. curatio

I N D E X.

tio 201. prognostica	207
Lethargi & phrenitidis discrimen	200
Lethargi & apoplexiæ discrimen	200
Lethargus an fiat primò in cerebro	220
Lethargus an gigni possit à melanco- lia	220
Lethargo an conueniat sectio venæ, si ab humiditate & frigiditate fiat	220
Lethargo an repellentia occipiti adhibean- tur	220
Leuitatis intestinorum causæ 691. signa 693. cura 695. conferentia 698. progno- stica	699
Lienis signa	655
<i>Αντρίξ</i> quid	691
Lienteria num derur, in qua sint semper acidi ructus	700
Linguae bathrachus quid	399
Lippa quid apud Arabes	343
Locus affectus in hæmicrania	163
Locus affectus in lethargo	196
Locus affectus in paralitide	406
Locus affectus in dolore dentium	429
Lotium quid, & eius diuisio	79
Lotium optimum quod	81
Lotium an sit excrementum tantum re- num	82. 83
Lipopsychia & syncopis quid differant	564

Mal

I N D E X.

M Ali habitus 666. signa & cura	668.
669. prognostica	672
Medicina quid	8
Medicamenti purgat. non potest dari cer- ta quantitas	126
Medicamentorum species	132
Melancholia, & eius diuifio	37
Melancholiæ generatio	38
Melancholia, morbus	308
Melancholiæ morbi species 309. causæ 310. signa 316. cura	321
Melâcholia morbus, quomodo differat ab humore melancholico	333
Melancholia confirmata an possit sana- ri.	333
Melancholia per inferiora purganda 325	
Melancholiæ per consensum cura	325
Melancholiam incitantia	329
Melancholiam curantia	329
Melancholici cur fiant epileptici	332
Membra quid sint	34
Membra frigidiora quæ	25
Membra cur sensus impressiorem non re- cipiant	338
Membrorum diuifio	339. 340.
Memoratricis officium	55
Memoria quid	62
Menses prouocantia	831
Mens	

I N D E X.

Menses supprimentia	838
Mensium suppresssionis causæ 826. signa	
827. cura 830. prognostica	731
Mensium profluuij causæ	833
Mensium profluuij, signa, cura 835. pro-	
gnostica	831
Modus cibandi in morbis, an cum aposte-	
mate	186. 187
Modus segregandi lac à sero	325
Modi reuulsionum an sint sex tantum	
174	
Morbus quid sit	62
Morbus regius ante septimum cur ma-	
lus	651
Morbus veteranus	195
Morbi status verè non cognoscitur	99
Morbi comitialis 222. causæ 224. signa	
227. cura 230. prognostica	240
Morbi regij 639. causæ 640. signa 644.	
cura 645. conferentia 698. prognosti-	
ca	651
Morbi omnes an cognosci possint per vri-	
nam	69
Morbi similes & instrumentarij	72
Morbi an cognoscantur, non cognito affe-	
ctu secundum naturam	71
Morborum genera	65
Morborum numerus	72
Morborum astutorum cur non sunt certa	

Y y

I N D E X

præfagia	465
N atura quid sit	111
Natura humana quid	12
Natura quot modis accipiatur	12
Naturalis scientia medico necessaria	10
Nausea quid, & quotuplex	56. 566
Nauseæ causæ	569
Nephritidis causæ 9 20. signa 9 11. curatio	779. prognost. 782
Nervi an oriuntur à corde	306
Nervis an usus calidorum frequens pro-	281
fit	281
Nervis calor quid efficiat	281
Notæ temperaturarum in genere	26
Nutrire in accessiōibus quādoq; licet	107
Nutritio quid sit	49
Nutritioni necessaria quæ	58
Nutrimētum non datur ratione morbi,	98
sed virium	98
Nutrimētum viscosum ac noceat hepa-	638
ti	638
O structio an sit causa missionis san-	123
guinis	123
Oculi an sint complexionis igneæ	358
Oculis an profint stupefacientia	358
Operatio naturalis quibus perficitur	51
Operatio quot modis lædatur	52
Ophthalmia quid	337
Ophthalmiæ species 338. causæ 339. signa	34

I N D E X

3 4 3. cura 3 4 6. localia 3 4 8. nocētia, pro- gnostica	357
Ophthalmia quo modo cognoscitur, lon- gè duratura	358
Orthopnoæ causæ 4 8 9. indicia 4 9 2. cura 4 9 3. conferentia	496
Orthopnoæ an possit fieri absq; febre	497
Ossa etiam apostemantur, teste Auicenn. & quomodo	194
Oxyrhodinum an applicandum in phre- nitide	191
Ozæna quid	424
Ozæna causæ	425
P Alpitationis cordis prognostica	562
Palpitatio & tremor an idem	564
Paraphrenitis unde fieri possit	193
Paralysis 2 6 4. causæ 2 6 6. signa 2 7 0. cu- ra	270
Paralysis generantia 2 7 8. curantia 2 7 8. cur in Paralyti, sensu remanente, solus a- mittatur motus	265
Parotidum causæ & indicia 4 1 9. cura 4 2 1 prognostic.	423
παρίδμια	448
Partes medicinæ quot	9
Peripneumonia & eius causæ 5 0 0. indicia 5 0 2. cura 5 0 4. cōferētia 5 0 6. prog. 5 0 7	
Peripneumonia an fiat per viam flu- xus	508

Y. y. 2

I N D E X.

Peripneumonia cur fiat à pleuritide, & non econuerso	506
Peripneumonia pituitosa an sit biliosa de- terior	508
Peripneumoniæ ab aliis morbis ortæ, an phlebotomia conferat	509
Pharmaca si plura misceantur, an sint eiuf- dem naturæ	130
Pharmaca an proprios humores attra- hant	131
Pharmaca à nutrimento quid differant	132
Pharmacum an omni tempore possit ex- hiberi	132
Pharmaca an indifferenter omnes humo- res purgent	132
Pharmacum assumpto an dormiendum	136
Phrenitidis diuifio & definitio 176. cau- sæ 178. indicia 179. cura 182. pro- gnostica	192
Phrenitis quænam mitior	192
Phrenitis an possit fieri absque febre	193
Phrenitis à sanguine an sit signum exi- tiosum	193
Phrenitidi an frigida conueniant	194
Phthisis 521. causæ 523. indicia 525. cura 526. prognostica.	530
Phthisis an à siccitate per se fiat	533
Phthy	

I N D E X.

Phthysī an abstergentia solum conferat	533
Phthysicis an zuccarum rosaceum recēns conferat	533
Pituita & eius diuisio	38
Pituita quomodo salsa fieri possit	42
Pituita non potest adeò assari, vt nigra euadat	314
Pituita an frigidior atra bile	47
Quomodo ex Pituita sit melancholia	47
Plenitudo ad visa & ad vires	93
Plenitudo an semper indicet de secunda vena	119
Plethora quid, & quotuplex	91
Plethora quomodo curatur	91
Pleuritis quid, & quotuplex 536. cau- sæ 537. indicia 538. cura 541. con- ferentia	547
Pleuritis an à tenui pituita fiat.	549
Pleuritis an deterior in sinistro quàm in dextro latere	549
Podagra quid	840
Polipus quid 423. causæ & cura	425
Polypum & ozænas curantia	427
Polypi & ozænx prognost.	428
Potentia quid	53
Præparatio an sit idem cum digestione & decoctione	116
Præparatio quot modis fiat	118

Y y 3

I N D E X.

Propriapismus quid, & eius causæ	818.
cura	820
Proposium artis medicæ est sanitas	8
Principium & elementum an idem	10
Pubertas quot annis duret	240
Pubertatis tempus	30
Pulsus diuisio 85. vehemens 85. plenus,	
vacuus	87
Pulsus ex temperie & ætate	87
Pulsus ex anni temporibus & regione	88
Pulsus virorum & fœminarum discrimen	88
Pulsus ex somno & vigilia	89
Pulsuum genera	89
Pulsus an dilatetur ex repletione	89
Pulmo an sit instrumentum anhelitus proprium	497
Pulmo an ulcerari possit ab humido tantum	533
Purgatio quid sit	126
Purgatio an non indigentibus proficiat	132
Purgare an liceat in die critica	132
Purgatio cur difficillis sub cane	136
Quid vitandum in purgantibus medicamentis	136
Qui apti non sunt ad purgandum	128

Putre

Putredo an sit causa mittendi sanguinem 124

Qualitates duæ an sint in elementis 181

Quartanæ causæ & signa 909. cura 911. prognostica 914

Quatuor tempora an reperiantur in omni morbo 861

Quot modis dicatur aliquid frigidum vel calidum 24

Quomodo ex pituita fieri possit melancholia 47

Quomodo aliquid per se per consensum affici cognoscatur 295

Quotidiana febris quæ, & eius causæ 903

Quotidianæ febris signa 904

Quotidianæ simplicis cura 907

Ramicum species 806. causæ 807. signa & cura 808. prognostica 813

Ranunculus quid sit 441

Ratiocinatricis officium 56

Ratio diuersitatis febrium quæ 882

Raucedo 468

Reficientia an præcedere debeant stiptica in syncopi 531

Regio consideranda in temperaturis 27

I N D E X.

Renum & vesicæ calculi	763.	causæ	764.
signa	766.	cura	768
Repletio duplex			92
Repletio nimia quid agat			92
Resolutio an fiat tantum sensu omisso			280
Reuulsionum modi			175
Risus an possit esse in melancholia			328
Robur sanis seruandum vel augendum			92
S anguis quid, & eius diuisio			37
S anguis unde accipiat suum colorem			38
Sanguinis sedes			38
Sanguis syncerus in venis non reperitur			48
Sanguis quot modis inutilis			49
Sanguis spumofus an semper indicium affecti pulmonis			520
Sanguinis missio etiam in vigesima die fieri potest			49
Sanguinis missio an tantum manè fieri debeat			123
Sanguinis missio an visum hebetet			124
Sanguinis missio an semper in plenitudi- ne fiat			124
Sanguinis mittendi scopus			123
Sanguinis reiectatio per superiora an sem- per			

I N D E X.

per mala	520
Sanitas quid sit	62
Sanitatis cognitio an medico necessa- ria	71
Sanitati quæ requiruntur	63
Sciatica quid	893
Scotomaticus affectus an suffusionibus o- culorum differat	122
Sectio an omni pleuritidi conueniat	194
Sectio venæ an omni ophthalmiæ conue- niat	358
Sedimentum vrinæ, an semper bonum si- gnum.	83
Senes quandoque sectionem venæ perfe- runt	121
Senum temperies	31
Sicciora membra quæ	25
Signa optimæ temperaturæ	28
Signa morborum in genere	76
Signorum alia diuisio	77
Signa per vrinam an certiora, quàm per pulsus	89
Signa vniuscuiusque humoris	85
Somnus quomodo malus	207
Sonitus aurium 401. causæ 402. signa 403. cura 405. curantia	407
Spasmus	283
Spiratio omnis an deficiat in apople-	

Yy 5

INDEX.

xix	261
Splenis affectus cura	660
Splenis humores an educi possint per vias vrinae	664
Splenis omni duritiæ an conferat omne lat	665
Sputi sanguinis cura	513
Status morbi quomodo cognoscitur	860
Sternutamentum an sit in distillatione sa- lubre	480
Strangulatio quid	454
Strangulatio an possit fieri ex inflamma- tione asperæ arteriæ	467
Stranguria quid	789
Stranguria cuius facultatis symptoma	791
Stranguriæ prognostica	796
Subuersio	570
Sudor in lethargo deiecit vires	207
Suffusionis causæ 362. signa 365. cura 368. obseruationes 374. prognosti- ca 376	376
Suffusio omnis an per chyrurgiam possit curari	377
Surditas quomodo à graui auditu differt 378. causæ 379. signa 380. cura 382. prognostica	417
Συνοχη quid	454
Syncope 552. prognostica 562. indicia	554.

I N D E X.

554. cura	558
Syncopa frequenter accidens an sit signum mortale	564
Singultus non desinens quid significet	577
T Abes quid sit	521
Tabis species	522
Tabidis conferentia	529
Tactus solus indicat temperiem	28
<i>Tapáxis</i> quid	338
Temperies quid, & quotuplex	1920
Theriaca an venenosa & non exhibenda	763
Tinesmi curatio	733
Tinnitus aurium	492
Tonfillarum cura.	452
Tremor in paralitide cur bonus	281
Tremoris cordis cura	556
Tumores an fieri possint in gutture absque dolore	466
Tussis curatio	483
In omni tussi sicca, num conueniant pilula bechicæ	487
Tussis in hydropo an sit signum malum	689
Tympanites an à frigido fiat	688
V Acuatio quot de causis fiat in principio morbi	150
Venæ sectio quo tempore fieri debeat	119
Venæ	

I N D E X.

Venæ sect. an vsque ad syncopem facien- da	120
Qui multam & paucam venæ sectionem expostulant	120
Venæ sectionem quandoque senes perfe- runt	121
Vertigo quid	208
Vertigo per consensum an attribuenda ca- piti	220
Vertigo omnis an per sectionem arteriæ curanda.	220
Victus ratio à quibus sumitur 97. vt in- stituenda	98
Victus ratio per ætates.	102
Victus ratio ex temporibus anni	103
Victus plenus	107
Vinum cur in paralyfi non concedatur	272
Vinum an in syncopi exhibendum	564
Visio an fiat extra mittendo	358
Vlcus aurium	391
Vlcera aurium mundificantia	399
Vlcerum brevis Galeni cura	398
Vomitus an semper possit prouocari	579
Vrina aquosa	184
Vrinæ retentio	798
Vrinæ stillicidium & causæ	798
Vrinæ stillicidij cura	794
Vrinæ	

I N D E X.

Vrinæ in voluntario exitui conferentia

805

Vrinæ Incontinentia, & eius causæ 803.

signa & cura

805

Vrinæ sedimentum an semper bonum

83

F I N I S.

121
Vltima de voluente etiam delectat
et delectat etiam delectat etiam
etiam delectat etiam delectat etiam
etiam delectat etiam delectat etiam

121

EXC
121

EVGDVNI,
EXCVDEBAT
IACOBVS
FORVS.

EXCERPTA
JACOBI
FORG

